



RHÉANTINE LUMIÈRE

Przeciwgonokokowa,



doustna szczepionka wielowar-
tościowa w pigułkach,
uzupełniona szczepami po-
branymi w Polsce.

WSKAZANIA:

Rzeczączka i wszelkie jej powikłania.

Leczenie przyczynowe, swoiste, absolutnie pewne i dogodne.

DAWKOWANIE. 4 pigułki dziennie: 2 rano i 2 wieczorem, na godzinę przed jedzeniem.

Flakon zawiera 32 pigułki kleratynowane.

Skład główny L. NASIEROWSKI, Warszawa, ul. Kaliska 9, tel. 924-39, 930-42

W KILE, DURACH I ZIMNICY

do stosowania śródmięśniowo:

„QUINBY SOLUBLE”

SOLUTIO AQUOSA

CHININI-JODO-BISMUTICI

Bezbarwny, nie plami, nie tłuszczy, nie drażni.



„Q U I N B Y”

EMULSIO OLEOSA

CHININI-JODO-BISMUTICI



Anyżowane ziarenka węgla topolowego z benzynaftolem i kwasem będzwinowym.

NADMIERNA FERMENTACJA JELITOWA, ZAPARCIE NAWYKOWE,
ZATRUCIA POKARMOWE, BĘDNICA.

1 do 2 łyżeczek od herbaty wieczorem po jedzeniu, lub przed snem. Połykać nie rozgryzając.



Jedynе połączenie arsenu, strychniny, żelaza, fosforu z FLUOREM.

NEURASTENJA, PRZEMĘCZENIE UMYSŁOWE, REKONWALESCENCJA,
GRUŻLICA POCZĄTKOWA.

3 razy dziennie po 1 do 2 drażetek po jedzeniu. 1 do 2 ampulek dziennie podskórnice, lub śródmięśniowo.

HÉMOPLASE

Lumière


CAŁKOWITY WYCIĄG Z KRWI BARANIEJ,
ZWIERZĄT NAJBARDZIEJ ODPORNÝCH NA GRUŻLICĘ,

Dzięki specjalnej metodzie przygotowania, HÉMOPLASE zawiera w stanie niezmienionym, biologicznie czynnym: **oxyhemoglobinę, lipoidy związku fosforowe, zczyny krwinek, surowicę krwi.**

Działanie HÉMOPLASE polega jednak nietylko na ilościowym wzbogacaniu ustroju składnikami leku, lecz na **pobudzaniu szpiku kostnego do tworzenia ciałek czerwonych.**

WSKAZANIA:

**GRUŻLICA,
ANEMJA,
BLEDNICA,
REKONWALESCENCJA,
CHŁAĆTWO,
KRWOTOKI I STANY
PO KRWOTOKACH.**



Postaci:

HÉMOPLASE AMPOULES à 10 cc. i à 5 cc.; Niezawodny, nawet w przypadkach **najuporczywszych.**

(Domieślnowo)

DAWKOWANIE: Dorośli. 2 lub 3 wstrzyknięcia po cc.; tygodniowo; Dzieci od 5—8 lat — 2 razy tygodniowo po 2 cc.; od 8—13 lat — 2 razy tygodniowo po 5 do 10 cc.

HÉMOPLASE DRAGÉS.

DAWKOWANIE: 6—10 drażetek dziennie podczas jedzenia.

HÉMOPLASE GRANULE. postać ziarnista (z cukrem i wanilią)
SPECJALNIE DLA DZIECI)

DAWKOWANIE:

Dzieci od 2—6 lat: 1—3 łyż. dziennie, od 6—12 lat: 3—4 łyż. dziennie podczas jedzenia.



Skład główny L. NASIEROWSKI Warszawa, ul. Kaliska 9, tel. 924-39, 930-42

Próby i literatura na żądanie WPP. lekarzy.