

HYPOTAN

TABLETKI

poходna choliny w połączeniu z chloralem


ROZSZERZA TĘTNICZKI I UŚMIERZA SKURCZE NA-
CZYNIOWE

POPRAWIA KRĄŻENIE KRWI, USUWA DOLEGLIWOŚCI
PODMIOTOWE, OBNIŻA CIŚNIENIE

NIE MA SZKODLIWEGO DZIAŁANIA NA SERCE, WĄ-
TROBĘ LUB NERKI

CHEM. FARM. ZAKŁADY L. NASIEROWSKI, WARSZAWA 22, KALISKA 9.

CARBO TISSOT



*anyżowane ziarenka węgla topolowego z naftolem i kwasem
będźwinowym*

NADMIERNA FERMENTACJA JELITOWA, ZAPARCIA
NAWYKOWE, ZATRUCIA POKARMOWE, BĘBNICA

DAWKOWANIE

*1 do 2 łyżeczek od herbaty wieczorem po jedzeniu lub przed
snem. Połykać nie rozgryzając!*

NERVOCITHIN



AMPULKI: *strychnina, żelazo, arsen, fosfor i fluor.*

DRAŻETKI: *żelazo, arsen, fosfor, mangan i fluor*

NEURASTENIA, PRZEMĘCZENIE UMYSŁOWE, RE-
KONWALESCENCJA, GRUŻLICA POCZĄTKOWA

*3 razy dziennie po 1 do 3 drażetek po jedzeniu wzgl. 1 do 2
ampulek dziennie podskórnice lub śródmięśniowo*

CHEM. FARM. ZAKŁADY L. NASIEROWSKI, WARSZAWA 22, KALISKA 9

PHOSPHACID

WZMACNIA ORGANIZM

WYZWAŁA JEGO SIŁY OBRONNE

LECZY NIEDOTLENIONYMI

ZWIĄZKAMI FOSFORO - WAPNIOWYMI

PRZEMĘCZENIE FIZYCZNE I UMYSŁOWE


STANY OGÓLNEJ NIEDOMOZI USTROJU

GRUŻLICĘ CHIRURG. I GRUŻLICĘ PŁUC

DAWKOWANIE PODANE W LITERATURZE



AMPULKI



KROPLE



T E N E B R Y L

Dwujodo-metano-sulfonian sodu (68,6% J)

**NAJLEPSZY ŚRODEK KONTRASTUJĄCY
DO BADAŃ RENTGENOLOGICZNYCH**

40% ROZTWORY TENEBRYL AMPUŁKI


<i>urografia dożylna u dorosłych</i>	<i>20 cm³</i>
<i>urografia dożylna u dzieci</i>	<i>5 cm³ i 10 cm³</i>
<i>arteriografia</i>	<i>10 cm³</i>
<i>arthrografia</i>	<i>5 cm³</i>

20% ROZTWORY TENEBRYL AMPUŁKI

pyelografia wstępująca

L. NASIEROWSKI

Chem. farm. zakłady, Warszawa 22, Kaliska 9.



PEPTICOL



ZESPÓŁ WIELOWARTOŚCIOWYCH PEPTONÓW Z MIĘSA
RYB, JAJ, MLEKA I ZBOŻA W STANIE PŁYNNYM



CHRONI PRZED WSTRZĄSEM ANAFILAKTYCZNYM,
ODCZULĄ USTRÓJ, LECZY ZABURZENIA W TRAWIENIU,
ODDYCHANIU I KRAŻENIU, SCHORZENIA UKŁADU
NERWOWEGO I DERMATOZY NA TLE ANAFILAKSJI



DAWKOWANIE: 1 — 2 łyż. od herbaty 3 razy dziennie (dzieci
połowę dawki) na 15 min. przed jedzeniem w wodzie gazowanej
CHEM. FARM. ZAKŁ. PRZEM. HANDL. L. NASIEROWSKI,
Warszawa, Kaliska 2

