

# Za najskuteczniejszą metodę leczenia rzerzączki

uchodzi dotychczas kombinowana metoda t. j. taka, która obok nieodzownego leczenia miejscowego wymaga bezwzględnie wewnętrznego środka przeciwrzerzączkowego.

Przy wewnętrznym leczeniu rzerzączki cieszy się największym uznaniem

# ARHOVINA

(środek niebalsamiczny)

(sporządzony wedle własnej metody z difenylaminu, tymolu i etylbenzoatu.)

## Działanie ARHOVINY

1. ARHOVINA podnosi kwasotę moczu i przyczynia się do jego wyjaśnienia.
2. Zmniejsza wydzielinę i działa hamująco na rozwój bakterii spec. rzerzączkowych.
3. Działa znieczulająco na okolicę moczopłciową; usuwa pieczenie przy oddawaniu moczu i bolesne wzwody prącia.

## Zalety ARHOVINY

w porównaniu ze środkami balsamicznymi.

1. Bóle, spowodowane leczeniem miejscowym uśmierza ARHOVINA.
2. ARHOVINA sprawia, że błona śluzowa przewodu moczopłciowego staje się mniej podatną dla rozwoju dwoinek tryprowych i chroni przed przeniesieniem się sprawy chorobowej na tylną część cewki moczowej, przez co unika się powikłań.
3. Cały szereg autorów odniósł wrażenie, że przy stosowaniu ARHOVINY występowały rzadziej rzerzączkowe zapalenia stawów i wsierdzia.
4. Stan ogólny chorych podnosi się, przy stosowaniu ARHOVINY, wskutek wyłączenia bolesnych przypadłości, przez co zwiększa się zdolność do pracy.
5. Niemily a przy stosowaniu środków balsamicznych występujący halor ex ore (który zdradza cierpienie chorego), nie objawia się nawet przy stosowaniu największych dawek ARHOVINY.
6. ARHOVINEJ można stosować zawsze, nawet przy słabym żołądku, któremu inne środki lecznicze zaszkodziły.
7. ARHOVINA nie powoduje zadrażnienia nerek nawet przy tygodniami trwającym stosowaniu największej dawki (6 razy dziennie po dwie pastylki).

### WSKAZANIA:

Urethritis gonorrhoeica anterior et posterior acuta et chronica, prostatitis acuta et chronica.

Cystitis et pyelitis gonorrhoeica et nongonorrhoeica.

Endometritis, Colpitis, Vulvitis gonorrhoeica.



### SPOSÓB STOSOWANIA:

Rp. 1 pud. oryg. pigulek arhov. (à 0,25 g.) à 30 sztuk = 2 M.  
1 pud. oryg. pigulek arhov. (à 0,25 g.) à 50 sztuk = 3 M.  
1 pud. oryg. pigulek arhov. (à 0,25 g.) à 15 sztuk = 1 M.  
(dla kas chorych)

Dawkowanie: 3-6 razy dziennie jedną lub dwie pigułki.

Wielu urologów i ginekologów zapisuje chętnie ARHOVINEJ na zewnątrz, dla większej wygody chorych.

#### 1. Pałeczki arhoviny (à 0,05 g.)

1 pud. oryg. a 10 szt. = 1.50 M.

1 pud. oryg. a 20 szt. = 2.50 M.

(2-3 razy dziennie 1 sztukę wprowadzić do męskiej lub żeńskiej cewki.)

#### 2. Kulki arhoviny (à 0,1 g.)

1 pud. oryg. a 10 szt. = 1.50 M.

1 pud. oryg. a 20 szt. = 2.50 M.

(2-3 razy dziennie 1 sztukę wprowadzić do pochwy lub do kiszki.)

#### 3. Czopki arhoviny:

12 szt. a 0.15 = 3.00 M.

3-4 razy dziennie 1 sztukę

prowadzić (dla kiszki stolcowej).

#### 4. Do wstrzykiwań.

Rp. Arhovin 2-5.00

Ol. Olivar ad 100,-

S. 2-4 razy dziennie strzykawką (podobnie jak zastrzykiwania w roztworze wodnym).

Wyczerpujące piśmiennictwo i próbki do usług Pp. Lekarzy.

Chemische Fabrik Goedecke & Co. Lipski Berlin N. 4.