www.dlibrary.com.pl

Allgemeine Geschichte der Pflanzengifte,

entworfen

von

Johann Friedrich Gmelin,

der Weltweisheit und Arzneikunde Doktorn, dieser öffentlichen und ordentlichen Lehrer auf der hohen Schule zu Göttingen, Königlich Grosbritannischen Hofrath, Mitgliede der Römisch Kaiserlichen Akademie der Naturforscher, der Russisch Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, der Königlich Grosbritannischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, und mehrerer anderer Akademien und gelehrten Gesellschaften, Vorstehern der physikalischen zu Göttingen.



BIBL. SZPIT. DZIEC. IM. GEBETHNOWA BAUMANOWA
658

Zweite vermehrte Auflage.

Nürnberg,
in der Raspeschen Buchhandlung 1803.

www.dlibra.wum.edu.pl

Vorrede.

Der Gang der Wissenschaften, mit welchen die Lehre von den Giften in Verbindung steht, wird es leicht begreiflich machen, daß auch diese im Jahre 1777 zuerst erschienene Geschichte der Pflanzengifte nach einem Zeitraume von beinahe sechs und zwanzig Jahren mancher Berichtigungen, Verbesserungen und Zusäze bedarf.

Zwar haben mich die Einwürfe des Herrn Ackermann und des nun verstorbenen Puhn gegen meine Bestimmung des Giftes und die Eintheilung und Aufzählung der Pflanzengifte, ob sie gleich zum Theil Mängel betreffen, die ich sehr wohl fühle, und schon damals fühlte, nicht bewogen, mich gänzlich nach ihren Vorschlägen zu richten, weil ich sie eben so mangelhaft fand.

Auch halte ich die chemische Beschaffenheit der giftigen Pflanzen, und die Natur der Bestandtheile, worauf ihre Kraft beruht, so wie ihre Wirkungsart auf den lebendigen Leib, bei allem Lichte unsers Zeitalters, noch nicht durchaus so deutlich aus einander gesezt, daß ich jezt schon eine Eintheilung der Pflanzengifte und eine zuverläßige Erklärung ihrer Wirkungsart darauf zu gründen wagte. Und da es mir überhaupt mehr darum zu thun war, dem Leser Thatsachen vorzulegen, aus welchen er die Natur dieser Gifte selbst beurtheilen konnte, so

www.dlibra.wum.edu.pl

habe ich sie, ohne auf eines der neuen Systeme Rükſicht zu nehmen, erzählt, auch, weil ich es bei meinem Zwecke für überflüſſig und ſelbſt für ſchädlich hielt, für Gegenſtände und Begriffe, die in der Sprache des gemeinen Lebens oder der bisher unter den Aerzten eingeführten allgemein verſtändlichen Sprache deutlich und beſtimmt genug ausgedrükt werden können, neue Worte zu gebrauchen, mich auch der neuen Kunſtſprache nicht bedient.

Da ich die wenigſten der Thatſachen, welche ich hier erzähle, ſelbſt zu beobachten, Gelegenheit hatte, ſo habe ich die Männer, auf deren Treue und Glauben ich ſie mittheile, genannt, die Stellen ihrer Schriften, wo ſie vorkommen, angezeigt, und hier und da wohl ihre eigene Worte angeführt: dieſe Sitte zu befolgen, dünkte mir um deſto nöthiger, weil wirklich nicht alle hier aufgenommene Beobachtungen, insbeſondere ſolche, die aus den Alten entlehnt ſind, von welchen wir nicht immer mit ſolcher Zuverläſſigkeit wiſſen, daß ſie unter dem vorgeſezten Namen dieſe oder jene Pflanze verſtanden haben, von gleichem Gewichte ſind, und manche Bemerkungen, die ich nach dem Vorgange Puhn's, um dieſes Werk deſto vollſtändiger zu machen, eingerükt habe, ohne nähere Beſchreibung der Zufälle, welche ſie erregen, ohne Erzählungen von Fällen, in welchen ſie ihre tödliche Wirkſamkeit an Menſchen geäuſert haben, hier aufgezeichnet ſind. So kann der nicht gänzlich ununterrichtete Leſer deſto leichter von dem Werthe dieſer Wahrnehmungen urtheilen, und oft ſchon aus meinen Aeuſerungen errathen, welchen ich ihnen beilege.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ungeachtet ich aber weit mehrere Gewächse unter die giftigen aufgenommen habe, als in der ersten Ausgabe, so wird mir doch noch mancher Arzt den Vorwurf machen, daß ich Pflanzengifte übersehen habe. Viele Körper, welche selbst der gewissenhafteste Arzt täglich als Heilmittel gebraucht, können allerdings in der Hand eines unbedachtsamen, unwissenden oder tollkühnen Afterarztes den Tod bringen; aber sie deswegen unter die Gifte zu zählen, wäre wohl eben so ungerecht, als den ätzenden Sublimat aus dieser Liste auszustreichen, weil er einmal, einem venerischen Mädchen in einem Tage zu acht Granen mit Wasser gegeben, ihm keine andere Ungelegenheit machte, als daß es davon öfters, als gewöhnlich, zu Stuhle gieng; oder Kartoffeln oder Branntwein unter die Gifte zu rechnen, weil jene, in solchem Uebermase genossen, daß der Magen davon borstete, den Tod brachten, und dieser, unter mancherlei Gestalten und Namen, von Kranken und Gesunden in zu grofer Menge auf einmal getrunken, tödliche Schlagflüsse a), oder sonst durch öftern und wiederholten Genus andere gefährliche Zufälle, schleichende und auszehrende Fieber, Wassersucht u. dgl. erregt, oder Bezoarstein, Perlen, Perlmutter, Korallen u. dgl., die der altmodische Arzt in Faulfiebern verordnet, diesen gefährlichen Körpern zuzugesellen, weil während ihres Gebrauchs, der das schnell fortschreitende Uebel nicht hemmen konnte, der Kranke der Last desselbigen unterlag.

---

a) Ein fürchterliches Beispiel dieser Art an einem Wächter hat J. G. Zimmermann in seinem Leben des Herrn v. Haller, Zürich 1755. 8. S. 24. aufgezeichnet.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sollte aber nicht vielleicht Kampfer, der, innerlich genommen, nicht nur Vögel, Kazen und sogar Frösche b) tödtet, sondern auch zu einem halben Quintchen und darüber verschlukt, Menschen den Kopf einnimmt, Ekel, Sinnlosigkeit, anfangende Wut, starke Hize und Zukungen, und in noch stärkern Gewichten allgemeine Kälte und Erblassen erregt c); sollte nicht höchst reiner Weingeist, der die meisten thierischen Säfte plözlich gerinnen macht, auf der Zunge, wie Feuer brennt, und bei Hunden und andern Thieren, wenn er ihnen in die Adern gesprüzt wird, Zittern, Zukungen, Herzklopfen, Engbrüstigkeit, und zuweilen den Tod erregt d); sollten nicht die scharfen, flüchtigen Oele, z. B. Anisöl e), Terpentinöl, Sevenbaumöl f), welche zu einem Skrupel bis zu einem Quintchen verschlukt, bei Tauben und Kazen Zittern, Zukungen, Betäubung, Unempfindlichkeit, Schlummer, Lähmung, und zuweilen den Tod verursachten, eher unter den Giften eine Stelle verdienen? Noch ist jedoch kein Beispiel bekannt, daß sie bei Menschen tödliche Wirkung geäusert hätten, und schon ihr starker durchdringender Geruch warnt vor ihrem Gebrauche in Gaben, welche solche Folgen veranlassen könnten.

---

b) Menghini Comment. Bononiens. B. IV. S. 139. u. f.

c) Alexander medicinische Versuche und Erfahrungen aus dem englischen übersezt. Leipzig 1773. 8. S. 96. u. f.

d) 1) Philosophical Transactions. B. XXVII. n. 335. S. 496. 497. 2) Sprögel a. a. O. S. 76. u. f. §. 39. Exp. 48—50.

e) Hillefeld a. a. O. S. 372c.

f) Ebenders. a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Versuche, welche man an Thieren angestellt hat, um die wahre Beschaffenheit und Wirkungsart der Gifte zu bestimmen, habe ich, vornemlich in Ermangelung zuverläßiger Beobachtungen und Erfahrungen, die man an Menschen gemacht hat, aufgeführt, ohne jedoch in den daraus gezogenen Folgerungen den Unterschied des körperlichen Baus, und insbesondere der Verdauungswerkzeuge, aus den Augen zu verlieren.

Eben so gilt auch der Widerwille des Viehes gegen gewisse Gewächse an sich allein nie für einen sichern Beweis ihrer giftigen Beschaffenheit. Denn, so wie Horn- und Wollvieh manches Arzneigewächs nicht frißt, so läßt die Schweizerkuh auf ihrer fetten Bergweide manche Pflanze stehen, welche der norwegische Ochs auf seiner magern Trift nicht verachtet; er kann nur auf die Vermuthung leiten, nur in Verbindung mit andern etwas beweisen.

Auch wird es immer in den meisten Fällen dieser Art schwer sein, blos aus den Zufällen zu errathen, ob der Kranke an den Folgen eines scharfen Pflanzengiftes oder eines mineralischen leide, und noch schwerer, daraus genau die Art des Pflanzengiftes zu bestimmen; gemeiniglich werden andere Umstände mehr Aufschlus geben.

Ueberhaupt sind auch in diesem Theile des menschlichen Wissens noch manche Lüken, die nur durch mehrere und genauere Beobachtungen ausgefüllt werden können.

Die Hauptabtheilungen dieser Gifte habe ich nach ihrer Uebereinstimmung in ihrer Wirkung und Wirkungsart gemacht; einmal um nicht genöthigt zu sein, die Er-

www.dlibra.wum.edu.pl

zählung der Zufälle, welche sie veranlassen, so oft zu wiederholen, und dann, um die Heilart desto umständlicher zu beschreiben und desto genauer zu bestimmen. Begreifen aber diese Abtheilungen zu viele Arten unter sich, so theile ich sie wieder, um ihre Kenntnis desto mehr zu erleichtern, nach botanischen Aehnlichkeiten in mehrere Abschnitte.

Die Beschreibungen der Pflanzen habe ich so genau und faslich zu machen gesucht, als es nur immer die Natur der Sache zulies, den Arzneigebrauch bei den meisten nur kurz berührt, auch ihren übrigen Nuzen nur mit wenigen Worten angezeigt, wohl aber, um sie noch kenntlicher zu machen, auf eine gute Abbildung verwiesen.

Bei der vollkommenen Kenntnis, welche wir inzwischen von den Schwämmen erlangt haben, ist es mir auch möglich gewesen, mehrere giftige nach ihrer Art zu bestimmen und anzugeben; da inzwischen manche Aerzte, selbst einige neuere, Beobachtungen über die giftige Wirksamkeit von Schwämmen geliefert haben, ohne eine genaue und deutliche Beschreibung der Art nach ihren äusern Merkmalen beizufügen, so stund es nicht in meiner Macht, alle diese Beobachtungen unter bestimmte Arten zu bringen.

Göttingen,
den 16ten Februar 1803.

www.dlibra.wum.edu.pl

Innhalt.

Seite

Einleitung. - - - - - 1—136

Nuzen der Lehre von den Giften. - - 1—22

Begriff und Namen des Giftes, und der Lehre von Giften. - - - - 22—32

Mittel, Gift und Vergiftung zu erkennen. - 32-69

Geschichte der Lehre von den Giften und ihres Misbrauchs. - - - - 69-84

Schriftsteller, die sich insbesondere damit beschäftigten. - - - 85-96

Verwahrungsmittel gegen Gifte und ihre Wirkung. 96-134

Eintheilung der Gifte. - - - 134-136

Eintheilung der Pflanzengifte. - - - 136

I) Ausdünstungen von Pflanzen und andere der Luft ahnliche Stoffe aus ihnen. - 136-162

α) Merkmale solcher schädlichen Gasarten und Dämpfe. - - - 151-156

β) Rettungsmittel dagegen. - - 156-162

II) Andere giftige Pflanzentheile und Pflanzen. 162-816

*) Schriftsteller von Pflanzengiften insbesondere. - - - 162-167

**) Eintheilung dieser Pflanzengifte. - 167

a) Natürliche Pflanzengifte. - 168-780

*) Allgemeine Merkmale. 168-177

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite

α) innere. - - - - 178-665

1) scharfe - - - - 179-393

*) besondere Merkmale - - 179-181

**) besondere Rettungsmittel - 182-186

a) Gurkenarten. - - 186-190

b) Zwiebelgewächse. - - 190-209

c) Personatae. - - 209-227

d) Hundswinden. Contortae. 227-244

e) Doldengewächse. - 244-258

f) Dem Hahnenfus nahe kommende. 258-274

g) Hahnenfusarten. - 274-304

h) Wolfsmilcharten. - 304-328

i) Hülsengewächse. - - 329. 330

k) Pflanzen mit einfacher Blumendeke. - - - 331-353

l) Bäume und Stauden. - 354-393

2) betäubende - - - 394-508

*) ihre Wirkungen und Merkmale 394-397

**) die Rettungsmittel dagegen - 397-399

***) Zauberkräuter - - 399. 400

****) Gifttränke. - - 400-402

*****) Liebestränke - - - 403

a) Nachtschatten - - 404-455

b) Rauhblätterichte Gewächse 455-457

c) Personatae - - 457-461

d) Kressen - - - 461

e) Zwiebelgewächse - 461-462

f) Porstarten - - 462-468

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite

g) Hülsengewächse - - 468-471
h) Gewächse mit vielen Staubfäden. 471-475
i) Gräser - - - 475-487
k) Gewächse mit Blumen ohne Krone. - - - 487-503
l) Gewächse mit zusammengesezter Krone - - - 503
m) Bäume und Stauden - 504-508

3) scharf und betäubend zugleich - 509-658

*) Merkmale und Wirkungen - 509-511
a) Bäume und Stauden 512-523
b) Nachtschatten - - 523-562
c) Doldengewächse - 562-619
d) Pflanzen mit vielen Staubfäden in jeder Blume - 619-624
e) Pflanzen mit einfacher Blumendeke - - 624-630
f) Schwämme - - 632-658

4) lähmende - - - 659-661

5) auszehrende - - - 662-665

β) äusere, die nur wenn sie durch eine Wunde unmittelbar mit dem Blute vermischt werden, schaden - - 666-680

*) Pfeilgifte - - - 668-672

γ) Gifte die sowohl verschlukt, als in Wunden beigebracht, schaden - 681-780
a) scharfe - - - 682-731
b) betäubende - - 732-780

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite

b) Widernatürliche – – – 781-807
*) Krankheiten des Getreides und Mehls 781-801
**) anderer esbaren Gewächse – 801-804
***) Verderben von Oel und Fett 804. 805
****) faulende Gewächse, und dergleichen Wasser, worinn sie stehen 805-807
c) Künstliche Pflanzengifte – – 808-816
a) brandige Oele – – 808-811
b) Laugensalze – – 811-816
α) feuerveste – – 811-813
β) flüchtige. – – 813-816

Einlei-

www.dlibra.wum.edu.pl

Einleitung.

In unserm Zeitalter wird es wohl keiner Verantwortung bedürfen, durch ein Werk dieser Art die Kenntnis der Gifte in allgemeinern Umlauf zu bringen; man wird mir wohl einwenden, daß ich dadurch dem Bösewicht die Waffen in die Hände gebe, in die Eingeweide der Menschheit zu wüten, ihm Mittel lehre, durch welche er seine verruchten Absichten am leichtesten, am gewissesten und beinahe so, daß er keine Gefahr läuft entdekt zu werden, ausführen kann, nicht nur denen Unmenschen, welche diese unseelige Kunst schon längst aus eigener Uebung und Erfahrung verstehen, neue Kunstgriffe, sondern auch solchen ruchlosen Menschen, die sie noch nicht kennen, denen aber um ihre schändlichen Zweke zu erreichen, kein Verbrechen zu gering, kein Menschenleben zu theuer ist, einen gebahnten Weg zeige; denn wer weis nicht, daß Ungeheuer, die solcher Schandthaten fähig sind, auch ohne Gifte zu kennen, zur Ausführung derselbigen andere eben so niederträchtige Mittel genug finden? Und wenn es auch erwiesen werden könnte, daß einer oder der andere durch Schriften dieser Art mit Giften bekannt wird, welche er zu seinen Greueln misbraucht, sollte diese Besorgnis nicht von dem Vortheil weit überwogen werden, den eine nähere sich weiter verbreitende Kenntnis der Gifte schon dadurch verschaft, daß sie dem bessern Theile von Menschen Mittel in die Hände giebt, die Bosheit von jenen zu entdeken und

www.dlibra.wum.edu.pl

ihre Schande zu offenbaren? Anderer Vortheile, welche sie dem Staate überhaupt, dem Arzte und Landwirth insbesondere leistet, nicht zu erwähnen.

Wenn das Wohl ganzer Staaten auf dem Wohl einzelner Mitglieder derselbigen zusammen genommen beruht, wenn jeder Staat desto glüklicher ist, wie unversehrter ihre natürliche Stärke, wie vollkommener ihre Gesundheit, wie heiterer und freier ihr Verstand ist, wie länger ihr Leben dauert, so haben ungezweifelt Kenntnisse, die den Menschen zeigen, welche unter denen uns umgebenden Körpern ihnen Stärke, Gesundheit und Leben rauben, wie sie diese an ihren äusern Eigenschaften erkennen, wie sie dieselbige an den Zufällen, welche sie im thierischen und vornemlich im menschlichen Körper erregen, erkennen, wie sie diesen Zufällen begegnen und überhaupt, wie sie ihrer schädlichen Macht auf ihren Körper ausweichen können, grose Verdienste um den Staat. Schon die Natur sagt uns, sie redet durch einen Trieb, den sie allen Thieren eingepflanzt hat, das zu vermeiden, was uns schädlich ist, wir haben diesen Trieb mit der Verfeinerung unserer Sitten abgestumpft und beinahe erstikt; den Trieb, dessen lauter unüberhörbarer Stimme unvernünftige Thiere ungehindert folgen, und dabei tausend Gefahren entgehen, denen sich das menschliche Geschlecht blos stellt: so suchen wir nun das, was unvernünftigen Thieren ihr unverdorbener Naturtrieb sagt, durch lange Umwege, welche uns weit nicht so sicher und bald zu unserem Ziele führen, als jener die Thiere.

Die leider! nur allzuhäufigen Unglüksfälle, welche sich schon auf den unvorsichtigen Gebrauch der Gifte ereignet haben, müssen in jeder menschenfreundlichen Seele, ja selbst in

www.dlibra.wum.edu.pl

dem gefühllosesten Menschen, dem nur sein eigenes Leben lieb ist, den Wunsch rege machen, daß die Merkmale, an welchen man diese gefährlichen Feinde des Lebens, die Gifte, erkennen kann, öffentlich in einer den Ungelehrten sowohl, als den Gelehrten verständlichen Sprache bekannt gemacht werden möchten. Die Menge und Mannigfaltigkeit dieser Körper ist zu gros, ihr äuseres Ansehen zuweilen zu unschuldig oder gar zu verführerisch, daß jeder sogleich das Schädliche erkennen, und selten so ausgezeichnet, daß jeder auf die Natur nicht aufmerksame Mensch dadurch gewarnt werden sollte. Der einfältige Hirte läßt sich durch den Glanz und einige Aehnlichkeit mit Kirschen verleiten, die Wolfskirsche zu geniesen; unschuldige Kinder speisen die süs schmekende Wurzel des Wüterichs, die glänzenden süslichten Beeren des Nachtschattens, die ölichten Saamen des Stechapfels; sie werden aber ein Raub des Todes, oder eilen doch dem schon geöffneten Grabe zu, wenn sie nicht die schnelle Hülfe eines entschlossenen und scharfsinnigen Arztes noch rettet. Hätten diese oder ihre Eltern die Stimme gehört, durch welche die Natur spricht, die äusern Merkmale der Gifte gekannt, und also gewust, daß das, was sie oder ihre Kinder vor sich oder bereits genossen hatten, Gift sei, wie leicht wäre es ihnen gewesen, sich oder ihre Kinder dem Tode zu entreissen, oder den schrecklichen Zufällen zuvorzukommen, die auf den Genus solcher Gifte erfolgen!

Sollte es daher nicht die Mühe lohnen, von Seiten der Obrigkeit, welche für das Wohl des Staats zu sorgen hat, wenn man sich auch nicht auf das Ganze einlassen will, wenigstens solche Veranstaltungen etwa in Schulen zu treffen, daß jedem Bürger dieses Staates entweder alle giftige Er-

www.dlibra.wum.edu.pl

zeugnisse seines eigenen Bodens, oder, weil doch diese wegen ihrer Aehnlichkeit mit Speisewaaren das meiste Unglük veranlassen, doch die giftigen Gewächse recht kenntlich würden? Wie viele Unfälle hätten durch eine solche Einrichtung nicht schon verhütet werden können, und wie viele können noch ferner verhütet werden?

Aber die Kenntnis der Gifte dient auch dazu, manche oft lange verborgene und im Dunkeln wütende Bosheit unwürdiger Mitglieder der Gesellschaft zu entlarven, so wie im Gegentheil die gedrukte und beschuldigte Unschuld zu retten und frei zu sprechen, schädliche und zur Schande der Menschheit eingewurzelte Vorurtheile auszurotten und ihre Quelle zu verstopfen: so fand in einem von Wepfern a) erzählten Falle der Wundarzt, daß die ruchlose Magd sich des Arseniks bedient habe, um das kranke ihr Mühe verursachende Kind aus dem Wege zu räumen; so entdekte J. Zeller b) durch die Arsenik und Schwefel haltende Lauge den abscheulichen Betrug, saure Weine um ihren Geschmak zu verbergen, mit Glätte zu verfälschen; so dekte Kaauw Börhaave c) die Schande eines lasterhaften Greises auf, dem auch der Gebrauch eines Giftes, wenn er nur seine unzüchtigen Absichten damit erreichen konnte, anfangs das Gewissen nicht schwer gemacht hatte; so sprach der so eben erwähnte einsichtsvolle Arzt J. Zeller d) sauren Wein, der, weil er einige Zeit in zinnernen Kannen gestanden hatte, von dem Zugiesen

---

a) Historia cicutae aquaticae Basil. 1716. 4. S. 274.

b) Docimasia, signa, causſae et noxa vini lithargyrio mangonisati. Tubing. 1707. 4.

c) Impetum faciens Hipocratis Lugd. Bat. 1745. 8. S. 282.

d) a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

der geschwefelten Lauge auch schwarz wurde, und diejenigen, welche ihn verkauften, von der absichtlichen Verfälschung mit Glätte frei; so entdekte Gassendi e) zu einer Zeit, da Wahrheiten dieser Art nur selten an Tag gebracht wurden, und vor ihm schon Lacuna, daß die Träumereien der Hexen blos auf eine Betäubung der Sinne und des Verstandes hinausliefen, in welche sie sich dadurch versezten, daß sie sich eine Salbe, wozu vornemlich die Wurzel des Bilsenkrautes komme, in den After schmierten.

Den wichtigsten Nutzen von der Kenntnis der Gifte zieht freilich zunächst der Arzt, welchem sie sowohl bei gerichtlichen Fällen als am Krankenbette am meisten zu Statten kommt.

---

e) Bei Garidelle histoire des plantes, qui croissent autour d'Aix et dans plusieurs endroits de la Provence, Aix. 1719. S. 236. Gassendi rencontra un berger, qui assura, qu'il avoit un onguent, par le moyen duquel il pouvoit aller, quand il lui plaisoit au sabat. Ce miserable mettoit par le moyen d'un tuyau dans le fondement à l'heure du coucher une certaine quantité de cet onguent, qui l'assoupissoit aussitot, et le faisoit tomber dans une reverie, dont il ne revenoit, que long tems après; il racontoit de merveilleuses visions à ses camerades, qui ne sachant rien de l'onguent, ni de son effet naturel, croyoient bonnement tout ce, que le berger disoit du sabat et des sorciers. Gassendi vouloit voir l'homme, qui l'éclairoit de tout ce, qu'il faisoit auparavant, et de l'onguent, qu'il mettoit dans le fondement, et il connut par le moyen de quelques personnes, qui epièrent ce berger, qu'il composoit cet onguent avec de la jusquiame noire, de la graisse et de l'huile; j'ai apris cette histoire d'une personne digne de foi..

www.dlibra.wum.edu.pl

Wie unentbehrlich ist sie ihm bei den so häufig vorkommenden Beschuldigungen von Vergiftung. Es wird z. B. jemanden, ohne daß man einen Grund davon anzugeben weis, übel, er erbricht sich mehrere Stunden nach einander fast ununterbrochen; er hat den fürchterlichsten durch kein Mittel zu hemmenden, schmerzhaften, stinkenden, sogar blutigen Bauchfluß; der Aderschlag ist klein, und doch empfindet er eine unaussprechliche innerliche Hize, einen unersättlichen Durst. Die äusern Glieder werden blaß und kalt, und lassen sich durch kein Feuer, durch keine natürliche Hize, durch kein Reiben erwärmen; in zwölf Stunden erliegt er endlich unter der Marter dieser grausamen Zufälle, und stirbt. Wenige Stunden nach dem Tode läuft die Leiche, wenn sie auch an einem kühlen Orte liegt, stark auf, und giebt einen ausserordentlich starken faulen Geruch von sich, der sich durch nichts vertreiben oder verbessern läßt; es strömt Blut aus Nase und Mund; es fliesen andere Säfte aus allen Oefnungen: der Arzt zergliedert sie, findet in allen Gefässen, in allen Eingeweiden das Blut äuserst dünn, aufgelöst und schaumicht; seine Messer laufen alle an und werden stumpf; der Geruch sagt ihm und allen Anwesenden zu deutlich, daß hier die Fäulnis mehr als angefangen habe; er hat also um so mehr einen starken Verdacht, daß dieser Mensch Gift bekommen habe, da noch überdies zu dergleichen Zeit keine bösartige Seuche umgeht, und alle eingezogenen Nachrichten dahin übereinstimmen, daß der Mensch zwölf Stunden vor seinem Tode, ehe er die verdächtige Speise oder Trank zu sich genommen hat, ganz gesund gewesen ist, und durch nichts, auch nur den mindesten Anlaß zu einer solchen Veränderung gegeben hat. Aber der Richter will eine bestimmte Nachricht, nicht bloße Vermuthungen. Der Arzt selbst ist damit noch nicht

www.dlibra.wum.edu.pl

beruhigt, weil von seinem Ausspruche das Leben des Beschuldigten abhängt, er öfnet Magen und Gedärme, erblikt hier ganz enge Zusammenschnürungen, dort ungeheure Erweiterungen, findet hin und wieder Entzündungen, schwarzblaue Brandfleken, sogar Löchergen, und fühlt sich in seinem Argwohn bestärkt. Aber er geht noch weiter, er sammlet, was er im Magen und in den Gedärmen zusammen scharren kann, und wirft, um dadurch vielleicht auf die Quelle des Uebels zu kommen, nachdem er es über Kohlen zur Trokenheit gebracht hat, etwas davon auf glühende Kohlen; plözlich fährt ein diker weisgrauer Rauch auf, der stark nach Knoblauch riecht; er hält ein Kupferblech über diesen Rauch, und sieht es weis werden; er vermischt etwas davon mit Schwefel, und treibt es in einem fest verschlossenen Glase durch die Hize in die Höhe, und erhält einen rothgelben Klumpen, wie wenn er Arsenik mit dem Schwefel aufgetrieben hätte; er weis also nun ganz gewis, daß der Mensch Arsenik bekommen hat; er trift vielleicht in dem Getränke, in den Trinkgefässen, in der Speise, welche der Kranke kurz vor seinem Anfall genossen hatte, eben so deutliche Spuren davon an, und wird dadurch in seiner Meinung bestätigt. Dieses einige Beispiel, von einem der leichtesten Fälle in der gerichtlichen Arzneikunst entlehnt, mag hinreichen, um zu zeigen, wie übel ein Arzt zurecht kommen mus, der in der Geschichte und Kenntnis der Gifte nicht bewandert ist, wie schwankend sein Urtheil, wie zweifelhaft sein Gewissen bei einer solchen Untersuchung sein muß, wie oft, wie leicht es ihm geschehen kann und geschehen muß, einen Unschuldigen für schuldig zu erklären, und einen Schuldigen los zu sprechen.

www.dlibra.wum.edu.pl

Eben so wichtig und noch wichtiger ist die Kenntnis der Gifte dem Arzte bei der Ausübung seiner Kunst selbst: muß nicht ein vernünftiger Arzt, wenn er sich eines glüklichen Erfolgs gewis versichern will, zuerst nach der Ursache der Krankheit forschen, und diese aus dem Wege zu schaffen suchen? Nun aber sind die Gifte eine Quelle, eine reiche Quelle nicht nur sporadischer, sondern selbst endemischer Krankheiten; ist also der Arzt mit der Natur der Gifte nicht bekannt, so kennt er einmal in sehr vielen Fällen den Feind gar nicht, mit welchem er zu kämpfen hat; er weis nicht einmal, daß er es mit einem Gifte zu thun hat, und bekümmert sich entweder nur um die Zufälle, welche er zu heben sucht, oder erdichtet sich eine falsche Ursache, und läßt, indem er diese aus dem Wege zu räumen trachtet, wenn es noch gut geht, das Gift inzwischen frei wirken, ohne ihm genug zu widerstehen, oder verstärkt noch seine schädlichen Kräfte.

Aber wenn auch der Arzt weis, daß die Ursache der Krankheit ein Gift ist, dieses sogar dem Namen nach kennt, wird ihm das bei der Heilung derselbigen genügen, wenn er seine Mischung, seine innere Natur nicht kennt? Wird er den betäubenden Stechapfel mit dergleichen Waffen bekämpfen können, als den fressenden Sublimat? Dem scharfen Arsenik vollkommen mit den gleichen Mitteln begegnen können, als dem einschläfernden Mohnsaft? Das ätzende Vitriolöl ganz durch die gleichen Kunstgriffe entkräften, als den erstikenden Salmiakgeist? Das Gift der Schlangen auf eben die Art unschädlich machen, als den tödtenden Schwaden in den Bergwerken? Wie leicht wird es ihm aber, wenn er weis, daß ein Gift, wenn er weis, welches Gift die Ursache der Krankheit ist, die er zu heilen hat? wenn

www.dlibra.wum.edu.pl

er die innere Natur dieses Giftes kennt, weis, worauf seine Schärfe, seine giftige Eigenschaft beruht?

Wer Geduld genug hat, das ungereimte Gewäsche von Hexenprozessen verflossener Zeiten mit einiger Aufmerksamkeit zu durchblättern, wird vor der schauervollen und der Menschheit zur ewigen Schande gereichenden Art zurükzittern, wie man die Unglüklichen, die man Hexen nannte, um sie zu heilen und zu bekehren, behandelte, quälte und ermordete. Hätten die Obrigkeiten, hätten die Aerzte jener Zeiten gewust, daß alle diese Erscheinungen, welche sie auf Bündnisse mit dem Teufel bezogen, Wirkungen eines betäubenden Giftes waren, daß es blos eine Art Wahnwiz war, welchen z. B. eingeschmierte Bilsenkrautsalbe verursacht hatte, so hätten sie nicht die menschenfeindliche Folter gebraucht, diese Elende zu bessern, nicht Feuer und Schwerd gebraucht, ihre Mitmenschen als Greuel von der Erde zu vertilgen; ein einsiger Gebrauch solcher Mittel, welche die schädlichen Kräfte der betäubenden Gifte schwächen, und eine strenge Aufsicht und Bestrafung derjenigen, welche sich solcher Mittel bedienten, und insbesondere derjenigen, welche andere dazu verführten, würde diese abscheuliche Seuche weit geschwinder und ohne Blutvergiesen mit der Wurzel ausgerottet haben.

Hätten unsere Vorgänger in der Kunst die Natur der Gifte besser gekannt, so würden sie nicht in allen Fällen, wo sie ein Gift ahnten, ohne Unterschied ihre hizigen schweistreibenden Mittel, ihre weitläuftigen zusammengesezten Latwergen, in welchen der Mohnsaft meistens die Hauptsache ausmachte, ihre morgen- und abendländischen Bezoarsteine u. dgl. gebraucht haben.

www.dlibra.wum.edu.pl

Aber noch von einer andern Seite hat die Kenntnis der Gifte grose Wichtigkeit für den Arzt; die Wirksamkeit der Gifte, und die Wirksamkeit der Arzneien gränzt so nahe zusammen, daß es äuserst schwer, ja beinahe unmöglich scheint, die Grenzen zwischen beiden ganz genau zu bestimmen, beide scheinen in der Klasse der heftigen oder drastischen Arzneien in einander zu flieſen, und es scheint bei vielen dergleichen Körpern nur darauf anzukommen, daß man der Wirkung diese oder jene Richtung gibt, um sie in Gift oder Arznei zu verwandeln. Beide bringen in den thierischen Körpern eine Veränderung hervor, welche an sich nicht erfolgt wäre; der Unterschied scheint nur darin zu liegen, daß wir bei dem Gebrauch der Arznei wenigstens die gute Absicht haben, und das Vertrauen hegen, der Körper werde zur Erhaltung, Wiederherstellung oder Besserung der Gesundheit dienen; bei dem Gifte hingegen hat entweder keine oder die entgegengesezte Absicht Statt; seine Wirkungen sind weit heftiger und ereignen sich gemeiniglich viel geschwinder; statt die Lebenskräfte aufzurichten, wie wir es von einem Arzneimittel mit Recht erwarten, schlagen sie sie plözlich nieder, oder löschen sie nach und nach aus; statt allzulebhafte und gewaltsame Bewegungen zu stillen, bringen sie alle Triebfedern der Bewegung in der thierischen Maschine in eine so heftige Unordnung, daß sie zulezt stille stehen müssen, und daß dem ganzen künstlichen Triebwerk ein plözlicher oder langsamer Untergang bevorsteht. Sollte es aber nicht möglich sein, diese ausschweifenden und mit dem Verderben des thierischen Körpers sich endigenden Wirkungen so einzuschränken, daß sie wirklich zu seinem Besten ausschlagen?

Allerdings ist es möglich, so bald der Arzt mit der Natur der Gifte, der Wirkungsart derselben sowohl als der

www.dlibra.wum.edu.pl

Arzneimittel, und mit der Natur der Krankheiten genau bekannt ist: denn einmal ist es gewiß, daß die meisten Gifte vieles von ihrer schädlichen Wirksamkeit verlieren, wenn sie nur in schwachem Gewichte, wenn sie in Krankheiten gegeben werden, in welchen die Säfte oder die festen Theile gerade die entgegengesezten Fehler in Vergleichung mit denen haben, welche die Gifte hervorbringen, und dann beruht die schädliche Wirksamkeit der Gifte öfters nur auf flüchtigen Theilchen; zerstreuen wir also von diesen so viel, daß der Körper zwar einen Theil seiner Wirksamkeit, aber noch nicht alle Wirksamkeit verliert, so verwandelt sich das Gift in ein Heilmittel, das in Krankheiten, welche sich auf gelindere Arzneien nicht bessern, von der treflichsten Wirkung ist: dies ist der Fall bei vielen scharfen und bei vielen betäubenden Giften: durch solche Kunstgriffe, welche wir bei vielen Giften gänzlich in unserer Gewalt haben, läßt sich dem Gifte nicht nur die Richtung sondern auch die bestimmte Stuffe von Wirksamkeit geben, die der Arzt wünscht: läßt man z. B. den Schierlingssaft langsam bei ganz schwacher Hize abrauchen, so bleibt ein sehr kräftiges Mittel zurük, das nur mit der äuserſten Behutsamkeit gebraucht werden darf; läßt man aber eben diesen Saft länger über den Kohlen stehen, und gibt stärkere Hize, so wird es schon schwächer; läßt man ihn vollends aufwallen und schäumt ihn ab, nimmt ihm dadurch die flüchtigen und leichteren, und daher oben schwimmenden Theilchen alle vollends hinweg, so wird er beinahe ganz kraftlos.

Es gibt aber noch ein anderes Mittel, wodurch die Gifte in Arzneien übergehen, und die bestimmte Stuffe von Wirksamkeit erhalten, welche der Arzt seinem Zweke gemäs findet, nemlich dieses: ihnen sogleich ihr Gegengift beizumi-

www.dlibra.wum.edu.pl

schen, und zwar in solcher Menge, daß dadurch zwar ein Theil ihrer schädlichen Kräfte zerstört, aber nicht ihre ganze Wirksamkeit aufgehoben wird. So ist Wasser, so ist Weingeist ein Gegengift der meisten scharfen Gifte, vornemlich wenn ihre Schärfe auf einem offenbaren Salz beruht; so ist es Essig und Honig bei vielen andern, vornemlich bei einigen scharfen, jener auch bei betäubenden Giften.

Diese Art, die Gifte zum Vortheil des menschlichen Geschlechtes zu nüzen, sie zu derjenigen Absicht zu gebrauchen, wozu sie die gütige Vorsehung bestimmt zu haben scheint, ist nicht eine Erfindung unserer Zeiten; nein, schon den ältesten griechischen Aerzten, von welchen uns Schriften und Nachrichten zurük geblieben sind, schon Hippokrates und andern war sie bekannt; schon sie, schon M. Porcius Cato, Herodotus pneumatikus, der falsche Demokritus, Aurelianus, Oribasius f) bedienten sich, um die hartnäkigsten auf keine andere Weise zu heilenden Krankheiten zu bezwingen, häufig der weissen Nieswurz, eines wahren Giftes; schon sie bedienten sich des aus Eselskürbissen gedrükten Saftes und des Mohnsaftes; schon Heraklides von Tarent zog ihren Gebrauch so wie den Gebrauch des Schierlings, des Bilsenkrauts, des Stechapfels dem Gebrauche anderer Mittel vor, und verordnete den Saft aus Eselskürbissen sogar gegen die Wirkungen der Gifte; schon Heras aus Kappadocien bediente sich des Operments, eines durch Schwefel gemilderten Arsenits, des Schierlings und der Wolfs-

f) Ausführlicher hat dieses Pet. Castelli de Helleboro epistola secunda, in qua confirmantur, ea quae in alia epistola de Helleboro allata fuere, Rom. 1622. 4. gezeigt.

www.dlibra.wum.edu.pl

milch; Apollonius des Bilsenkrautes und Alrauns; Andromachus, der jüngere, eben dieser Pflanze, des Schierlings, und, wie die meisten ältern Aerzte, des Mohnsaftes; Asklepiades des Alrauns, des Bilsenkrautes, des Operments; Aurelianus des Euphorbium und der Kupferfeile, auch G. Fallop rühmte die getroknete Wurzel von Eselskürbissen in der Wassersucht.

Mehr als anderthalb Jahrhunderte nach ihm war es ein Greuel in den Augen der meisten Aerzte, ein Mittel zu gebrauchen, wenigstens innerlich zu gebrauchen, das sich auch nur von ferne den Verdacht eines Giftes zugezogen hatte; man verdammte den Arzt, der es wagte, einen so gefährlichen Schritt zu thun, beschuldigte ihn wohl öffentlich des Lasters der Giftmischerei, man glaubte in allen Fällen mit den unthätigen, erdhaften oder mit den erhizenden schweistreibenden Mitteln auszukommen, wenn sie auch noch so hartnäkig waren; man verkannte die Natur der Krankheiten, die Natur des menschlichen Körpers und seine Kräfte und die Natur derjenigen Körper, welche uns die Vorsehung gegeben hatte, gegen hartnäkige Uebel zu streiten. Man war ängstlich genug kein Gift zu gebrauchen, aber auch unempfindlich genug bei der offenbaren Unzulänglichkeit der gewöhnlichen Mittel, seinen Nebenmenschen unter der Gewalt der schreklichsten Zufälle schmachten oder dem offenen Rachen des grausamsten Todes entgegen eilen zu sehen, ohne ein kräftiges Mittel zu seiner Rettung zu versuchen, gleichsam als ob man nicht verpflichtet wäre, in einem solchen Falle wo man, wenn man der Krankheit freien Lauf läßt, oder nur die gewöhnlichen Mittel gebraucht, den gewissen Tod vor sich sieht, zu einem Mittel seine Zuflucht zu nehmen, von dessen glüklichem Erfolge

www.dlibra.wum.edu.pl

man zwar nicht ganz versichert ist, von welchem man aber, wenn anderst noch etwas hilft, noch allein Hülfe erwarten kann. Es würde ein frevenlicher Eingriff in die Majestätsrechte Gottes und in die geheiligten Rechte der Menschheit sein, das Blut eines Unschuldigen zu vergiesen, wenn uns weder Pflicht gegen uns selbst oder andere, noch Gehorsam gegen die Obrigkeit dazu auffordert, aber wenn ein Unheuer von Menschen seine mörderische Hand ausstrekt, um mir oder meinem Freunde das Leben zu nehmen, wenn ich weis, daß mir kein anderes Mittel übrig ist, diesen Streich abzuwenden, als der Tod meines Feindes, bin ich dann nicht berechtiget, meinem Feinde das Leben zu nehmen, um das meinige oder das Leben meines Freundes zu retten? und wenn der Tod meines kranken Mitbürgers nicht anders aufgehalten werden kann, als durch ein zweifelhaftes und gefährliches Mittel, hätte ich mir keinen Vorwurf zu machen, wenn ich dieses verabsäumte?

Zu diesen den Gebrauch der Gifte rechtfertigenden Gründen kommt denn noch, daß ein kluger einsichtsvoller und fürsichtiger Arzt es gänzlich in seiner Gewalt hat, die schädlichen Kräfte des Giftes zu schwächen, und sie sogar in Heilkräfte umzuschaffen, daß er also nach dieser Umwandlung diese Körper nicht mehr als Gifte, sondern vielmehr und eigentlich als Arzneimittel ansehen kann.

Nach dieser Zeit war Fricke, oder wie er sich in seinen lateinischen Schriften g) nannte, Friccius, ein muthvoller Ulmerischer Arzt, der zu Anfange des leztverflossenen

g) 1. De virtute venenorum medica. Ulm 1701. 8. 2. Pars Doxa de venenis Augustae Vindel. 1710. 8.

www.dlibra.wum.edu.pl

Jahrhunderts lebte, einer der ersten, der es wagte, aus Liebe zur Wahrheit, aus Ueberzeugung und Erfahrung der allgemeinen Stimme zu widersprechen, und unbekümmert um das Urtheil seiner blöden und stumpfsichtigen Zeitgenossen mit allen Kräften gegen ein so schädliches und so tief eingewurzeltes Vorurtheil zu kämpfen. Vielleicht gieng er in seinem Eifer zu weit, und empfahl den Gebrauch der Gifte da, wo wir ihn missen können, wo wir sicherere und doch dabei kräftige Mittel haben, vielleicht sezte er auch den Werth der gewöhnlichen gelinderen Mittel etwas zu sehr herunter, vielleicht war er etwas zu kühn; wie dem aber auch sei, so bleibt ihm das nie genug zu rühmende Verdienst, daß er für die spätern Aerzte das Eis gebrochen, und in einer das Wohl der Menschheit so nahe angehenden Sache einen Nachfolgern den Weg ungemein erleichtert hat.

Indessen blieben die Aerzte nach seiner Zeit noch lange schüchtern genug, um nicht in seine Fusstapfen zu treten; die betäubende Stimme des Pöbels, welche sie als Giftmischer verdammte, und alles Zutrauen der Kranken von ihnen abwandte, wirkte mehr auf sie, als die sanftere Stimme des Gewissens, die sie aufforderte, ohne darauf zu achten, nichts zu versäumen, was sie nur immer zum Wohl des menschlichen Geschlechts, zur Minderung des Elends thun könnten; die meisten folgten ihnen, und viele waren unbillig und bosshaft genug, laut dem Pöbel beizustimmen, und alles in die unterste Hölle zu verdammen, was nur Miene machte, ihren dreisten Behauptungen zu widersprechen. Nur wenige von zärterm Gefühle bei dem Anblike des Jammers und mehr um innere Beruhigung als um das Urtheil der Welt bekümmert, hatten Muth genug, in hartnäkigen Fällen, wo sie mit

www.dlibra.wum.edu.pl

gewöhnlichen Mitteln nichts ausrichten konnten, zu Giften, und zwar aus Furcht vor dem Gifte neidischer Amtsgehülfen, öfters heimlich und unter dem Deckmantel eines Geheimnisses ihre Zuflucht zu nehmen.

Schon hatte zwar Olaus Borch g) auf diesen Gebrauch aufmerksam gemacht; es war schon Börhaave, der gröste Arzt seines Zeitalters, der sich des ätzenden Sublimats, schon andere grosse Aerzte des kürzlich verflossenen Jahrhunderts, die sich anderer unter die Gifte gerechneter Körper innerlich bedienten; aber es schien vorzüglich der wienerischen Schule und insbesondere einem van Swieten und von Störck h) vorbehalten zu sein, den Gebrauch vieler Arzneien dieser Art in der Ausübung der Heilkunde wieder herzustellen und einzuführen, bei der schönen Gelegenheit, welche sie dazu hatten, Erfahrungen darüber anzustellen, in ein helleres Licht zu sezen, und durch ihr Ansehen zu befestigen i). So sehr aber auch Aerzte, welche ohne Vorurtheil handeln, den Gebrauch er Gifte durch ihr lehrreiches Beispiel empfehlen, so sehr er Aerz-

---

g) Oratio de venenis, in Opusc. et Orat. academ. nolt. 1725. 8.

h) s. Gabr. Zagoni de inventis quibusdam huius seculi in arte salutari novis Ultraj. 1764.

i) s. davon mit mehrerem Chph. Blaschke diss. de vi venenorum medica Vienn. 1757. 2) G. Chph. Detharding de medendi methodo per venena Bulzow 1762. 3) J. E. Wichmann diss. de insigni venenorum quorundam virtute medica. Goetting. 1763. 4. 4) Phil. Fr. Gmelin diss. de materia toxicorum hominis in medicamentum convertenda. Tubing. 1765. 4. 5) Piderit diss. de venenis et modo quo ut medicamenta salutaria agunt. Marburg. 1773. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

Aerzten, welche Entschlossenheit, Scharfsinn, Behutsamkeit, Beobachtungsgeist, und gründliche Einsichten in die Lehre von den Krankheiten in sich vereinigen, zu empfehlen ist, so gewiß sind auch die Gifte in der Hand eines Arztes, der diese Eigenschaften nicht hat, oder gar durch die entgegengesezten ausgezeichnet ist, er mag nun von der Obrigkeit zur Ausübung seiner Kunst berechtiget sein, oder nicht, nicht anders, als wie ein Schwerd in der Hand eines Rasenden k); durch ein blindes Ungefähr können sie vielleicht in diesem oder jenem Fall Nuzen schaffen, aber in weit mehreren Fällen, statt die Gesundheit wieder herzustellen, die Krankheit verschlimmern, statt den Tod zu entfernen, seine Ankunft unvermuthet beschleunigen; sie sind es eigentlich, welche das sonst so ungerechte Urtheil mit Recht trift, das man im Allgemeinen allen Aerzten gesprochen hat, welche von Giften Gebrauch machen und gemacht haben.

Dieser Einwurf gegen den Gebrauch der Gifte, daß durch einen unbedachtsamen Gebrauch derselbigen so vieles Unheil gestiftet werden kann, ist in der That einer der wichtigsten; aber hebt denn der unrechte Gebrauch, hebt der Misbrauch den rechten Gebrauch auf? Liegt nicht die Schuld von dem unglüklichen Erfolge solcher Mittel mehr an denen, welche sie gebrauchen, als an den Mitteln selbst? Müßten wir nicht, wenn sich dieses so verhielte, viele der kräftigsten Mittel, die noch niemand zu den Giften gezählt hat, selbst den Kampfer, sogar die Fieberrinde und andere dergleichen missen, weil sie zur Unzeit, in Krankheiten, deren Ursache sie nicht

k) S. Hahn Orat. de venenorum usu in medicina Ultraj. 1773. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

heben können, oder noch gar verstärken, gebraucht, nothwendig schaden müssen, und schon so oft geschadet haben? Würde es nicht besser gethan sein, wenn die Obrigkeiten selbst, um uns vor solchen Folgen der Gifte zu sichern, bei der Wahl ihrer Aerzte sorgfältiger sein, und keinem die Ausübung einer so wichtigen Kunst erlauben würden, dem nicht schon seine Einsichten ein Recht darzu verschaften? wenn sie allen Afterärzten ihr mörderisches Handwerk niederlegen würden? Denn diese sind es eigentlich, welche von solchen Mitteln, weil sie am schnellsten, am augenscheinlichsten wirken, um sich in den Augen des Pöbels Ansehen zu verschaffen, den unfürsichtigsten, den gefährlichsten und den verdammungswürdigsten Gebrauch machen.

Bei einem rechtschaffenen Arzte hat inzwischen der Gebrauch der Gifte seine Grenzen, welche er nicht überschreitet; ihn blenden keine Lobsprüche, wenn sie auch noch so nachdrüklich, von noch so angesehenen, von noch so verdienten Aerzten unserer oder verflossener Zeiten diesem oder jenem Körper beigelegt werden; ja wie gröser diese Lobsprüche sind, wie weiter man die Wirksamkeit dieses oder jenen Körpers auszudehnen sucht, desto verdächtiger wird ihm das Lob; er sieht diese Aerzte als Menschen an, welche fehlen können, als Menschen, deren Einsichten immer eingeschränkt sind, als Menschen, die wohl auch ein falscher Ehrgeiz verleiten könnte, den eitlen Ruhm eines Erfinders oder Wiederherstellers mehr lieb zu gewinnen, als die Wahrheit und das Glück ihrer Mitbürger. Er prüft also die Erfahrungen, welche er in ihren Schriften aufgezeichnet findet, auf das strengste, untersucht genau, ob sie die Zufälle der Krankheit aufrichtig beschrieben, die Wirkungen der gebrauchten Mittel unpartheiisch erwähnt, der Krankheit den rechten Namen gegeben,

www.dlibra.wum.edu.pl

und also Grund genug gehabt haben, ihre Arznei anzupreisen; findet er dieses, so macht er an dem ersten Elenden, der sich seiner Sorgfalt anvertraut, wenn bei ihm der gleiche Fall statt hat, und bisher die kräftigsten Mittel unter den gewöhnlichen ohne Nuzen verordnet wurden, mit der, einem Arzte nie genug zu empfehlenden Behutsamkeit einen Versuch, und befolgt dabei streng die Vorschrift jenes Arztes, welcher dieses Mittel zuerst gebraucht und angerühmt hat; findet er seinen Kranken auf den Gebrauch dieses Mittels augenscheinlich besser, so segnet er den Arzt, der den ersten Gedanken gehabt hat, der Wirkung dieses Körpers diese vortheilhafte Richtung zu geben, und danket dem Gott, der auch die Gifte zum Heil der Menschenkinder geschaffen hat.

So sehr ich also auf der einen Seite dem Arzneigebrauche der Gifte das Wort rede, so weit bin ich entfernt, junge Aerzte nur von ferne zu veranlassen, daß sie diesen Gebrauch so allgemein machen und so weit ausdehnen, als einige zum Theil angesehene Aerzte; ich traue nicht allen hochtönenden Versicherungen, nicht allen glänzenden Lobsprüchen, nicht allen scheinbaren Erfahrungen, womit so manche unserer Aerzte aus übertriebener Liebe für ihre Meinungen die Welt überschwemmen, so manchen kurzsichtigen Arzt verführen, so manche Elende noch elender, der wahren Arzneikunst mehr Schande als Ehre, und ihre Ausübung unsicher machen. Sollte es nicht besser gethan sein, sich vielmehr des Gebrauchs der Gifte zu enthalten, der bei aller Sorgfalt auf unserer Seite und ohne unsere Schuld, durch ein Versehen des Kräutermannes, des Kräuterhändlers, des Apothekers, des Kranken selbst, oder derer, welche ihn bedienen, so leicht gefährlich werden, und, wenn wir gleich bei uns beruhigt

www.dlibra.wum.edu.pl

sind, denn doch üble Nachreden nach sich ziehen kann, wo wir die Krankheit mit den gewöhnlichen, sichern, von jedermann dafür anerkannten Arzneien zu bezwingen hoffen können? Aber wo diese Hofnung schwindet, da ist es Pflicht, für ein menschenliebendes Herz unerläßliche Pflicht, die Stimme des Gewissens höher zu achten, als die Stimme der Menschen, und, wo uns eigentlich sogenannte Arzneien verlassen, zu Gift unsere Zuflucht zu nehmen.

Auch dem Landwirth schaft die Kenntnis der Gifte Nuzen; denn viele Gifte sind es nicht blos in Beziehung auf den Menschen, sondern auch in Absicht auf andere, unvernünftige Thiere; unter diesen sind manche, welche dem Landwirthe, bei seinen Geschäften sehr hinderlich sind, oft seine schönsten Hofnungen vereiteln, und Jahre lang daurende Bemühungen fruchtlos machen. So zernichtet oft ein furchtbarer Haufen unersättlicher Würmer, oder ein unzählbares Heer gefräßigen Ungeziefers die schönsten Aussichten des Landmanns auf seinen Wiesen und Aekern, in seinen Bäum- Kohl- und Weingärten; so stören andere Arten Ungeziefer unsere Ruhe, andere greifen unsere Nahrungsmittel, unsere Kleider, Bücher, Naturaliensammlungen, unser Hausgeräthe an; andere schaden unserer Gesundheit oder nehmen uns gar das Leben, wenn wir sie zu sehr überhand nehmen lassen.

Viele Thiere der obern Klassen, säugende und Vögel, stehen durch ihre Lebensart, durch die Art, wie sie ihre Nahrung suchen, durch die Art der Nahrung selbst den Absichten und Bemühungen des Landwirths gerade im Wege, oder fügen ihm doch Schaden zu. Viele Vögel und Säugthiere, und unter den lezten insbesondere die verschiedenen Arten von Mäusen, nähren sich von Samen, und stehlen sie von Kornböden und Feldern, wenn sie noch unter der Erde liegen,

www.dlibra.wum.edu.pl

oder schon auf dem Halme stehen; einige kleinere Arten zernagen die Wurzeln der Gräser und Gartengewächse, und untergraben die Erde, welche der Landmann im Schweisse seines Angesichts baut; viele Raubthiere, auch andere wilde Thiere, beunruhigen und tödten die Hausthiere, vornemlich das Federvieh, oder suchen unsere Saaten heim: gegen alle diese Feinde findet der Landwirth das kräftigste Mittel, die sicherste Hülfe, die mächtigsten Waffen an den Giften, die er diesen schädlichen Thieren unter der Gestalt eines Dampfes, oder mit ihrem gewöhnlichen und angenehmsten Futter beibringt, und sich auf diese Weise durch ihren Tod gegen alle die gedachten Gefahren sicher stellt.

Ferner giebt es z. B. unter den giftigen Thieren und Pflanzen sehr viele, an welchen durchaus nicht alle Theile, sondern nur einer oder der andere giftig, und die übrigen unschädlich, zuweilen gar esbar sind. Das Fleisch der Viper, deren Bis, wenn man den Kranken sich selbst überläßt, den unvermeidlichen Tod bringt, ist in vielen Gegenden eine gewöhnliche und unschädliche Speise; bei dem Scharbokskraute hat nur die Wurzel eine schädliche Schärfe, die übrigen Theile sind ganz mild.

Unter den giftigen Pflanzen oder ihren giftigen Theilen sind es viele nicht zu allen Zeiten des Jahrs; ja sie verlieren zu einer gewissen Jahreszeit alles Schädliche so sehr, daß sie dann ohne Schaden gespeist werden können. So ist die Wurzel der Zeitlosen im Herbst ohne alle Schärfe; so hat die Wurzel, und selbst der untere Theil des Stengels vom Gifthahnenfuß im Maimonat, wenn die Pflanze blüht, nicht die mindeste gefährliche Schärfe.

www.dlibra.wum.edu.pl

Viele, vornemlich unter den giftigen Wurzeln, können durch leichte Kunstgriffe ihrer schädlichen Eigenschaften so sehr beraubt werden, daß man sie nun speisen kann. Die Amerikaner drüken aus der giftigen Manihotwurzel den Saft aus, und machen dann allerlei bei ihnen sehr gewöhnliche Speisen daraus; so wird in Westindien und Südamerika die Wurzel von verschiedenen Arten des Aron, welche eine ausnehmend schädliche Schärfe hat, blos durch das Ausdrüken des Saftes ein unschädliches und sehr gemeines Nahrungsmittel über den Winter; eben so kann man auch das Kraut und die Blumen des Gifthahnenfuses, wenn sie zu zwo Händen voll, zwo Stunden lang mit einem Pfunde Wassers gekocht und etwas gewürzt werden, als eine angenehme Speise genieſen.

Viele Gifte sind dem Landwirthe, dem Fabrikanten, dem Handwerker, dem Künstler, dem Handelsmann noch von einer andern Seite merkwürdig, und wenn sie ihm auch als Gifte schaden, so können sie ihm doch nach ihren übrigen Eigenschaften den beträchtlichsten Nuzen leisten, ihre Kenntnis ihm also auch von dieser Seite nicht gleichgültig sein.

Toxikologie, Pharmakologie oder die Lehre von den Giften zeigt, welche unter denen uns umgebenden Körpern durch blos körperliche zum Theil noch nicht genug bekannte Kräfte dem Menschen, wenn ihre Wirkung nicht aufgehalten wird, an seiner Gesundheit oder gar an seinem Leben unwiederbringlichen Schaden zufügen, wie man sie erkennen kann, was ihre Wirkungen sind, und wie man diese durch entgegengesezte Kräfte anderer Körper aufheben, sogar vortheilhaft benuzen kann.

Solche Körper aber nennt man Gifte, mit welchem Namen unsere Sprache sie bestimmter bezeichnet, als die

www.dlibra.wum.edu.pl

griechiſche und lateiniſche, das τοξικον der Griechen, von τοξον, einem Bogen mit Pfeilen, gewis richtiger als von dem Taxbaum, bedeutete eigentlich nur die Gifte, womit die Pfeile beſtrichen worden l).

Auch der Ausdruk μεσα und Φαρμακα, den manche griechiſche, und was den lezten betrift, auch lateiniſche Schriftſteller, ohne weitern Zuſaz für Gifte gebrauchten, iſt eben ſo unbeſtimmt, denn davon nichts zu gedenken, daß einige m) mit dem lezten auch vorzüglich lekere Gerichte bezeichneten, war es auch der Name der Arzneien; doch hat ſich die erſte Bedeutung noch bis auf unſere Zeiten in den Alexipharmacis erhalten, wovon die Aerzte, vornemlich zu Anfang des lezt verfloſſenen Jahrhunderts ſo viel zu ſchwazen wuſten, und worunter ſie ſolche Mittel verſtanden, die das Gift, aber das Gift im weitläuftigſten Sinne des Worts, bändigen und

---

l) Aelius Promotus περὶ των ροβολων και Φαρμακων: ſo ſagt auch Nikander in ſeinen Alexipharmac. Gorraeo interprete. Pariſ. 1622. v. 243. &c.

„Illo (ſcil. toxico) Gorraei nomades populusque feracem
Qui colit Euphratem, armat ſua tela veneno
Quae poſtquam haeſerunt, et non ſanabile vulnus
Inflixere, caro livet, virusque putreſcit
Vipereum, atque cutis ſe tabo foeda reſolvit.„

m) So z. B. ſagt Ael. Speert in Adriano. c. 21. „Inter cibos unice amabat tetrapharmacum ſeu potius pentapharmacum, quo poſtea ſemper Adrianus eſt uſus, ipſe dicitur repetiiſſe, hoc eſt ſumem, phaſianum, pavonem, pernam cruſtulatam et aprugnam, und Lampridius in Alexandr. Severo c. 30. „Uſusque eſt Adriani tetrapharmaco frequenter, de quo in libris ſuis Marius Maximus loquitur.„

www.dlibra.wum.edu.pl

seinen Wirkungen auf den menschlichen Körper Einhalt thun: daher gab schon Homer n) um die Gifte von den Arzneien zu unterscheiden, jenen noch den Beinamen εσθλα και λυγρα, Aristoteles den Beinamen θανατοφορα, Hippocrates θανασιμα oder κακουργα, Dioskorides, Theophrast und Galen nannten sie bald φαρμακα θανασιμα bald δηλητηρια bald φθοροποια.

Auch mit der lateinischen Benennung venenum und virus gieng es im Grunde nicht besser, denn von den uneigentlichen Bedeutungen, welche sich Redner und Dichter, so wie von andern also auch von diesem Worte erlaubten, gebrauchte man insbesondere das Wort venenum auch,

1) wie das griechische φαρμακον zugleich für Arznei o);

2) für Zaubereien, für Kunstgriffe von Heren und Hexenmeistern p)

---

n) Οδυσς IV. 230.

o) S. Oelrichs diff. juridic. selectiff. in acad. Belgii habit. thes. V. I. T. III. Diff. 24. S. 191. so sagt Digest. leg. pandect. 236. de verborum Significationibus, Cajus: Qui venenum dicit, debet adjicere, num malum vel bonum, nam et medicamenta venena sunt, quia eo nomine continetur, quod exibitum naturam ejus, cui adhibitum esset mutat.„

p) So z. B. Codronchi de morbis veneficiis L. IV. Mediol. 1618. 8. so längst vor ihm Horaz z. B. L. I. Od. 27.

„Quae saga, quis te solvere Thessalus
Magus venenis, quis te poterit Deus!„

und Epod. Od. V. „venena magnum fas nefasque, non valent convertere humanam vicem.„

www.dlibra.wum.edu.pl

3) Plinius, Ovid q) und Virgil r) für Schminke, so wie für Farbe überhaupt.

So bestimmt aber immer die Bedeutung des Worts Gift in unserer Sprache ist, so schwer hält es doch die Begriffe, welche sich damit verbinden, so zu sammlen und auszudrüken, daß man weder zu viel noch zu wenig sagt: dies ist die Klippe, an welcher selbst die grösten Aerzte früherer und unserer Zeiten gescheitert haben.

Ich will hier nichts von der Bestimmung der Alten sagen, nichts von derjenigen, welche uns Fricke s) und G. Fr. Sigwart t) geben; selbst die grösten Aerzte, Cl. Camerer u) Herm. Börhaave x), J. Nep. van Cranz y) J. R. Spielmann z), Hier. D. Gaub a) haben den Begriff des Giftes entweder nicht ganz erschöpft, oder zu weit

---

q) Z. B. L. I. de arte amandi v. 352. „Tum quoque sua collinet ora venenis.„

r) Z. B. Georgic. L. II. v. 465. „Alba nec Assyrio fucatur lana veneno.„

s) Paradoxa de venenis. S. 6.

t) Diss. venenorum discrimina summatim excussa. Tubing. 1765. 4.

u) Diss. de venenorum indole ac dijudicatione. Tubing. 1725. S. 4.

x) Praelect. in instit. propr. medic. 8. §. 1119. B. VI. S. 374.

y) Materia medica et chirurgica. Vienn. 8. B. III. 1763. S. 3.

z) Institution. mater. medicae. Argentor. 1774. 8. S. 2. §. 11.

a) Institutiones pathologicae medicinalis. Leid. 1758. 8. §. 496. etc.

www.dlibra.wum.edu.pl

ausgedehnt; auch J. Fr. Ehrmann b) scheint, wenn er das Wesen des Giftes darein sezt, daß es niemanden nähre, die thierische Natur ändere, und wenn davon über ein gewisses durch Erfahrung bestimmtes Maas genommen werde, tödte, zu vergessen, daß diese Bestimmung auch auf manche Arzneimittel paßt, und die von aussen angebrachten Gifte nicht in sich begreift, und J. G. Reyher c), wenn er die Hauptwirkung aller Gifte in die Nerven sezt, zu vergessen, daß manche Gifte nicht zuerst und zunächst auf die Nerven wirken, und manche Arzneien eben so wirken können.

Um den Namen eines Giftes zu verdienen, muß etwas

1) ein irdischer Körper sein. Wir haben nicht nöthig, wie es sonst so häufig geschah d), die Kraft der Gifte, so unerwartet sie auch oft wirkt, aus der Einwirkung überirdischer Geister, oder dem Einfluß der Gestirne abzuleiten. Die Wirkung dieser Gifte, wenigstens derer, welche wir kennen, fließt aus ihren Eigenschaften, von welchen wir freilich nicht immer den Grund anzugeben wissen: der Sublimat hat eine äzende, fressende Schärfe; durch diese äusert er, es mag dieses oder jenes Gestirn am Himmel sein, seine Wirkungen, welche er der mit Quecksilberkalk vereinigten scharfen Säure zu verdanken hat; warum aber diese in dieser Verbindung

---

b) Diss. praes. I. D. Reisseissen, de veneno doloso. Argentor. 1781. 4. §. III. S. 4.

c) Tent. praes. I. H. Ackermann de venenorum actione quaedam generatim exponens Kil. Holsat. 1782. 4. §. 5. S. 7.

d) S. z. B. Cobronchi a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

eine so ausgezeichnete Schärfe annimmt, wissen wir nicht ganz befriedigend zu erklären. Beruht nun die Wirkung der Gifte auf körperlichen Kräften, so folgt daraus so viel, daß wir im Stande sind, ihr durch andere körperliche Kräfte Einhalt zu thun.

2) Sind die Gifte solche Körper, welche sich nicht in der Natur des thierischen Körpers umwandeln, nicht von den Kräften der Verdauung bezwingen lassen, sondern oft noch die thierischen Säfte, gleichsam wie ein Sauerteig, in eine andere Natur verwandeln. So bringen die meisten betäubenden Gifte, so bringt das Gift der Schlangen das Blut ganz geschwind in eine Art Fäulung, und es kommt kein einziges Gift in die thierischen Säfte, welches nicht ihren natürlichen Zusammenhang ändern sollte.

3) Sind die Gifte solche Körper, welche, wenn man ihrer Wirkung freien Lauf läßt, wo nicht allen, doch den meisten Menschen den Tod bringen. Ein gesunder Mensch, der ihn nicht gewohnt ist, wird z. B. von einem Skrupel Mohnsaft und wohl noch von wenigerem in einen tiefen Schlaf fallen, den Gebrauch seiner Sinne und alle willkürliche Bewegung verlieren, und wenn er diesen Wirkungen desselbigen ungehindert unausgesezt und sich selbst überlassen bleibt, vielleicht in wenigen Stunden ein Raub des Todes werden; und doch speisen die Morgenländer eben diesen Mohnsaft zu ganzen Quintchen, ohne tödliche Folgen davon zu empfinden e). Doch

---

e) Reinegg bei Blumenbach, medicin. Biblioth. B. II. S. 373. seq. 2) Bekon Observations en Grèce &c. B. III. K. 15. S. 404. 3) E. Kämpfer Amoenit. exotic. S. 644. 4) Pr. Alpin Medicin. aegypt. S. 255. 5) G. Richter

sah Clauder selbst in Teutschland einen Menschen, welcher sich so daran gewöhnt hatte, daß er, ohne eine schädliche Wirkung davon zu fühlen, achtzehn Monate nach einander täglich ein halbes Loth davon verschlukte. Doch giebt man in der Mundsperre, vornemlich in Westindien, innerhalb 24 Stunden 14 f) — 120 g) Grane davon mit glüklichem Erfolge. Indessen bleibt doch der Mohnsaft ein Gift, wenn er auch nicht in allen Fällen todliche Wirkungen äusert, weil er sie doch in den meisten äusert; so wie es auf der andern Seite Körper giebt (welche aber eben deswegen unter den Giften keine Stelle verdienen) die nur bei wenigen gewissen Leuten h) oder unter seltenen Umständen i) schädliche Wirkungen äusern.

Progr. de adsuetudine venena ferendi in Drimyphagis. Goetting. 1744.

f) Gloser Transactiones of the society at Philadelphia. B. I. S. 317.

g) Don. Monro Praelectiones medicae in Cronii instituto et oratio anniversaria ex Harveyi Instituto dicta die oct. 18. A. 1775. in theatro Collegii R. Medicorum Londinensium. Londin. 1776. 8.

h) So sah z. B. Darluc (Histoire naturelle de la Provence B. II. S. 370. von einem halben Löffel voll Lavendelöl mit Melissenwasser, den man einem Kinde eingab, tödliche Zukungen erfolgen.

i) So sah z. B. R. Lentilius (Ephemer. Acad. Caesar. Natur. Curios. Ann. 4 Dec. II. Abs. 159.) drei Knaben plözlich von heissem Brode sterben; so Enaux und Chaussier (Methode de traiter les morsures des animaux enragés et de la vipere, suivie d'un précis sur la pustule maligne. Dijon. 1785. 8.) von einem nach Westendorfs

4) Muß das Gift seine Wirkungen äusern, wenn auch wenig davon gegeben wird; dadurch unterscheidet es sich wieder von vielen andern schädlichen Körpern. Aezender Sublimat, Arsenik, Spiesglanzbutter z. B. bringen, auch nur zu wenigen Granen gegeben, in einem Körper, der nicht dazu vorbereitet ist, oder durch die Kunst des Arztes gegen ihre Wirkung geschüzt wird, den Tod zuwege. Salpeter zu drei Lothen gegeben hat bei einer Frau tödliche Entzündung und Brand erregt k), und schon zu anderthalb Lothen mit einem halben Loth gereinigten Weinsteins genommen, einen Knaben innerhalb zwei Tagen getödet l); Weingeist kann auch tödliche Wirkungen äusern, und man hat Beispiele, daß ein einiger starker Trunk einen Schlagfluß herbei zog, der

---

Vorschrift verstärkten Weinessig, der verschlukt wurde, tödliche Magenentzündung; so Fonestus (Observat. et Curation. Medicin. L. XXI.) von Anisöl eine Kolik, die nur durch narkotische Mittel und Bilsenkraut geheilt werden konnte; so Kölpin (bei Pyl Aufsäze und Beobachtungen zur gerichtlichen Arzneiwissenschaft. B. V. I. n. 19. bei einer Frau vom Ailhaudischen Pulver den Tod erfolgen; G. W. Wedel sah (Amoenitat. mater. medic. Ien. 1684. 4. L. II. Sect. II. C. IV. S. 240) von einem Löffel voll Haselwurzblätter und Wurzel einen Mann an Durchlauf und Erbrechen sterben. Wie oft mögen Aloe, Koloquinten, Gummigutt, Jalape und ihr Harz am unrechten Orte gebraucht, ähnliches Unglük verursacht haben!

k) Souville Iournal de medicine, chirurgie, pharmacie &c. B. LXXIII.

l) Allgemeine Litteratur Zeitung. Iena, 4. 1788. Dec. S. 796.

www.dlibra.wum.edu.pl

sich mit dem Tode endigte m); Wein, wenn er täglich in groser Menge getrunken wird, kann allerdings eben so wirken, wie ein langsames Gift, und durch eine langsame Auszehrung nach und nach das Leben auslöschen: wem wird es aber deswegen einfallen, Salpeter, Weingeist, Wein im eigentlichen Verstande Gift zu nennen, da sie doch nur dann schädlich n) sind, wenn wir sie gegen die Bestimmung der Natur in zu groser Menge zu uns nehmen?

5) Muß die Art, wie das Gift wirkt, nicht so ganz offenbar sein. Wenn ein Mensch mit dem Strike erdrosselt wird, wenn er im Wasser ersäuft, oder im Feuer verbrennt, wenn ihm ein Mordgewehr das Herz oder ein anderes edles Eingeweide durchbohrt, oder sonst verwundet, so fällt es einem jeden, der nur einige Kenntnis von dem menschlichen Leibe hat, sehr leicht, die Ursache einzusehen, warum diese Körper diese Wirkungen äusern musten, welche blos auf ihren mechanischen Eigenschaften beruhen, aber warum bringt Blei, das eher süs, als scharf schmekt, in welchem man mit einem auch noch so wohl bewafneten Auge nichts Hauendes, nichts Stechendes, nichts Spiziges gewahr wird, in einem Gewichte gegeben, wo es nicht durch seine Schwere, in einer Gestalt, da es nicht durch seine Eken wirken, zerreissen oder verwun-

---

m) Schrekliche Beispiele dieser Art haben L. Schröck (Ephemerid. Acad. Caesar. Natur. Curios. Dec. II. Ann. 6 Obs. 85.) Butzius ebend. Dec. III. Ann. 5. 6. obs. 83.) und J. G. Zimmermann (Leben des H. v. Haller. Züerich 1755. 8. S. 24.) aufgezeichnet.

n) S. davon J. E. Ferd. Schulze de toxicologia veterum 1788. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

den kann, in mildem Essig oder süsem Wein aufgelößt, so erschrekliche Zufälle, und einen langsamen Tod zuwege?

6) Muß diese Wirkung immer stärker sein, als man nach der geringen Menge des Giftes erwarten sollte. Wenn der Schwelger, der alle Tage herrlich und in Freuden lebt, seinen Magen täglich mit den feinsten Speisen überlädt, seine Säfte durch hizige Getränke und Gewürze in beständiger Wallung erhält, endlich nach vielen durchschleuderten Jahren über Mangel an Eßlust, über Mattigkeit und Trägheit klagt, wenn ihn zulezt ein plözlicher Schlagfluß dahin raft, oder eine langsame Wassersucht das Leben nimmt, so ereignet sich nichts gegen unsere Erwartung. Wenn ein Kranker auf etliche Lothe Salz, die ihm der Arzt verordnet, öfters zu Stuhle geht, als er nach dem gewöhnlichen Laufe der Natur sollte, so ist diese Folge nicht unerwartet. Aber wenn ein gesunder, mäsiger Mensch, der den Gesezen der Natur, in Absicht auf seinen Leib vollkommen gemäß lebt, vielleicht von zehn Granen Bleizuker, die ihm ein Unmensch heimlich beibringt, Mangel an Eßlust, Abnahme der Kräfte, die grausamsten Schmerzen, die hartnäkigsten Verstopfungen u. dgl. erfährt, wenn er, ohne sich irgend einer andern Ursache bewußt zu sein, in der Blüthe seiner Jahre verwelkt, und nichts als den Tod vor sich sieht; wenn ein anderer durch die List eines abscheulichen Bösewichts von etlichen Granen Arseniks in die unerträglichsten Bauchschmerzen, in einen starken unheilbaren Bauchfluß, in das heftigste Erbrechen verfällt, und in kurzer Zeit ein Raub des Todes wird, wie unerwartet ist dieses?

7) Kommt es hier auch sehr viel auf die Art und Absicht an, auf welche und in welcher ein Körper in den mensch-

www.dlibra.wum.edu.pl

lichen Leib gebracht wird. Wenn Athen seine Missethäter mit Schierling hinrichtet, wenn ein unmenschlicher Thrasyas daraus einen Trank bereitet, womit er seinem unschuldigen Nebenmenschen nach Gefallen das Leben verkürzen kann, so hatten beide den Tod des Menschen, welchem sie den Schierling beibrachten, zur Absicht; sie gebrauchten also den Schierling als Gift. Wenn sich ein Wagehals von Aerzten des Schierlings in Krankheiten bedient, mit welchen ein starkes Fieber verknüpft ist, so wirkt er als Gift; wenn aber ein kluger, behutsamer Arzt in Fällen, wo der Gebrauch anderer Mittel fruchtlos war, und wo er sich nur noch vom Schierling eine glükliche Wirkung versprechen kann, den behutsam bereiteten, und durch Eindiken seiner schädlichsten Theile beraubten, aber doch noch wirksamen Schierlingssaft gebraucht, so wird der Schierling unter seinen Händen zur Arznei.

Von der Art, wie man sowohl überhaupt, als in besondern Vorfällen Gifte und Vergiftung erkennen kann m*).

Wir schöpfen Verdacht, daß Körper, die wir noch nicht genau kennen, Gifte sind, wenn sie

---

m*) S. davon 1) Gruner progr. de forensi veneficii notione rite informanda. Ien. 1796. 4. 2) J. Fr. Ehrmann a. a. O. und de veneficio culposo. Argent. 1782. 4. 3) Reß Recherches pathologiques, anatomiques et judiciaires sur les signes de l'empoisonnement: ou réponse à cette question: Quels sont dans les malades et dans les cadavres les signes certains, d'après lesquels un Medecin puisse decider, qu'un homme a été empoisonné par un corrosif, lors qu'il

faut

www.dlibra.wum.edu.pl

1) einen widrigen, betäubenden, erstikenden Geruch haben; so hat das Bilsenkraut einen widrigen, betäubenden, so der Schwefel, wenn er brennt, einen scharfen erstikenden Geruch.

2) Wenn sie auf der Haut Blasen ziehen, oder auch nur mit der äussersten Spize der Zunge gekostet, einen sehr scharfen Geschmak äusern; so wissen wir dieses von den meisten Arten des Hahnenfußes.

3) Wenn sie aus einer Ordnung von Geschöpfen sind, aus welcher wir bereits mehrere giftige kennen, wenn sie in ihren äusern, zoologischen, botanischen, mineralogischen Merkmalen nahe mit ihnen verwandt sind; so sind uns alle Schlangen verdächtig; so lange wir nicht gewiß sind, daß ihr Biß unschädlich ist, weil viele unter den Schlangen ganz gewis giftig sind; so sezen wir ein gerechtes Mistrauen in alle Bilsen, weil viele unter ihnen gewis zu den Giften gehören; so stellen uns überhaupt die Kräuterkenner ganze Ordnungen von Gewächsen auf, die, so wie in ihren äusern, also auch in ihren innern Eigenschaften mit einander übereinkommen, obgleich diese Vergleichungen so lange noch sehr unvollständig sind, so lange wir noch an einer und eben derselbigen Pflanze, sogar an einer und eben derselbigen Frucht Theile von ganz verschiedenen Kräften, unter einer und eben derselbigen Gattung ganz unschädliche und giftige Arten finden. Unter diesen Ordnungen sind nun vorzüglich die Nachtschattenarten,

---

faut éclairer les juges sur ce delit? à Londres et Paris 1784. 8. 4) Sallin Recueil periodique de la societé de medecine de Paris rédigé par I. C. Sedillot jeune. à Paris. 8. B. VII. an. VIII. n. XII. S. 343. &c.

www.dlibra.wum.edu.pl

und die im Waſſer wachſenden Schirmpflanzen verdächtig; ſo ſchlieſen wir aus dem Knoblauchgeruch, den ein mineraliſcher Körper auf glühenden Kohlen von ſich gibt, auf eine giftige Eigenſchaft, weil wir einen ſolchen Geruch am Arſenik wahrnehmen.

4) Wenn ſie von Vieh, es werde denn durch Hunger oder Liſt darzu verleitet, oder durch Wechſel der Weide oder Krankheit in ſeinem Naturtrieb geſtört, nicht berührt und gefreſſen, ſondern vielmehr ſo wohl auf der Weide, als in der Krippe verachtet werden, wenn ſie ſelbſt Ziegen und Schweine verabſcheuen. Dieſes Merkmal gilt nun freilich nicht ſo wohl von Mineralien, da ohnehin nur ſehr wenige derſelbigen den Thieren zur Nahrung dienen, ſelbſt nur mit groſer Einſchränkung von giftigen Thieren, da nicht alle unſchädliche dieſe fliehen, ſondern vornemlich von den Giften des Pflanzenreichs.

5) Noch mehr, wenn die Thiere, denen wir ſolche zweifelhafte Körper mit Liſt oder Gewalt, durch den Mund, oder den Aſter, oder durch eine Wunde beibringen, Schaden davon leiden, wenn bei ihnen auf den Genuß ſolcher Körper plözlich, ohne daß ſie zuvor krank geweſen wären, grauſame, heftige Zufälle, Zukungen, Schmerzen, Ohnmachten, Schlafſucht, Blutflüſſe u. dgl. erfolgen, noch mehr, wenn ſich bei ihrer Zergliederung Löcher in dem Magen und in den Gedärmen, Brandfleken in dieſen Theilen, die ſich keiner andern Urſache zuſchreiben laſſen, ſtarke der Fäulung ſich nähernde Auflöſung des Blutes, ein ſtark aufgetriebener Unterleib finden, ſolche Umſtände können hier ein Licht aufſteken. Dieſen Weg, die Wirkſamkeit anderer Körper auf den thieriſchen zu erforſchen, betraten ſchon die älteſten Aerzte, und

www.dlibra.wum.edu.pl

in spätern Zeiten Wepfer o) mit einigen seiner Zeitgenossen und Freunden, G. Ad. Theoph. Sprögel p), Ge. Karl Hillefeld q), Er. Viband q*) u. a. heiterten in der That auf diesem Wege diese Dunkelheiten etwas auf. So gab z. B. einer von Wepfer's Freunden einer zweijährigen Kaze nach und nach drei Quintchen gestossener bitterer Mandeln; bald darauf war ihr Mund und Rachen voll eines dünnen Wassers, welches immer zäher wurde; sie zitterte am ganzen Leibe, und fiel, als dieses aufhörte, in tiefen Schlaf, blieb unbewegt liegen, und schlos die Augen zu; nach einer halben Stunde bekam sie heftige Erschütterungen des Kopfes, welches sie aus dem Schlaf wekte; sie öfnete nun die Augen, sahe die Umstehenden an, schrie, und wollte davon laufen; sie konnte jedoch nicht von der Stelle kommen, und, als man ihr, um sie fortzujagen, einen Stoß gab, kroch sie nur, wie ein Wurm, und schleppte die Hinterbeine nach sich, kam aber nur bis in die Mitte des Zimmers, wo sie sich auf die rechte Seite legte, die heftigsten Krämpfe im Magen bekam, und alles, was sie zuvor zu sich genommen hatte, von sich geben mußte, darauf aber sich bald wieder erholte, nur daß sie noch eine Zeitlang immer wieder Speichel im Munde hatte. Allein auch, wenn es ausgemacht ist, daß ein Thier, dem solche verdächtige Körper beigebracht wurden, gänzlich gesund war, darf man sich auf solche Erfahrungen nicht im-

o) a. a. O.

p) Experimenta circa varia venena in vivis animalibus instituta. Goetting. 1753. 4.

q) Experimenta quaedam circa venena. Goetting. 1760. 4.

q*) Försög ög Erfaringer om Giftars Virkaeng pa Dyr Kiobenh 1792. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

mer so weit verlassen, daß man davon zuversichtlich auf den menschlichen Körper schliesen kann.

Denn der Körperbau der verschiedenen Thiere weicht zu sehr von dem Bau des menschlichen Leibes ab, den der Arzt zum Augenmerke hat, als daß der gleiche Stoff auf alle den gleichen Einfluß haben sollte. Welch ein groser Abstand ist zwischen den Thieren der niederen Klassen und denen der oberen! Der Wurm und das Insekt haben in ihren Gefässen einen kalten ganz blaß gefärbten Saft, dessen Umlauf sehr langsam ist; sie ziehen die Luft auf eine andere Art und durch andere Werkzeuge ein, und selbst ihre Nahrungs- und Verdauungswerkzeuge sind ganz anders beschaffen. Der Fisch, die Schlange, der Frosch, deren Körperbau dem menschlichen doch schon näher kommt, wie weit sind sie doch von ihm unterschieden!

Immer noch kaltes Blut, immer noch ein sehr langsamer Umlauf der Säfte, immer noch andere Werkzeuge des Athmens, immer noch eine grose Verschiedenheit in den Werkzeugen der Verdauung, auf welche die meisten Gifte zuerst wirken. Auch die Vögel, die den Säugthieren zunächst stehen, haben einen ganz andern Magen; denn so wie er bei den meisten Säugthieren häutig ist, so besteht er bei diesen aus starken Fleischfasern, welche sie in Stand sezen, die härtesten Körper zu bezwingen — die, nach dem gewöhnlichen Gange der Natur, den meisten Säugthieren, wo nicht tödlich, doch gewis höchst schädlich sein würden; so wissen wir z. B. von vielen Vögeln, daß sie kleine Steine, und zwar harte Kieselsteine verschlingen. Aber selbst die Säugthiere, die mit dem Menschen so viele Aehnlichkeit haben, daß sie die grösten Naturforscher mit diesem unter eine Klasse

www.dlibra.wum.edu.pl

ſezen, wie weit ſteht auch bei ihnen der körperliche Bau von demjenigen des Menſchen ab! Man betrachte, um anderer Verſchiedenheiten nicht zu gedenken, nur den Magen, weil er doch derjenige Theil iſt, der von den meiſten Giften am erſten und am meiſten zu leiden hat, derjenige, von welchem ſich die unſeligen Wirkungen des Giftes am häufigſten erſt auf die übrigen verbreiten. Bei den wiederkäuenden Thieren iſt er vierfach; bei dem Pferde hat er oben eine Klappe; bei den Raubthieren iſt er in der Mitte ſehr verengert; bei dem Elephanten in Verhältnis zum ganzen Thiere ſehr klein; bei der Maus kleiner, als der Blinddarm; bei dem Affen hat der Blinddarm keinen Abſaz: ſchon dieſe Abweichungen müſſen es ſehr wahrſcheinlich machen, daß nicht jeder Körper, der dem einen Thiere ein Gift iſt, es auch dem andern ſein müſſe; dieſe Muthmaſung beſtätigen die häufigen Wahrnehmungen, welche man gemacht hat, daß Körper, die dem einen Thiere ein ſchreckliches Gift ſind, dem andern, wo nicht zur Nahrung dienen, doch unſchädlich ſind. Viele dem Menſchen giftigen Gewächſe ſind die Wohnung und Nahrung vollkommener und unvollkommener Inſekten; in dem Waſſer, womit man ſie angegoſſen hat, ſchwimmen Myriaden mikroſkopiſcher oder ſogenannter Infuſionsthierchen; unterſchiedene Käferarten hält weder Arſenik, noch Sublimat von unſern Bücher- und Kräuterſammlungen ab; die Bienen in Pontus ſaugen, ohne ſich ſelbſt zu ſchaden, aus den Blumen der giftigen Azalea Honig, welcher nach Xenophon's Erzählung, ein ganzes griechiſches Heer zu Boden ſchlug; die Fiſche, Schildkröten, Kröten und Fröſche der ſüſſen Waſſer freſſen viele Waſſerpflanzen, welche dem Menſchen ein Gift ſind; viele Vögel freſſen den Schierlingsſamen gerne, und freſſen ihn ohne Schaden, und nach Kaſp. Bauhin laſſen ſich Tau-

www.dlibra.wum.edu.pl

ben, Wachteln, Hühner, selbst Gänse und Schweine bei mäßigem Gebrauche mit Samen von Sommerlolch mästen. Gleisse schadet überhaupt keinem unvernünftigen Thiere; Pferde fressen, wenn es getroknet ist, das Eisenhütchen; Schafe, nach Aelian's Bericht, Schierling und Küchenschelle; Ziegen sowohl diese als die scharfen Wolfsmilcharten; Hunde die Schierlingswurzel ohne Schaden.

So belehren uns auf der andern Seite viele Beobachtungen, daß Körper, welche dem Menschen nicht im mindesten schädlich sind, oder doch keine tödliche Wirkung auf ihn äusern, z. B. Oele, sogar milde Oele, wenn man ihre ganze Oberfläche damit überschmiert, fast allen Würmern und Insekten tödlich sind. Terpentinöl, Severbaumöl, selbst Anisöl erregt bei Tauben und Kazen, wenn es ihnen von einem Skrupel bis zu einem Quintchen eingegeben wird, Zittern, Zukungen, Betäubungen, Unempfindlichkeit, Schlummer, Lähmung, und zieht zuweilen den Tod nach sich [r]); laufendes Queksilber ist, Spulwürmern und Läusen tödlich; Kalch, Asche auch gemeines Kochsalz, Gartenschneken und Blutigeln; Kampher, von welchem zehen bis sechzehn Gräne einem Kaninchen nichts schadeten [s]), und ein halbes Quintchen bis zu zwei Skrupeln bei einem Menschen zwar eine Art von Berauschung und Sinnlosigkeit, Ekel, Wahnsinn, sogar einen Anfang von Wuth, starke Hize und Zukungen [t]) und in

---

r) Hillefeld a. a. O. S. 37. ꝛc,

s) Ebendas. a. a. O. S. 31. 32.

t) 1) S. L. de Maza Compend. medico-pract. de venen. S. 3. 2) Alexander medicinische Versuche und Erfahrungen aus dem Engl. übersezt. Leipz. 1773. 8. S. 96.

www.dlibra.wum.edu.pl

noch stärkerm Gewichte allgemeine Kälte, Erblassen und Ermattung erregt u), Hunde toll macht x), aber beiden nicht tödlich ist, tödet das meiste kleine Ungeziefer, Frösche, Vögel, und Kazen y); Fischkörner und der Samen mehrerer Wolfsmilcharten ist den Fischen, gemeines Kochsalz den Wassersalamandern, Weingeist den Salamandern überhaupt, so wie den Schildkröten z) und Fröschen a); Dillsamen dem Krummschnabel und Dompfaffen; Petersilie den Papageien und andern Vögeln; Hollunderbeere jungen Hühnern; bittere Mandeln den meisten Vögeln, und so wie die Fischkörner, den meisten Säugthieren, die Gundelrebe und das Ockel der Araber den Pferden, der Pfeffer den Schweinen, der Burbaum den Kamelen, die Kalmie und die Bâka der Araber den Schafen, das Riedigras, der Wasserpfendesamen b) und die Wurzel des Frühlingssafrans c) dem Hornvieh tödlich.

---

u) Alexander a. a. O.

x) Brunwell Medical observations and inquiries by a Society of Physicians at London. London. 8. B. VI. 1784.

y) Menghini Comment. Academ. et Instit. Bonnon. B. VI. S. 199. &c.

z) Schon wenn man ihnen etwas davon eingibt, noch mehr, wenn man etwas davon auf das entblößte Herz legt, die ersten schon, wenn man sie darein wirft, wenn sie auch den Kopf über dem Weingeist haben. Rosa. Lettera quarta sopra alcune curiosità fisiologiche 1783. 8. S. 139.

a) Wenn sie darein geworfen werden, in 3 Stunden, Rosa a. a. O. S. 150.

b) Hacquet's neue Sammlung nüzlicher Unterrichte von der krainischen Gesellschaft des Akerbaues und nüzlicher Künste. Laybach 4. B. I. 1779. S. 51.

c) Ebendersf. a. a. O. S. 29.

www.dlibra.wum.edu.pl

Aus diesen Erfahrungen erhellt also, daß, wenn es auch viele Körper gibt, welche für den Menschen eben sowohl Gifte sind, als für andere, vornemlich Säugthiere, manche, die beinahe allen Thieren einen unvermeidlichen Tod bringen, es doch ein sehr gewagter Schlus sein würde, wenn man folgern wollte: dieser Körper äusert in diesem oder jenem Thiere nachtheilige und tödliche Wirkungen; also muß er sie auch im Menschen äusern, oder: dieser oder jener Körper ist diesem oder jenem Thiere oder allen übrigen unschädlich, also ist er es auch gewis dem Menschen.

Auch das Einsprizen in die Blutgefässe von Thieren gibt keinen sichern Aufschlus über die giftige oder unschädliche Natur der Körper. Weingeist erregt, wenn er einem Hunde oder anderen Thiere in die Adern gesprüzt wird, Zittern, Zukungen, Herzklopfen, Engbrüstigkeit und zuweilen d) so wie Mohnsaft und Oele, wenn sie auf die gleiche Weise beigebracht werden e) den Tod.

Um mehrere Gewisheit zu erlangen, wird es demnach nothig, am menschlichen Leibe selbst Versuche zu machen; diese können entweder mit dem Blute oder andern Säften eines

---

d) 1) Philosophic. Transactions. B. XXVII. n. 335. S. 496. 497. 2) Sprögel a. a. O. S. 76. ꝛc. §. 39. Ext. 48—50.

e) F. Fontana Traité sur le venin de la vipere, sur les poisons americains, sur le Laurier - cerise et sur quelques autres poisons vegetaux; on y a joint des observations sur la structure primitive du corps animal, differentes experiences sur la reproduction des nerfs et la description d'un nouveau canal de l'oeil. à Florence. B. I. II. 1781. 4. übers. seit, Berlin. B. I. II. 1787. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

gesunden Menschen auser dem lebendigen Leibe, oder an Missethätern, oder an uns selbst angestellt werden.

Die Versuche der ersten Art erläutern lange nicht so viel, als sich manche, welche sie gemacht haben, einbildeten: denn die meisten wirken auf den menschlichen Körper, in so ferne er lebendig ist; die meisten stürmen auf die Lebenskräfte los, und schlagen sie plözlich nach und nach darnieder, und einige unter diesen äusern ihre volle Wirkung, ohne gerade in den Säften eine sehr merkliche Veränderung hervorzubringen; die Aerzte also, welche ohne Beurtheilungskraft aus solchen Versuchen und ihrem Erfolge auf ähnliche Wirkungen im lebendigen Körper schlossen, sind allerdings zu übereilt gewesen; sie haben den wichtigen Gesichtspunkt, daß der Arzt den Einflus der Gifte auf den lebendigen Leib zu betrachten hat, zu sehr aus den Augen verloren, und auf diesen Grund eine Menge sinnreicher Hypotheſen erbaut, wovon ein groser Theil, so weit er noch steht, alle Tage Gefahr läuft, in sein altes Nichts zurük zu fallen. So sahen sie z. B. daß, wenn sie Mohnsaft, mit frischem, so eben gelassenem Blute vermischten, dieses davon sehr dünn ward, und einen weit grösern Raum einnahm; sie erklärten also die Wirkung des Mohnsaftes daraus, daß er das Blut sehr verdünne, die Gefässe stark ausdehne, und da er diese Wirkung auch im Hirn äusere, das Werkzeug der innern Sinne und den Ursprung der Nerven drüke. Allein warum äusert der Mohnsaft seine Wirkung gerade im Gehirne, und nicht vielmehr in einem andern Eingeweide, z. B. in den Augen, deren Gefässe eben so weich sind, eben so wohl nachgeben, und sich ausdehnen lassen? Warum äusert eine Pille von Mohnsaft, die unverändert, ohne am Gewicht verlohren zu haben, wie-

www.dlibra.wum.edu.pl

der durch den Stuhl abgeht, ohne daß wir nur muthmassen könnten, es sei etwas davon in die Blutgefässe übergegangen, schon ihre schlafmachende Kraft?

Darzu kommt denn noch, daß uns solche Versuche leicht verleiten können, Körper für Gifte anzusehen, welche es nicht sind, und umgekehrt andere Körper für unschädlich zu erklären, welche wahre Gifte sind. Die Auflösungen der Metalle in mineralischen Säuren, welche gröstentheils Gifte sind, die wasserfreien mineralischen Säuren selbst, denen wohl niemand ihre Ansprüche an diese Klasse von Körpern streitig machen wird, haben eine Kraft, die thierischen Säfte zum Gerinnen zu bringen; aber diese Kraft kommt den mineralischen Säuren auch noch dann zu, wenn sie so sehr mit Wasser verdünnt sind, daß sie alle giftige Schärfe verlohren haben; sie kommt auch dem Weingeist zu, würde man also nicht ungereimt schliesen, wenn man deswegen, weil die verdünnten mineralischen Säuren, weil der Weingeist die Säfte zum Gerinnen bringt, diese unter die Gifte rechnen, oder umgekehrt, weil diese lezten nicht giftig sind, auch jene Metallauflösungen und wasserfreien Säuren für unschädlich erkennen wollte? Nur dann können solche Versuche nüzen, wenn man schon einmal überhaupt weis, daß diese oder jene Körper Gifte sind; dann lehren sie zuweilen, unter welche Klasse von Giften man sie zu ordnen habe: denn so haben die meisten betäubenden Gifte, so wie die meisten thierischen, die Eigenschaft, das Blut heftig aufzulösen; die wasserfreien mineralischen Säuren, und die Auflösungen metallischer Körper in denselbigen, eine Kraft die Säfte zu verdiken.

Bei der Unzulänglichkeit dieser Beweise haben die Aerzte, so oft ihnen Körper vorkamen, von welchen sie noch nicht

www.dlibra.wum.edu.pl

versichert waren, ob sie überhaupt, und ob sie eine schädliche oder heilsame Wirksamkeit auf den menschlichen äusern würden, schon längst ihre Zuflucht zu Missethätern genommen, welche die Gerechtigkeit ohnehin zum Tode bestimmt hatte, und welche auf diese Weise der Welt noch nüzen konnten, und ihnen nach dessen unterschiedener Art das Gift bald auf diese, bald auf jene Weise beigebracht; bald innerlich eingegeben, bald, weil viele Gifte ihre Wirkung nur dann äusern, wenn sie unmittelbar mit dem Blute vermischt werden, äuserlich angebracht. So wurde in England der erste Versuch mit dem Einimpfen der Kinderblattern an einer Kindesmörderin gemacht, so versuchte Matthiol die Kraft des Eisenhütchens an einigen Missethätern.

Allein zum lezten Mittel findet sich nicht immer Gelegenheit; dann bleibt also kein anderes mehr übrig, uns von der Natur eines solchen Körpers zu versichern, als dasjenige, das Konr. Gesner; und in neuern Zeiten A. v. Störck, Krapf, Alexander u. a. so oft zum gröſten Vortheil der Arzneikunst gebrauchten, ähnliche Versuche an sich selbst zu machen; diese Forderung an die Aerzte scheint zwar fürchterlich, verliert aber ihre fürchterliche Seite, so bald man die Bedingungen weis, unter welchen, und die Fürsichtsmaasregeln kennt, mit welchen dergleichen Versuche anzustellen sind.

Ist man also auf keinem der vorher angezeigten Wege so weit gekommen, die Natur des Körpers, mit dessen Untersuchung man sich beschäftigt, zu ergründen, so bringt man ihn, und zwar, wenn er anderst dadurch nicht zu sehr verändert wird, in flüssiger Gestalt auf die Haut, am besten zwischen den Fingern, reibt ihn auch wohl, wenn er troken

www.dlibra.wum.edu.pl

ist, darauf, oder läßt ihn einige Zeit darauf liegen; frist er die Haut entweder plözlich, oder doch nach einiger Zeit an, erregt er Entzündung, Blasen, heftige Schmerzen, Geschwüre, wohl gar Krämpfe u. dgl.; so läßt sich sicher schliesen, daß er noch viel gewaltsamer auf die innere mehr blos liegende und empfindlichere Haut des Magens und der Gedärme wirken wird, und es fließt daraus ein gegründeter Verdacht, daß dieser Körper Gift sei.

Allein auch davon giebt es Ausnahmen. Es gibt Körper, welche auf der Haut die erzehlten Zufälle verursachen, und doch keine Gifte, ja wohl gar eßbar sind, und es gibt andere, welche keinen dieser Zufälle veranlassen und doch wahre Gifte sind. Verschaft also dieser Erfolg keine Gewisheit, so untersucht man den verdächtigen Körper behutsam durch den Geruch; hat er da etwas widriges, betäubendes, oder ausserordentlich scharfes und erstikendes, oder riecht er, wenn man ihn auf glühende Kohlen wirft, nach Knoblauch, so ist er wahrscheinlich giftig.

Aber auch diese Probe halten einige unbezweifelte Gifte aus. Blei hat keinen Geruch, und gibt auch, wenn es auf Kohlen geworfen wird, keinen von sich, und doch ist Blei eines der mächtigsten unbezwinglichsten Gifte.

Läßt sich aber dadurch noch keine Gewisheit über die Beschaffenheit des verdächtigen Körpers erhalten, so untersucht man ihn, doch mit der größten Behutsamkeit durch den Geschmak, und bringt ganz wenig davon ganz fürsichtig an die Spize der Zunge, und nachher sogleich wieder aus dem Munde. Zeigt er da ausnehmende Schärfe, erregt er Krampf, Röthe, Entzündung, Erstarren der Zunge, brennende hart-

www.dlibra.wum.edu.pl

näkige Schmerzen, Unempfindlichkeit und Mangel des Geschmaks, ein Abschälen der Oberhaut und Sprünge auf der Zunge, und im Rachen ähnliche Zufälle, Bluten aus dem Zahnfleische, völlige Unvermögenheit oder doch beträchtlichen Widerstand in der Aussprache, häufigen und starken Zufluß des Speichels, erregt er sogar, wo nicht sogleich durch ölichte, lindernde, saure, der Faulnis widerstehende Mittel gesteuert wird, kalten Brand, folgen die beschriebenen Zufälle bald auf den gemachten Versuch, sind sie etwas anhaltend, gesellen sich ihnen Verwirrung im Kopf, Bangigkeit und Angst, Zukungen in entfernten Theilen bei, so ist der geprüfte Körper gewis Gift, und dann ist es Zeit, seinen fernern Wirkungen Einhalt zu thun.

Aber auch da können noch viele Gifte unbekannt bleiben. Das reine Metall und das Glas vom Spiesglanze haben weder roh, noch, wenn sie auf glühende Kohlen geworfen werden, Geruch; sie sind aber auch ganz ohne Geschmak, und doch verdienen sie unter den mineralischen Giften eine der ersten Stellen. Einige Aerzte sind vielleicht aus einer die Pflichten gegen sich selbst verlezenden Liebe zur Wahrheit noch weiter gegangen; sie haben sich der Wirkung solcher Körper noch mehr blos gestellt, und um ihre Natur selbst zu ergründen, selbst ihr Leben aufs Spiel gesezt. Wenn auch die Beschuldigung, welche mehrere Schriftsteller Konr. Gesnern gemacht haben, daß er aus einem solchen übertriebenen Eifer für Wahrheit an sich selbst einen Mord begangen habe, wie Herr v. Haller deutlich dargethan hat, ungegründet ist, so ist doch so viel gewis, daß er viele dergleichen verdächtige Körper, nicht nur durch die Werkzeuge des Geruchs und Geschmaks geprüft, sondern sie sogar, um

www.dlibra.wum.edu.pl

sich von ihrer Wirksamkeit zu versichern, hinunter geschlukt hat.

Bei einem solchen Versuche mus sich daher der Arzt sehr wohl fürsehen, von dem verdächtigen Körper nur wenig zu sich nehmen; sich, ehe er es zu sich nimmt, mit Brechmitteln, und andern öhlichten, wässerichten und sauren Gegengiften versehen, damit, wenn die Wirksamkeit des Giftes zu stark wird, er dieselbige sogleich hemmen kann, auch indem er sich diesen Wirkungen ausezt, nicht allein bleiben, weil sich leicht Zufälle ereignen können, welche ihm den freien Gebrauch seiner Sinne rauben, ihn dadurch hindern, das zu beobachten, was er beobachten wollte, und selbst solche, die ihm den schleunigen Beistand anderer nothwendig machen: wenn er alsdann, wenigstens in ihrem Anfange, die Zufälle zu erleiden hat, welche auf den Gebrauch dieses oder jenes Giftes erfolgen, welche, wenn ihnen kein Einhalt geschieht, dem Leben selbst ein Ende machen würden, dann kann er sich freilich, doch mit der äuserstен Gefahr seines Lebens, versichern, daß solche Körper Gifte sind.

Zwar hat der gütige Schöpfer der Natur allen Körpern, deren Gebrauch auf den unsrigen schädlich wirken könnte, gewisse Merkmale aufgedrükt, durch die er uns gleichsam warnen wollte: unvernünftige Thiere, deren Naturtrieb noch unverdorben ist, rohe Völker, die der Natur noch getreu sind, und ihre Sinnen noch nicht durch feine Lebensart, und Weichlichkeit abgestumpft haben, folgen diesem wohlthätigen Winke von selbst; aber Menschen, die sich auf eine höhere Stuffe der Aufklärung stellen, übersehen, wenn sie nicht sehr auffallend sind, gemeiniglich diese Merkmale, und finden sich dadurch genöthigt, das durch lange Umwege zu suchen, was

www.dlibra.wum.edu.pl

sie auf dem leichtesten und kürzesten Wege hätten finden können, wenn sie der Natur hätten folgen wollen.

Die Gifte unterscheiden sich, so wie alle andere natürliche Körper, durch gewisse äuserliche in die Sinne fallende Eigenschaften, sowohl unter sich, als von jedem andern natürlichen Körper; diese unterscheidenden Merkmale gibt die Naturbeschreibung an, bei welcher sich also der Arzt Raths erholen muß.

Oft aber mangeln diese Merkmale, weil die Körper nicht mehr in ihrer natürlichen Gestalt sind, oder sie sind zweideutig, oder lassen es noch im Zweifel, ob dieses oder jenes Gift vor sich habe; das gilt vornemlich von den mineralischen, und unter diesen insbesondere von denen durch Kunst hervorgebrachten Giften. In einem solchen Falle nimmt der Arzt seine Zuflucht zur Scheidekunst, borgt von ihr die Merkmale, wodurch sich die Körper unterscheiden, vermischt den Körper, den er zu untersuchen hat, mit mancherlei Salben und andern Auflösungsmitteln, bringt ihn rein und unvermischt, sowohl als mit andern Körpern versezt, in offene und geschlossene, schwächere und stärkere Hize, bemerkt die Erscheinungen, die sich bei allen diesen Arbeiten zeigen, genau, vergleicht sie mit solchen, wie sie der Scheidekünstler bei Behandlung bekannter Gegenstände beobachtet, und schließt aus ihrer Uebereinstimmung oder Verschiedenheit auf die innere Natur des Körpers. Trift er z. B. bei Untersuchungen dieser Art auf einen Körper, der auf glühende Kohlen geworfen, ganz in einem diken, weisgrauen, nach Knoblauch riechenden Rauch aufgeht, der in verschlossenen Gefässen bei starker Hize einen weissen, wenn er aber mit Schwefel versezt ist, einen gelben oder rothen Sublimat gibt, der roh oder in seinen

www.dlibra.wum.edu.pl

Dämpfen dem Kupfer seine rothe Farbe nimmt, und sie in eine weisse verwandelt u. dergl., so kann er gewis sein, daß es Arsenik ist.

Aber oft ist bei solchen Fällen des verdächtigen Körpers zu wenig vorhanden, als daß der Arzt eine chemische Prüfung damit vornehmen, oder wenn er sie auch unternimmt, zuverläßige Schlüsse daraus ziehen könnte; dann versucht er es mit einem Hunde oder einem andern gesunden Thiere, bringt ihm etwas von dem verdächtigen Körper durch den Mund oder eine Wunde bei, hat auf die Zufälle, welche er erregt, genau Acht, vergleicht sie mit denen, welche man bei solchen Thieren auf den Gebrauch bekannter Gifte wahrgenommen hat, und sucht daraus ihre Natur zu ergründen. Wenn z. B. ein Hund sogleich auf den Genuß eines solchen Körpers in die gewaltsamsten Zukungen verfällt, wenn er durch Mund und After häufigen, stinkenden, blutigen Unrath von sich gibt, wenn er sogleich ermattet und zu Boden sinkt, wenn er in wenigen Minuten darauf mit dem Tode ringt, wenn sich bei seiner Zergliederung Löcher und Brandflecken im Magen und in den Gedärmen finden, wenn sein Aas ganz schnell in Fäulung geht, so läßt sich mit einer der Gewisheit zunächst kommenden Wahrscheinlichkeit schliesen, daß dieser Körper giftig war.

Kommt also der Arzt in einen solchen Fall, wird er zu einem Kranken gerufen, von welchem man argwohnt, daß er Gift bekommen oder eingenommen habe, oder bestellt, die Leiche eines solchen Unglüklichen zu öfnen, um sein Urtheil über diesen Verdacht zu fällen, so muß er dabei nicht blos als Arzt zu Werke gehen, sondern um seiner Sache gewis zu werden, auch andere Umstände in Erwägung ziehen; er muß sich

1) nach

www.dlibra.wum.edu.pl

1) nach der Gemüthsstimmung seines Kranken erkundigen, ob er heiter und aufgeräumt, Herr über seine Leidenschaften gewesen sei, oder ob ihn unbezwingliche Schwermuth, Raserei, innerlicher Kummer und Unzufriedenheit mit seiner Lage, heimliche oder offenbare und zügellose Leidenschaft, fehlgeschlagene Hofnung, gezwungene Unempfindlichkeit und Verachtung des Todes, gefährliche Neugierde oder äusere Umstände zu dem verzweifelten Entschluße, sich selbst das Leben zu nehmen, haben bringen können. Kann er von dem lezten sichere Nachricht einziehen, so ist schon der erste Schritt zur Untersuchung gemacht.

So erzehlt Plinius Secundus f) von dem Vater des Licinius Cecinna, daß, da ihn seine lange Krankheit des Lebens überdrüssig machte, er sich mit Mohnsaft das Leben nahm.

2) Muß sich der Arzt, nicht nur überhaupt nach den Einsichten des Kranken, sondern insbesondere nach seinen Kenntnissen in diesem wissenschaftlichen Felde erkundigen; lassen ihn diese vermuthen, daß er leicht einen giftigen mit einem heilsamen oder doch unschädlichen Körper verwechseln konnte, so verstärkt sich der Argwohn.

3) Muß er nachfragen, ob die Leute, mit welchen der Kranke umgegangen, mit welchen und aus deren Händen er gespeißt hat, von einer solchen Denkungsart, und besonders von einer solchen Gesinnung gegen den Kranken sind, daß er ihnen auch von ferne die verruchte Absicht zutrauen konnte, diesen aus dem Wege zu räumen, ob sein Verhalten gegen sie so gewesen ist, daß sie seinen Tod hätten wünschen kön-

---

f) Histor. natur. B. XX. K. 18.

www.dlibra.wum.edu.pl

nen. So war die Magd in dem Falle, den Wepfer g) erzehlt, so der abgelebte Wollüstling in der Geschichte von Kaauw Börhaave h), so der griechische Kaiser Emanuel i), als das ganze Heer des abendländischen Kaisers Konrads III. darauf ging, allerdings in einem starken Verdacht, daß sie Gift beigebracht hätten; so konnte hingegen den Kammerdiener des Brandenburgischen Churfürsten Joachims II. der gegen ihn rege gewordene Argwohn, er habe seinen Herrn durch einen Trank i*) vergiftet, schon deswegen nicht treffen, weil er mit dem Tode seines Herrn alles zu verlieren in Gefahr stand k).

4) Muß er sorgfältig nachforschen, ob der Mensch, von welchem er vermuthet, daß er Gift bekommen habe, vorher ganz gesund war, denn eine Krankheit muß in der Wirkung nothwendig eine Aenderung machen, sie in dem einem Falle schwächen, in dem andern verstärken, und man kann dann leicht das für die Wirkung eines Giftes ansehen,

---

g) a. a. O. S. 275.

h) a. a. O. S. 282.

i) S. Stengel bei Lindestolpe lib. de venenis Francf. et Lipſ. 1739. 8. S. 444.

i*) oder Giftbecher nach Thuanck's Hiſtor. ſui tempor. Lond. 1733. B. III. S. 68.

k) Möhsen Beschreibung einer berlinischen Medaillensammlung, die vorzüglich aus Gedächtnismünzen berühmter Aerzte besteht, nebst einer Geschichte der Wissenschaften in der Markbrandenburg, besonders der Arzneiwissenschaft von den ältesten Zeiten an bis zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts. Berlin und Leipzig 4. Th. II. 1781. S. 517. 519.

www.dlibra.wum.edu.pl

was doch im Grunde Wirkung der Krankheit war l); er muß demnach, wenn ihm dieser Fall vorkommt, die Zufälle genau mit denen vergleichen, die er in einem andern Fall dergleichen Krankheit wahrnahm, wo aber auch nicht der entfernteste Argwohn von Vergiftung statt findet. Wenn ein ganz gesunder Mensch auf einmal unvermuthet die Zufälle erfährt, wie ich sie hernach beschreiben werde, so ist der gröste Argwohn da, daß er Gift bekommen habe m). Wenn sich bei einem Kranken auf einmal wider den gewöhnlichen Gang der Krankheit, und ohne daß man eine andere Ursache davon anzugeben wüßte, die Zufälle auf das äuserste verschlimmern, und den Kranken dem Tode geschwind nahe bringen, so hat man alle Ursache, Argwohn auf Gift zu schöpfen; so war der Fall, den Wepfer n) erzehlt. Wenn sich zu der Krankheit plözlich fürchterliche bei dieser Art von Krankheit ganz ungewöhnliche Zufälle, die, wo nicht geradezu tödlich, doch unheilbar sind, gesellen, und wenn überhaupt die Zufälle so gemischt sind, daß es einem geübten Arzte leicht wird, von der einen Seite die Zufälle der Krankheit, von der andern die

---

l) Dieses war in dem so eben angeführten Falle wirklich so, Möhsen a. a. O. S. 514.

m) So verfiel z. B. der junge Herzog von Mailand Johann Galeacius von Gift, das ihm sein Oheim Ludwig beibringen lies, plözlich in eine heftige und tödliche Krankheit, die man dann für natürlich ausgab. Guicciardini Istoria d'Italia. T. II. L. 1. S. 26. und Gordon vie de Pope Alexandre et de son fils Borgia, traduit de l'anglois. Amsterdam 1732. B. I. S. 76.

n) a. a. O. S. 274.

www.dlibra.wum.edu.pl

Wirkungen des Giftes zu erkennen, so läßt sich auch daraus Aufschluß erlangen.

5) Muß er sich versichern, ob sich nicht der Mensch, welchen er vor sich hat, durch lange anhaltenden nagenden Kummer, durch anhaltende, verderbene, unordentliche und lüderliche Lebensart, vornemlich durch Ausschweifungen in der Liebe und im Misbrauch hiziger Getränke u. dgl. nach und nach eine Auszehrung zugezogen hat, welche oft mit den Wirkungen eines schleichenden Giftes viele Aehnlichkeit hat; denn so sind z. B. die Geschichtschreiber unter sich nicht einig, ob Alexander mit dem Zunamen der Grose an seinen Sünden oder an Gift gestorben ist. Hier ist aber die auserste Behutsamkeit nöthig, und der Arzt findet bei der Beurtheilung und Unterscheidung keiner andern Abtheilung von Giften so viele Schwierigkeiten, als bei dieser; inzwischen werde ich in der besondern Betrachtung dieser Abtheilung einige Merkmale angeben, woran man sie erkennen kann.

6) Muß er erfragen, ob nicht zu der gleichen Zeit mehrere Leute in der gleichen Gegend, welche nicht die gleiche Kost genieſen, auch sonst nicht zusammen kommen, an der gleichen Krankheit darnieder liegen; denn es gibt unter den umgehenden bösartigen Fiebern einige, deren Zufälle den Wirkungen eines Giftes so gleich sehen, daß grose Aerzte dadurch veranlaßt worden sind, die Schuld davon auf ein in einem der allgemeinen Elemente schwebendes Gift zu werfen. Betrachtet man z. B. ein bösartiges Flekfieber; auch sie fallen, ohne daß man zuverläſig eine nähere Ursache anzugeben wüſte, plözlich an; plözlich stellt sich Betäubung und Schlummer, oft auch Raserei, oft Zukungen am ganzen Leibe oder in einzelnen Theilen, oft auch heftiges Erbrechen, starke

www.dlibra.wum.edu.pl

Bauchflüsse ein; es zeigen sich wie vom Arsenik, rothe, zuweilen schwarzblaue gleichsam Brandflekken auf der Haut; die Leiche schwillt sogleich nach dem Tode stark auf, und geht schnell in Fäulung o). Bei einer solchen Uebereinstimmung der Zufälle muß also der Arzt sehr bedachtsam sein, und, wenn er gewahr wird, daß noch viele andere, welche nicht die gleiche Kost genießen, und bei welchen nicht der geringste Argwohn auf Gift fällt, mit den gleichen Uebeln kämpfen, behutsam unter den Zufällen einer solchen bösartigen Seuche, und unter den Wirkungen eines Giftes unterscheiden.

7) Muß er nachfragen, ob nicht auch andere, welche mit dem Kranken an dem gleichen Orte waren, in dem gleichen Hause wohnen, sich mit der gleichen Arbeit beschäftigen, an dem gleichen Tische gespeist haben, ähnliche Zufälle erfahren, wenn sie auch nicht gerade so heftig sein sollten; findet er dieses, so gibt es ihm schon groses Licht und Anlas zu weitern Untersuchungen. So sah H. Börhaave p) acht Kranke, welche mit einander auf dem Felde umher gelaufen waren, auf einmal in Bangigkeit, Wahnwiz, Reiz zum Erbrechen und Zukungen verfallen, er schloß daraus auf eine

---

o) S. auch bei Wepfer a. a. O. S. 254. ein Beispiel dieser Art.

p) Wie leicht darinnen gefehlt werden kann, und wie grose Fürsicht von Seiten des Arztes nöthig ist, Folgen gewöhnlicher Krankheiten von Wirkungen des Giftes zu unterscheiden, hat unter andern Baylies (in der deutsch. Uebers.) bei Pyl Magazin für gerichtliche Arzneikunst und medicinische Polizei. Stendal 8. B. II. S. 4. 1785. n. 10 S. 653—675. einleuchtend gezeigt.

www.dlibra.wum.edu.pl

ihnen allen gemeinschaftliche Ursache q) und fand sie im Schierling, den sie gegessen hatten. So sah Fr. Hoffmann r) das ganze Haus eines Zinngiesers, der Kupfer mit Arsenik schmolz, in sehr kurzer Zeit aussterben. So ist die Hüttenkaze, die schrekliche Folge der giftigen Bleidämpfe und des Staubes von Glätte bei den Hüttenleuten gemein, welche sich vornemlich mit der Behandlung des Bleis und seiner Erze bei starker Hize, mit dem Wägen der Glätte u. dgl. beschäftigen. So war in dem Falle, den Wepfer s) erzehlt, leicht zu merken, daß die Ursache des Unfalls in der Speise liegen muste.

8) Ist der Arzt also dadurch auf einige Spur gekommen, so muß er zu erfahren suchen, mit welcher Arbeit sich der Kranke kurz vor dem Anfall beschäftiget habe, was er für ein Gewerb treibt; er muß die Kuchengeräthschaft fleisig durchsehen, ob nichts von Blei, Kupfer, Messing darunter ist, ob dieses nicht durch saure Flüßigkeiten, die man darinn aufbewahrt oder gar gekocht hat, angefressen oder gar aufgelößt ist, er muß die Keller durchsuchen, ob der Wein nicht mit Blei verfälscht ist, die Pumpen und Cisternen, in welchen das Wasser aufbewahrt, die Röhren, durch welche es geführt wird, und wenn es Regenwasser ist, selbst die Dächer und Rinnen, über und in welchen es herunter läuft, untersuchen, um zu sehen, ob er nicht in diesen die Quelle des Uebels findet. So erfuhr man z. B. bald, daß P. Hermann,

---

q) Praelect. in propr. instit. medic. ed. Halleri. B. VI. S. 388.

r) Opuscul. patholog. practic. B. II. S. 426.

s) a. a. O. S. 230.

www.dlibra.wum.edu.pl

der grose leidnische Lehrer, über der Zubereitung des sogenannten Spiesglanzöls sein Leben einbüste; so sind gewissen Gewerben, welche sich mit giftigen Körpern, Quekssilber, Blei, Arsenik u. dgl. beschäftigen, Gold- und Silberarbeitern, Töpfern, Berg- und Hüttenleuten u. a. gewisse Krankheiten eigen, welche ihren Grund blos in ihren Arbeiten haben; so fand J. Scheuchzer t) in dem schweizerischen Kloster Engelsberg die Ursache einer endemischen tödlichen Krampfkolik in dem kupfernen und messingenen Küchengeschirr, das gar nicht mehr verzinnt, und, weil man alles ohne Unterschied darinn kochte, so angefressen war, daß es alle Speisen, und selbst die Butter, welche man darinn aufbewahrte, blau färbte; so sah R. J. Camerer u) auf den Genus des mit Blei verfälschten Weins häufig Bleikolik, Percival x) auf den Genus eines Getränkes, das in einem bleiernen Gefässe gegohren hatte, und auf den täglichen Gebrauch von Wasser, das mit einer bleiernen Pumpe ausgepumpt wurde, ein anderer Arzt y), auf den Genus von Wasser, das über ein mit Menninge angestrichenes Dach herunter flos, eben diese erfolgen.

9) Muß der Arzt den Garten besichtigen, aus welchem die Küche des Kranken versehen wird, untersuchen, ob kein giftiges Gewächs darinn ist, und nachfragen, ob der Gärtner oder Koch dieses für ein unschädliches esbares angesehen, und

---

t) Itin. alp. I. S. 12.

u) Diss. de colica paretico-epileptica. Tubing. 1698. 4.

x) Observations and Experiments on the poison of Lead. London 1774. 8. ins teutsche übersezt von Ackermann im Magazin für Aerzte. St. 3. S. 282.

y) Ebendas. S. 281.

www.dlibra.wum.edu.pl

als solches in die Küche gebracht hat; er muß nach dem Orte selbst hingehen, von welchem der Kranke oder die Seinigen sagen, daß er die Wurzeln, das Kraut oder die Früchte genommen hat, von welchen er vermuthet, daß sie nachtheilig auf ihn gewirkt haben, wenn er sich dessen noch zu erinnern weis. So fand Wepfer z) den Grund des Unfalls in dem Klostergarten, ein anderer Arzt a) im Weinberge, noch andere im Walde oder auf dem Kräutermarkte.

10) Zuweilen ereignet es sich, daß Kranke durch Vermessenheit eines Afterarztes, oder durch ein sträfliches Versehen des Apothekers statt Arznei Gift bekommen. Wenn ein Weib, das an der Schwindsucht, aber noch nicht ohne Hofnung zur Wiedergenesung liegt, sogleich auf den Genus eines Tranks von einem Afterarzte die unerträglichsten Bangigkeiten bekommt, die sich nur mit dem Tode endigen, wenn der Wagehals um sich schuldlos zu zeigen das doppelte Gewicht des gleichen Tranks auf der Stelle zu sich nimmt, bald darauf in Unmacht fällt, von Sinnen kommt, und in Zeit von einem halben Tage dahin stirbt, wenn die Aerzte, welchen die Untersuchung dieser Begebenheit aufgetragen wird, keine andere Ursache dieser Todesfälle entdeken können, so ist stark zu vermuthen, daß dieser Afterarzt in der Absicht, Arznei zu reichen, Gift gegeben habe; einen ähnlichen Todesfall erzehlt b) Wepfer, und so bemerkt der berühmte englische Gärtner, Miller, daß die Apotheker zu London zu einer gewissen Zeit statt der Enzianwurzel die Wurzel des Bilsen-

---

z) a. a. O. S. 230.

a) Matthiol Comment. in Dioscord. L. VI. S. 1415.

b) a. a. O. S. 254—256.

www.dlibra.wum.edu.pl

krautes gebraucht, und die Kranken, ohne daß man hinter die Ursache kommen konnte, auf den Gebrauch dieser falschen Enzianwurzel die grausamsten Zufälle empfunden haben. Der Arzt muß also bei einem solchen Falle, wenn ihm die übrigen Umstände nicht Licht genug geben, seinen Kranken fragen, ob, und welche Mittel er schon gebraucht, und von wem er sie gebraucht habe, er muß die Verordnungen in der Apotheke selbst nachsehen, und wenn er in diesen keinen Fehler gewahr wird, die Bestandtheile, welche dazu kommen, sorgfältig durchgehen, und der Ursache des Unfalls nachspüren.

11) Dann muß sich der Arzt auch nach Nebenumständen erkundigen, ob z. B. der Kranke nichts an einem verdächtigen Orte genommen und gegessen habe, ob er nicht, wenn sich der Fall in wärmern Ländern zuträgt, von einer Schlange oder einem andern giftigen Thiere, oder z. B. in Teutschland, in der grösten Hize oder in der grimmigsten Kälte von einem Hunde oder einem andern tollen Thiere, gebissen worden ist, oder sich eine Zeitlang z. B. in einem neu getünchten mit Bleifarbe angestrichenen, verschlossenen, mit schädlicher Luft angefüllten Zimmer aufgehalten habe, u. dgl. So nehmen Kinder öfters das Gift das man Mäusen gelegt hat, und erfahren davon alle die Zufälle, welche Arsenik und Sublimat nach sich ziehen c).

12) Muß der Arzt dem Kranken selbst, wenn er anderst noch bei Sinnen ist, eine Beschreibung desjenigen Körpers abzuloken suchen, dem er die Schuld an seinem Unglük beimißt; so unvollkommen diese auch immer nach der verschie-

c) Einige Beispiele dieser Art erzehlt Wepfer a. a. O. S. 280—282. 302.

www.dlibra.wum.edu.pl

denen Art, und den mancherlei Einsichten des Kranken sein mag, so kann sie ihm doch zuweilen einen Weg zeigen, auf welchem er in seinen Untersuchungen weiter kommen kann. So schloß El. Rud. Camerer d) in seinem Falle aus dem Umstande, daß die Kinder Beeren, wie Wacholderbeeren, die jedoch süs gewesen wären, mit sich nach Hause gebracht hätten, auf die Beeren des gemeinen Nachtschattens; so schloß er in einem andern Falle e), aus der Erzehlung des Kranken, daß er um die Herbstzeit Waldkirschen gegessen und bald darauf diese Zufälle erlitten habe, auf die Wolfskirschen; hier muß man aber immer die Zeit des Jahrs, zu welcher ein solches Unglük geschieht, mit zu Rathe ziehen, und sie mit derjenigen vergleichen, zu welcher dieser oder jener Theil der Pflanze vorhanden oder in seiner größten Wirksamkeit ist. So sind die Wolfskirschen zu Ende des Sommers reif, die meisten Wurzeln im Frühling, die meisten Kräuter, ehe die Pflanze blüht, am wirksamsten.

13) Muß der Arzt von dem Körper selbst etwas zu bekommen suchen, welchem der Kranke oder seine Freunde die Ursache der Unfälle zuschrieben, diesen sorgfältig untersuchen, und, wenn er noch unversehrt und unverändert sein sollte, aus seinen äusern Eigenschaften seine Natur zu bestimmen suchen, und sein Urtheil darauf gründen. So hatte, z. B. ein alter Mann, der sich nebst zwo Frauen im Walde damit vergiftet hatte, noch einige Beeren der Wolfskirsche in der Tasche; so fand Lobstein f) in seinem Falle die Quelle

---

d) Bei Wepfer a. a. O. S. 226.

e) Ebendas. S. 227.

f) In dem Anhange zu Querin Differt. de venenis vegetabilibus Alsatiae Argentor. 1766. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

des Uebels im Zimmer des Kranken; so ein anderer Arzt g) noch an den äusern Theilen des Vergifteten.

14) Allein oft leisten diese äuserlichen Merkmale noch lange kein Genüge, verschaffen nicht die mindeste Gewisheit, oder mangeln gänzlich; dann muß der Arzt den Körper chimisch untersuchen, auf Kohlen streuen, destilliren, sublimiren, mit andern Körpern versezen, und aus den Erscheinungen, die sich ihm hier zeigen, nachdem er sie sorgfältig mit denjenigen verglichen hat, welche nachher noch insbesondere angegeben werden sollen, auf ihre innere Natur schliesen. So weis man z. B. daß Knoblauchgeruch, den ein Körper von sich gibt, wenn er auf glühende Kohlen geworfen wird, und weises Anlaufen von Kupfer, wenn es darüber gehalten wird, auf Arsenik deutet. So zeigte in einem solchen Falle eine solche Untersuchung den Ungrund des Verdachtes h).

15) Aber oft bekommt der Arzt von diesem verdächtigen Körper so ungemein wenig, daß er aus dem Versuche, den er damit anstellt, keinen gültigen Schlus ziehen kann; dann muß er ihn Thieren, am besten Säugthieren vorwerfen, ihnen auch etwa mit einem ihnen sonst angenehmen Futter zu fressen geben, und zusehen, ob sie ihn fressen, und was für Zufälle davon erfolgen. Will das Thier gar nichts davon fressen, so ist es schon ein verdächtiges Anzeichen, stirbt es auf den Genus davon, oder erfährt es doch grausame Zufälle, welche denen mehr oder weniger ähnlich sehen, wie er

---

g) Screta a Zaworzii bei Wepfer a. a. O. S. 282.

h) J. Th. Pyl Aufsäze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Berlin. 8. Erste Sammlung 1783. S. 34—45.

www.dlibra.wum.edu.pl

sie an dem Kranken bemerkt, zeigen sich auch nach dem Tode des Thieres solche Erscheinungen, wie an der Leiche eines Vergifteten, allenthalben Brandflecken, schnelle Fäulung, starkes Aufblähen des Unterleibes, Entzündungen und Löcher im Magen und in den Gedärmen, so ist es äuserst wahrscheinlich, daß dieser Körper ein Gift, und der Kranke demnach vergiftet ist. So gibt man als ein Zeichen eines tollen Hundes an, wenn ein Stük Fleisch, das man ihm nach seinem Tode stark am Munde reibt, einem andern gesunden Hunde vorgeworfen, von diesem nicht gefressen wird; so schlos Wepfer i) aus dem Umstande, daß alle Fliegen, die von einem gewissen Wasser tranken, tod dahin fielen, aus dem Umstande, daß ein Schwein auf die gleiche Weise gerödet worden war, auf die giftige Eigenschaft der Körper, welche ein Kind zu sich genommen hatte, so H. C. F. Richter k) daraus, daß ein Huhn, ein Hund und eine Kaze von einem Brode, welches für vergiftet ausgegeben war, ohne die geringste Veränderung in ihrer Gesundheit, eine beträchtliche Menge gefressen hatten, daß dieser Verdacht ohne Grund war.

16) Oft aber kann der Arzt von demjenigen Körper, auf welchen der Verdacht fällt, gar nichts mehr erhalten; hier kommt ihm zuweilen das Erbrechen und der Bauchfluß des Kranken zu statten, wodurch manchmalen wieder etwas von dem Gifte aus dem Leibe geschaft, und ihm also die Untersuchung leichter gemacht wird; der Arzt muß daher auf das, was durch Mund und Stuhlgang abgeht, sorgfältig Acht haben, mit demselbigen die gleiche Prüfung, wie sie

---

i) a. a. O. S. 275.

k) Bei Ppl a—r, a. O. S. 29—33.

www.dlibra.wum.edu.pl

bereits (13. 14. 15.) angegeben ist, vornehmen, und auf gleiche Weise die Folge daraus ziehen. So sah z. B. El. R. Camerer[1]) in demjenigen, was der Kranke durch Erbrechen von sich gegeben hatte, viele ganze und zerdrükte Beeren und Samen der Wolfskirschen mit ihren Häutchen.

17) Allein sehr oft reichen alle diese Kennzeichen zur vollkommenen Gewisheit nicht hin, oder vielmehr verlassen sie den Arzt zum Theil oder gänzlich, von allen diesen Hülfsmitteln entblößt nimmt er nun die ihm noch einzige Zuflucht zu seiner Kunst; mit den Schriften und Erfahrungen seiner Vergänger, und Zeitgenossen bekannt, in seiner eigenen Erfahrung aufmerksam genug, muß er aus diesen Quellen die Mittel schöpfen, durch welche sein Zwek noch zu erreichen steht, aus ihnen die Zeichen entlehnen, an welchen er seinen Feind erkennen kann, die Zufälle sammlen und zusammen stellen, welche er selbst sowohl, als andere Aerzte auf den Genus ungezweifelter Gifte, sowohl überhaupt als in ihren besondern Arten wahrgenommen haben, seinen Fall mit aufmertsamem Blike und beobachtendem Geiste übersehen, und die Zufälle, welche sich ihm diesesmal darstellen, mit jenen mit der äussersten Sorgfalt vergleichen; dann erst kann er in zweifelhaften Fällen mit einiger Zuversicht entscheiden; aber nirgends hat der Arzt aufgeklärten Verstand, durchdringenden Scharfsinn und gründliche Gelehrsamkeit mehr nöthig, als gerade hier, wenn er nicht gar zu oft einen Schuldigen loszusprechen, oder einen Unschuldigen zu verdammen Gefahr laufen will: die Wirkungen vieler Gifte kommen oft so nahe mit den Zufällen bösartiger Krankheiten überein, welche eine andere Ursa-

1) a—r. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

che haben können m), daß es äuſerſt ſchwer hält zu unterſcheiden, und die verruchte Bosheit der Unmenſchen, der Giftmiſcher, die, vornemlich in Italien, ihre unſelige Kunſt auf einen ſo hohen Gipfel der Vollkommenheit gebracht haben, hat ihren Giften eine ſolche Feinheit zu verſchaffen gewußt, daß ihre Wirkungen oft nicht in die Sinne fallen, lange ganz verborgen bleiben und nun ganz unmerklich das Licht des Lebens ausblaſen. Hier folgen alſo zuerſt nur die allgemeinen Zufälle, welche auf den Gebrauch eines Giftes erfolgen n).

---

m) 1) Baylies a. a. O. 2) Boſe prog. de diagnoſi veneni ingeſt. et in corpore geniti. Lipſ. 1774. 4. 3) B. Metzger progr. de veneficio caute dijudicando. Regiomont. 1785. 4) Fr. Hoffmann diſſ. de cauta et circumſpecta veneni dati accuſatione. Hal. 1734. wie insbeſondere ſcharfe der Galle ähnliche Zufälle erregen können, davon S. Percival Practical eſſays. B. I. S 87.

n) Eine Beſchreibung ihrer Wirkungen ſ. 1) von Rehfeld Diſſ. de morbis et ſymptomatibus a venenis et veneficiis natis. Erford. 1652. 2) von Jeſſenius a) diſſ. de morbis, quos venena extrinſecus morſu, ictu illata inferunt Wittenberg 1596. b) diſſ. de morbis, quos venena intra corpus ſumta efficiunt. Wittenberg 1596. und 3) von Hahnemann bei Hufeland Iournal der praktiſchen Arzneikunde. B. II. S. 471. der daraus vornemlich entlehnten Zeichen von Vergiftung 1) von Werdenberg bei Wilh. Fabricius von Hilden obſervat. et curation. Centur. V. Francof. 1627. 4. 2) von J. B. Batoller Diſceptatio unica de ſignis propriis veneni ſumti. Origuel. 1661. 3) von Rebel Diſſ. de ſignis intoxicationis. Heidelb. 1733. 4) von Retz recherches ſur les ſignes de l'empoiſonnement. Lond. et Paris 1784. 8.

www.dlibra.wum.edu.pl

Die Wirkungen, welche die Gifte äusern, sind meistens plözlich, es geht plözlich, auch in dem gesundesten Körper, nachdem er dieses oder jenes verdächtige Gericht oder Getränk zu sich genommen, sich dieser oder jener Gefahr blos gestellt hat, zuweilen, wie bei den schleichenden Giften, ohne daß es der Mensch sogleich gewahr wird, eine nachtheilige Veränderung vor: die Lebenskräfte liegen auf einmal gänzlich darnieder, oder sind doch auf einmal sehr merklich geschwächt; es stellt sich meistens ein wahres Fieber ein; der Aderschlag ist undeutlich, meistens schwach, bald widernatürlich langsam, bald widernatürlich schnell, bleibt wohl auch einigemal aus, und der Kranke fällt in Ohnmacht. In den meisten Theilen des Leibes ist eine unerträgliche Hize, in einigen eine unbezwingliche Kälte; meistens zeigt sich auch in einem oder dem andern Theile des Leibes eine widernatürliche rothe, blaue, schwarze, blasse oder gelbe Farbe; oft schwillt der ganze Leib, oder einzelne Theile desselbigen über alle Maasen auf; oft nimmt der ganze Leib oder einzelne Theile auf einmal ab, und werden ganz mager; oft verliert der Vergiftete auf einmal den vollen und rechten Gebrauch aller äuserlichen Sinne, oder einen unter denselbigen. Er fällt von einem Schlummer in den andern, oder gar in einen tiefen Schlaf, von welchem er beinahe nicht aufzuweken ist. Sehr oft geräth seine Einbildungskraft in die größte Verwirrung; er verliert alles Gedächtnis, allen Zusammenhang der Begriffe, allen Gebrauch der Vernunft; in mehreren seiner Eingeweide finden sich Verstopfungen, Entzündungen, Verhärtungen, Krämpfe und Brand; der Athem ist oft schwach, schnell, tief, schwer, bang, schmerzhaft, unterbrochen, oder hört ganz und gar auf; die Stimme ist unverständlich, hol oder mangelt gänzlich. Es zeigt sich sehr oft, und zuweilen

www.dlibra.wum.edu.pl

zum Glük des Vergifteten ein starkes o) äuserst schmerzhaftes, oft blutiges, und durch die kräftigsten Mittel nicht zu stillendes Erbrechen, unerträgliche Magenkrämpfe und Bauchgrimmen, und sehr starke sehr oft blutige und in allen Mitteln hartnäkig widerstehende Bauchflüsse; ein andermal die hartnäkigste Verstopfung des Leibes. Oft zeigt sich ein unmäßiger Schweis, oft ein unmäßiger Harnflus, oder auch eine äuserst schmerzhafte Verhaltung oder ungewöhnliche, z. B. grüne p) Farbe des Harns. Nicht selten klagen die Kranken über Schmerzen in allen Theilen des Leibes, und über unauslöschlichen Durst und Trokenheit; oft brechen die grausamsten Zukungen über den ganzen Leib, oder in einzelnen Gliedern aus, zuweilen werden diese gelähmt; meistens, und darinn suchen viele Aerzte ein sehr beständiges Merkmal eines genommenen Giftes, zeigt sich auch ein Aufspringen der Sehnen an den Händen, zuweilen stellt sich auch Mundsperre ein; auch Mangel an Eßlust und Schluchzen ist ein ziemlich gemeiner Zufall, der auf den Genus von Giften erfolgt. Meistens sind die Säfte sehr aufgelößt, selten widernatürlich dik, aber immer von ihrer natürlichen Beschaffenheit weit entfernt. Auch diese lezten Zufälle stellen sich sehr oft sehr schnell auf den Genus des Giftes ein.

Allein auch bei diesen Kennzeichen bleibt der Arzt oft noch ungewis, wenn ihm nicht die Merkmale von den besondern Arten der Gifte mehr Licht geben.

18) Allein

---

o) Dreisigmal nach einander Sam. Collins Systema anatomicum of the body of men, birds, beasts, fishes, with its diseases, cases and cures. London. 1685. fol.

p) Forestus de ventriculi affectibus. L. XVIII. Leid. 1594. 8.

www.dlibra.wum.edu.pl

18) Allein auch diese Merkmale, welche er aus den Erscheinungen im lebendigen Körper entlehnt, verlassen den Arzt oft, und dann bleibt ihm nichts übrig, als sich bei den Toden Raths zu erholen q); oft wird er auch zu spät gerufen, und es ist ihm mehr darum zu thun zu wissen, ob der Verstorbene an Gift oder an einer aus einer anderen Ursache entsprungenen Krankheit sein Leben verlohren habe. Er mus also den Leichnam, so bald als möglich nach dem Tode, aufmerksam nach allen seinen Theilen besichtigen, die Veränderungen, welche er erblikt, sorgfältig mit den Zufällen, welche der Verstorbene kurz vor seinem Tode gehabt, vergleichen, sie von denen, welche die Folgen eines natürlichen Todes oder anderer Krankheiten sind, auch in seinem Falle sein können, wohl zu unterscheiden wissen, und dann erst mit Scharfsinn, Behutsamkeit und Gewissenhaftigkeit sein Urtheil fällen. Oft findet er noch im Magen oder in den Gedärmen und ihren Theilen die materielle Ursache des Todes, die er nach den oben angegebenen Merkmalen, weiter zu untersuchen hat: dann geben ihm nach der Beschreibung und Versicherung derer, welche Gelegenheit hatten, Beobachtungen darüber anzustellen, folgende Zeichen an der Leiche ziemlich gegründeten Argwohn, daß der Verstorbene an Gift gestorben sei.

Wenn sich gleich nach dem Tode die stärkste Fäulnis einstellt, ohne daß künstliche oder natürliche Wärme sie befördert; wenn der ganze Leib sogleich nach dem Tode über

---

q) Mit welchen Schwierigkeiten dieses verknüpft sei, hat unter andern Fr. Doublet in seiner Probeschrift Praes. Fo. Bapt. Baigneres; An post mortem physica veneni certitudo difficile comparanda. Paris. 1777. gezeigt.

alle Maasen aufschwillt; wenn sich das Oberhäutchen sehr leicht von der Oberhaut ablößt r); wenn sich auf der ganzen Oberfläche schwarze, rothe, braune oder blaue Fleken zeigen s); wenn einzelne Glieder z. B. Zunge, männliche Ruthe u. a. auserordentlich aufgelaufen und schwarz sind; wenn die Nägel an Händen und Füsen eine ganz fremde Farbe haben, und leicht abfallen; wenn die Haare zu ganzen Händen voll ausfallen; wenn man in den Eingeweiden, vornemlich in der Lunge, im Magen und in den Gedärmen deutliche Spuren von Entzündung und Brand, eine gelbe, blaue oder schwarze Farbe, oder dergleichen Fleken, wenn man darinn Löcher, an der einen Stelle starke Zusammenschnürungen, an der andern ungemeine Erweiterungen antrift, so kann man, wenn man die oben angezeigten Umstände sorgfältig damit vergleicht, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schliesen, daß der Verstorbene Gift bekommen habe t). Mit Recht kann man einwenden,

---

r) Dieses bemerkte z. B. J. P. Albrecht Ephemerid. Acad. Caesar. Natur. Curios. Decemb. III. Ann. 3. Obs. 124. an der Leiche eines Mädchens; mehrere dergleichen Merkmale s. bei Wagener diss. de signis veneno interfectorum Regiomonti 1707. 4. und Welsch de signis lethalitatis in iis qui veneno exstincti sunt. Lips. 1662.

s) So war z. B. die Leiche von Germanikus voll Fleken und schwarzblau; Nero hatte ihm zwar eine Maske von Gips über das Gesicht machen lassen, da aber gerade starker Regen einfiel, so schwemmte er sie hinweg, und verrieth seinen Brudermord.

t) Von der auch bei diesen Folgerungen höchst nöthigen Bedachtsamkeit s. Morgagni: de sed. et caus. morbor. art. 18—20.

www.dlibra.wum.edu.pl

daß auch diese Merkmale, welche sowohl im lebendigen Leibe, als in der Leiche vorkommen, den Arzt nothwendig in vielen Fällen ungewis lassen müssen, auch läßt sich nicht läugnen, daß sie niemalen alle zusammen treffen, daß einzelne unter ihnen nichts entscheiden, selbst dann nichts entscheiden, wenn einige von ihnen zusammen kommen, daß fast keines derselben so allgemein sei, daß es sich auf den Genus aller Gifte überhaupt und ohne Unterschied einstellte, daß keines unter ihnen so entscheidend sei, daß sich der Arzt nicht täuschen, und die Zufälle einer andern bösartigen Krankheit mit den Wirkungen eines Giftes verwechseln könnte. Ueberhaupt hält es schwer, in solchen Fällen klar zu sehen, wo die verruchteste Bosheit oft die arglistigsten Ränke anwendet, ihr Vergehen zu verbergen; der Arzt mus daher alle Kräfte des Verstandes, seinen ganzen Scharfsinn und Beobachtungsgeist, alle seine Einsichten zusammen nehmen, um durch diese Dunkelheiten durchzublikken, von allen Seiten alles zusammen suchen, keinen Umstand unbemerkt und ungeprüft lassen, von welchem er Licht borgen kann; es mag sein, daß viele, daß fast alle Merkmale fehlen können, wie man dieses von einigen italienischen Giften versichert, und der Kranke doch Gift bekommen hat, doch seinem Tode unmerklich entgegen geht: daß ein kleines Gewicht eines Giftes zwar gelindere und wenigere Zufälle hervorbringen, aber doch tödlich sein könne; daß, besonders bei den langsamen Giften andern die Wirkungen nicht so auffallen, obgleich der Kranke selbst, wenn er nur im mindesten darauf Acht haben will, bald darauf eine grose nachtheilige Veränderung in seinem Körper verspühren mus; daß ein kalter Trunk bei erhiztem Körper, eine andere plözliche Erkältung oder auch andere Ursachen, welche vornemlich die Werkzeuge des Odems verlezen, ohne daß man

www.dlibra.wum.edu.pl

sogleich hinter diese Ursachen kommt, ähnliche Folgen, als die langsamen Gifte, haben können.

Auch läßt sich nicht läugnen, daß es ausser der lezten Wirkung, dem Tode, wenige Wirkungen gibt, worinn alle Gifte insgesammt mit einander übereinkommen, daß viele unter denselbigen nur gewissen Klassen der Gifte, andere nur besondern Arten derselbigen eigen sind, daß einige mehr unmittelbar auf die Nerven, andere mehr auf die Säfte, andere mehr auf die festen Theile, einige mehr auf die Bewegungen, welche von dem wechselsweisen Einflusse der Seele auf den Leib abhängen, auf die Werkzeuge der äusern und innern Sinne, auf die willkührlichen Bewegungen, andere mehr auf die Werkzeuge der Lebensbewegungen, auch auf den Umlauf der Safte, auf die Lungen, noch andere mehr auf die übrigen Eingeweide, den Magen, die Gedärme, die Harnwege, die Leber u. dgl. wirken.

Allein gerade dieser Umstand kann dem Arzte, wenn er ihm auf einer Seite grose Hindernisse in den Weg legt, von der Vergiftung im Allgemeinen gewis zu werden, dadurch sehr zu Statten kommen, daß er ihm die besondere Natur dieses Giftes offenbaret, und wenn er diese einmal kennt, auch seine Bemühungen den schrecklichen Wirkungen desselbigen zuvorzukommen, ungemein erleichtert. So zeigten sich bei den acht Kindern, welche von dem Wüterich gespeißt hatten u) Magenschmerzen und Zukungen, diese in einer schauervollen Stärke, aber nur diejenigen, welche mehr davon gegessen hatten, verloren den Gebrauch ihrer Sinnen; nur diese bekamen Schluchzen, Klopfen in der Gegend des Herzgrübchens,

---

u) Wepfer a. a. O. S. 5. u. f.

www.dlibra.wum.edu.pl

Erbrechen oder Reiz zum Erbrechen, und Mundsperre, nur eines von ihnen fiel in tiefen Schlummer, aus welchem es beinahe nicht aufzuweken war, nur bei einem stellten sich Erkalten der äusern Glieder ein, nur bei zweien zeigte sich ein schwarzblauer Ring um die Augen, nur bei einem erfolgte wahres Erbrechen, an welchem die Arzneien keinen Theil hatten, nur bei einem starker Harnfluß.

Geschichte der Lehre von den Giften.

Die Kenntnis der Gifte ist kein ausschliesliches Eigenthum der Völker, welche das Licht der Wissenschaften erleuchtet; auch Völker, die noch auf einer sehr niedern Stuffe der Ausbildung stehen, kennen mehrere, und bedienen sich ihrer theils die Pfeile, womit sie ihr Wild erlegen, und diejenigen, womit sie ihre Feinde verfolgen, damit zu bestreichen, theils zu noch heimtükischern Werkzeugen ihrer Rachsucht und anderer Leidenschaften. Zum Vergiften der Pfeile gebrauchen die Einwohner von Sierra Leona die gelben Kerne eines Baums, der das Ansehen einer Weide hat, und Früchte wie Bohnen mit vier bis fünf dem Tamarindensamen ähnlichen Samen trägt v); nach Fenner w) sind die Wunden vom Pfeilgifte der Negern auf Gomera, wenn sie bluten, unheilbar, und, wenn sie nicht auf der Stelle ausgesogen oder ausgeschnitten

v) Finch bei Purchas Pilgrim B. I. B. 4. K. 4. §. 1. S. 415.

w) Bei Hakluyt The principal navigations, voyages, traffics and discoveries of the english nation. London. fol. B. II. 2. S. 59.

www.dlibra.wum.edu.pl

werden, in vier Tagen unter ſtarkem Erbrechen tödlich; in Kongo ſind Vergiftungen ſehr gemein x), und werden oft durch geringe Beleidigungen veranlaßt y). 1692 lies der König von Widah an der Sklavenküſte ſeinen Feind, einen Prinzen Afferi, mit Gift aus dem Wege räumen z). Auch die Schwarzen in Amerika haben ein langſam tödendes Gift, deſſen Bereitung ſie geheim halten, von welchem die Kranken nach und nach ſchwinden, keine geſunde Stunde mehr genieſen, und oft erſt nach einigen Jahren ſterben a).

Ueberhaupt kennen und nuzen die Einwohner des mitternächtlichen b) und mittägigen c) Amerika, ſo wie der benachbarten Inſeln, ſolche Mittel, ihre Rache zu befriedigen, genug.

Die Tataren gebrauchten ſchon im dreizehnten Jahrhunderte Gifttränke, um ihre Gefangene umzubringen d) und

---

x) Zuchelli relazione del viaggio e miſſione di Congo. Venez. 1712. S. 152.

y) S. Ogilby Deſcript. of Africa. S. 532.

z) New collection of voyages and travels for Aſtley. B. III. S. 54.

a) Kalm Reiſen nach dem nördlichen Amerika. Göttingen 1764. 8. B. II. S. 544.

b) 1) Ebenderſ. a. e. a. O. 2) Loskiel Geſchichte der Miſſion der evangeliſchen Brüder unter den Indianern in Nordamerika. Barby 1788. 8.

c) Dampier voyage round the world, tradnit en Francois Rouen. 1723. B. I. S. 56. II. S. 4. 63. IV. S. 55. 2) Frizier's allerneueſte Reiſe nach der Südſee aus dem Franzöſiſchen überſ. 8. 1718. S. 74.

d) Plano Carpini bei Hakluyt a. a. O. B. I. S. 33.

www.dlibra.wum.edu.pl

einer ihrer Kaiser kam auf einem vorhabenden Zuge nach Ungarn durch Gift um e).

Schon zu Xenophon's Zeit war unter den Persern Vergiftung sehr gemein f); auch gebrauchte in Persien ein Engländer dieses Mittel, zween seiner Landsleute aus dem Wege zu räumen, von welchen der eine sehr aufschwoll g).

Die Einwohner von Tidor haben eine Salbe, welche sie unbemerkt anschmieren, und damit in drei bis vier Tagen tödten h); die javanischen Weiber ein Gift, das sie sehr listig gebrauchen, um sich ihre Männer vom Halse zu schaffen i); der Indianer hat sein Momgas bravas, für welches man noch kein Gegengift kennen, und welches doch so mächtig wirken soll, daß, wer nur wenig davon speist, plözlich erblaßt k).

Auch in der griechischen und römischen Geschichte sind Vergiftungen keine seltene Erscheinungen. Wer kennt nicht das mit Gift eingeschmierte Kleid, welches Dejanira dem Herkules zuschikte l)? Wer nicht das Gift, das Ulysses von Ephyra holte, um seine Pfeile damit zu tränken m)?

---

e) Ebenderselbe a. e. a. O. S. 35. 51.

f) Κυρου παιδειας βιβλ. ή. κεφ. ή. ζ.

g) Copland bei Purchas a. a. O. B. I. B. 4. K 8. §. 3.

h) Pigafetta bei Ramusio in viaggi &c. B. I. S. 367. 6.

i) Woodes Rogers voyage in new collection of voyages &c B. III. 1767. S. 224.

k) Heucher Mithridates sistens praeservationem principis venen Opp. omn. B. I. S. 411.

l) Διοδωρ. IV. S. 243.

m) Homer Οδυσσ. βιβλ. α.

www.dlibra.wum.edu.pl

Wer nicht n) den Verdacht, der auf Philipp von Macedonien ruhte, daß er durch seinen vertrauten Taurion Arastus ein Gift reichen lies, welches nicht scharf war oder schnell tödete, sondern schleichende Hize, ermattenden Husten, Blutspeien und Auszehrung verursachte?

So trugen Demosthenes und Andere seiner und der folgenden Zeiten beständig ein Gift in den Ringen unter dem Stein, damit sie sich, wenn sie es für gut fänden, das Leben nehmen könnten o). Eben das erzehlen Plutarch p)

---

n) Plutarch τα σωζομεν. παντα cum interpret. Herm. Curser Francf. 1620. fol. παραλληλ. B. I. S. 1051. 2) Polybius ἱστορ. βιβλ. Δ. S. 318. 319. "τον πρεσβυτερον Ἄρατον δοσαρεστηθεντα τοις ὑπ αὐτου πεπραγμενου ἐν τη Μεσσηνῃ μετ' ὀυ πολυ μετα ταυριανος του χειριζοντος αὐτῳ τα κατα Πελοποννησον, ἐπανειλετο φαρμακῳ παρυτικα μεν ὀυν ἠγνοειτο παρα τοις, εκτος το γεγονος· και γαρ ἡ δυναμις ὀυ των παρ' αὐτὸν τὸν καιρον ἀπελλυονσων, αλλα χρονον ἐχουσα και διαθεσιν ἐργαζομενη. τον γε μεν Ἄρατον αὐτου ὀυκ ελανθανε το κακον· ἐγενετο δε δηλον ἐκ τουτων. ἀπυυτας γαρ ἐπικρυπτομενος τους ἀλλους προς ἑνα των ὑπηρετων κεφαλων ὡ δια την συνηθειαν ὀυκ ἐσταξε τον λογον· αλλ' ἐπιμελως αὐτῳ κατα την ἀῤῥωστιαν του προειρημενου συμπαροντος, και τι των προς τῳ τοιχῳ πτυσματων ἐπισημοναμενου διαιμον ὑπαρχον εἰπε ταυτα τ' απιχειρα της Φιλικης κεκομισμεθα της προς Φιλιππου.,,

o) Plutarch a. a. O. S. 860.

p) a. a. O. S. 381.

www.dlibra.wum.edu.pl

und Livius q), vornemlich von Hannibal, der, als er sich zu dem Könige von Bithynien flüchten wollte, und dem römischen Consul L. Q. Flamminikus übergeben war, sich auf diese Art ums Leben brachte.

Antejus bekam Gift und beschleunigte, weil es ihm zu langsam wirkte, seinen Tod dadurch, daß er sich die Adern entzweischnitt r).

Als Q. Fabius Maximus Aedilis currulis war s), starben zu Rom in einem Jahre theils wegen der schlechten Witterung, theils durch die Argliſt Anderer viele vornehme Leute an dergleichen Krankheiten und beinahe mit dem gleichen Erfolge. Eine Magd, welche sich deswegen bei Fabius meldete, sagte ihm, sie wolle ihm die Ursache dieser Todesfälle eröfnen, wenn man ihr versprechen wollte, daß sie nichts zu befürchten hätte: Fabius gelobte ihr alle Sicherheit; nun offenbarte sie, daß vornehme Frauen solche Gifte t) kochten, die, wenn man ihr auf der Stelle folgen wollte, über der That erhascht werden könnten. Sie folgten ihrer Wegweiserin, und fanden wirklich einige in der Arbeit begriffen, und noch andere geheime Dinge bei denselbigen; dieses brachten sie nun vor Gericht, und liesen zwanzig Frauen, bei welchen sie solche Dinge gefunden hatten, vorladen. Es

---

q) Histor. roman. 1622. L. 30.

r) Heucher a. a. O. S. 421.

s) Tit. Livius a. a. O. B. VIII. K. 50—52. S. 444.

t) Dis dünkt mir der rechte Ausdruk für das venena des Römers. Ein französischer Uebersetzer in Gazette salutaire, 1761. u. 52. drükt es mit Herbes lethargiques et mortelles aus.

www.dlibra.wum.edu.pl

erschienen aber nur zwei von ihnen: Kornelia und Sergia, beide vornehmen Geschlechts; sie behaupteten, diese Mittel wären heilsam: der Richter wollte sie widerlegen, und hies sie ihre Tränke selbst nehmen. Man lies das Volk aus einander gehen; indessen besprachen sich diese mit den andern Frauen, und da sich diese weigerten, so tranken sie alle, und starben u). Man ergrif sogleich ihre Mitschuldigen, die noch eine Menge anderer anzeigten, und verdammte hundert und siebenzig. Vor dieser Zeit hatte man keine Untersuchung mit Giften angestellt.

So räumte Quarta Hostilia den Proconsul Klaudius mit Gifte aus dem Wege x), der Proconsul Posthumius Albinus seine Frau Publicia, Klaudius Asellus auch seine Frau Lucinia y).

Attilius Regulus, der den Römern rieth, ihre Gefangenen mit den Karthaginesern nicht auszuwechseln, hatte in seiner Gefangenschaft zu Karthago ein Gift bekommen, das ihn nicht schnell tödete, sondern seinen Tod verzögerte, damit er bis zur Zeit der Auswechselung leben, aber nachher auszehren möchte z).

Germanikus hielt sich fest überzeugt, daß ihn sein niederträchtiger Nebenbuhler Piso a) vergiftet habe, und

---

u) Der gleiche Uebersezer (s. t.) sezt hinzu à l'instant; in der Urschrift finde ich davon kein Wort.

x) Tit. Livius a. a. O. B. XL.

y) Valerius Maximus Rerum memorabilium. B. VI. K. 3.

z) Aulus Gellius Noct. Attic. cur. Tornaesii. 1692. B. VI. K. 4. S. 211.

a) Kornelius Tacitus Annales cura Ernesti, Lipsi. 1772. 8. B. II. S. 205. III. S. 230. 236. 246.

www.dlibra.wum.edu.pl

die Römer waren damals so stark im Rufe, daß sie mit dergleichen unrühmlichen Künsten bekannt wären, daß der Fürst der Katten Algandester ihnen versprach, Hermann zu töden, wenn man ihm Gift darzu schiken würde b).

So nahm Sejan Drusus c), Agrippina dem Proconsul Silan d) in Asien, welcher es in der Mahlzeit bekam, mit Gift das Leben. Der Unmensch Nero e) lies den Britannikus durch Pollio Julius bei einer Lokusta, welche dieser, weil sie der Giftmischerei beschuldigt wurde, unter seiner Aufsicht hatte, Gift bereiten; denn dafür hatte er schon gesorgt, daß diejenigen, die um den Britannikus waren, ihm keine Treue und Glauben hielten; zuerst bekam er das Gift von seinem Hofmeister, allein entweder war es nicht stark genug gewesen oder mus die Leibesbeschaffenheit des Britannikus von der Art gewesen sein, daß es nicht in seine volle Wuth ausbrechen konnte; er gab es durch den Stuhlgang wieder von sich. Nero wurde die Zeit lang; er drohte daher Pellio, und dieser trieb die Giftmischerin stärker an; sie versprach endlich die Wirkung des Giftes so schnell einzurichten, als wenn er durch das Schwerd umkäme; man kochte also neben dem Zimmer des Cäsars ein Gift, das man als schnell wirkend zuvor erkannt hatte. Es war Sitte, daß vornehme Kinder mit andern von ihrem Alter im Angesichte ihrer Anverwandten, an einer eigenen Tafel speisten; weil nun Britannikus die Ge-

---

b) Ebendersf. a. a. O. B. II. S. 210. ꝛc.
c) Ebendersf. a. a. O. B. IV. S. 321. ꝛc.
d) Ebendersf. a. a. O. B. XIII. S. 620. ꝛc.
e) Ebendersf. a. a. O. B. XIII. S. 637.

www.dlibra.wum.edu.pl

wohnheit hatte, Speisen und Getränke durch einen seiner geliebtesten Diener vorher versuchen zu lassen, so kam man um diesen Weg zur Entdekung des Frevels abzuschneiden, auf den Einfall, Britannikus ein unschädliches Getränk, das auch sein Diener, zuvor kosten sollte, aber ganz heis zu geben; so heis wollte er es nicht nehmen, man gos also kaltes Wasser zu, und darinn war nun eben das Gift; dieses drang ihm so durch alle Glieder, daß ihn Stimme und Odem verliesen; alles was um ihn herum war, zitterte; viele flohen unbedachtsam davon, und diejenigen, welche tiefer sahen, hefteten ihren Blik auf Nero, der sich auf den Stuhl zurük gelegt hatte, und that, als wenn er gar nichts wüßte; endlich sagte er, es sei die Fallsucht, welche Britannikus von seiner Kindheit an gehabt hätte, und er würde bald wieder zu sich selbst kommen. Noch in der nemlichen Nacht verbrannte man die Leiche des Britannikus.

Obgleich Suetonius Tranquillus f) der offene Lebensbeschreiber dieses Kaisers, nichts davon erwähnt, und keine andere Beispiele von der giftigen Beschaffenheit dieses Wurms vorhanden sind, so behauptet doch Philostrat, Titus Vespasian sei an einem Gifte, und zwar an dem Gifte des Meerhasen gestorben, auch Jovian soll durch einen Gifttrunk sein Leben verlohren haben g).

Noch unter Kaiser Valentinini bestrafte Apronian, als Statthalter von Rom, viele Giftmischer h).

---

f) De XII Caesaribus Edit. exhib. Schildio. Lugd. Bat. 1667. B. VIII. S. 775.

g) Gryfostom Ὁμιλιᾳ κε.

h) Ammianus Marcellinus Rer. gestar. B. XXVI. K. 3.

www.dlibra.wum.edu.pl

Selbst in der nordischen Geschichte finden sich Verfälle dieser Art i). Als der dänische König Woldemar seine Tochter Margaretha an den norwegischen König Haquir, einen Sohn des schwedischen Königs, Magnus Smoek, vermählte, mischte er Gift unter den Wein: die Mutter des Bräutigams starb sogleich, der König, ihr Gemahl, wurde aber durch Hülfe seines Arztes wieder gesund; auch Woldemar's eigener Prinz starb, weil er unfürsichtiger Weise auch von dem Weine getrunken hatte; so starb auch Steno Stuur, der ältere an Gift, welches ihm die Verlobte seines Nachfolgers Swanton Stuur's in einem Gastmale zu Süderköping beigebracht hatte. Auch Erich der vierzehnte, König in Schweden, starb im Schlosse Orby an Gift, das er in einer Bohnenbrühe von Stokholm aus erhalten hatte.

Nach Dalrymple k) starb der Kanzler von Schottland Wilh. Connyn, an einem vergifteten Kelche im Abendmale; unter der Regierung König Heinrichs des Dritten starben in England auf einmal viele vornehme und gelehrte Leute: man fand nachher, was man schon geargwohnt hatte, daß nemlich ein blaues, flüssiges Gift, welches in fest verschlossenen Gefäßen aufbewahrt war, und ursprünglich den Franzosen zugeschrieben wurde, dieses Unheil gestiftet hatte; man wollte es Hunden geben, welche man zuvor recht hatte hungern lassen, sie wollten es aber nicht kosten; man gab es

---

i) Lindenstolpe Lib. de venenis cura Menzel. Francf. et Lipf. 1739. 8. S. 768.

k) Annals of Scotland from the acceſſion of Malcolm III. surnamed Canmore to the acceſſion of Robert I. Edinburgh. 1776.

www.dlibra.wum.edu.pl

ihnen unter ihrem gewöhnlichen Futter, und sie starben plözlich l).

Auch kostete manchem Engländer der Handelsneid anderer europäischer Völker das Leben; so gaben z. B. 1713 Portugiesen zu S. Jago den Engländern in der Mahlzeit Gift, das zuerst Erbrechen und Durchfall, dann Zukungen in den Eingeweiden und Gliedern, zulezt Raserei, bei einigen, des Gebrauchs von Gegengiften ungeachtet, den Tod erregte; einer schwoll am dritten Tage davon auf; die meisten waren aber durch den Gebrauch von Arzneien am fünften wieder gesund m). Auch die Spanier gaben einem Engländer in Amerika Gift n). So bekam auch der Stadthalter der damaligen Provinz Utrecht, Herr von Nortcarmes, von den Spaniern ein langsames Gift, welches ihm eine hartnäkige, zulezt tödliche Gelösucht verursachte o).

Schon 1498 kam auch in Böhmen die Sucht unter die Frauen, Pulver zu bereiten, womit sie ihre Männer insbesondere vergifteten p); so starb nach mehreren Vermuthungen der edle Held, Herzog Bernhard von Weimar, an Gift, das er in einer Brühe bekommen hatte, zu Neuburg

---

l) Matth. Paris Histor. major Edit. Witts. London 1684. S. 835. 836.

m) Bekmann Voyage to Borneo. S. 14.

n) New Collection of Voyages and travels for Astley B. I. 1745. S. 253. b.

o) Lindenstolpe a. a. O. S. 731.

p) Hagel böhmische Chronik. S. 840. b. „1498 kam ein wunderlich Ding an Tag, nemlich das etliche Weiber zu Prag Pulver bereitet, damit sie ihren Männern, oder wem sie gewollt vergeben können.„

www.dlibra.wum.edu.pl

am Rhein q); glüklicher war der Prinz Eugen von Savoyen; er bekam 1708 von Ryssel, welches damals stark belagert und fest eingeschlossen war, einen Brief; in diesem Briefe lag ein Stükchen graues Papier, welches mit dem flärksten Gifte getränkt war; dem Prinzen kam die Sache verdächtig vor, er brachte also das Papier einem Hunde listig bei, und dieser starb auf der Stelle r).

Auch unter den Türken sind solche geheime Ermordungen nichts ganz ungewöhnliches. So lernte Valvasor s) 1669, da er sich in Afrika aufhielt, bei einem Mohomedaner Ali Haisa, ein Gift kennen, welches so verborgen und so langsam wirken sollte, daß man die Wirkung nach Belieben auf ein Jahr hinaus verschieben konnte, so gewis, daß es kaum um zwei oder drei Tage fehlte, und so heftig, daß man noch kein Gegengift kenne. Einem türkischen Bassa zu Aleppo wurde ein anderer, der den Weg zu dem Herzen der Grosen besser zu finden wußte, zum Nachfolger gesezt. Der erste nahm diesen mit ungemeiner Pracht auf, und legte ihm da neben andern Geschenken ein vergiftetes seidenes mit Gold gestikt-s Schnupftuch zurechte; der neue Bassa sah es mit vielem Vergnügen an, und ging unbesorgt zur Abendtafel; aber den andern Morgen, nachdem er das Gift aus dem Schnupftuch eingehaucht hatte, lag er erblaßt auf seinem Lager, ohne daß andere die schnelle Ursache seines Todes wus-

---

q) 1) Hallische neue gelehrte Zeitungen 1727. St. 14. S. 111. 2) Lindenstolpe a. a. O. S. 768. 3) Meusel allgemeine Welthistorie. Halle, B. 39. S. 1776.

r) Lindenstolpe a. a. O. S. 739.

s) Bei Heucher a. a. O. S. 421.

www.dlibra.wum.edu.pl

ten t). Unter der Regierung Kaiser Friedrichs II. hatten die Türken den Pfeffer vergiftet, der aus den Morgenländern nach christlichen Häfen ging u).

Aber vorzüglich war diese frevelhafte Kunst in Frankreich und Italien zu Hause. Der Kardinal Coligny starb an einem vergifteten Apfel v); der Kardinal Karl von Lothringen bekam von einem berüchtigten Giftmischer seiner Zeit, M. G. Barthelemi, einen Beutel, der, als er ihn öfnete und hinein sahe, ihn plözlich tödete w). An einem langsamen Gifte starben Hincolin und de Verdun x), und ein Staatsgefangener, der diesen Weg zum Tode selbst gewählt hatte y). 1711 unter der Regierung Ludwig des Vierzehnten starben von sechs Menschen aus dem königlichen Hause die vier nächsten Kronerben; man schrieb dieses einer Vergiftung eines Prinzen vom Geblüt zu, der nun der nächste Thronerbe war z).

So hat man ein Florentinisches Gift a); Birch b) gedenkt eines andern c) italienischen Giftes, das von der Art

---

t) Barclai bei Heucher a. a. O. S 431.

u) Matth. Paris a. a. O. S. 600.

v) Thuanus a. a. O. B. III. S. 65.

w) Ebenders. aus der Lebensgeschichte des Abts von Clügey a. e. a. O. S. 366.

x) Lettres choisies de feu Mr. Guy Patin. Cologne. 12. B. III. S. 139.

y) Ebendas. S. 236.

z) Voltaire, Siecle de Louis XIV.

a) Philosophical Transactions 1665.

b) History of the Royal society B. IV. S. 15.

c) Vermuthlich einer Art Aqua tofana.

www.dlibra.wum.edu.pl

Art ist, daß man es, wenn es unter Speise oder Getränk gemischt wird, weder durch Geschmak, noch durch Geruch unterscheiden kann, man muthmaßte damals, es werde aus einer Art Lattich bereitet, und gab Essig und Limonensaft für seine besten Gegengifte an; der Mensch, welcher damit vergiftet wird, fällt in Schlaf, erwacht aber mit Zittern, Fieber und niedergeschlagenen Kräften aus demselbigen; läßt man ihm zur Ader, so stirbt er plözlich, und gibt man ihm herzstärkende Mittel, so wird das Fieber stärker, und macht ihm in zwei bis drei Tagen den Garaus. Heucher gedenkt d) eines andern geheimen Giftes, das in Zeit von einer Viertelstunde, Leo e) noch eines andern, das, wenn ein Gran davon unter zehn Leute ausgetheilt wird, alle zusammen in noch kürzerer Zeit tödet; Ronaldin f) eines Giftwassers, womit man selbst wohlriechende Blumen vergiftete, indem man es zu wiederholten malen und so lange, bis sich diese öfneten, auf die Blumen gos.

So wurde Thomas von Aquino vergiftet g); eben das behaupten Einige, doch ohne hinreichenden Grund, von Hugo Grotius h); das gleiche Schikfal war Kaiser Friedrich dem Zweiten i) und den Päbsten Urban dem Achten k)

---

d) a. a. O. S. 411.

e) Bei Heucher a. e. a. O.

f) Bei Heucher a. a. O. S. 431.

g) Opuscoli di Autori siciliani B. XVIII.

h) Lettres choisies de feu Mr. Guy Patin, à Cologne B. I. 1592. S. 17.

i) Matth. Paris a. a. O. S 662.

k) Lebret Magazin zum Gebrauch der Staats- und Kirchengeschichte. Frankfurt und Leipzig. 8. B. IV. S. 128. 129.

www.dlibra.wum.edu.pl

und Alexander dem Sechsten l) bereitet; dem ersten wurde das Gift von einem seiner Vertrauten, Peter de Vincis unter ein abführendes Mittel gemischt, welches ihm der Arzt verordnet hatte; der kluge Kaiser ahnte den Betrug, und der nichtswürdige Giftmischer warf aus Bestürzung darüber den Giftbecher hin; um sich seiner Sache zu versichern, lies der Kaiser das wenige, was noch in dem Becher zurükgeblieben war, Missethätern im Kerker reichen, und auf der Stelle waren sie des Todes. Pabst Urban der Achte sollte nach einer Verabredung, welche Thom. Orsolini und ein Augustiner Domin. Branza unter sich getroffen hatten, entweder in der Hostie vergiftet, oder Gift auf sein Geschwür gestreut werden, aber das Vorhaben wurde noch vor der Ausführung entdekt. Alexander dem Sechsten brachte ein Tonkünstler Tomasino, als er von Forli, seiner Vaterstadt, nach Rom zurük kam, einen Brief, worinn, wie er sagte, die Gemeine von Forli den Pabst um Frieden bat, und seine Barmherzigkeit anflehte; er hatte das Geheimnis verstanden, diesen Brief zu vergiften, und sich eines so feinen Giftes bedient, daß, wenn der Pabst den Brief eröfnet hätte, sein Tod unvermeidlich gewesen wäre; aber dieser erfuhr alles, und lies den Tonkünstler und seine Mitschuldigen ins Gefängnis werfen.

Nicht so glüklich waren die römischen Kaiser Otto der Dritte und Heinrich der Siebente; jener m) starb von vergisteten Handschuhen, welche ihm die Gemahlin des rö-

---

l) Gordon a. a. O. B. II. S. 37. 38.

m) Heucher a. a. O. S. 431.

www.dlibra.wum.edu.pl

mischen Bürgermeisters Crescentius zugeschikt hatte, dieser n) an einer vergifteten Hostie.

Pabst Urban der Vierte gab dem römischen Könige Konrad, dem Vierten, Schuld, er habe seines Bruders Sohn Friedrich, und selbst dessen Vater Heinrich vergiftet o), so wie hingegen nach andern p) eben-dieser Konrad durch Gift, und zwar durch ein Klistier q) aus der Welt geschaft worden sein soll. Der sicilische König Manfred schikte an das königliche Kind Konraden Gesandte, die ihn begrüsen und ihm Geschenke bringen sollten; die Mutter des Prinzen merkte den Betrug, und sezte einen andern Jungen an seine Stelle; die Gesandten brachten ihre Geschenke, und unter diesen auch schön eingemachte Früchte dar, aber der untergeschobene Prinz hatte sie kaum gekostet, so verwechselte er kurz darauf das Leben mit dem Tode r).

Eben dieser Manfred schikte den Ritter Cavalcant mit noch zwei andern an seinen Nebenbuhler Karl von Anjou, damit sie sich bei ihm einschmeicheln, und seinem Leben nachstellen sollten; er hatte sie dazu mit funfzig verschiedenen Arten von Gift versehen, damit sie, wenn eine oder mehrere die Absicht verfehlen sollten, immer noch eine andere in Bereitschaft hätten s).

---

n) Ebendersf. a. a. O. S. 439.

o) Matth. Paris a. a. O. S. 765. 768.

p) Ebendersf. a. a. O. S. 768.

q) Heucher a. a. O. S. 438.

r) Nik. Parthan. Giannetes bei El. Camerer disp. de venenorum indole et dijudicatione. Tubing. 1725. 4. S. 16.

s) Aus den Briefen Pabsts Urbans des Vierten Edm. Martene und Ursin Durand Thesaurus novus anecdotorum Lut. 1717. B. II.

www.dlibra.wum.edu.pl

So räumte unter dem Pabste Clemens dem Achten Mark. Ant. Massimi seinen ältern Bruder Lukas mit Gift aus dem Wege, welches er zuvor an seinem Kutscher versucht hatte t).

So sah Hier. Cardan u) zu Venedig einen Joh. Scottus, dem sein Schwager, weil er ihm einen Rechtshandel gedroht hatte, ein langsames Gift, vermuthlich aus der Abtheilung der verstopfenden, beigebracht hatte; er hatte ein anhaltendes Fieberchen, das alle drei Tage heftiger wurde, klagte über beständigen nagenden Schmerzen im Magen, zehrte aus, und hatte keinen Schlaf; er erbrach zähen und diken Schleim, und hatte ziemlichen Durst, und weissen verdorbenen Stuhlgang.

Aber in edlern Absichten haben sich, schon frühe, die Aerzte mit der Untersuchung der Gifte beschäftigt; schon Attalus, der zu Kato's Zeiten lebte, versuchte die Kraft des Bilsenkrautes, der Nieswurz, des Schierlings, und des Eisenhütchens an Missethätern; Mithridat prüfte, freilich mehr in der Absicht, die Wirksamkeit seiner Gegengifte zu erforschen, die Kraft der Gifte, an seinem eigenen Leibe; Matthiol, Brassavolus und einige andere stellten ihre Versuche wieder an Verbrechern an.

Aber der verdienstvollste Naturforscher, auch von dieser Seite betrachtet, der selbst sein Leben nicht achtete, wenn er hoffen konnte, etwas neues zu entdeken, wodurch er seinen Mitbürgern nüzen konnte, war Konr. Gesner: er machte

---

t) Lebret a. a. O. B. IV. S. 60.

u) De venenis. Fat. 1563. B. II. K. 1.

www.dlibra.wum.edu.pl

wie in unsern Zeiten Alexander und Störk, um die Kräfte der Gewächse, die schädlichen sowohl als die nützlichen zu erfahren, den Versuch an seinem eigenen Leibe, und entdekte dadurch wirklich die wahre Wirksamkeit mancher Gewächsstoffe, welche zuvor noch sehr unbestimmt war.

Ohne die Schriften aufzuführen, welche nur nebenher von den Giften z. B. als Ursachen von Krankheiten, oder natürlichen, oder Kunsterzeugnissen reden, verdienen folgende hier insbesondere erwähnt zu werden:

1. *Νικανδρου περι Αλεξιφαρμακων* ed. graecae Venet. 1499. und 1506. fol. 1523. apud Aldos. 8. Colon. 1530. 4. graecae et latinae. Paris. cum Gorrhaei poetica versione 1549. 8. und nebst dem Werke *περι θηριακων* 1557. 4. Genev. cum versione Lonicceri 1606. fol. graec. latin. et ital. edit. Angel. Mar. Bandini. Florent. 1564. 8. Latin. prof. vert. Lonicero. Colon. 1531. 4. cum nonnull. Schol. cura Jagm. P. Esteve Valent. 1552. 8. Latin. carm. auct. Eur. Cordo. 8. Francof. 1532. Helmst. 1614. cur. Gorrhaei. Paris. fol. 1566. und 1622. Gallic. versit. auct. I. Grevino. Antwerp. 1567. 4. ex libris scriptis emendavit, animadversionibus et paraphrasi latina illustravit I. G. Schneider. Hal. 1792. 8.

2. *Πεδανιος Διοσκοριδης περι ὑλης ἰατρικης λογοι ἑξ περι ἰοβολων ἑνιων, και περι λυσσων ἑκμειων.* 4. Venet. 1518. Basil. 1529. und nebst seinen übrigen Werken griechisch und lateinisch cura I. Ant. Saraceki Lugd. 1598. fol. cum castigat. Goupyli Paris 1549. 8. von seinen zahlreichen Uebersezungen und

www.dlibra.wum.edu.pl

Erklärungen S. Alb. v. Haller Bibliotheca botanica. Tiguri 4. B. I. S. 79—87.

3. Κλ. Γαληνος περι τοξικων wird zwar von den Arabern angeführt, aber von Oribasius, der ein langes Verzeichnis der Schriften dieses Arztes liefert, nicht erwähnt.

4. K. Ἀετιος Τετραβιβλιον δ. β. βλ. α. wovon griechische Handschriften in der pariſiſchen, wieneriſchen, Bodleiiſchen und in der ehemaligen vatikaniſchen und venetianiſchen Bücherſammlung von S. Marco vorhanden, und lateiniſche Ueberſezungen von J. Cornarius zu Baſel fol. 1533. 1535. 1536. 1542. 1549. zu Venedig 1534. fol. 1549. und 1552. 8. zu Lyon 1549. fol. und 1560. 12. erſchienen ſind.

5. Paul von Aegine de re medica L. Vtus, wovon auſer denen, welche alle 7 Bücher in ſich faſſen, griechiſche Handſchriften in der mediceiſchen Bücherſammlung, und von allen ſieben Büchern griechiſche Ausgaben fol. zu Venedig 1528. und zu Baſel 1538. und lateiniſche Ueberſezungen von Alban. Torinus zu Baſel 1538. fol. und 1546. 8. von Winter von Adernach fol. zu Paris 1532. und zu Baſel 1534. mit Anmerkungen von Goupylus und J. B. Camotius zu Venedig 8. 1553. und 1554. von J. Cornarius zu Baſel 1556. fol. erſchienen ſind.

6. J. Actuarius methodus medendi L. VItus oder de compoſitione medicamentorum. L. Imus, wovon ſich noch in mehreren öffentlichen Bücherſammlungen Handſchriften finden, und ſowohl von J. Rouellius zu Paris 1539. 12. und 1546. 8. zu Venedig 1541. als

www.dlibra.wum.edu.pl

von Konr. Gesner zu Basel 8. 1540. und 1546. spätere Ausgaben erschienen sind.

7. Aelius Promotus περι ἰοβολων και δηλητηριων φαρμακων, wovon Hier. Mercurialis (L. de venen. II. K. 10.) die griechische Handschrift hatte.

8. Schanaki Katab al Sanum oder Buch von den Giften. S Herbelot Biblioth. orient. S. 39.

9. Ibn Wahsijah von den Giften und ihren Gegengiften S. Alb. v. Haller Biblioth. botan. Tigur. 4. B. I. S. 175.

10. Abubeker Mohammed, gemeinhin von seinem Vaterlande Raja Rhazes Elchav. oder Continens L. XXImus, von welchem ganzen Werke eine arabische Handschrift in der königlich spanischen Büchersammlung im Eskurial vorhanden, und lateinische Uebersezungen, fol. von Feragi und Jabugati zu Brescia 1486. und von Hier. Surianus 1500. 1506. 1509. 1511. und 1542. erschienen sind, und Librorum ad Almansorem, von welchen sich arabische Handschriften in der Bodleiischen vatikanischen und mediceischen Büchersammlung finden, und lateinische Uebersezungen fol. zu Mailand 1481. zu Basel 1544. zu Venedig 1497. und 8. zu Lyon 1511. erschienen sind, L. VIIImus, von welchem die arabische Urschrift im Eskurial liegt.

11. Haly Abbas Almaleki, oder Kamel al sammt al thabiat, B. IIItes, von welchem Werke arabische und andere Handschriften in der Bodleiischen, pariſischen und in der spanischen Büchersammlung im Eskurial vorhanden und mit der Aufschrift: Liber totius medicinae necessarius, zu Venedig 1492. fol. mit einer andern Regalis dispositio oder Liber totius medicinae

www.dlibra.wum.edu.pl

necessaria continens zu Lyon 1523. 4. lateinische Uebersezungen erschienen sind.

12. Ebn Sina, gemeinhin Avicenna Canon L. Vltus, von welchem Werke zu Rom 1593. fol. eine arabische, 1492 zu Neapel fol. eine hebräische, und derer nicht zu erwähnen, welche mit andern, oder mit seinen sämtlichen Werken zugleich erschienen sind, zu Venedig 1488. 4. eine lateinische Ausgabe erschienen ist.

13. Ebn Raschid, gemeinhin Awerrhoes de theriaca et venenis. Lugd. 4. 1517. 1552. fol. 1553.

14. Moses Maimonides de venenis et curationibus, wovon Handschriften in der mediceischen, in einer oxfordischen, und der spanischen Büchersammlung im Eskurial vorhanden sind.

15. Abubeker Yesdensis, gemeinhin Yesdy de rebus naturalibus, oleribus, arboribus, frumentis, venenis, wovon sich in der öffentlichen Büchersammlung zu Paris eine Handschrift findet.

16. Abraham Ben Jehudah de venenis, wovon eine Handschrift in der kaiserlichen Bibliothek zu Wien befindlich ist.

17. Gemaladdin Abdalla Ben Abul Hassan Ali Ben Ajus Curatio morborum, s. plena materia medica, wovon sich eine Handschrift in der öffentlichen Bibliothek zu Paris findet, T. I. de venenis.

18. Jakuka al Nabathi al Kesra Alkukani Tecab al fanum, wovon in der öffentlichen Büchersammlung zu Paris eine Handschrift vorhanden ist.

19. Jadiguiar Ibn Scherif Tractatus de medicina, wovon sich in der gleichen Sammlung eine Handschrift

www.dlibra.wum.edu.pl

befindet, und ein Theil sich mit Giften und Gegengiften beschäftigt.

20. Aegidius de venenis.

21. Albericus aus England de venenis 1079.

22. Bonamici (der zwischen 1301 und 1350 lebte) de venenis. (Handschriftlich).

23. Rich. Großhrad de venenis (eine Handschrift im Coll. von Eton).

24. Ant. Guainerius de venenis Par. 1518. 4.

25. Gentil. de Fulgineo (Foligno) l. de venenis 1) als Anhang seines l. de Febribus cum receptis suis novissime recognitus, adjecto repertorio. fol. Venet. 1519 und 1526. und in Quaestiones et Tractatus extravagantes. fol. Par. 1510. Venet. 1520. 1555.

26. Arnod Bouhuone gemeinhin Villanovanus de venenis et antidotis. Patav. 1487. 4. Mediol. 1475.

27. Santes de Ardoynis aus Pisaura de venenis L. VIII. fol. Venet. ope Bernardin. Riccii. 1492. Basileae cura Theod. Zwinger 1562.

28. Ferd. Ponzelti de venenis commentarius L. III. fol. Venet. 1492. und Basil. 1562. 4. Rom 1521.

29. Liber de venenis et eorum remediis. (in der Vossischen Büchersammlung)

30. J. Martinus aus Ferrara, de venenis (in der Handschrift in der öffentlichen Büchersammlung zu Paris).

31. Jak. de Dondis de venenis cum C. Gesneri chirurgica collectione. Tigur. 1555. fol.

32. Pet. de Apono (Abâno) L. de venenis, von welchem sich hier und da auch noch Handschriften finden, und zu Lyon 1593. 16. von Laz. Voet eine französische

www.dlibra.wum.edu.pl

Ueberſezung erſchienen iſt. fol. Par. 1450. Mant. 1472. und 1473. Venet. 1476. 1485. 1548. 1565. 1595. Lipſ. 1498. Francof. 1679. 4. Mediol. 1475. Venet. 1473. 1487. 1537. Lipſ. 1488. 1497. 1500. Romae 1490. 8. Venet. 1550. Lipſ. 1550. Argentor. 1566. Baſil. 1531. Marburg 1537.

33. Joh. Jarava hiſtoria de las Iervas y plantas ſacada Dioſcorides Anazarbeo y otros autores. Amberes 1557. fol.

34. Laz. Boet Tr. de venenis. Venet. 1550. 12.

35. J. Fr. Arma de venenis Taurin. 1557. 8.

36. J. Stubing de peſtilentia L. III. de venenis. L. I. Vienn. 1561. 8.

37. Hier. Cardanus L. III. de venenis. Patav. 1563. 4.

38. Jak. Grevin deux livres de venenis. Anvers 1568. 4. ins Lateiniſche überſezt von Jerem. Martius Antwerp. 1571. 4.

39. Bened. Patin de venenis, quae in humanis fiunt corporibus L. III. eorum natura, cauſis, differentiis, morbis, qui inde fiunt, morborum ab iis provenientium curatione. Brix. 1572. 8.

40. Ambr. Paré diſcours de venins et de la peſte. Paris 1582. auch in Oeuvres fol. 1575. 1579. und 1588. und zu Lyon 1602. L. XXI. S. 483—624.

41. Joh. Liebault l. de praecavendis curandisque venenis, mit dem theſaurus ſanitatis paratu facilis. Paris 1577. 16. Francof. 1578. 8.

42. Hier. Mercurialis de venenis ex morbis venenoſis. L. III. opera Alb. Schelig. Francof. 1584. 8. Baſil. 1588. Venet. 1584. und 1601. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

43. Andr. Baccii de venenis et antidotis. Rom. 1586. 4. Venet. 1596. fol.

44. Roder. a Fonſeca de venenis et eorum curatione. Rom. 1587. 4.

45. Alb. Schelig tract. de venenis et morbis venenoſis. Venet. 1588. 4.

46. Ant. Bouchart de venenis. Baſil. 1590.

47. J. Schenk a Grafenberg de venenis L. VII. Freiburg 1597. 8.

48. Pet. ab Uffenbach theſ. de venenis et morbiferis medicinis in genere. Baſil. 1597. 4.

49. Baſ. Plinius Carmen de venenis et venenatis in univerſum, et de morbi gallici inveſtigatione. 8. Witteberg. 1597. Norib. 1603. und 1689.

50. Schröter diſſ. de temperamentis, mixtione et venenis. Ien. 1598.

51. Abr. Fuchs de venenis Baſil. 1602. 4.

52. Lögler diſſ. de venenis. Baſil. 1603.

53. Auguſtin Daniel de venenis. Marburg. 1604. 4.

54. Pet. Foreſt l. de venenis et fucis. Leid. 1606. 8.

55. Arn. Wrickart de venenis. Baſil. 1608. 4.

56. Kögler de venenis. Lipſ. 1608. 4.

57. Euſtach. Rudius de morbis occultis et venenatis. L. V. Venet. 1610. fol.

58. Joach. Burſer 1) Paradoxum de venenis 1615. 4. Baſil. et Lipſ. 2) Diſceptatio de venenorum natura et qualitatibus inter Burſerum et Valent. Hertel. Lipſ. 1625. 8.

59. Valer. Martinius de veneno peſtilenti ac de venenis tractatio. Venet. 1633. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

60. Sig. Lebzelter de natura venenorum. Lipſ. 1631. 4. Lugd. Gall. 1644. fol.

61. Andr. Ant. de Caſtro de venenatis in Fr. Sanchez Oper. med. Toloſ. 1636. 4.

62. Mich. Vital de numero, differentiis et promta venenorum activitate. (eine Handſchrift.)

63. J. Pravot Opuſc. de venenis et alexipharmacis. Francof. 1641. 12. Mediol. 1646. 8.

64. Georg Raſt de veneno in genere. Regiom. 1641. 4.

65. Thom. Caſtello Ochoa L. de venenis. Granad. 1644. 4.

66. Wilh. Piſo und Georg Marcgraf hiſtor. naturalis Braſiliae. Amſterdam 1648. fol. L. III. ius de venenis et antidotis.

67. Chph. Schelhammer diſſ. de veneno. Ien. 1649. 4.

68. Joh. Kaſp. Fauſius de venenis morbisque venenoſis. Heidelb. 1656. 4.

69. Attil. Bulgetius de venenis, als Anhang zu L. de affectionibus cordis. Patav. 1657.

70. Valent. Heinr. Vogler de venenis. Helmſt. 1661. 4.

71. W. Ramſay tr. on poiſons. London. 1661. 8.

72. Eb. Göckel de venenis, eorum cauſis et antidotis. Aug. Vind. 1669. 12.

73. Val. Lober mantiſſ. de venenis et eorum antidotis. Francof. 1671.

74. Benj. Scharf Τοξικολογια ſ. de natura venenorum in genere tractatus phyſico-medicus. Ien. 8. 1678. 1679. in's Teutſche überſezt mit der Aufſchrift: Verwahrungsmittel wider die einſchleichenden Giftmiſcher. Erfurt 1698. 8.

75. Fr. Schrader de venenis et antidotis. Leid. 1679. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

76. J. G. Walther Sylv. medic. opulentiſſim. Budiſſ. 1679. C. de venenis.

77. J. Andr. Schlegel de venenis, morbis venenatis eorumque curatione et alexipharmacis. Erford. 1679. 4.

78. G. Wolfg. Wedel de venenis et bezoardicis. Ienae 1682. 4.

79. Bernh. Albinus (reſp. I. C. Menzel) diſſ. de venenis. Francof. ad Viadt. 1682. 4.

80. Georg a Turre Dryadum Hamadryadumque triumphus, ubi univerſa plantarum natura ſpectatur. Patav. 1685. fol.

81. J. B. Röſer de venenis. Witteb. 1687. 4.

82. G. Vater 1) de venenis et antidotis. Wittenb. 1700. 2) de venenis et philtris. Wittenb. 1706.

83. P. Ammann Praxis vulnerum lethalium ſex decadibus hiſtoriarum rariarum cum cribrationibus. Francof. 1701. 8.

84. Rich. Mead mechanical account of poiſons. 8. London 1702. 1708. 1738. und 1743. Dublin. 1729 in's Lateiniſche überſezt, Leid. 1737. und 1750. 8. Neopol. 1739. und 1758. 8. Amſterd. 1749. 8. Francof. 1763. 8. von Joſ. Nelſon. Londin. 1737. 8. 1750. 4. Oeder Götting. 1749. in's Italieniſche 1744. 4.

85. Ludw. Luk. Bauer de venenis. Argentor. 1706. 4.

86. Joh. Linder, gewöhnlicher Lindenſtolpe de venenis prodromus. Lond. 1708. 12. recuſus et animadverſionibus illuſtratus a. c. G. Stenzel mit der Ueberſchrift: L. de venenis in ordinem redactus et animadverſionibus auctus. Lipſ. 1739. 8.

87. Wilh. Whinkey de viribus venenorum. Leid. 1710. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

88. Joh. Bapt Gaſtaldi. An venena inter ſe differant. Avenion 1715. 12.

89. Fr. Hoffmann 1) de erroribus circa venena. Hal. 1718. 4. 2) de cauta veneni dati accuſatione. Hal. 1734. 3) De laeſionibus externis, abortivis venenis ac philtris. Hal. 1729.

90. J. de Kinder und W. Friedr. Windt Nucleus belgicus materiae medicae. Bruxellis 1719. 4.

91. D. Fr. Freſe de venenis eorumque antidotis. Lugd. Bat. 1722. 4.

92. El. Camerer diſp. (reſp. I. Fr. Gmelin) de venenorum indole et dijudicatione. Tubing. 1725. 4.

93. Bockler diſſ. (reſp. R. Davie) de venenis Argentor. 1729. 4.

94. Mich. E. Ettmüller 1) de veneni propinati dubiis indiciis. Lipſ. 1727. 4. 2) Progr. de venenorum abſumtorum cognitione. Lipſ. 1729. 4.

95. Chr. G. Stenzel de venenis L. III. Witteb. 1733. 4.

96. W. Wilh. Muys de venenis eorumque antidotis. Franeck. 1733. 4.

97. Joh. Lanzoni Oper. vol. I—III. Lauſann. 1738. 4. L. de venenis et antidotis. Leid. 1744.

98. J. Fr. Cartheuſer de venenis eorumque differentiis, indole, principiis actuoſis, effectu ſingulari, ſpecifica curatione. Francof. ad Viadt. 1741.

99. J. F. W. Memorie dell'Academia di Cortona. Rom. 4. T. II. 1741.

100. I. Loncq de venenis et antidotis. Leid. 1744.

101. And. E. Büchner de venenis et eorum agendi modo. Hal. 1746. 4.

102. L. H. L. Hilchen de venenis. Gieſſ. 1748.

www.dlibra.wum.edu.pl

103. Heinr. Joh. Nep. Cranz Materia medica et chirurgica juxta syſtema naturae digeſta. Vienn. 8. 1762. et auct. 1766. Vol. IIIum.

104. J. J. Piccardt de venenis et antidotis. Lugd. B. 1764. 4.

105. G. Fr. Siegwart (reſp. I. Ch. Sommer) Venenorum diſcrimina ſummatim excuſſa. Tubing. 1765.

106. G. Ludw. Gräter diſſ. de venenis in genere. Argent. 1767. 4.

107. J. Cook's Treatiſe on poiſons, vegetable, animal and mineral, with their cure, London 1770. 12.

108. Luther de venenis eorumque differentiis et actione. Erford. 1773. 4.

109. J. Preſtwich diſſ. on mineral, animal and vegetable poiſons. Newberg. 1775. 8.

10. Gift und Gegengift. Strasburg 1776.

111. J. G. Reiher (praeſ. I. Fr. Ackermann) tentam. de venenorum actione generatim quaedam exponens. Kil. 1782. 4.

112. Georg Logan diſſ. de venenis. Edinb. 1779. auch Teutſch mit der Aufſchrift: Verſuch über die Gifte. S. Petersburg 1783. 8.

113. Th. Houlſton obſervations on poiſons and on the uſe of mercury in the cure of obſtinate diſſenteries. London. 8. 1784. in's Teutſche überſezt mit der Aufſchrift: Bemerkungen über die Gifte und den Gebrauch des Queckſilbers bei der Kur hartnäkiger rother Ruhren. Altenburg 1786. 8. New Edit. 1787.

114. Boiſſier Sauvages trattato de, veneni, comment. de M. Autumonelli. Napoli. T. I. II. 1785, 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

115. J. J. Plenk toxicologia ſ. doctrina de venenis et antidotis. Vienn. 1785. 8. auch in teutſcher Sprache.
116. J. S. Halle Giftſhiſtorie des Thier Pflanzen- und Mineralreichs. Berlin 1787. 8.
117. Iſenflamm diſſ. de veneni effectu. Erlang. 1792.
118. C. C. Heinr. Marc allgemeine Bemerkungen über die Gifte und ihre Wirkungen im menſchlichen Körper. Erlang. 1795. 8.
119. Succow (diſſ.) Toxicologiae theoreticae delineatio. P. I. II. Ienae 1795.
120. Hahnemann bei Hufeland Journal der praktiſchen Arzneikunde, B. II. S. 471. und B. V.
121. Paul Kolbani Giftgeſchichte des Thier-Pflanzen- und Mineralreichs nebſt den Gegengiften und der mediciniſchen Anwendung der Gifte. Wien 1798. 8.
122. Joh. Frank Handbuch der Toxicologie nach Grundſäzen der Browniſchen Arzeneylehre und der neuen Chemie. Wien 1800. 8.

Von Verwahrungsmitteln gegen Gifte.

Ob gleich die Natur der Gifte ſehr verſchieden iſt, und ſowohl überhaupt, als wie nach dem ſie auf dieſe oder jene Weiſe, auf dieſem oder jenem Wege beigebracht werden, auf eine ſehr verſchiedene Weiſe wirkt, bald dieſes, bald jenes Syſtem des lebendigen Leibes zuerſt und zunächſt beſtürmt, ſo hat es doch, beſonders in frühern Zeiten, Leichtgläubige, ſelbſt unter den Aerzten, genug gegeben, welche, bald durch gewiſſe angebliche Verhältniſſe der Geſtirne zum Menſchen, bald durch geträumte Uebereinſtimmungen gewiſſer Geſteine

und

www.dlibra.wum.edu.pl

und anderer lebloſen Dinge mit den verſchiedenen Theilen ſeines Leibes, bald durch gerühmte unmittelbare Eingebungen eines höhern Weſens geleitet, bald überhaupt aus Schwärmerei oder Aberglauben ſich einbildeten, oder aus abſichtlichem Betrug behaupteten, Mittel zu haben, woran ſie ſo wohl jede Vergiftung augenbliklich erkennen, als auch gegen die Wirkung jedes möglichen Giftes ſicher ſtellen könnten. So ſtanden groſe Becher aus dem Horne des Nashorns, in welche man das Getränk gos, ſo manche Edelſteine und Halbedelſteine, die man in Ringen trug, lang in dem Rufe, daß ſie durch gewiſſe Veränderungen, die ſich an ihnen offenbarten, die Gegenwart des Gifts zu erkennen geben. Andere z. B. Paracelſus und ſeine Schule, rühmten ſich ein ſolches allgemeines Verwahrungsmittel gegen alle Gifte zu kennen und zu beſizen, und beriefen ſich, wenn ſie es je der Mühe werth fanden, auf einen Widerſpruch zu achten, auf das Beiſpiel von Mithridat, der nach der Geſchichte zulezt kein Gift finden konnte, ſich umzubringen, wo er es auch wünſchte.

Allein Mithridat hatte ſich nach und nach ſo ſehr an mancherlei Gifte gewöhnt, daß er zulezt auch ſtärkere Gewichte derſelbigen ohne Schaden ertragen konnte x), wie es noch jezt in Beziehung auf den Mohnſaft bei einem groſen

---

x) 1) Hier. Mercurialis a. a. O. B. I. K. 6. 7. 8. 2) J. Renou inſtitutiones pharmaceuticae. 4. 1608. B. I. K. 13. 3) M. Schurig chylologia. Dresd. 1725. 4. S. 342. 4) Timaus a Guldenklee Caſus medicinales et obſervationes practicae &c. Lipſ. 1662. 4. B. VII. Caſ. 16. 5) G. G. Richter progr. de adſuetudine venena ferendi in Drimyphagis. Goetting. 1744.

www.dlibra.wum.edu.pl

Theil der Morgenländer ist; und dann kannte man zu dieser Zeit bei weitem nicht so viele und so unterschiedene Arten von Gift, man kannte beinahe nur die thierische, also beinahe nur eine Klasse von Giften, gegen welche sich eher ein auf alle passendes Gegengift finden laßt, als gegen die grose Mannigfaltigkeit von Giften, die wir jezt kennen. Wenn sich der Marktschreier rühmt, daß ihm kein Gift schaden könne, und sich gegen leichtgläubige Zuschauer darbietet, jedes Gift zu verschlingen, daß man ihm darbiete, so schränkt sich doch auch diese Vermessenheit, wenn nicht alles auf Taschenspielerei und groben Betrug hinaus läuft, am Ende blos auf die scharfen Gifte ein; denn theils gewöhnt er sich, wenn er sich auf solche Künste legt, nach und nach daran, theils schmiert er sich, ehe er sie spielt, Mund, Kehle, Magen und Gedärme mit Butter oder anderem Fette ein; so sind die Theile, auf welche die scharfen Gifte, wenn sie verschlukt werden, zuerst treffen, gegen ihre unmittelbare Berührung und damit auch gegen ihre ungestümere Wirksamkeit geschüzt; aber wird ihn dieses Verfahren auch gegen ein beraubendes Gift, wird es ihn gegen die Folgen von dem Bisse eines giftigen Thieres, wird es ihn gegen die Wirkungen einer eingeathmeten schädlichen Luft sicher stellen?

Wer wenigstens weis, daß die verschiedenen Klassen von Giften zunächst auf so verschiedene Systeme des thierischen Organismus, daß selbst Gift von einer Klasse auf das gleiche System nicht alle auf die gleiche, zuweilen auf eine ganz entgegengesezte Weise wirken; der kann sich nicht enthalten, Mittel, welche allen Giften ohne Unterschied und mit gleicher Kraft widerstehen, gegen alle schüzen, für Undinge zu erklären, und wird sich die Ausnahmen von den allgemei-

www.dlibra.wum.edu.pl

nen Gesezen der Natur, die Menschen, denen auch die schädlichsten Gifte nicht geschadet haben sollen, so wenig als die Beispiele von Leuten, welche Kieselsteine, Glas, allerlei schneidende, stechende und hauende Werkzeuge ohne merklichen Schaden verschlukt haben, nicht irre machen lassen.

So vergeblich übrigens die Mühe sein dürfte, auf ein Mittel zu sinnen, welches den Giften, die in den Leib kommen können, ohne noch zu wissen, von welcher Art sie sind, kräftig genug widerstehe; so entschieden ist es, daß man sich gegen ihre Wirkung, wenigstens in etwas schüzen kann, so bald man weis, von welcher Art sie sind. So gibt es gewisse Künste, Handwerker, Berufsgeschäfte, welche den Arbeiter in Gefahr sezen, dergleichen Gifte einzuhauchen. So hilft z. B. den Hüttenleuten, welche mit Arsenik und Bleierzen, oder Erzen die, wenn sie auch nicht darauf bearbeitet werden, doch etwas von diesen metallischen Körpern mit sich führen, zu thun haben, so Töpfern und andern Künstlern und Handwerkern, welche sich den schädlichen Dämpfen des Bleis auszusezen haben, Gold- und Silberarbeitern, welche bei dem Vergolden und Versilbern im Feuer oft Gefahr laufen, Quekfilberdämpfe einzuhauchen, der häufige Genus von Fett, Butter, Spek u. dgl. mit und unter ihren übrigen Speisen, so dem Scheidewasserbrenner und andern Fabrikanten, welche beständig in einem Kreise voll der schädlichsten Dämpfe von mineralischen Säuren leben, Salmiakgeist und andere flüchtige Laugensalze, wenn sie sie von Zeit zu Zeit unter die Nase halten.

Ein vorzügliches Verwahrungsmittel, welches zwar die Gifte nicht unschädlich macht, nicht gänzlich entkräftet, aber doch ihren Wirkungen einige Schranken sezt, liegt in der Le-

www.dlibra.wum.edu.pl

bensart eines jeden Menschen. Ein Mensch, der durch Ausschweifungen von dieser oder jener Art, oder von mancherlei Arten zugleich, durch Krankheiten, durch innern Kummer, durch allzustarke, anhaltende Anstrengung der Seelenkräfte, durch unmasige Strapazen oder gänzliche Enthaltung von aller Bewegung geschwächt ist, leidet unter übrigens gleichen Umständen weit mehr von der Macht der Gifte, als ein Gesunder, der sich durch eine seiner ursprünglichen Beschaffenheit und seiner Beschäftigung angemessene Lebensart in einer natürlichen Stärke erhalten hat. So wie dieses von den Giften überhaupt gilt, so gilt es vornehmlich von denen, welche durch eine langsame Auszehrung tödten.

Zwar läßt sich nicht läugnen, daß die scharfen Gifte, welche durch den heftigen Reiz, den sie auf die festen Theile machen, alles in die ausschweifendsten Bewegungen sezen, auf einen Körper, dessen Lebenskräfte noch unversehrt sind, dessen Fleischfasern noch die natürliche Stufe von Reizbarkeit, dessen Nerven die gehörige Empfindlichkeit haben, weit heftiger wirken müssen, als auf einen andern, dessen Kräfte geschwächt, dessen Fasern minder reizbar, dessen Nerven nicht mehr so empfindlich sind; aber es ist eben so gewis, daß ein recht starker Körper solche widernatürlich heftige Bewegungen weit eher aushalten kann, als ein geschwächter, wenn sie auch in diesem weit nicht so heftig sein sollten x*).

---

x*) S. darüber auch Guyon Leçons diverses B. I. S. 70—80. und B. Gratarolus consilium de praeservatione a venenis mit variorum curation. sudor. anglic. in Germania expert. ausgegeben.

www.dlibra.wum.edu.pl

Von Gegengiften.

So unbestimmt die Begriffe waren, welche sich die alten Aerzte von der Natur eines Giftes machten, eben so und noch weit unbestimmter waren ihre Begriffe von den Mitteln, den schrekllichen Folgen dieser Gifte zuvorzukommen, oder von den Gegengiften; so wie sie nicht nur das Gift nannten, was heut zu Tage mit diesem Namen bezeichnet wird, sondern denselbigen auch auf die unbekannte Ursache gefährlicher, hiziger, vornemlich umgehender Krankheiten, ausdehnten, so nannten sie auch alle die Mittel, von welchen sie nach ihrer Lehre glaubten, daß sie diese Krankheiten bezwingen könnten, Gegengifte oder Antidota; einige giengen, aus dem Gesichtspunkte, daß alle Ursachen der Krankheiten Feinde der Gesundheit und des Lebens sind, gegen welche sie mit diesen Waffen zu kämpfen hätten, sogar so weit, daß sie alle Arzneimittel mit diesem Namen bezeichneten.

Ueberhaupt herrschten über diese Gegengifte kaum glaubliche Vorurtheile; leichter läßt es sich z. B. begreifen, wenn der General einer englischen Flotte Dudley y) mit einem Stüke Knoblauch das Gift aus einer Wunde von vergifteten Pfeilen zog; aber was soll der aufgeklärte Arzt dazu sagen, wenn er ließt, die Aerzte Kaiser Albrechts des ersten hätten ihn, weil er Gift bekommen hatte, an den Beinen aufgehängt, ihm ein Aug ausgestochen, und nun eine Arznei beigebracht, die das Gift zum Auge heraus trieb? Was soll er zu den zahlreichen und weitläuftigen Mischungen des Mohnsaftes sagen, die man nicht etwa blos gegen gewisse Arten

y) J. Hawkins bei Hakluyt a. a. O. B. III. S. 487.

www.dlibra.wum.edu.pl

der Gifte, sondern, troz allem Widerspruche der gesunden Vernunft gegen alle Gifte ohne Unterschied, empfahl, so sehr rühmte, daß man selbst dem Wein die Kraft eines solchen allgemeinen Gegengiftes mitzutheilen glaubte, wenn man das Mark aus dem Weinstok herausnahm, und statt desselben etwas von dem Gegengift hineinstekte z)? Wie sich erklären, daß schon mehrere ältere, vornemlich griechische Aerzte, Nikeratus, Andromachus, der Leibarzt des Kaisers Nero und dessen Sohn, späterhin Bestinus und Scribonius Largus, Schober a), J. E. Burggraf b), Fr. Pona c), Triphyllo Jaknos d) nicht nur auf die Entdekung eines solchen allgemeinen Gegengiftes ausgiengen, sondern es wirklich entdekt zu haben sich rühmten?

Allein, was von dem an sich widersprechenden Begrife eines allgemeinen Verwahrungsmittels gilt, das trift auch das allgemeine Gegengift. Wo ist das Gegengift, das der schädlichen Kraft giftiger Lustarten und Dünste, wenn sie eingeathmet werden, das der tödlichen Jauche der Schlangen, wenn sie unmittelbar mit dem Blute vermischt worden ist, das der furchtbaren Wirkung anderer Gifte, welche hinuntergeschlukt werden, mit gleicher Kraft widersteht? Wird ein Gegengift, welches diese abwendet, auch den Unglüklichen retten, der in Schnupftabak ein Gift bekommt, das ihn ra-

---

z) 1) J. Cassianus Florentinus de re rustica L. IV. c. 8. 2) Pseudo-Democritus de re rustica L. V. c. 3.

a) Schazkämmerlein wider Gift. Grätz 1575.

b) Alexipharmacum omnium venenorum. Lugd. B. 1610. 4.

c) Antidotus bezoardica versus omnia venena. Veronae 1622. 12.

d) Giftjäger. Frankf. 1567.

www.dlibra.wum.edu.pl

fend macht, und noch nachher um den vollen Gebrauch seines Verstandes bringt e)?

Wenn noch etwas vernünftiges im Begriffe eines allgemeinen Gegengiftes liegt, so gilt es höchstens von den Giften, welche hinunter geschlukt werden; diese wieder aus dem Leibe zu schaffen, ehe sie noch anfangen zu wirken, oder wenigstens, ehe sie anfangen, ihre grausamen Wirkungen über das Gebiet des Magens auszudehnen, ist immer der erste Schritt zu einer glüklichen Heilung; aus diesem Grunde sind Brechmittel und alle Mittel, welche diese zwar widernatürliche, aber in diesem Falle heilsame Bewegung des Magens befördern, erschlaffende Arzneien, laue, ölichte, schleimige, wässerichte Getränke in groser Menge genommen, wo der Argwohn eines hinunter geschlukten Giftes statt findet, noch von allen wahren Aerzten als die wirksamsten empfohlen und befunden worden; so lies nach Suidas schon Asklepiades die Kranken, von welchen er vermuthete, daß sie Gift genommen hatten, so Diphylus Siphinus f), der mit Demetrius Polykrates zu gleicher Zeit lebte, seine Kranke nach dem Genus giftiger Schwämme brechen; so befahl schon g) Nikander dem Vergifteten den Mund aufzu-

---

e) Journal von und für Deutschland 1789. St. 2. S. 127.

f) Von kräftigen Gegengiften s. auch 1) Heinr. a Lea de curandis venenis per medicamenta simplicia et facile parabilia. Arnhem. 1603. 8. 2) M. Zuccari Methodus occurenti venenatis corporibus Neapol. 1611. 4. 3) S. Hahnemann a. a. O. B. V. 4) C. A. Struve Noth- und Hülfsbüchlein vom tollen Hundsbis und d. Görlitz 1796.

g) a. a. O. v. 225.

www.dlibra.wum.edu.pl

sperren, und den Kopf des Magenschlundes mit den Fingern zu reizen, daß er sich erbrechen müsse; Foreſt h) in solchen Fällen ein Erbrechen; so Herm. Börhaave i) täglich zwölf Pfunde mit Honig versüsten Wassers, hinternach eine starke Gabe weissen Vitriols; so stellte El. Camerer k), mit einem Brechmittel, so Kaauw Börhaave l) mit einigen Unzen Baumöl, einer grosen Menge Wassers, Spiesglanzglas in spanischem Wein und zulezt mit Brechwurzel, andere Aerzte mit lauen Getränken, die ein Erbrechen zuwege brachten, ein Vater sein Kind mit Tabaksranke m), Lobſtein n) mit einer grosen Menge durch Syrup versüsten Oels und mit Milch, welche die gleiche Wirkung hatten, zwei vergiftete Kinder wieder her. Und warum sollte ein Mittel, das die Natur selbst so oft gebraucht, um schädliche Körper, wenn sie in den Magen gekommen sind, wieder auszuſtossen, dessen sie sich insbesondere öfters o) zur Rettung von Vergifteten bedient, hier nicht eine vorzügliche Stelle verdienen? Inzwischen erfordert der Gebrauch der Brechmittel auser der Maasregel der Behutsamkeit, die er überhaupt erfordert, hier noch besondere.

---

h) a. a. O.

i) Praelect. in propria inſtitut. rei medic. ed. Alb. Haller. Goetting. 8. T. VI. 1744. S. 386. 387.

k) a. a. O.

l) a. a. O.

m) Bei Wepfer a. a. O.

n) a. a. O.

o) Ein Beiſpiel von verſchlukten Wolfskirſchen, die auf dieſem Wege von ſelbſt wieder vom Kranken kamen, hat Boucher Iournal de medecine, pharmacie, chirurgie &c. B. XXIV. S. 310 ꝛc. aufgezeichnet.

www.dlibra.wum.edu.pl

1) Muß man ungefähr wissen, wie lange es schon ist, daß der Kranke das Gift bekommen hat, denn ist es

α) noch nicht lange, und läßt sich also vermuthen, daß das Gift noch nicht über den Magen hinaus gekommen sei, so läßt sich mit Grund hoffen, daß ein Brechmittel allen weitern bösen Folgen vorbeugen wird.

β) Ist es aber schon länger, und zu vermuthen, daß das Gift bereits in die Gedärme übergegangen sei, so kann zwar ein gelindes Brechmittel dazu dienen, das, was noch davon in den Falten des Magens und allenfalls noch im Zwölffingerdarm hängt, auszustoßen, und dadurch die Wirkung von diesen Theilen des Darmkanals abzuwenden; allein in diesem Fall läßt sich durch abführende Mittel, durch oft wiederholte starke Klistire von Oel, Milch, Wasser, andern erweichenden, milden, lauen Flüssigkeiten viel mehr ausrichten, auf der einen Seite die Häute der Gedärme gegen den Reiz des Giftes schüzen, und die Schärfe des lezten einhüllen; auf der andern aber das Schädliche auf dem Wege welcher nun näher und leichter ist, nemlich durch den Stuhlgang hinweg schaffen.

γ) Ist es aber noch länger her, und aus den Zufällen zu muthmassen, daß das Gift aus dem Magen und den Gedärmen bereits in die Säfte übergegangen sei, so werden allerdings Brechmittel, in so ferne sie die (meistens) ohnehin zu lebhaften Bewegungen durch den Reiz, welchen sie auf den Magen machen, noch vermehren können, das Uebel gemeiniglich verschlimmern.

2) Läßt sich vermuthen, daß das Gift, von welchem der Kranke leidet, von der scharfen Art ist, so ist es besser,

www.dlibra.wum.edu.pl

wenn die Zufälle nicht sehr heftig sind, zu versuchen, ob man nicht blos durch den recht häufigen Genus blos erschlaffender, lauer, ölichter, oder wässerichter Getränke Erbrechen zuwege bringen kann, oder, wenn die Heftigkeit der Zufälle schleunigere Hülfe erfordert, sowohl ein solches Brechmittel zu wählen, welches nicht eigentlich scharf ist, z. B. amerikanische Brechwurzel, als auch neben her eine grose Menge jener Getränke nehmen zu lassen.

3) Muß man sich dann vor Brechmitteln äuserst hüten, wenn nach sichern Merkmalen das Gift bereits Entzündungen in dem Magen, wenn es selbst das heftigste, durch kein Mittel zu stillende äuserst schmerzhafte und schwächende, noch mehr wenn es ein blutiges Erbrechen erregt.

4) Desto heilsamer wird das Brechmittel wirken, wenn die Zufälle zu erkennen geben, daß der Kranke an den Folgen eines betäubenden Giftes leidet.

5) Aber hier (4) insbesondere, überhaupt wo Brechmittel gegen Gift dienen, müssen sie in stärkern Gewichten gereicht werden, als in gewöhnlichen Fällen.

Ein sehr mächtiges Gegengift, das in vielen Fällen, aber freilich bei weitem nicht in allen die schleunigste und sicherste Hülfe leistet, hat uns die Natur in dem Wasser angewiesen. Das Wasser ist ein Auflösungsmittel aller Salze; viele Gifte, insbesondere viele scharfe Gifte, haben ihre schädliche Wirksamkeit blos ihren salzigen Bestandtheilen zu verdanken; manche unter ihnen sind ganz und gar wahre Salze; diese lösen sich also in Wasser auf, oder es geht doch ihr wirksamster Bestandtheil in Wasser über, und dann haben diese Salze die Eigenschaft, daß sie sich mit einer ungeheuren

www.dlibra.wum.edu.pl

Menge Wassers vermischen lassen, ohne sich wieder davon zu scheiden, und daß so wie sie ein geringer Antheil Wassers wirksamer macht, sie eben so die Beimischung einer grösern Menge nach und nach entkräftet. So wird ätzender Sublimat, eines der schärfsten Gifte, das wir kennen, durch die Beimischung von 12000 Theilen Wassers unschädlich; so fand Krapf reines Wasser als das sicherste Gegengift gegen die Schärfe des Hahnenfuses, und eiskalt in groser Menge getrunken gegen das Gift der Schwämme; doch ist über den Gebrauch des Wassers zu bemerken:

1) Schadet zwar Wasser, wenn es rein ist, in keinem Falle nichts, wo ein Vergifteter zu besorgen ist; allein in einigen Fällen, z. B. wo sich Wasserscheue einstellt, nach dem Biß toller Thiere und in einigen andern Fällen, kann es gar nicht angebracht werden, in andern z. B. im Bisse anderer giftigen Thiere, wird es ohne grosen Nuzen sein. —

2) Muß das Wasser, wenn es die übrigen Umstände gestatten, auf mehr als einem Wege, durch den Mund, in Klistiren, Bähungen, Bädern zugleich beigebracht werden, damit, wenn das Gift auch schon in die Gedärme gekommen, oder bereits in die Säfte gedrungen ist, es noch geschwächt, verdünt und ausgespült werden könne.

3) Muß man das Wasser in sehr groser Menge geben. Weniges Wasser würde zwar die schädlichen Salze auch auflösen, allein es würde sie nur wirksamer machen, nur ihren Uebergang in die Milch- und Blutgefässe beschleunigen, und statt ihre unseligen Wirkungen zu hemmen, sie noch befördern. Gibt man hingegen eine grose Menge Wassers, so wird nicht nur jedes Theilchen des Giftes in unzählige Theilchen Wassers eingehüllt, und gehindert, seine volle Schärfe zu äusern,

www.dlibra.wum.edu.pl

sondern die Natur wird auch gereizt, durch diesen oder jenen Weg, durch den Mund, oder durch den After, oder durch den Harn, die ungeheure Last von Wasser, welche vornemlich auf die Werkzeuge der Verdauung drükt, und sie ausnehmend ausspannt und mit diesem das darin aufgelöste Gift aus dem Leibe zu schaffen.

4) Diese lezte Wirkung, hauptsächlich wenn das Wasser die Wirkung der Brechmittel unterstüzen oder gar ihre Stelle ersezen soll, wird noch mehr befördert, wenn das Wasser lau gebraucht wird, eine Wärme, welche der Magen durchaus nicht ertragen kann, und bei welcher er gemeiniglich alles, was ihm in dieser Temperatur von Getränken anvertraut wird, wieder auswirft. Aber diese Wärme leistet auch noch von einer andern Seite gute Dienste; laues Wasser löst die Salze viel geschwinder, es löst gemeiniglich auch mehr davon auf; es kann also, das Gift mag nun noch in dem Magen, oder es mag in den Gedärmen, oder es mag bereits in den Gefässen sein, seine verdünnende, versüsende, der Macht der Gifte widerstehende Kräfte viel schneller, weit stärker äusern.

5) Wasser kann in jedem Zeitlaufe der Krankheit, welche das Gift erregt, ohne Schaden, und, wenn es ein Gift von der scharfen Art und innerlich beigebracht worden ist, immer mit Nuzen gebraucht werden, ob es gleich dem Gifte mächtiger widersteht, wie früher es genommen wird.

6) Gilt das, was vom Wasser gesagt ist, von allen Getränken, an welchen das Wasser den größten Antheil hat, wenn sie anderst frei von Salzen sind.

www.dlibra.wum.edu.pl

Das dritte Gegengift machen die milden Oele p), aus dem Pflanzen- und Thierreiche, Mandelöl, Baumöl, Ricinusöl q) und dgl. Butter, Fett u. a. aus, Mittel, deren sich die Natur nicht nur selbst bedient, um schädliche Schärfe unthätig zu machen, sondern deren sich auch der Arzt nach vielfachen Erfahrungen in andern Feldern seiner Kunst zu gleichen Absichten mit dem glüklichsten Erfolge bedienen kann; diese Mittel füllen scharfe Theilchen, wie die Scheide das scharfe Schwerd, ein, und machen sie dadurch unwirksam. Doch mus dabei in Erwägung gezogen werden.

1) Müssen die Oele frisch, frei von allem Geruche, frei von allem fremden Geschmac, vornemlich frei von der ranzigen Schärfe sein, welche sie so oft annehmen, wenn sie etwas zu alt sind; sind sie von der lezten angesteckt, so erreicht man die Absicht, die schädliche Schärfe des Giftes zu mildern, damit sogar nicht, daß sie vielmehr dadurch noch neue Verstartung erhält.

2) Sind diese Oele gegen mehrere Arten von Gift, nicht nur gegen die Schärfe, sondern auch gegen solche, welche keine offenbare Schärfe haben, gegen die Gifte von Blei und Spiesglanz, selbst gegen die betäubende, und, nach einigen Erfahrungen, sogar gegen Schlangengift zu gebrauchen.

3) Leisten sie ihre Wirkung nicht nur zu Anfang der Krankheit, welche das Gift hervorgebracht hat, ob sie gleich dann am meisten ausrichten, indem sie, vornemlich wenn sie bald gegeben werden, die Wirkung des Brechmittels unter-

---

p) Forest a. a. O.

q) Odier Iournal de medecine, chirurgie, pharmacie, B. II.

www.dlibra.wum.edu.pl

schützen, sondern auch wenn die Krankheit weiter gekommen ist, indem sie die scharfen Theilchen des Giftes einhüllen, die sich entweder noch in den Gedärmen aufhalten, und ihre Häute zu widernatürlichen Zusammenziehungen reizen, oder bereits in das Geblüt übergegangen sind, die festen Theile, welche dadurch gereizt und gespannt werden, und in die gewaltsamsten Bewegungen ausbrechen, schlaff und schlüpfrig machen.

4) Müssen auch sie in groser Menge und zu ganzen Pfunden auf mehr als einem Wege, durch den Mund, als Klistire und als Bähungen beigebracht werden.

5) Können sie selten schaden, wenn nicht das Gift selbst von der Beschaffenheit eines verdorbenen Oels oder von der Abtheilung der betäubenden ist, welche ohnehin die Empfindung der Nerven stumpf, und die Reizbarkeit der Fleischfasern träg machen, doch machen diejenigen, welche zugleich scharf sind, eine Ausnahme.

6) Gilt das, was von milden Oelen gesagt ist, auch von Mitteln, welche aus öhlichten Samen bereitet werden, z. B. von Samenmilchen.

Das vierte Gegengift sind die Schleime, geschmak- und geruchlose, im Wasser leicht auflösliche Stoffe, z. B. Quittenschleim, Haferschleim, Gerstenschleim, Tragantschleim, der Schleim von Eibischwurz, Käsepappeln u. dgl. Viperngallerte u. a. von diesen gilt eben das was schon von den Oelen gesagt ist r); zwar ist ihre einhüllende Kraft nicht ganz so groß, als bei den Oelen; allein sie haben dagegen auf einer andern Seite wieder Vortheil.

---

r) Majault in Gazette de santé 1758. n. 47.

www.dlibra.wum.edu.pl

1) Vermischen sie sich leichter mit Wasser, lösen sich daher leichter in den thierischen Säften auf, und gehen so leichter in die Milch- und Blutgefässe über; sie leisten daher, wenn das Gift bereits ausser dem Bezirke des Magens und der Gedärme ist, ihre Dienste sicherer und geschwinder.

2) Sie bleiben nicht so lange an den Häuten des Magens und der Gedärme hängen; sie sezen also den Arzt nicht der Gefahr aus, indem er auf der einen Seite das Gift zu entkräften sucht, auf der andern diese Theile zu sehr zu schwächen, und die Mündungen der Milch- und der Blutgefässe, welche sich darinn öfnen, zu verstopfen.

3) Verderben die Schleime nicht so leicht, da hingegen milde Oele, wenn sie lange in dem Magen und in den Gedärmen bleiben, durch die natürliche Warme des menschlichen Leibes ranzig werden, und dadurch mehr schaden können, als sie jemalen nüzen.

Unter die Mittel, welche uns die Natur zur Gegenwehr gegen so mächtige Feinde, wie die Gifte sind, verliehen hat, gehört mit Recht auch die Milch, eine Flüssigkeit, in welcher Schleim, Oel und Wasser mit einander vereinigt sind, deren Gebrauch also in allen Fällen, und unter den gleichen Umständen und Fürsichtsregeln, unter welchen milde Oele, Wasser und Schleim Nuzen schaffen können, sicher, heilsam und bewährt ist [1]; da inzwischen die genannten Theile so mit einander vereinigt sind, daß sie sich nicht nur

---

1) S. davon Aepli bei Hartenkeil Salzburg. medicin. Zeitung B. II. S. 150. 2) von Eiken Sammler B. I. S. 12.

www.dlibra.wum.edu.pl

von selbst, sondern auch auf die Beimischung unterschiedener Körper sehr leicht von einander scheiden, und so scheiden, daß sie sich nicht leicht wieder mit einander vereinigen lassen, so gibt es doch Fälle, in welchen sie keinen glücklichen Erfolg, wenigstens keine schleunige Hülfe verspricht.

1) Wenn die scharfen Gifte saurer Art sind, vornemlich wenn es mineralische Säuren t) sind; diese machen die Milch gerinnen, die geronnenen Milchklumpen, welche sich in keinem thierischen Saft mehr auflösen, fallen dem ohnehin gänzlich in Unordnung gerathenen Magen zur Last, und hindern die Wirkung der übrigen Bestandtheile der Milch.

2) Wenn das Gift von der Natur des Weingeistes ist, denn auch dieser macht bei der natürlichen Wärme des menschlichen Leibes die Milch gerinnen. Gleiche Dienste leisten auch Milchchokolade u) und Milchbrei.

Sechstens gehört unter diese allgemeinen Mittel der Essig, der noch zu allen Zeiten von allen wahren Aerzten unter die kräftigsten Gegengifte gezählt worden ist, er mag aus Bier oder Wein oder einem andern Gewächssafte gewonnen sein, und mit ihm alle sauren Pflanzensalze und Pflanzensäfte, Weinstein, Sauerkleesalz, der Saft von Sauerampfer, Berberisbeeren, Limonien, Citronen, Johannisbeeren, sauren Kirschen- u. a. selbst saure Molken, Mittel, welche, weil sie von den Kranken gerne, also leicht in der gehörigen Menge

---

t) Doch hat sie noch gegen diese H. Leibarzt Lentin Beobachtungen einiger Krankheiten ꝛc. S. 165. empfohlen.

u) Ephemerid. Acad. caesar. Natur. Curios. Dec. III. Ann. 5. et 6. S. 102.

www.dlibra.wum.edu.pl

Menge genommen werden, und so recht kräftig wirken können, dem Arzte desto willkommener sein müssen. Bei ihrem Gebrauch ist jedoch zu bemerken:

1) der Essig widersteht, so wie die übrigen Säuren, der Faulung mächtig; die meisten Gifte des Thierreichs, die betaubenden Gifte des Gewächsreiches, und viele scharfe Gifte, auch solche, deren hauptsächlich wirksamer Grundstoff noch nicht bekannt ist, haben eine Kraft, das Blut und die übrigen Säfte aufzulösen, daß es, wo nicht bei lebendigem Leibe, doch sogleich nach dem Tode in Fäulung übergeht; also kann der Essig gegen die Wirkungen des Schlangengiftes, gegen die Wirkung der spanischen Fliegen, gegen die Wirkungen von dem Bis wüthender Thiere mit dem größten Nuzen, nach einer Menge richtiger Erfahrungen v) gegen die Folgen der betäubenden Gifte, der scharfen Laugensalze, und selbst gegen die schadlichen Kräfte des Arsenits, nach mehreren Erfahrungen auch gegen verschiedene scharfe Gifte des Gewächsreichs, gegen weisse und schwarze Nieswurz, Zeitlose, Meerzwiebel, Aronswurz, Zaunrübe, Wüterich, Schierling und Bilsen mit zuversichtlicher Hofnung eines erwünschten Erfolgs gebraucht werden. So erzehlt Cornelius Celsus w) die Geschichte eines Knaben, welcher von einer Schlange gebissen war, und als er darauf sehr starken Durst bekam, und doch nichts anders haben konnte, durch einen guten Trunk Essig gelabt und gerettet wurde; so verordnet Cramer x) ein bis

---

v) Sage analyse des trois regnes de la nature B. I. S. 251.

w) L. de medicina, cura Almeloveen. Amstelod. 1713. L. V. C. 5. n. 4. S. 310.

x) Commercium litterarium Nativum 1735. S. 33.

www.dlibra.wum.edu.pl

zehen Grane gestossener spanischer Fliegen, welche er, um ihre schädliche Schärfe zu mildern, in vier Loth sehr guten Essigs kochen läßt in der Wasserscheu; so versichert Sage y), daß durch Essig ein Verlobter von vier und zwanzig Jahren, der dreisig Grane Mohnsaft zu sich genommen hatte, gerettet worden sei.

2) Löst der Essig verschiedene Metalle auf, man kann ihn also bei unterschiedenen reinen metallischen Giften, selbst bei einigen mechanischen mit Nuzen, und in diesen Fällen auch weit sicherer gebrauchen, als jede mineralische Säure, welche zwar das Metall stärker angreift und schneller auflöst, aber auch die Haut des Magens anfrißt, wenn sie nicht sogleich Metall genug findet, um damit gesattigt zu werden, und gemeiniglich durch die Beimischung von diesem ihre Schärfe noch verstärkt. So ist Essig und die meisten übrigen Gewächssäuren ein milderndes und zum Theil mächtiges Gegengift des Spiesglanzmetalls und Spiesglanzglases, des Bleies, des Kupfers und des Eisens, wenn das lezte so in den Leib kommt, daß es durch seine mechanische Eigenschaften schaden kann, in so ferne er nemlich diese Metalle auflöst, ihre Schärfe mildert oder ihre Ecken und Spizen abrundet, oder doch ihre Ausförderung aus dem Leibe erleichtert.

3) Aeusert der Essig auch einige Kraft auf die Harze, ob er sie gleich nicht wahrhaftig chemisch auflöst; bei vielen Giften liegt der wirksamste Theil in diesem Harze; diese können also durch Essig am besten entkräftet, am besten ihrer schädlichen Schärfe beraubt werden.

---

y) a. a. O. S. 252.

www.dlibra.wum.edu.pl

4) Ist der Essig eine Säure; alle Säuren verwandeln sich mit Laugensalzen in Mittelsalze, in welchen Säuren und Laugensalze, wenn sie zuvor auch noch so scharf waren, mild und unschädlich werden; deswegen ist der Essig ein starkes Gegengift gegen alle Laugensalze, sie mögen in fester oder flüssiger, in tropfbarer oder elastischer Gestalt sein; so ist der Essig ein herrliches Mittel gegen die scharfen Dünste des Salmiakgeistes, wenn er gleichfalls durch die Nase eingezogen wird, und so haben die Aerzte schon längst seine Dämpfe gegen die faulenden Ausdünstungen verschiedener Körper, vornehmlich gegen die Ausflüsse, von welchen viele die ansteckenden und umgehenden Krankheiten ableiten, empfohlen.

5) Allein weil er eine Säure ist, wird er in manchen andern Fällen nichts ausrichten, denn ist 1) das Gift ohnehin schon saurer Art, z. B. Scheidewasser, Vitriolöl u. dgl. oder hat es wenigstens eine vorschlagende wirksame Säure in sich, so wird er eher schaden als nuzen; ist 2) das Gift, oder die Arzeneien, welche man dagegen gebraucht, von der Art, daß sie der Essig zersezt oder gerinnen macht, hat man z. B. bereits Seife, Schwefelleber oder Milch gegeben, so wird der Essig wenigstens ohne Erfolg gebraucht werden.

6) Gibt es mehrere Gifte von sehr scharfer Art, von welchen sich nicht behaupten läßt, daß sie die Natur einer Säure hätten, bei welchen der Essig, so wie andere Gewächssäuren fruchtlos gebraucht wurden. So bemerkt dieses Krapf von der Schärfe des Hahnenfuses, mit welcher er wiederholte Versuche dieser Art gemacht hat; so andere von der Wurzel des gelben, und den Blumen und Blättern des blauen Eisenhütchens, daß sie, ob sie gleich mit

www.dlibra.wum.edu.pl

Essig als Salat gespeißt wurden, doch tödliche Zufälle erregt haben.

7) Löst der Essig zwar einige Metalle, und unter diesen auch Blei und Kupfer auf; allein er benimmt dem ersten seine stopfende, und dem lezten seine beisende Eigenschaft nicht, im Gegentheil vereiniat er sich damit zu einem Salze, das sich in allen Säften unsers Leibes auflöst, und nur gar zu leicht aus Magen und Gedärmen in die Milch- und Blutgefässe eindringen, und dadurch seine traurige Wirkungen über den ganzen Leib verbreiten kann. Soll sich also in solchen Fällen vom Gebrauch des Essigs Nuzen hoffen lassen, so müssen zu gleicher Zeit auf der einen Seite die Häute des Magens und der Gedärme gegen die Schärfe der Auflösungen geschuzt, auf der andern aber die Säure, so bald sich vermuthen läßt, daß sie das widernatürlich im Leibe befindliche Metall aufgelöst habe, wieder aus dem Leibe geschaft werden. Man muß also mit dem Gebrauche des Essigs den Gebrauch ölichter und schleimiger Getränke verbinden, und sogleich auf denselbigen mit abführenden Mitteln die zwote Absicht zu erreichen suchen.

8) Muß der Essig gleichfalls, so wie die bisher angezeigten Gegengifte, wenn er eine glükliche Wirkung leisten soll, und, wie nachdem das Gift unter dieser oder jener Gestalt, auf diese oder jene Art beigebracht worden, bald so, bald anderst gebraucht, bald unter die Nase gehalten, bald in Bähungen, bald in Klistiren gebraucht, bald eingenommen werden.

9) Muß der Essig, wenn er nicht unter die Nase gehalten wird, zwar nicht sehr stark, aber er muß rein, vornemlich rein von Metalltheilchen, von Blei und Kupfer sein,

www.dlibra.wum.edu.pl

einmal, weil ihn diese an sich schon schädlich machen, und also schon an sich, statt Nuzen zu schaffen, Schaden anrichten, und dann, weil durch diese Beimischung der Essig einen Theil seiner mildernden und auflösenden Kraft verliert.

10) Aeussert er seine Wirkung zwar am gewissesten und geschwindesten, wenn er gleich zu Anfang, da sich das Gift noch im Magen und in den Gedärmen aufhält, gebraucht wird, allein er ist auch noch sehr kraftig, wenn dieses bereits in die Säfte übergegangen ist.

Ferner gehört unter diese Gegengifte gemeine Seife in Wasser aufgelöst, wie sie schon Börhaave und nach ihm Cranz und Hahnemann empfohlen; mag sie immer bei betäubenden Giften wenig ausrichten, so wird sie vollends, da sie leicht und allenthalben bei der Hand ist, bei scharfen Giften aus dem Mineralreiche desto glüklicher wirken.

Auch den Honig, den die Bienen aus dem süsen Safte mancher Gewächse sammlen, haben die Alten schon als Gegengift gebraucht; er kommt in seinen Wirkungen den Oelen und Schleimen sehr nahe, wirkt aber auch, wie diese, bei Giften, welche eingeathmet werden, nichts; er ist aber

1) mild, süs, und wenn er frisch und nicht von giftigen Pflanzen gesammelt ist, ohne die mindeste Schärfe, und kann also bei allen scharfen Giften, ihre Schärfe mag mehr mechanischer oder mehr chemischer Art sein, mit Nuzen gebraucht werden, einmal um ihre Eken, Spizen und scharfe Theilchen einzuhüllen, daß sie nicht als solche wirken können, dann um die Haut des Magens und der Gedärme zu bekleiden, und sie gegen die Schärfe dieser Gifte zu schüzen, und

www.dlibra.wum.edu.pl

dann hat er noch den Vortheil, daß er diese scharfen Gifte bald wieder mit sich durch den Stuhlgang abführt.

2) Man ist bei seinem Gebrauche nicht so eingeschränkt, zu gleicher Zeit auch andere Mittel zu gebrauchen, wie bei dem Gebrauche einiger andern.

3) Ist er angenehm zu nehmen, und zu jeder Zeit der von dem Gifte verursachten Krankheit zu gebrauchen.

4) Muß er mit Wasser verdünnt, und in groser Menge genommen werden.

5) Widersteht er auch der Fäulung etwas, und kann daher auch da mit Nuzen gebraucht werden, wo das Gift eine allgemeine Auflösung der Säfte verursacht.

6) Leistet er selbst bei betäubenden Giften gute Dienste.

Mohnsaft oder Opium ist von vielen unter den Alten beinahe für das einzige Gegengift angesehen worden, ob er gleich bei weitem nicht auf alle unbedingt paßt, und bei seinem Gebrauche viele Behutsamkeit und Einschränkung erfordert.

1) Der Mohnsaft hat die Kraft, die Nerven zu betäuben, und sie gegen äusern Reiz unempfindlich zu machen; er nimmt in bestimmtem Gewicht gegeben, den Fleischfasern ihre Reizbarkeit und ihre Kraft sich zusammenzuziehen; ist also durch entgegengesezte Kräfte anderer Körper die Empfindung der Nerven ungemein erhöht, schmerzhaft erhöht, die Fleischfasern durch einen übernatürlichen Reiz genöthigt, sich stark und widernatürlich häufig zusammen zu ziehen, und brechen deswegen in die gröſten unordentlichen Bewegungen aus, so wird der Mohnsaft sehr gute Dienste leisten, und durch

www.dlibra.wum.edu.pl

die Unempfindlichkeit, welche er den Nerven, durch die Trägheit, welche er den Fleischfasern einflößt, die Zufälle weit minder schrecklich machen; aber ein kluger Arzt traut dieser oft nur anscheinenden Linderung der Zufälle nicht; er hält sie nur für einen Stillstand, den er mit seinem Feinde getroffen hat, und weit entfernt, in dieser Ruhezeit müssig zu sein, wendet er inzwischen alle Mittel an, das Gift selbst zu entnerven, und aus dem Leibe zu führen; der Mohnsaft kann also bei den schärfsten Giften, wenn sie nicht zugleich betäubend sind, mit Nuzen gebraucht werden, und ist daher, weil ein groser Theil der Gifte, welche die Alten kannten, von der scharfen Art waren, eine Zeitlang fast für ein allgemeines Gegengift gehalten worden.

2) Aber eben daraus folgt, daß es ein fürsichtiger Arzt niemalen bei dem Gebrauche des Mohnsaftes allein bewenden lassen muß. Der Mohnsaft wirkt nicht auf das Gift selbst, er schüzt nur die Theile, und auch diese nur auf einige Zeit dagegen; so bald seine Wirkung aufhört, kann das Gift, weil es noch unverändert ist, ungehindert wirken, der Arzt muß also in der Zwischenzeit, noch ehe er sich durch den Mohnsaft Ruhe geschaft hat, das Gift selbst zu zerstören und auszuführen suchen.

3) Eben daraus, daß der Mohnsaft die Reizbarkeit der Fleischfasern ungemein schwächt, folgt noch eine andere Fürsichtsregel; durch diese Eigenschaft werden zwar die heftigen und krampfichten Bewegungen, welche die scharfen Gifte in verschiedenen Theilen des Leibes erregen, gestillt, aber es werden auch die natürlichen und ordentlichen Bewegungen, vornemlich in den Theilen, an welche der Mohnsaft unmittelbar gebracht wird, es wird die wurmförmige Bewegung

www.dlibra.wum.edu.pl

der Gedärme, durch welche die Natur die schädlichen und zur Nahrung untauglichen Stoffe wieder aus dem Leibe schafft, gehemmt; der Arzt würde also, wenn er Mohnsaft geben wollte, der Natur gerade entgegen arbeiten, das Gift in den Magen, oder den Wolf in den Stall einschliessen; daraus folgt also, daß er nur dann seine Zuflucht zu Mohnsaft nehmen muß, wenn die Bewegungen so heftig sind, daß er zu besorgen hat, sie würden dem Leben des Kranken noch eher ein Ende machen, als er hoffen könnte das Gift zu entkräften, und auch da muß er sich durch die scheinbare Milderung der Zufälle nicht verführen lassen, zu glauben, daß das Gift nun bezwungen sei.

4) Hat der Mohnsaft die Kraft, alle Säfte stark aufzulösen, so daß sie noch bei lebendigem Leibe der Fäulnis zunächst kommen. Er ist also bei allen Giften, welche die gleiche Wirkung äusern, wie die betaubenden und die meisten thierischen und feuerfesten sowohl als flüchtigen Laugensalze, nicht nur unnüz, sondern sogar schädlich [2]).

5) Ist der Mohnsaft wegen der Wirkung, welche er auf Nerven und Fleischfasern äusert, in allen denen Fällen, in welchen das Gift eben dieselbige Kraft hat, also in allen Fällen, wo betäubende Gifte vorkommen, äuserst schädlich, weil er, statt ihre Wirkung zu hemmen, sie noch verstärkt.

6) Muß man in allen Fällen sehr behutsam mit dem Mohnsafte umgehen, wenn man den Kranken nicht in die äuserste Gefahr stürzen will, weil wenige Grane hinreichen,

---

2) S. davon Unzer medicinisches Handbuch. Lüneburg und Hamburg 1779. 8 Theil 2. S. 245.

www.dlibra.wum.edu.pl

auch in dem gesundesten nicht daran gewöhnten Menschen tödliche Zufalle zu erregen.

7) Gilt, was von dem Mohnsafte gesagt ist, von allen Mitteln, die aus diesem Safte zubereitet werden, oder in welchen er den wichtigsten und den wirksamsten Bestandtheil ausmacht, also vom Extractum opii, Opium cydoniatum, Tinctura thebaica, Essentia anodina officinalis, Laudanum liquidum Sydenhami, Electuarium Diascordium Fracastorii, Orvietanum, Philonium romanum, Mithridatium Damocratis, und dem vorzüglich als Gegengift gerühmten z*) The-

---

z*) 1) Γαληνος περι θηριακ. ad Pisonem. Paris. fol. 1531. 1534. 1536. 2) Caballi de theriaca. Venet, 1497. fol. 3) Laz Perez historia theriacae. Tolet. 1575. 4) J. P. Crassi, Leon. Turrisani, und M. Oddi meditationes in theriacam et mithridatium antidotum confirmatae a collegio Patavino &c. Venet. 1576. 5) M. Oddi meditationes in theriacam et mithridatium. Venet. 1576. 6) A. Boletta theriaca Andromachi juxta placita J. P. Crassi, B. Turrisani et M. Oddi. Patav. 8. 1576. 1626. 7) Jak. Pons Avertissement pour la préservation et la cure générale contre les poisons Sycophantie theriacale. Lyon. 1634. 8. 8) Babon Μιθριδατειοτεχνια ad. Drering. 1620. 9) Pona de vero balsamo degli antichi, nel quale si prova, che il solo balsamo arabico è il legitimo, a salvo di ogni altro liquore abbracciato sotto nome di balsamo degl antidoti. Venez. 1623. 4. 10) F. Scarella de theriaca. Batav. 1635. 11) Fr. Porta de opobalsamo nuper in theriacae, confectione adhibita et inter romanos medicos controversa. Rom. 1641. 12) M. P. Maria Theriacae et Mithridatii accurata structura. Patav. 1642. 13) Kasp. Marchius Progr. Praeparatio theriacae Andromachi. Kilon. 1663. 4. 14) Thom. Bartholin de theriaca in

www.dlibra.wum.edu.pl

riak oder Theriaca Andromachi und caeleſtis, nur mit dem Unterſchiede, den das verſchiedene Verhältnis des Mohnſaftes in dieſen verſchiedenen zuſammengeſezten und zubereiteten Arzneien nothwendig macht.

So unläugbar aber die Kraft der bisher angeführten Gegengifte unter den erwähnten Einſchränkungen, und ſo gewis ſie durch Vernunftgründe und Erfahrungen erwieſen iſt, ſo wenig gilt dieſes von den meiſten übrigen, welche die Alten mit ſo vielen Lobſprüchen erhoben, und mit dem Namen Bezoardica, Alexipharmaca, Alexiteria oder giftvertreibende Mittel bezeichnet haben; einige derſelben dienen nur bei gewiſſen Arten von Giften, wie z. B. Laugenſalze und etliche Arten von Erde bei verſchlukten Mineralſäuren, und andern Giften, deren Wirkung auf einer ſolchen Säure beruht; andere ſcheinen des Namens der Gegengifte gänzlich unwerth zu ſeyn.

Erſte Abtheilung.

1) Laugenſalze

α) feuerfeſte, in Waſſer aufgelößt, und ſtark damit verdünnt.

---

officina J. G. Beckeri diſpenſata Diſſ. II. Hafn. 1671. 4. 15) J. Garner Diſſ de theriaca. Hamb. 4. 1678. diſſ. 2. 1679. 3 1689. 16) Chr. Wedel de theriaca. Ien. 1700. 4. 17) Notto de theriaca Andromachi ejusque origine ingredientibus et uſu medico. Lubec. 4. 1702. 1706. 18) Viet Lettre aux Profeſſeurs de Pharmacie de Paris pour ſervir de reponſe à une lettre de la theriaque. Paris 1705. 19) Rud. J. Camerer diſſ. de theriaca. Tubing. 1720, 4. 20) Karl Bagard diſcours ſur l'hiſtoire de la theriaque 1755.

www.dlibra.wum.edu.pl

a) Weinſteinſalz, z. B. bei verſchluktem Arſenik und ätzendem Sublimat.

b) Aezſalz nach Fontana und Maderer bei thieriſchen Giften.

β) flüchtige,

trokenes flüchtiges Laugenſalz, und die mancherlei mit Waſſer (Spiritus ſalis ammoniaci aquoſus) oder Weingeiſt (Spiritus ſalis ammoniaci vinoſus), mit Weinſteinſalz (Spiritus ſalis ammoniaci cum ſale tartari paratus), oder mit Kalk (Spiritus ſalis ammoniaci calcarius), ohne andere Zuſäze (Spiritus ſalis ammoniaci ſimplex), oder mit einem Zuſaz von Anis — (Spiritus ſalis ammoniaci aniſatus), Citronen, — (Spiritus ſalis ammoniaci citratus), Saſſafras — (Spiritus ſalis ammoniaci ſaſſafratus); Engelwurz — (Sal volatile oleoſum angelicae), oder Bernſteinöl (Spiritus ſalis ammoniaci ſuccinatus, oder Eau de luce), oder mehreren dergleichen Oelen zugleich (Spiritus ſalis ammoniaci aromaticus, Sal volatile oleoſum), aus Salmiak oder durch gewaltſame trokene Hize in feſter (Sal volatile) oder flüſſiger (Spiritus) z. B. aus Regenwürmern (Spiritus lumbricorum volatilis), Elfenbein (Spiritus eboris), Hirſchhorn (Spiritus cornu cervi) bereitet und im lezten Falle mit brandichtem Oele getränkt. Sie können insbeſondere im Scheintode von eingeathmeten ſchädlichen Dämpfen und giftigen Luftarten, wenn es nicht ſelbſt laugenhaftes Gas war, was den Scheintod verurſacht hat, mit Nuzen gebraucht, und in ſolchen Fällen in die Bruſt eingerieben, unter die Naſe gehalten oder geſchmiert, Röllchen damit befeuchtet in die Naſe geſtekt, auch ſolchen

www.dlibra.wum.edu.pl

Verunglükten etwa 30 Tropfen mit einem Löffel voll Wassers eingegeben z**), aber es muß auch mit ihrem Gebrauche inne gehalten werden, so bald der Scheintode wieder athmet a).

Auch scheint, wenn gleich Fontana das Einsprizen des Hirschhorngeistes in die Adern bei zwölf Lämmern und Kaninchen, welche von Vipern gebissen waren, untrüftig fand b), vornemlich der mit Bernsteinöl getränkte Salmiakgeist nach den Erfahrungen von Jussieu c), Bertin und Morand d), und la Borde e) im Schlangenbisse von guter Wirkung zu sein.

2) Erden

α) Bittererde

gebrannte hat Percival Practical Essays B. I. S. 5. insbesondere bei sauren Giften als Gegengift empfohlen.

β) Kalkerde

A) kohlensaure

1) aus dem Mineralreiche

---

z**) Sage a. a. O. B. I. S. 282.

a) Vogel bei Baldinger neues Magazin für Aerzte. B. IV. St. 3. S. 197.

b) Opusc. scientific. Firenz. 1783. 8. S. 173.

c) Memoir. de l'Academ. des sciences à Paris pour l'ann. 1747.

d) Ergą specificum viprae morsus antidotum Alcali volatile. Paris 1744.

e) Iournal de medicine, de chirurgie et de pharmacie B. XII. Ian. 2. S. 534.

www.dlibra.wum.edu.pl

a) Mondmilch f),
b) Luchsſtein Belemnites,
c) Judennadeln, Lapis judaicus,
d) Beinbruchſtein, Oſteocolla g)

2) aus dem Thierreiche h)
a) Eierſchalen,
b) Krebsſtein,
c) Krebsſcheeren,
d) Schalen von gemeinen Gartenſchneken,
e) Schalen von verſchiedenen gemeinen Muſcheln,
f) Auſternſchalen i)
g) Perlmutter,
h) Perlen,
a) morgenländiſche
b) abendländiſche k)
i) Rükenſchild des Tintenwurms, Os ſepiae,
k) rothe Korallen,
l) weiſſe Korallen l).

---

f) gehört allerdings nicht immer dahin, ſondern zuweilen zur Alaun- oder Gipserde.

g) iſt auch oft nichts weniger, als reine kohlenſaure Kalkerde.

h) halten doch zum Theil noch eine ſchwache Spur Phosphorſäure und thieriſche Gallerte.

i) einige von dieſen halten auch noch etwas thieriſche Gallerte.

k) die meiſten enthalten auch noch Kohlenſäure.

l) von allen dieſen erdichten Mitteln ſ. mit mehrerem Tralles virium quae terreis remediis gratis hactenus adſcripta ſunt, examen rigoroſius. Wratislav. 1740. 8.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sie kann allerdings, wenn das Gift saurer Natur ist, von einigem Nuzen sein, indem sie sich in der Säure auflößt, und sie abstumpft, aber

1) wirkt sie auch da langsamer und schwächer als Wasser, wenn es in groser Menge genommen wird, und verdünnte Laugensalze,

2) hat das Gift Schwefelsäure in sich, so wird sie damit zu Gips, der sich äuserst schwer in Wasser, also auch in thierischen Säften auflößt, und dann

3) entbindet sich bei ihrem Uebergang in die Säuren eine Menge kohlensaures Gas, das durch seine grose Schnellkraft und Ausdehnbarkeit zu einer neuen Quelle schlimmer, wenigstens schmerzhafter Zufälle werden kann,

4) hat das Gift auser der Säure noch Metalltheilchen in sich, so werden diese niedergeschlagen, und sind in diesem Zustande oft weit schädlicher, als im aufgelößten,

5) wirkt sie durchaus nicht auf Gifte, wenn sie von einer andern als sauren Natur sind, durchaus nicht, wenn sie laugenartig sind, verschlimmert vielmehr die Zufälle, wenn das Gift von der Art ist, daß es die Säfte auflößt, da sie nach Pringle's und Anderer Versuchen Fäulnis befördert,

6) wirkt sie nicht das mindeste auf die festen Theile des lebendigen thierischen Leibes, nichts auf die Nerven; sie kann also auch dann, wenn die Gifte unordentliche und heftige Bewegungen verursachen, nicht einmal in so fern einige Linderung, geschweige denn gründliche Hülfe, verschaffen,

7) geht sie für sich allein, ohne in Säure aufgelößt zu sein, nicht in die Säfte über; findet sie also diese nicht

www.dlibra.wum.edu.pl

im Magen oder in den Gedärmen, so wirkt sie einmal nicht das mindeste auf die Säfte, und dann bleibt sie in den Werkzeugen der Verdauung als eine schwere Last liegen, und hindert den glüklichen Erfolg anderer Arzneien, selbst die Natur in ihren heilsamen Bemühungen.

B) phosphorsaure

1) aus dem Steinreiche, Unicornu fossile,

2) aus dem Thierreiche,

a) von Säugethieren,

α) Menschenschedel vornemlich von Missethätern,

β) Zahne verschiedener Thiere,

a) von Elephanten, Elfenbein,

b) vom Wallros,

c) vom Nilpferde,

d) vom wilden Schwein.

γ) Hörner,

a) vom Nashorn,

b) vom Einhorn,

c) vom Hirsch,

roh,

ausgekocht,

gebrannt,

d) vom Elend,

δ) Elendsklauen.

ε) Seekuhstein, Lapis Manati.

ζ) Hasensprunge, Tali leporum.

b) von Schlangen,

Viperngräten,

c) von Fischen,

www.dlibra.wum.edu.pl

α) Barſchenſteine,
β) Karpfenſteine,
γ) Hechtſteiſer,

von ihr gilt beinahe das gleiche, was von der kohlenſauren Kalkerde geſagt iſt; nur daß ſich bei ihrer Auflöſung in Säure keine oder doch nicht ſo viele Kohlenſäure entbindet.

C) ſchwefelſaure
manche Mondmilch,
Fraueneis.
kann nie keine heilſame, und, wenn ſie vollends gebrannt iſt, leicht eine giftige, auszehrende Wirkung äuſern.

α) Alaunerde.
Dahin gehören die mancherlei Arten von Bolus und Siegelerde *), die, wenn ſie eiſenſchüſſig ſind, zuweilen, jedoch nur einen ſehr eingeſchränkten Nuzen ſchaffen können, denn

1) löſt ſich ein Theil davon wirklich in Säuren auf, macht mit dieſen ein Mittelſalz, und kann alſo, wenn das Gift von dieſer Art iſt, ſeinen Wirkungen Schranken ſezen.

2) Das Mittelſalz, welches ſie mit der Säure bilden, löſt ſich ziemlich leicht in Waſſer, alſo auch in thieriſchen Säften auf, ſchränkt alſo ſeine Wirkung nicht blos auf Magen und Gedärme ein, ſondern verbreitet ſie weiter.

3) Das Mittelſalz, welches Alaunerde und Eiſenkalk mit Säure bildet, hat eine zuſammenziehende und ſtärkende

*) S. davon Guyon a. a. O. B. II. S. 444.

www.dlibra.wum.edu.pl

kende Kraft, und kann also, wenn die scharfe Säure geschwächt hat, von Nuzen sein.

4) Bei Giften, welche nicht saurer Art sind, werden auch diese Erdarten ohne Erfolg gebraucht werden.

Ganz kraftlos hingegen sind gegen die bisher bekannte Gifte, und zum Theil schon dadurch, daß man im Zutrauen auf ihre Kraft den Gebrauch besserer und zwekmäßigerer Mittel versäumt, zum Theil durch ihre innere Natur schädlich:

1) Kieselarten,
   α) Lazurstein,
   β) Karneol,
   γ) Schwalbenstein,
   δ) Edelsteine,
      a) Sapphir,
      b) Smaragd,
      c) Rubin,
      d) Hyacinth,
      e) Granat,
   ε) Bergkristall,

Denn davon nichts zu sagen, daß sie, wenn sie nicht sehr zart abgerieben sind, sehr leicht schon auf eine mechanische Weise schaden können, haben sie weder etwas flüchtiges, durch welches sie auf die Nerven, noch etwas salziges, durch welches sie auf reizbare Fasern wirken können, noch lösen sie sich in Säuren auf; sie sind also auch in solchen Fällen, wo sonst noch wohl andere Erdarten einige Hülfe versprechen, unnüz.

www.dlibra.wum.edu.pl

2) Metallische Arzneien,

α) von Spiesglanz,

a) Antimonium diaphoreticum,

b) Bezoardicum minerale,

c) — — martiale,

d) — — joviale,

e) — — lunare,

f) — — solare,

β) von Gold,

a) Goldsafran,

b) Knallgold,

γ) von Quekſilber,

a) Zinnober,

α) natürlicher,

b) künſtlicher,

1) einfacher,

2) Spiesglanzzinnober.

Sind dieſe Körper nicht ſehr genau zubereitet, und vornemlich diejenige unter ihnen, welche durch Fällung gewonnen werden, nicht ſehr ſorgfältig ausgewaſchen, ſo beſizen ſie oft eine Schärfe, vermöge welcher ſie ſelbſt leicht als Gifte wirken können; ſind ſie es aber, ſo wirken ſie zu ſchwach, die Goldkalke zu unſicher.

3) Einfache und rohe Gegengifte, aus dem Thierreiche.

α) thieriſche Auswürfe,

a) weiſſer Hundekoth, Album graecum,

b) Hünermiſt m),

---

m) Baricellus Hortul. genial. S. 250.

www.dlibra.wum.edu.pl

c) Menschenmist n),

d) Mist von mehrern Thieren o),

e) Speichel p),

β) widernatürliche Erzeugnisse in Thieren, meist in Säugthieren,

a) Knochen aus dem Herzen des Hirschs; Officula de corde cervi,

b) Gallensteine von Menschen,

c) Gallensteine vom malaccischen Igel, Piedra del porco,

d) Affensteine,

e) Steine von Pferden,

f) Steine von Hornvieh,

g) Bälle aus dem Magen des Rindviehs,

h) Gemsenkugeln Aegagrobilae, Bälle meist von den feinen Wurzelzäserchen der Bärwurz, welche die Gemsen verschlungen, und mit einem nach und nach erhärtenden thierischen Stoff überzogen haben,

i) Morgenländischer Bezoar q), ein Stein aus dem Magen der Bezoarziege, welcher, so wie er

---

n) Zakutus aus Portugal Med. Dr. Histor. B. I. S. 569.

o) Paulini heilsame Drekapotheke. Frankfurt 1714. 8. B. I. S. 316. II. S. 195

p) Ephemerid. Acad. Caesar. Natur. curios. Dec. II. Ann. 6. Obs. 62.

q) Seine Kräfte hat insbesondere K. Bauhin De lapide bezoar. Basil. 1713. 8. gerühmt, und durch scheinbare Erfahrungen zu erweisen gesucht, aber schon Fr. Slare seine und ähnlicher Steine Kraftlosigkeit dargethan Ex-

www.dlibra.wum.edu.pl

zu uns kommt, weder Geruch noch Geschmak hat, und also schon in so weit nur wenige Wirksamkeit verspricht,

k) Abendländischer Bezoar, von unterschiedenen europäischen und americanischen Arten der Ziegen und Gazellen.

4) Einfache und rohe Gegengifte aus dem Gewächsreiche.

α) Säfte,

a) morgenländischer Balsam,

b) Aloe,

c) Kampfer,

d) Myrrhe,

β) Wurzeln von

a) Astranz,

b) Bibernell,

c) Contrayerva,

d) Diptam,

e) Eberwurz,

f) Engelwurz,

g) Enzian,

h) Galgant,

i) Kostwurz,

k) Liebstökel,

l) Meisterwurz,

m) Natterwurz,

n) Ninsi,

o) Pestilenzwurz,

---

periments and observations upon oriental and other stones, which prove them to be of no use in physick. London 1715. 8.

www.dlibra.wum.edu.pl

p) Virginiſche Schlangenwurz,
q) Schwalbenwurz,
r) Wegerich,
s) Zitterer,

γ) Kräuter, von
a) Kardobenedikt,
b) Lachenknoblauch,
c) Mariendiſtel,
d) Raute,
e) Salbei,
f) Wermuth,

δ) Blumen von
a) Citronen,
b) Hollunder,
c) Geisraute,
d) Pommeranzen,
e) Ringelblumen,

ε) Spizen der Staubrege,
Safran,

ζ) Früchte,
a) Einbeeren,
b) Hollunderbeeren,
c) Lorbeeren,
d) Wacholderbeeren,

η) Fruchtſchalen,
a) Citronenſchalen,
b) Pommeranzenſchalen,

ϑ) Samen von
a) Aglei,
b) Citronen.

www.dlibra.wum.edu.pl

5) Durch Kunst zubereitete und zusammengesezte Arznei

α) aus dem Gewächsreich r),

ausser den Essenzen und Tinkturen, welche aus den meist sehr reizenden und erhizenden Gewächsstoffen (4) mit Weingeist bereitet, und dadurch noch erhizender wurden, ausser den mancherlei weitläuftiger zusammengesezten balsamischen Essenzen, Bezoartinkturen, Pestelixiren, Gesundheitselixiren, Lebenselixiren, Elixis proprietatis, die ihre Erfinder fast durchaus auch gegen Gifte rühmten, z. B.

Essentia alexipharmaca Stahlii,

— — dulcis Halensis,

— — theriacalis,

Mixtura simplex,

Spiritus theriacalis camphoratus,

Tinctura ordinaria Wedelii;

β) aus dem Thierreiche,

z. B. verbrannter Igel;

γ) aus bisher noch unbekannten Stoffen,

a) Lapis de Goa.

b) Piedra del Cobras de Capello, dessen Unzulänglichkeit gegen die giftige Kraft des Tabaksöls Redi s) durch Versuche deutlich erwiesen hat.

Eintheilung der Gifte.

Bei der Unbestimmtheit und ungleichen Ausdehnung des Begriffes, welchen auch noch heut zu Tage viele Aerzte

---

r) Sie hauptsächlich verstand man gemeinhin unter dem Namen der Bezoardischen Mitel.

s) Opuscul. Th. II. S. 10. 26.

www.dlibra.wum.edu.pl

mit dem Worte Gift verbinden, bei der Schwierigkeit, die Grenzen zwiſchen den heftig wirkenden Arzneien und den Giften genau zu beſtimmen, bei dem Dunkel, in welchem noch manche Gifte und die Würkungsart der meiſten liegt, bei der Menge von Vorurtheilen und falſchen Thatſachen, welche dieſe Lehre vormals entſtellt haben, zum Theil noch entſtellen, iſt es wohl unmöglich, eine befriedigende Eintheilung der Gifte zu entwerfen; daß einige Gifte ſchnell wirken t), andere (ſchleichend) einen langſamen Tod herbeiführen u) und unter dieſen einige vornemlich die Zeugungskraft erſtiken, iſt wohl entſchieden; ob es aber Gifte gibt (venena abſoluta), gegen die durchaus kein Gegengift gefunden werden kann, die, wenn man auch ſogleich entdekt, daß ſie beigebracht ſind, und alles anwendet, was ihrer verheerenden Kraft Einhalt thun kann, unerläslich tödten, wenn gleich einige Gifte mit unbegreiflicher Geſchwindigkeit wirken, ob es Gifte gibt, die, wenn auch der nichtswürdige Menſch, welcher ſie beibringt, keinen mittelbaren oder unmittelbaren Einfluß auf Küche, Teller, Tafel, Lebensart ſeines auserſehenen Schlachtopfers hat, auf eine beſtimmte Zeit, Tag, Woche, Jahr tödten x), möchte ich bezweifeln.

---

t) Stenzel de venenis acutis. Vitemb. 1732. 4.

u) Ephemerid. Acad. Caeſar. Nat. Curioſ. Dec. II. Ann. VIII. Obſ. 210.

x) 1) Carrarius Quaeſt. de venenis ad terminum. Venet. 1548. fol. 2) Amatus aus Portugal Curat. Cent V. cur. 91. Cent. VI, cur. 88. 3) Marcellus Donatus a. a. O. B. VI. c. 1. S. 586. 4) Stenzel de venenis terminatis et temporaneis quae Galli poudres de ſucceſſion vocant. Vitemb. 1730. 4. 5) Gupon a. a. O. B. I. S. 11.

www.dlibra.wum.edu.pl

Besser theilen sich die Gifte nach den Naturreichen ein, aus welchen sie abstammen, also in Pflanzengifte, mineralische und thierische Gifte.

Pflanzengift und ihre Eintheilung.

Das Pflanzenreich hat einen vielfachen gegenseitigen Einfluß auf das Thierreich, so wohlthätig er unter gewissen Umständen auf den Menschen ist, so höchst nachtheilig und tödlich ist er unter andern. Eben die Pflanzentheile, welche im Sonnenlicht den Luftkreis mit einem neuen Vorrath reiner Lebensluft bereichern, dusten im Schatten und bei Nacht einen tödlichen Hauch aus y), den schon die Alten im tödlichen Schatten mancher Bäume gekannt haben.

Aus allen Gewächstheilen, selbst aus den grünen strömt im Schatten und bei Nacht, aus den übrigen im Sonnenschein und Licht, so wohl als im Schatten und Dunkeln, selbst, wenn sie ganz gesund sind, ein luftförmiger

---

y) J. Ingenhouß Experiments upon vegetables discovering their great power of purifying the common air in the sunshine, and injure it in the shade and at night, to which is added a new method of examining the accurate degree of salubrity of the atmosphere. London 1779. 8. ins Teutsche übersezt mit der Aufschrift: Versuche mit Pflanzen, wodurch entdekt worden, daß sie die Kraft besizen, die atmosphärische Luft beim Sonnenschein zu reinigen, und im Schatten und des Nachts über zu verderben, nebst einer neuen Methode die Reinigkeit der Atmosphäre genau abzumessen. Leipzig 1780. 8. und Journal de physique L. XXXIV. 1789. Iuin S. 436.

www.dlibra.wum.edu.pl

Stoff aus, der nicht blos, wenn er von betäubenden oder andern giftigen oder scharfriechenden, z. B. Zwiebeln, Rettig, Meerrettig, Senf u. dgl., selbst wenn er von noch so angenehmen riechenden Blumen z) kommt, sondern auch wenn er von ganz geruchlosen Gewächsen aufsteigt, auf die Gesundheit einen schädlichen Einfluß äußert, und zwar, wenn er nicht gerade eingeathmet, oder wenn er mit einem Uebergewicht, oder auch nur mit gleich vieler gemeiner Luft eingeathmet wird a), ohne merklichen Nachtheil bleibt, aber, wenn er in der gemeinen Luft, wie z. B. in verschlossenen Zimmern, das Uebergewicht bekommt, nicht nur andere Thiere, selbst solche, die sonst in Rücksicht auf die Luft, welche sie einathmen, nicht so empfindlich sind, z. B. Insekten, Frösche, Eidechsen, Aale und andere Fische b) tödet; so erregen wohlriechende Blumen, z. B. weisse Lilien, Tuberosen, Rosen, Bohnenblüthe, Heu, Mußkatellerkraut in verschlossenen Zimmern bei Leuten von zärtlichern und beweglichern Nerven nicht blos ein Uebelbehagen und Kopfschmerzen, sondern auch wohl Zukungen und Unmachten, sogar nach Tillers c) Versicherung, nach welcher man ein Frauenzimmer, das in einem mit dem Geruche der Veilchen ganz angefüll-

---

z) Priestlei Experiments and observations relating to various branches of natural philosophy &c. 8. B. I. S. 296. ꝛc. und Abschn. XXVII. n. 1, a. 2) Marigues Iournal de physique B. XV. 1780. Mai.

a) F. Fontana a. a. O. S. 3.

b) Pearson Observations and Experiments on the tepid springs of Buxton, London 1784. 8. B. II. S. 62. 72. 77.

c) Diss. de morte subita ex nimio violarum odore oborta, Vitemb. 1762.

www.dlibra.wum.edu.pl

ten Zimmer geschlafen hatte, den andern Morgen, ohne auch nur eine andere Ursache muthmasen zu können, todt fand, und nach G. Forster's d) Zeugniß, der von einem Juden erzählt, daß er die Aengstlichkeit einen mit Safran gefüllten Sak dadurch zu sichern, daß er darauf schlief, mit dem Leben bezahlte, den Tod, so wie auch Lagsi e) in einer mit dem Dufte solcher Blumen, oder den Ausdünstungen anderer starkriechender Gewächsstoffe, z. B. Kampfer, Benzoe, stinkenden Assants angefüllten Luft mehrere Thiere sterben sah. So erregten die Blumen des Geisblatts Würgen, Mattigkeit und Lähmung der Zunge f) die Ausdünstungen der Adenanthera pavonina g) der Kamokladie mit gezahnten Blättern g*), der vielblätterichten und stinkenden Zehrwurz h), der Oleanderblumen h*), der Schlangenwurz i), der stinkenden Anagyris k), des Wallnusbaums l), des Hollunders m), des Indigs und der farnesischen Mimosa n), Un-

---

d) Göttingisches Magazin. Erster Jahrgang St. 2. S. 200.

e) Commentar. Bononiens. B. IV. S. 84. 85.

f) G. Forster a. e. a. O.

g) Rolander bei Rottböll Act. litterar. univers. Hafniens. B. I. 1778. n. VI. S. 291.

g*) Jacquin Stirp. Amer. S. 13. t. 175. f. 4.

h) 1) Linné hort. Cliffort. S. 434. 2) Kalm a. a. O. B. I. S. 59.

h*) Linné de odoribus medicamentorum, Amoenit. Academic. B. III. S. 200.

i) Linné de viribus plantar. Amoen. academ. B. I. S. 451.

k) Ebenders. a. e. a. O.

l) Ebenders. a. e. a. O.

m) Ebenders. a. e. a. O.

n) Rolander a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

machten, der Duft der lezten bei den Schwarzen Schlafsucht, die sie oft ihr ganzes Leben hindurch nicht verläßt o), der Geruch von Iatrops umbellata Kopfschmerzen, Erbrechen und Bauchfluß p), der Duft von Capsicum truncatum q) Niesen, Kopfschmerzen und Erbrechen; so starben in einer Stunde sieben Menschen auf einem Haufen Heu, den sie aufmachen wollten, und für Müdigkeit eingeschlafen waren r), drei Bootsknechte s) und zwei Männer t) plözlich bei dem Eröfnen zuvor lang verschlossen gewesener Kisten mit Gewürz. Eben so nachtheilig wirkten langverschlossene Kornböden u), und lang verschlossene Kisten mit Wäsche und anderer Geräthschaft x).

In diesen Erfahrungen ist es offenbar, das unter solchen Umständen aus Pflanzen und Gewächsstoffen aufsteigen-

---

o) Ebenders. a. e. a. O.

p) Ebenders. a. a. O. S. 293.

q) Ebenders. a. a. O. S. 287.

r) Sage a. a. O. B. I. S. 283. ein ähnliches Beispiel erzählt Fabricius von Hilden bei Heuchern a. a. O. S. 429.

s) Merklin bei Heucher a. a. O. B. I. S. 429.

t) Sam. Lebel Ephemer. Acad. Caesar. Natur. Curios. Dec. I. Ann. 3. obs. 145.

u) 1) H. Cardanus Oper. omn. Lugd, 1663. B. III. S. 26. 2) Behrens Select. diaetet. Francof. et Lipf. 1710. S. 18. 19. 3) Portius de aere morbifero S. 313. 4) Vidius Ars medicinalis. Venet. 1611. B. III. S. 4. 5) Mercurialis a. a. O. B. I. K. 13.

x) Kasp. a Seyes Elysius jucundarum quaestionum campus. Brux. 1661. fol. Quaest. 99. 2) Riolan Method. medend. B. II. K. 19.

www.dlibra.wum.edu.pl

de Stikgas, welches jene schädliche Wirksamkeit äusert y) und mit dem kohlsauren Gas die Eigenschaft gemein hat, ein brennendes Licht auszulöschen und sich in keinem Falle selbst zu entzünden.

Aber auch das kohlensaure Gas kommt im Gewächsreiche vor; es zeigt sich hauptsächlich bei Pflanzen, und vornemlich bei Pflanzensäften, welche gähren y*); auch dieses ist den Thieren z) nur dann gefährlich, wenn sie es einathmen müssen a), indem es so in den Körper gebracht, die Reizbarkeit der Fasern zerstört b); selbst wenn es mit Lebensluft vermischt ist, erleiden die Thiere, wenigstens schlagflüssige Zufälle darin c), sa sah Rozier d) ohne Spuren einer Säure in den Lungen, Kaninchen, Meerschweinchen, Vögel, Karpfen und, wiewohl langsamer, Insekten, in diesem

---

y) S. davon Eaglesfield Smith Observations and Experiments made to determine the poisonous qualities of azote. Europ. Magazin. 1797. Aug. S. 97.

y*) M. von Marum und A. Paets von Troostwyck Verhandelingen van hex bataafsch Genootschap der proefin dervindelyke wysbegeerte. te Rotterdam. D. 8. 1787. S. 1—61.

z) S. davon Bacher Inaugural experimental dissertation, being an endeavour to ascertain the morbid effects of carbonic acid gas or fixed air on leachy animals and the manner, in which they are produced Philadelph. 1795. 8.

a F. Fontana a. a. O. S. 64.

b) Ebenders. a. a. O. S. 17.

c) Ebenders. a. a. O. S. 8. 9.

d) Bei Lichtenberg Magazin für das Neueste aus der Physik ꝛc. Gotha 8. B. IV. H. 2. 1787. S. 81.

www.dlibra.wum.edu.pl

Gas, Muſchenbröck e), R. Boyle f), El. Camerer g) nicht nur kleine Vögel, ſondern auch Kröten, Schlangen und Schneken unter einer Gloke, unter welcher das Gas aus gährendem Brodteig und gährenden Weintrauben aufgefangen wurde, auch Moſcali h) ſah Fröſche von den Ausdünſtungen des gährenden Lolchs plözlich ſterben.

Auch auf Menſchen wirkt dieſes Gas ſehr nachtheilig; Leute, welche in Indien den Pfeffer zu durchſuchen hatten, wurden, wenn er ſich ſchon erhizt hatte, häufig krank i).

Auch iſt die Luft in Kellern, die keinen guten Luftwechſel haben, zu der Zeit, wenn der Wein in voller Gährung begriffen iſt, wenn man nicht durch Kalkmilch oder Seifenſiederlauge, oder durch Bewerfen des Bodens und der Wände mit Kalk, den man mit Waſſer angemacht hat, die Säure aus dem Luftkreiſe ſcheidet i*), zuweilen ſo ſehr mit dieſem Gas überladen, daß ſie k) bei Menſchen, welche ſich

---

e) *Tentamin. Experim. natural. Academ. Cimentin.* Leid. 1731. 4. S. 123.

f) Works London. fol. B. IV. 1744. S. 126.

g) Diſſ. de praeſidiis pro arte medica ab antlia pneumatica petendis. Tubing. 1691. S. 35.

h) Obſervationi ed eſperienze ſul ſangue fluido e rappreſo. Milano. 1783. S. S. 102.

i) S. Purchas a. a. O. B. I. B. 3. K. 4. § 4. S. 172.

i*) Chaptal Annal. de chimie B. XXXVI. S. 30. 31.

k) 1) Jo. Faber Annotat. ad Fr. Hernandez novam plantarum, animalium et mineralium hiſtoriam Rom. 1626. 2) Neumann Praelection chemic. herausgegeben durch Zimmermann S. 755. 756. 1164. 3) Nebel de viribus electricitatis medicis. S. 38. 4) Bernh. Rannazzini

in dieselbige wagen, Beängstigung, Betäubung, Lähmung, Schlagfluß verursacht; wirklich blieb von einer solchen Kellerluft ein groser Zergliederer in der Schweiz sieben Tage lang unbeweglich, und wurde nachher auf einer Seite gelähmt, verlor alles Gedächtnis, und führte nur noch ein Pflanzenleben fort l).

Auch haben Zakutus aus Portugal m) Rotari n), Drelincourt o), G. E. Stahl p), L. Schröck q), Pia q1), Fr. A. von Wasserberg q2) u. a. q3) Beispiele genug von der schnell tödlichen Wirksamkeit dieser aus gährenden Weinen aufsteigenden Luftart auf Menschen aufgezeichnet. So tödete auch die Luft aus einer Cisterne, in welche man den Rückstand von der Gewinnung des Zu-

---

de morbis artificum diatribe. S. 504. 511. ꝛc. 5) Muschenbröck a. a. O. 6) Donatus und Plater bei Heucher a. a. O. S. 429.

l) A. v. Haller in seiner Ausgabe von Börhaave Praelection. in prop. instit. medic. B. VI. S. 185.

m) a. a. O. obs. I.

n) Giornale de Litterati d' Italia. Venez. B. XXIX. 1718. S. 434.

o) de humani foetus membranis hypomnemata. Hag. Com. 1717. Oper. omn. S. 460.

p) Fundament. chem. B. III. S. 91.

q) Ephemer. Acad. Caesar. Nat. Curios. Dec. III. ann. II. obs. XLV. S. 56.

q1) a. a. O. B. IV.

q2) Medicinisch-physische Commentarien. Wien und Leipzig. 8. Erster Band. 1783.

q3) Histoire de l'academie des sciences à Paris pour V. ann. 1773.

www.dlibra.wum.edu.pl

kers geworfen und einige Tage lang aufbewahrt hatte, zwei Schwarze, welche sie reinigen sollten, plözlich r).

Auch die Fäulung von Gewächsstoffen füllt den Luftkreis, in welchem sie vorgeht, mit Gasarten an, welche ihn der Gesundheit sehr nachtheilig auch wohl dem Leben gefährlich machen, und meist ein Gemenge aus Stikgas, Kohlensaure und entzündbarem Gas sind. So erregten z. B. einst die Ausdünstungen von faulendem Kohl zu Delft, eine bösartige Seuche s), so die Ausdünstungen des von Schlangenkraut abgezogenen Wassers, als ein damit angefülltes Glas in Stücke zerbrach, Zukungen t); so geben die Ausflüsse von Lein und Hanf, wenn sie geröthet werden, zu mancherlei umgehenden Krankheiten Anlaß u), und werden, wenn diese Arbeit in stehenden Wassern vorgenommen wird, oft sogar Fischen gefährlich; so kostete die Bereitung des Indigs die in Surinam angesiedelte Holländer so viele Sklaven, welche darüber hin starben, daß sie genöthigt waren, dieses Gewerb aufzugeben x); so fielen bei dem Zersägen eines alten faulen Balkens ein Mann und eine Frau todt zu Boden y), so

---

r) H. Hughes History of Barbados. Lond. 1750

s) Defay la nature considerée dans plusieurs de ses operations. Paris 1783. 8. S. 25.

t) Phil. Hochstetter rarior. observat. Aug. Vindel. 1674. Dec. V.

u) 1) G. Zimmermann Erfahrungen Th. II. S. 219. 2) Dana, Bonvoisin, und Fontana Memoir. de l'Academie des sciences à Turin, B. V. pour les ann. 1790. 1791. S. 32—39.

x) Quatremer d'Isjonval Analyse et examen chymique de l'indigo. á Paris 1777. 4. S. 10.

y) L. Schröck a. a. O. Arn. IV. Obs. 90.

www.dlibra.wum.edu.pl

sah Timäus von Guldenklee von altem stinkenden Papier, das man stark bewegt hatte, Schlagfluß und Tod erfolgen z).

Eben so gefährlich wirken die luftartige Wesen, welche, wenn diese durch äusere Anwendung von Feuer erhizt, noch mehr wenn sie bis zum Glühen und Brennen erhizt werden, auch von den unschädlichsten Gewächstheilen ausströmen, auf den Luftkreis; davon nicht zu erwähnen, daß dergleichen erhizte Körper diesem seinen heilsamsten Theil, die Lebensluft, entziehen, so daß es so weit gefehlt ist zu glauben, daß brennende Holzstöße die Luft einer Gegend, oder Rauchwerke die Luft eines Zimmers verbessern, daß sie vielmehr diese Luft, vornemlich für Kranke, noch schädlicher machen a); diese Ausflüsse, welche aus dergleichen erhizten Gewächsstoffen austretten, bestehen gröstentheils b) aus entzündbarem Gas, das zwar, wenn es auf

z) Bei Heucher a. c. a. O.

a) 1) Achard Sammlung physikalischer und chemischer Abhandlungen Berlin. 8. Erster Band 1784. S. 296—318. 2) Cornette Memoir. de la Societé de medicine à Paris pour ann. 1786. S. 320—326.

b) 1) Scheele Abhandlung von der Luft und dem Feuer nebst einem Vorbericht von T. Bergmann. Upsala und Leipzig 1777. 8. S. 147. 2) Corvinus diss. sistens historiam aëris factitii Argentor. 1776. 4. 3) J. v. Ingenhouß Anfangsgründe der Elektricität von N. C. Molitor. Wien 1781. 8. S. 126. 4) Al. Volta lettera sul l'aria infiammabile delle paludi. Milano 1777. 8. S. 94. 5) Minkelers Memoire sur l'air inflammable de differentes substances. Louvain 1784. 8. 6) Senobier recherches analytiques sur la nature de l'air inflammable. à Genev. 1784. 8. 7) Berthollet Memoir. de l'Acad. royale des sciences à Paris pour l'ann. 1785. S. 331. &c.

www.dlibra.wum.edu.pl

auf andern Wegen in den thierischen Leib kommt, unschädlich ist, selbst wenn es mit vieler gemeiner Luft vermengt eingeathmet wird, ohne merkliche nachtheilige Wirksamkeit ist c), wenn es aber allein, oder mit weniger gemeiner oder Lebensluft vermengt, und nur etwas anhaltend geathmet wird, Thieren aller Art, Schneken, Fliegen, Bienen, Fischen, Schlangen, Mausen, Vögeln d), Fröschen e), tödlich ist. So fand Desaguliers f) die Luft, in welcher Weingeist gebrannt hatte, gefährlich; so Chr. M. Adolphi g) und ein Anderer h) den Dampf von brennendem Holze, noch ein Anderer den Dampf von brennendem Stroh i); Mosse der k) bei zween starken Tagelöhnern und le Maire l) den Dampf von brennendem Oel, Wachs und Terpentin,

---

c) F. Fontana a. a. O. S. 3.

d) 1) Muschenbrök a. a. O. S. 123. 2) Boyle Experim. nov. physico-mechanic. Cent. II. S. 100 — 102. 105. 108. 110. und Works B. IV. S. 120. 3) Prieſtley Experim. and obſervations on different kinds of air. London. 8. B. I. 1774. 2. Sect 3. 5. 4) Bucquet Memoir. de la Societé de medecine à Paris. B. 1.

e) Charles bei Sage und dieſer ſelbſt a. a. O. B. I. S. 48. 49.

f) Courſe of experimental Philoſophy. London 1744. B. II. S. 389.

g) De conclavibus aegrotor. Lipſ. 1727.

h) Recueil des memoires de l'Academie de Beziers 1730. Dec.

i) Fränkiſche Sammlungen von Anmerkungen. Nürnberg 8. B. II. S. 144. 145.

k) Diſſ. de deliquio animi. Argentor. 1692. 4.

l) Bei Pia Detail des ſuccès de l'établiſſement de la ville de Paris, en faveur des noyés. Suppl. III. 1775.

www.dlibra.wum.edu.pl

beinahe tödlich, bedarf es unter solchen Umständen noch eines besondern Giftes, um den Dampf einer brennenden Fakel tödlich zu machen, der z. B. Pabst Clemens VII. getödtet haben m) soll?

Schädlicher als alle diese Arten verdorbener Luft, und weit häufiger tödlich ist der sogenannte Kohlendampf, oder gemeine Luft, in welcher Kohlen geglüht haben, die ihr den grösern Theil ihrer Lebensluft entziehen, und sie dagegen mit Kohlensäure oder fixer Luft überladen m*).

Schon in ältern Zeiten war er in übelm Rufe, mehrere Geschichtschreiber n) suchen darinn die Ursache von dem Tode Jovians, selbst die Weiber des von Hannibal belagerten Sagunts sollen sich, um dem Sieger nicht in die Hände zu fallen, absichtlich damit um's Leben gebracht haben o); einen von den Holländern, welche auf der merkwürdigen Reise in Nova Zembla überwinterten, tödete der Kohlendampf, durch welche er sich gegen die fürchterlichste

---

m) Paré bei Heucher a. e. a. O.

m*) 1) Scheele a. a. O. S. 91. 2) Priestley Observations on different kinds of air. Abschn. VIII. und Experiments and observations on different kinds of air. B. I. Abschn. 2. S. 177. 3) Senebier Annales de chimie B. IV. 1790, S. 26. 4) Lavoisier Memoir. de l'Academ. des scienc. à Paris pour l ann. 1781. S. 448—467.

n) 1) Hieronimus Epistol. ad Heliodor. 2) Vellejus Paterulus L. 2. S. 53. 3) Zonarias in Foviano. S. 24. 4) Sozomenos L. VI. c. 6. 5) Orosius L. VII. c. 31. 6) Ammianus Marcellinus a. a. O. B. XXV. c. 10. S. 342.

o) Diodor ἐκλογ. B. XXIV. S. 884.

www.dlibra.wum.edu.pl

Kälte zu schüzen suchte p) und so stellen Amatus aus Portugal q), Baco Verulam r), Marcellus Donatus s), Wilh. Fabricius von Hilden t), Joh. Faber u), Hier. Mercurialis x), Nik. Fontanus y), K. Bartholin z), Domin. Panawolus a), Fr Hoffmann b), Hagedorn c), Wepfer d), Hacksber e), Desaguliers f), Manitius g), d'Hurmann h), Pör-

---

p) Baco Verulam Historia naturae X. Works. B. III. S. 194.

q) Curat. medicinal. Venet. 1557. 8. Cent. VII. cur. 33.

r) a. e. a. O. S. 193.

s) De histor. medic. mirabil. Francof. 1613. S. 170.

t) Observat. et epistol. Francof. 1646. fol. und de gangraena et sphacelo. Oper. omn. Francof. 1646. S. 787.

u) a. a. O.

x) a. a. O. B I. K. 13.

y) Observation. rarior. analect. Amstelod. 1641. c. 22. S. 67.

z) Exercitation. miscellan. Leid. 1675. S. 38.

a) Anologista, Pentecost. Hanov. 1654. 4.

b) 1) Bedenken von dem tödlichen Dampfe der Holzkohlen. Halle 1716. 8. 2) Medicin. consultator. P. V. Dec. 3. cas. IV.

c) Observation. et historiar. medico-pract. rarior. Centur. 3. Rudolst. 1698. 8.

d) Observation. medico-practic. de affectibus capitis internis et externis. Scaphus. 1727. 4.

e) Philosophical Transactions, for the year. 1710. n. 328. S. 199. &c.

f) a. a. O. S 389. 558.

g) De idiosyncrasia ex diversa solidorum corporis humani irritabilitate optime dijudicanda. Leid. 1749. S. 25.

h) Memoires sur les funestes effets du charbon allumé, Paris et Nancy 1776.

www.dlibra.wum.edu.pl

tal i), Meglin ii), Martin i2), Banau i3), Troja i4), Gardane i5), Pia k), Pyl l) und andere m) genug Beispiele von Menschen auf, die vom Kohlendampfe in verschlossenen Zimmern, nicht nur von Kohlpfannen, Feuerstübchen oder offenen Kaminen, sondern auch aus Oefen, welche Risse hatten, oder in ihren Theilen nicht dicht genug zusammen gefügt waren, grösstentheils wirklich um's Leben, zum Theil aber dem Tode so nahe gekommen sind, daß sie

---

i) 1) Iournal de physique &c. B. IV. 1774. Oct. 2) Memoir. de l'Academie des scienc. à Paris pour l'ann. 1775. 3) Bericht über die mephitischen Dämpfe, und vorzüglich über die Wirkung des Kohlendampfs auf den menschlichen Körper, nebst einer kurzen Nachricht von den wirksamsten Mitteln, Erstikte wieder zum Leben zu bringen, nach der fünften französischen Ausgabe übersezt, nebst einem Anhang von Rettung ertrunkener Personen und todt gebohren scheinender Körper. Frankfurt 1778.

ii) Iournal de medicine, chirurg. pharmacie. B. XLIII. 1775, Mars.

i2) Ebendas. B. LXIX. 1786. Dec.

i3) 1) Ebendas. B. XLIII. Ianv. 2) Gazette de santé par I. I. Gardane, à Paris 1775. 3) Iournal de physique B. IV. 1774. Dec.

i4) Iournal de physique. B. XI. 1778. Fevr.

i5) Ebendas. Mars.

k) a. a. O. B. IV. und VI.

l) Aufsäze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Berlin. 8. Erste Sammlung 1783. n. 1. S. 1—28.

m) Z. B. Sammlung von Natur- Kunst- und Litteraturgeschichten von einigen Breslauischen Medicis. 1719. Mon. Dec. 2) Gazette de santé par une societé de Medecins. à Paris 1776.

www.dlibra.wum.edu.pl

nur mit Mühe und Anstrengung gerettet werden konnten. Hier nur einige derselben, aus welchen zugleich der Gang seiner schröklichen Wirksamkeit und die Veränderungen, die er im Leibe anrichtet, erhellen.

Erste Geschichte.

In der Christnacht 1715 giengen einige abergläubische Leute zu Jena in ein Weinbergshäuschen, um daselbst zur Zeit der Mitternacht durch Beschwörungen der Geister einen Schaz zu heben: die strenge Kälte dieser Nacht nöthigte sie, noch ehe sie ihr eigentliches Geschäft vornehmen konnten, Fensterläden und Thüren vest zuzuschliesen, und in dem Häuschen ein Kohlenfeuer zu unterhalten. Einem von ihnen wurde es zum dritten Male so übel, daß er die Beschwörung nicht vollbringen konnte, und die beiden andern starben eines schnellen Todes: den andern Tag fand man, als man nachsuchte, den einen zwar noch am Leben aber ohne Bewegung zunächst an der Thüre, und brachte ihn nachher wieder zurecht; die beiden übrigen aber blieben tod. Zu diesen zwei Leichen stellte man Wächter, welche des Nachts wieder, der Kälte wegen, ein Kohlenfeuer machten, und, einen einigen ausgenommen, der kaum noch gerettet wurde, auch starben. In den beiden ersten Leichen fand man nichts widernatürliches, als äusserlich braune und blaue Fleken, innerlich aber die Gefäße der Hirnhaut von Blut ganz strozend.

Zweite Geschichte.

Vier Soldaten wurden zu Magdeburg bei einem Schneider in eine Stube einquartiert; sie hatten den Tag

www.dlibra.wum.edu.pl

über bei kaltem und Regenwetter exercirt, und zündeten daher Abends in einem Windofen, der mitten im Zimmer stand, Kohlenfeuer an, um bei dieser Wärme ihre Kleider zu troknen. Sie legten sich darauf ganz ermüdet zu Bette; den andern Morgen fand man sie alle vier tod darinn; an ihren Leichen war nicht die mindeste Spur von empfangenem Gifte, oder einer andern Ursache des Todes wahrzunehmen.

Dritte Geschichte.

Ein Franziskaner bezog nach einer ermüdenden Reise, auf welcher ihn Frost und ungestümme Witterung verfolgt hatten, ein niedriges, feuchtes und neu gebautes Zimmer; die zwei ersten Nächte schlief er ganz ruhig; die dritte Nacht aber sezte er wegen der Kälte und Feuchtigkeit ein Geschirr mit glühenden Kohlen darein, und legte sich, als diese grösstentheils ausgeglimmt hatten, zu Bette: den andern Morgen suchte man ihn, weil er nicht zur gewöhnlichen Zeit in die Kirche kam, in seinem Zimmer; als er aber niemand hören wollte, brach man die Thüre mit Gewalt auf, und da fand man ihn auf der rechten Seite liegend, mit dem Gesichte von der Wand abgekehrt, gewaltig röchelnd, und mit einem weissen Schaum vor dem Munde, der bereits in etwas eingetroknet war; man rief ihm, man riß ihm die Augen auf, allein kein Zeichen von Empfindung oder Bewegung. Man gab ihm Mithridat ein; darauf brach er vielen zähen Schleim hinweg, der Aderschlag war hart und zitternd: das Gesicht und die Adern am Halse aufgelaufen und ganz roth, die Augen hervorstehend, trüb und dik. Noch zeigte sich weder Empfindung noch Bewegung; er schluchzte, röchelte, und holte

www.dlibra.wum.edu.pl

sehr ängstlich Odem. Man brachte ihn nachher in eine warme Stube, lies ihm etliche Mal zur Ader, gab ihm erquikende Arzneimittel ein, und Klistire; so wurde er nach und nach wieder gänzlich gesund.

Den meisten dieser Gefahren entgeht man freilich, wenn man die Gelegenheiten vermeidet, bei welchen sich solche luftförmige Gifte zeigen, aber manchen stürzt Unwissenheit, oder Unachtsamkeit und Tollkühnheit in dieselbige; andern macht es ihr Beruf zur Pflicht, oder ihr Gewerb unvermeidlich, sich ihnen zu nähern; diesen insbesondere ist es wichtig, die Merkmale zu wissen, an welchen man diese luftförmige Gifte erkennen kann, und ihnen sowohl als den Aerzten muß es darum zu thun sein, die Mittel zu wissen, wodurch man sich gegen ihren gefährlichen Einfluß schüzen, und Verunglükte retten und wieder herstellen kann.

Allgemeine Merkmale giftiger Luftarten aus dem Gewächsreiche.

Eine Luft in Zimmern, Kellern, auch wohl an andern vom Winde nicht gehörig bestrichenen Orten erregt den Argwohn einer giftigen Beschaffenheit gegen sich n), wenn sie o)

---

n) 1) Bassiani Carminati de animalium ex mephitibus et noxiis halitibus interitu ejusque propioribus causis, Lodi. L. I—III. 1777. 2) Bucquet Memoire sur la maniere, dont les animaux sont affectés par differens fluides aëriformes méphitiques, et sur les moyens, de remedier aux effets de ces fluides, précédé d'une histoire abrégée des différens fluides aëriformes ou gas. Paris 1778. 8. 3) J. Fr. Gmelin Progr. de aeris vitiosi exploratione. Goetting. 1794. 4.

o) Es ist wohl kaum nöthig, zu erinnern, daß hier nur von

www.dlibra.wum.edu.pl

1) Geruch, noch eher, wenn sie unangenehmen Geruch hat.
2) Wenn sie, auch in der Nähe, trüb erscheint.
3) Wenn eine brennende Kerze oder andere brennende Körper, welche man darein bringt, viel matter, als in gemeiner Luft brennen, und bald oder gar gleich Anfangs verlöschen, oder die Luft, welche man prüfen will, so wie die Kerze daran kommt, sich entzündet.
4) Wenn die zu prüfende Luft bei der Vermischung mit Salpetergas in einer Glasröhre nur wenig oder gar nicht im Umfange abnimmt, im lezten Falle auch keine rothgelbe Dämpfe gibt.
5) Wenn sie auch von Phosphor, den man unter einer Glasglokе oder dergleichen Röhre brennend darein bringt, im Umfange nicht vermindert wird.
6) Wenn sie mit entzündbarem Gas vermengt unter einem sonst luftleeren und mit Wasser oder Quekſilber gesperrten Gefässe durch einen starken elektrischen Funken sich nicht entzünden läßt, oder wenn er sie auch entzündet, gröstentheils in ihrer luftförmigen Gestalt zurükbleibt.
7) Wenn Thiere, vornemlich Säugthiere und Vögel, in einer solchen Luft, in welcher man sie einige Zeit erhält, Unbehaglichkeit zu erkennen geben, auch wohl, wenn sie länger darinn bleiben, Zukungen, Lähmungen

---

denen Arten des Verderbens der Luft die Rede ist, an welchen Pflanzen und ihre Theile oder Säfte ihren Antheil haben, und nur von denen Merkmalen, welche auch ein mit den genauern und vollkommenern die Stufe dieses Verderbens bestimmenden Werkzeugen nicht versehener Arzt oder Naturforscher aufzusuchen im Stande ist.

www.dlibra.wum.edu.pl

einzelner Theile und andere gewaltsamere Zufälle zu erleiden haben, oder gar ihr Leben aufgeben.

8) Wenn in einer solchen Luft, ohne daß sich diese Erscheinungen aus andern Ursachen erklären lassen, Menschen, insbesondere empfindlichere Menschen, Beklemmung, Neigung zum Schlafe, Schwindel, Uebelkeiten fühlen, oder gar in Zukungen und Unmachten fallen.

Wenn also z. B. der Arzt bei einem Scheintoden, dem er zu Hülfe kommen soll, keine andere innere oder äussere Ursache seines Zustandes enträthseln kann, wenn er aus den Umständen, dem Gewerbe des Verunglükten, der Erzählung seiner Freunde zu vermuthen Ursache hat, daß ihm eine auf eine oder die andere oben erwähnte Weise verdorbene Luft diesen Unfall zugezogen hat, wenn er Gelegenheit hat, diese Luft entweder an Ort und Stelle zu untersuchen, oder wenigstens etwas davon zur Prüfung erhält, so wird es ihm nicht schwer halten, seiner Sache gewis zu werden, und seinem Feinde ins Gesicht zu sehen. Aber auch der Nichtarzt, dem sein Leben lieb ist, und dem Geschäfte oder Zerstreuungen doch oft eine solche Gefahr zuziehen können, wird es sich zur Warnung dienen lassen, eine Luft, an welcher er die oben aufgestellten Merkmale, wenigstens mehrere derselbigen, gewahr wird, eine Luft, welche durch eine oder die andere obengedachten Veranlassungen vergiftet sein könnte, zu vermeiden p).

---

p) Linné Respiratio diaetetica. Amoenit. academ. B. VIII. S. 151 &c.

www.dlibra.wum.edu.pl

Verwahrungsmittel gegen verdorbene Luft aus Pflanzen.

Aber wenn Gewinnsucht lokt, Beruf nöthigt, Menschenliebe aufferdert, solche Gefahren nicht zu achten, aus brennenden Häusern Menschen und Güter zu retten, wenn Flamme und Rauch über ihm zusammen schlagen, und was die eine verschont, der andere erschwert, oft unmöglich macht, sich in niedrige, enge, schlecht gelüftete mit gährendem Wein angefüllte Keller zu begeben, andere, an welchen diese Kellerluft oder Kohlendampf seine fürchterliche Wirksamkeit schon zu äusern angefangen haben, dem Tode zu entreissen, der sie bereits zu erwarten scheint, wer es nicht in seiner Gewalt hat, die Sitte, grüne Pflanzen in einiger Menge bei Nacht in verschlossenen, vollends in bewohnten oder gar in Schlafzimmern, die noch schlimmere Gewohnheit in solchen Zimmern glühende Kohlen zu halten, zu verbannen, alle Stellen hoch und nach Verhältniß des darinn liegenden Weins geräumig und luftig genug erbauen, mit den nöthigen Luft- und Lichtlöchern versehen, und allenfalls noch nach Baumé's q) Vorschlag eine mit einem weiten Trichter in der äusern Luft sich endigende Röhre in den Keller leiten zu lassen r), der wird sich folgende Geseze zu machen haben:

---

q) Iournal de physique 1774. Ianv.

r) Mehrere Vorschläge, auch solche Luft zu verbessern, haben Karl Jak. Ludw. Coquerrau und Nik. Chamboe an aer corruptus expurgari possit. Paris 1769 und 1778. und Joh. Karl Gichter progr. de variis aërem corruptum emendandi mediis. Lipſ. 1781. angegeben.

www.dlibra.wum.edu.pl

1) Von Zimmern, Gewölben, Kellern, deren Luftkreis auf eine oder die andere verdächtig ist, die Thüren mehrere Stunden, auch wohl halbe Tage lang vorher zu öfnen und offen zu erhalten.

2) Wenn diese eine Zeit lang offen gestanden haben, auch alle Fenster und andere Seitenöfnungen aufzuschließen, und, wenigstens einen halben Tag, offen stehen zu lassen, ehe er sich hinein begibt; wo ihm aber die Noth nicht erlaubt, so lange zu warten, bis genug frische, gesunde Luft eingedrungen, und verdorbene ausgetreten ist,

3) mit der Fürsicht, daß ihn ein Anderer, der sorgfältig darauf acht gibt, auf das erste Zeichen, das er gibt, wenn ihn Uebelkeit, Betäubung, Schwindel, Herzklopfen oder Beklemmung anwandelt, durch ein um den Leib gebundenes Seil zurükziehen kann, wenn ihn denn die Kräfte so weit verlassen haben sollten, daß er sich nicht selbst zurük zu ziehen vermag, oder ihn Dreistigkeit oder Eifer für Pflicht verleitet haben sollte, auf die erste Anwendung dieser Zufälle nicht zu achten.

4) Ein Schnupftuch mit Salmiakgeist angefeuchtet, mit sich nimmt, und dieses von Zeit zu Zeit vor Mund und Nase hält.

5) Die von Rozier s) empfohlene Geräthschaft: oder da doch Mangel an Lebensluft oder wenigstens an hinreichender Menge derselben alle diese Gefahren herbei-

---

s) Bei Lichtenberg Magazin für das Neueste aus der Physik ꝛc. B. IV. St. 2. S. 87.

www.dlibra.wum.edu.pl

führt, eine mit einem Hahnen zu verschließende Blase oder Flasche mit Lebensluft, oder die auch damit oder mit gemeiner Luft gefüllte von H. v. Humboldt t) vorgeschlagene Rettungsflasche an den Ort der Gefahr mit sich nimmt, und, so oft die Gefahr näher rükt, frische Luft aus derselben einathmet.

Rettungsmittel gegen verdorbene Luft von Gewächsstoffen u).

1) Muß der Verunglükte so schnell als möglich in frische reine Luft gebracht werden; wenn er noch nicht lange

---

t) 1) Bei H. v. Crell chemische Annalen 1796. B. II. S. 204—210. 2) Bei H. v. Moll Jahrbücher der Berg- und Hüttenkunde. Salzburg. 8. B. II. 1798. S. 225—233.

u) 1) J. C. Fr. Scherff Anzeige der Rettungsmittel bei Leblosen oder in plözliche Lebensgefahr Gerathenen. Altona 1780. 8. 2) J. Fuller new Hints relative to the Recovery of Persons drowned and apparently dead with a View to render that Practice more generally successfull. London 1784. 8. 3) Ed. Goodwyn connexion de la vie avec la respiration ou recherches experimentales sur les effets, que produisent sur les animaux vivans, la submersion, la strangulation et les diverses especes de gas nuisibles, avec une definition precise du genre de maladie, qui en resulte, sa difference, et la mort, et les meilleurs moyens d'y remedier, traduit de l'anglois par N. Halle. à Paris a. 4. 8. 4) Fothergill Untersuchung über die Hemmung der Lebenskraft bei Ertrunkenen, Erstikten ꝛc. aus dem engl. von G. Fr. Michaelis. Leipzig 1796. 5) Ant. Portal instruction sur les traitemens des asphixies

in der verdorbenen gewesen ist, wird er zuweilen schon dadurch gerettet.

2) Muß er bei aufrechter Stellung in vollen Güssen mit kaltem Wasser besprizt x), oder nach russischer Sitte y) halbnakend in Schnee gelegt, und der Leib mit Schnee und kaltem Wasser gerieben werden.

3) Muß ihm, indem man ihm die Nase zudrükt, und selbst die Brust abwechselnd drükt und nachläßt, vermittelst eines Handblasebalgs, dessen Röhre mit nasser Leinwand umwunden, ihm bei vest angedrükten Lippen in den Mund, oder wenn dieser vest geschlossen sein sollte, in die Nase gestekt wird, ganz sachte Luft in die Lungen geblasen werden; erhebt sich während dieser Arbeit die Brust und zischt die Luft zurük, so ist

---

par le mephitisme, des noyés, des personnes mordues par des animaux enragés, des enfans, qui paroissent morts en naissant, des personnes, qui sont empoisonnées, et de celles, qui sont asphixiés par le froid à Paris, an. 4. 12.

6) Chr. A. Struve a) Uebersicht der Rettungsmittel in plözlichen Lebensgefahren, zum Gebrauche für Wundärzte. Dritte Aufl. Hannover 1798. 8. b) Noth- und Hülfstafel von tollem Hundsbiß, von Giften, vom Verschluken, vom Erstiken. Hannover 5te Aufl. 1798. c) Noth- und Hülfstafel für Ertrunkene, Erfrorne, Erhänkte, nebst den Hülfsmitteln für todtscheinende neugebohrne Kinder. Hannov. Achte Aufl. 1798.

x) Kellner bei Pyl Magazin für gerichtliche Arzneik. und medicinische Polizei B. II. St. 4. S. 810—813.

y) M. Guthrin Philosoph. Transact. B. LXIX. for the Year 1779. P. II. n. 22. S. 325.

www.dlibra.wum.edu.pl

es ein gutes Anzeichen, und dann hält man damit an, bis man ein Klopfen des Herzens und der Adern wahrnimmt, oder den Kranken athmen sieht z).

4) Noch besser, wenn man sie sogleich bei der Hand hat, kann ihm Lebensluft eingeblasen, und dabei die von Gorcy a) zu Neubreysach vorgeschlagene Geräthschaft sehr vortheilhaft gebraucht werden.

5) Man läßt dem Verunglükten, nachdem man den etwa im Mastdarme befindlichen erhärteten Unrath hinweggeräumt b), allenfalls auch noch nachher den Mastdarm mit einem Absud von Tabak ausgespült hat, auch durch einen Blasebalg Luft, oder durch eine eigentlich dazu eingerichtete c) Maschiene Rauch von Tabak ab-

---

z) Dieses Mittel hat auch Pia a. a. O. B. I—VI. in vielen ähnlichen Fällen sehr wirksam gefunden.

a) 1) Iournal de medecine, chirurgie, pharmacie 1799. Iuin; 2) Iournal de physique 1790. Fevr. S. 118.

b) Esmalle bei Pia a. a. O. Th. V. 1776. 2) Vogel bei Baldinger neues Magazin für Aerzte B. IV. St. 3. S. 198

c) 1) H. D. Gaub Adversar. var. argumenti Leid. 4. L. I. 1771. S. 45—55. Pl. I. Abl. 1. 2. 3. 2) F. G. Zimmermann bei Baldinger neues Magazin für Aerzte B. I. St. I. 1778. 2) Schäffer Gebrauch und Nuzen des Tabaksrauchsklistirs, mit einer Abbildung. 4) Von Haen Rat. medend. B. I. S. 113. 5) Feller diss. de enematibus atque nova fumum tabaci inferendi methodo. Lipsi. 1781. c. fig. 6) Gordane sur les asphyxies avec la description d'une nouvelle boëte fumigatoire portative avec fig. 7) Pia a. a. O. B. IV. S. 279 ꝛc. Pl. 1. 2. 8) Einige ungenannte Aerzte zu Bern, Unterricht wie man

gesezt, und zu wiederholtenmalen in den After blasen; wo diese nicht bei der Hand ist, oder nicht bald genug herbeigeschaft werden kann, kann man sich darzu auch einer thönenern Tabakspfeife bedienen; man schmiert das Ende des Stiels etwa einen Daumen lang, mit Oehl ein, stekt es so tief nach dem Rüken hin in den Mastdarm, füllt den Kopf mit Rauchtabak, den man anstekt, bindet ein Schnupftuch darüber, und läßt ihn einen andern in den Mund nehmen und den Rauch einblasen.

6) Man läßt ihn, am besten in einer sizenden Stellung auf dem Bette oder im Lehnstuhle, Glieder, Rükgrad, und, wenn er ganz entkleidet werden kann, den ganzen Leib mit rauchen wollenen Tüchern stark reiben, und dieses Reiben auch während dem Gebrauch der übrigen Rettungsmittel fortsezen.

7) Man hält ihm flüchtiges Laugensalz oder Salmiakgeist unter die Nase, schmiert ihm etwas davon unter die Nase, stekt ihm Röllchen Papier damit befeuchtet, in die Nase [d], oder gibt ihm auch einige Tropfen davon mit vielem Wasser verdünnt in den Mund [e]; in Ermanglung dessen kann man auch wohl frische Zwiebel oder geriebenen Meerrettig unter die Nase halten, Tabaksrauch, oder einen andern scharfen unschädlichen Rauch, oder mit dem Federkiele Schnupftabak oder

---

die aus dem Wasser Gezogene oder Erstikte behandeln soll. Bern 1776. mit Abb.

d) Sage a. a. O. B. I. S. 282.

e) 1) D. Herrmann a. a. O. 2) Pia a. a. O. B. IV.

www.dlibra.wum.edu.pl

gestoßenen Pfeffer in die Nase blasen, auch wohl mit dem Bart einer Feder in der Nase kizeln.

8) Sezt ihm auf die Fußsohlen, auf den Nabel, zu beiden Seiten der Brust, oder auch auf andere Theile und Gegenden des Leibes Schröpfköpfe, oder in deren Ermanglung Biergläser, welche aber stark ziehen, und eine starke Flamme haben müssen, oder laßt grose Tropfen von brennendem Siegellak darauf fallen.

9) Man gibt dem Kranken durch die Brust mehr nach der linken Seite hin, vermittelst einer darzu eingerichteten Geräthschaft den elektrischen Funken, den man, wenn schwächere Funken nicht wirken, immer mehr verstärkt.

10) Man sucht den Kranken durch eine in Oel getauchte Feder, womit man ihm den Kopf des Schlundes kützelt, oder durch ein flüssiges Brechmittel, welches man ihm, damit es desto gewisser in den Magen kommt, durch eine krumme Röhre eingießt, zum Erbrechen zu bringen, und durch Streichen des Unterleibs von unten nach oben diese Wirkung zu befördern.

11) Offenbaren sich während dem Gebrauche dieser Mittel Zeichen des Lebens, so sprengt man dem Kranken kaltes Wasser ins Gesicht.

12) Nun erst f) läßt man ihm am Arme mit der Lanzette zur Ader, und macht eine weite Oefnung; kommt kein

---

f) Johnson und Cullen bei Pia a. a. O. B. V. auch Haller. Götting. gelehrte Anzeig. 1780. S. 349.

www.dlibra.wum.edu.pl

kein Blut, so hat man nicht nöthig, die Wunde zu verbinden, aber doch Acht zu geben, daß sich der Kranke nicht verblute, oder über ein Pfund Blut verliere; aber man kann die Aderlässe wiederholen, auch wohl, nachdem man die Stelle wohl gerieben hat, jedoch mit der gleichen Fürsicht, die Drossel öfnen g).

13) Man legt ihm nun Bäuschgen oder warme Brodrinde stark mit Weingeist angefeuchtet, auf die Gegend des Nabels oder Herzgrübchens.

14) Man gibt ihm wohl auch jezt zum Erbrechen fünf bis sechs Grane Brechweinstein in einem Thee von Chamillenblumen, in stark gesalzenem Wasser oder in Seifenwasser, auch wohl in warmem Harne.

15) Ist der Kranke nun so weit hergestellt, so sucht man ihm durch Wasser mit Wein, durch Klistiere aus Wasser und Wein mit etwas Salz durch warme Brodrinde mit Essig oder Wein befeuchtet und vor die Nase gehalten, durch Hollunderblumen- oder Melissenthee, warmes Bier oder Wein, recht saure Limonade mit etwas Wein, überhaupt aber durch dienliche Nahrungsmittel vollends wieder zu Kräften zu helfen.

Sollte wohl das Gift, womit die Türken ihre wohlriechende Salben, Wachsstöke, Schnupftücher h) und Sättel i), das Gift, womit andere durch so lange wieder-

---

g) Pia a. a. O. und bei ihm Cullen ebendas.

h) Cardanus a. a. O.

i) Scaliger exercitationes ad subtilitates Cardani. Exoteric. exercit. L. XV. Lutet. 1557. S. 214.

www.dlibra.wum.edu.pl

holtes Aufgieſen auf Blumen, bis dieſe ſich öfneten k), Blumen vergiftet haben ſollen l), das Gift der Blumen, womit Kleopatra in einem Kranze auf ſeinem Haupte Antonius vergiftet haben ſoll m), das Gift der Nelke, deren Matthiol n) gedenkt, das Gift der Handſchuhe, deren Geruch Kaiſer Otto III. o) und Heinrich IV. nebſt einem Herzog von Savoien umgebracht hat p), das Gift der Briefe, das dem Prinzen Eugen von Savoien q) und dem Pabſt Alexander VI. q1) beſtimmt war, das Gift an der Silbermünze, welche eine Mutter ihrem Kinde zum Geſchenke machte q2), ein ſolches feines flüchtiges allgemeines Pflanzengift geweſen ſein, oder gehören ſie vielleicht eher zu den beſondern Pflanzengiften?

Beſondere Pflanzengifte.

Auch von dieſen haben mehrere Schriftſteller gehandelt; einige von allen insgeſamt, andere von den giftigen Gewächſen gewiſſer Länder und Gegenden und noch andere

k) Renaldin bei Heucher a. a. O. I. S. 431.

l) Guyon a. a. O. S. 79. 80.

m) Plinius hiſt. mund. B. XXI. K. 3.

n) Comment. ad Dioſcor. Praefat. ed L. VI.

o) Heucher a. e. a. O.

p) Linné de odoribus medicamentorum, Amoenit. acad. B. III. S. 201.

q) Lindeſtolpe a. a. O. S. 739.

q1) Gordon a. a. O. II. S. 37. 38.

q2) Schenk obſervationes medicinales de venenis. Francof. 1600. B. VII. S. 701. 702.

www.dlibra.wum.edu.pl

nur von gewissen, oder auch nur von einer natürlichen Ordnung derselbigen.

1) J. v. W(yck) Verroog betreffen de ongeneyne schadelyne planten. Roterdam 1747. 8.

2) J. A. Unzer medicinisches Handbuch. Lüneburg 1770. 8.

3) J. G. Puche diss. de venenis vegetabilibus generatim. Erlang 1784. 4.

4) Ebendess. Materia venenata regni vegetabilis. Lips. 1785. 8.

5) Die neueste Stubentapeten für die Jugend, oder genaueste Abbildungen der bekanntesten Giftpflanzen und Giftschwämme nebst einer angemessenen Beschreibung. Prag. Fol. Heft I. 1789.

6) Chr. A. Frege Anleitung zur Kenntniß der schädlichen und giftigen Pflanzen für Stadt- und Landschulen. Kopenhagen 1796. 8.

7) J. H. A. Duncker kurze Beschreibung der gefährlichen Giftpflanzen für Kinder und Ungelehrte ic. Brandenburg 1796.

8) Beispiele von allerlei Unglüksfällen zur Belehrung und Warnung besonders für die Jugend, nebst einem Anhange über giftige Pflanzen. Göttingen 1798.

9) J. A. Bieber Giftkräuterbuch oder Sammlung der mehrsten wildwachsenden und in Gärten gezogenen Giftpflanzen, für Stadt- und Landschulen. Gotha 1799. 8.

10) J. C. A. Mayer einheimische Giftgewächse, welche für Menschen am schädlichsten sind. Nach der Natur beschrieben und abgebildet. Berlin, gr. fol. Heft I. 1799. II. 1800.

www.dlibra.wum.edu.pl

11) Giftpflanzenbuch oder die ſchädlichſten Giftgewächſe Teutſchlands, nach der Natur abgebildet und beſchrieben zum Unterricht in Schulen und für das gemeine Leben mit illuminirten Kupfern. Berlin 1800. 8.

Mit mehreren Pflanzengiften haben

12) Heriſſant Philoſophical Transactions. B. XLVII. for the years 1751 and 1752.

13) Pet. Roſſi de nonnullis plantis, quae pro venenatis habentur obſervationes et experimenta. Florente 1762. 4.

14) und F. Chr. Dölz neue Verſuche und Erfahrungen über einige Pflanzengifte. Nürnberg 1792. 8.

Verſuche, vornemlich an Thieren, angeſtellt.

II.

15) J. J. Eſteve dictionario de les yervas y plantas medicinales, que ſe hallan en el regno de Valencia bei Capdevila.

16) Wilſon Synopſis of britiſh plants in Ray's method with a botanical dictionary. Newcaſtle 1744. 8.

17) Wilmer obſervations on the poiſonous vegetables, which are either indigenous in Great-Britain, or cultivated for ornement. London 1780. 8.

18) Theod. Pet. Carls de plantis Belgii qualitate quadam hominibus ceterisve animalibus nociva ſ. venenata praeditis. Bruxell. 1774.

19) Bulliard Plantes veneneuſes et ſuſpectes de la France. Paris 1780. 12.

20) Rud. Jak. Spielmann (reſp. Guerin) diſſ. de venenis vegetabilibus Alſatiae. Argentor. 1766. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

21) Kurze Abhandlung derjenigen inländiſchen Pflanzen, durch deren unvorſichtigen Gebrauch bei Menſchen und Vieh großer Schade, ja der Tod ſelbſt verurſacht werden könne. Bern 1774.

22) P. R. Vicat Hiſtoire des plantes vénéneuſes de la Suiſſe, contenant leur deſcription, leurs mauvais effets et leurs antidotes, redigée ſurtout d'après l'hiſtoire des plantes Helvetiques de M. de Haller Yverdun 1776. 8.

23) J. S. Halle die teutſchen Giftpflanzen zur Verhütung der tragiſchen Vorfälle in den Haushaltungen nach ihren botaniſchen Kennzeichen, nebſt den Heilmitteln. Berlin 8. 1784. Neue Auflage 1801.

24) J. A. Garn Beſchreibung der häufigſten deutſchen Pflanzengifte nebſt Anzeige der Gegenmittel derſelben. Wittenberg und Zerbſt 1792. 8.

25) Dan. Gottfr. Schreber Sammlung verſchiedener Schriften, welche in die Policey- Cameral- und andere Wiſſenſchaften einſchlagen. Halle 8. B. VI. 1760. (geht, wie die beiden zunächſt folgende Schriften, vornemlich diejenige an, welche auf Wieſen und Weiden wild wachſen).

26) Langguth progr. de plantarum venenatarum arcendo ſcelere. Witteberg 1770.

27) G. R. Böhmer de plantis, auctoritate publica exſtirpandis, cuſtodiendis et ex foro proſcribendis. Vittemb. 1792.

28) J. Fr. Gmelin Abhandlung von den giftigen Gewächſen, welche in Teutſchland, und vornemlich in Schwaben wild wachſen. Ulm 1775. 8.

www.dlibra.wum.edu.pl

29) L. B(ywald) S. I. Selectae ex amoenitatibus Academicis C. Linnaei dissertationes ad universam naturalem historiam pertinentes, additamentis auctae, Graec. 1764. 4. (die giftigen Pflanzen Steiermarks).

30) J. Mich. Luther diss. de venenis vegetabilibus in genere, et in specie de plantis venenatis in territorio Erfordiensi sponte crescentibus. Erford 1792. 4.

31) Griffith Hughes natural history of Barbados. London 1750. fol.

32) Die vorzüglichsten Giftpflanzen Deutschlands. Für den Bürger und Landmann vom Verfasser der Abhandlung über das Lebendig begraben. Jena 1801. 8.

III.

33) Fr. von Sterrebeek Theatrum fungorum of het Tonneel de Campernoelgien &c. Antwerp. 4. 1675. 1677. 1712.

34) Fr. A. G. Knoll plantae venenatae umbelliferae. Lipsi. 1771. 4.

35) J. Fr. Stromeyer diss. de plantarum folanacearum ordine. Goetting. 1772. 4.

36) Karl v. Krampf Experimenta de nonnullorum ranunculorum venenata qualitate, horum externo et interno usu. Vienn. Austr. 1766. 8.

37) Ant. Mayer diss. de venenata ranunculorum indole, horumque interno externoque usu. Vienn. 1783. 8.

38) C. G. Hagen diss. resp. Nic. Kwiatkmorky de ranunculis prussicis. Regiom. 1783.

www.dlibra.wum.edu.pl

39) Karl v. Krapf Beschreibung der in Unteröstreich wachsenden und zum Verkauf sowohl erlaubten als unerlaubten Schwämme, samt den unesbaren, schädlichen, giftigen oder auch verdächtigen ꝛc. Wien, gr. 8. H. I. 1782.

40) Kerner die giftige und eßbare Schwämme, welche in Würtemberg und übrigen Teutschland wild wachsen. Stuttgart 1786. 8. (mit bemahlten Abbildungen).

41) Eb. Zeviani Memorie di matematica e fisica della Società italiana. B. III. 1786. S. 465. &c.

42) Brugnatelli Giornale fisico-medico. B. I. 1795. n. 86.

43) Essay on culinary poisons. London 1781. 8.

44) Ingram Enquiry into the cause of death of Scewen, to which is added an account of accidental poisons, to which Families are exposed, with their antidotes 1777.

45) P. Kollani Abhandlung über die herrschende Gifte in den Küchen. Presburg 1792. 8.

Eintheilung der Pflanzengifte.

Viele Gifte des Gewächsreiches besitzen ihre gefährliche Wirksamkeit schon so, wie sie die Natur uns darstellt; andere erlangen sie erst durch Krankheiten oder andere zufällige Veränderungen, welche den Pflanzen, ihren Theilen oder ihren Säften zustoßen; aus noch andern bereitet erst die Kunst Gifte: Es gibt also natürliche, widernatürliche und künstliche Pflanzengifte.

www.dlibra.wum.edu.pl

Erste Klasse.

Natürliche Pflanzengifte.

Das Pflanzenreich ist sehr fruchtbar an giftigen Körpern, ob gleich Aberglauben, Liebe zu dem Wunderbaren, Unachtsamkeit auf die Wirkungen der Natur, und das hohe Ansehen der Aussprüche des Alterthums ihre Anzahl in den Verzeichnissen der Aerzte viel zu groß angegeben haben; denn nicht jeder Körper, der entweder an sich schädlich ist, oder es erst durch unrechten Gebrauch wird, verdient den Namen eines Giftes.

Die Natur hat die meisten dieser Gifte ziemlich deutlich ausgezeichnet, um uns vor der Gefahr zu warnen, in welche uns ihr unfürsichtiger Genuß stürzen könnte. Rohe Völker und unvernünftige Thiere, die dem Winke der Natur gehorsamer sind, und ihre Sinnen noch in ihrer ursprünglichen Stärke erhalten haben, kennen, von einem noch unverdorbenen Triebe geleitet, diese Sprache, in welcher die Natur zu ihnen redet, und folgen ihrer mütterlichen Stimme; aber gebildete Menschen, welche sich mehr von der glüklichen Einfalt der Natur entfernt haben, vermissen diese Vortheile und sind genöthiget, das durch lange Umwege, Beobachtungen, Erfahrungen und Vernunftschlüsse zu suchen, was sie bei genauerer Bekanntschaft mit der Natur, und bei einer sorgfältigern Befolgung ihrer Geseze bei dem ersten Anblike hätten bemerken können.

Es fehlt aber doch bei vielen dieser giftigen Gewächse nicht an Merkmalen, die so auffallend sind, einen so starken Eindruk auf unsere Sinnen machen, daß ein Mensch, der nur

www.dlibra.wum.edu.pl

die geringste Achtsamkeit auf die Körper, die um ihn herum sind, hat, sie unmöglich übersehen kann. Wenn das äusere Ansehen einer Pflanze widrig und unangenehm ist, wenn ihre Blumen eine traurige, schwarzblaue, schmuziggelbe oder unangenehme bräunlichte Farbe haben, wenn ihre ganze Oberfläche mit einem stinkenden Kleber bekleidet ist, wenn sie den ganzen Luftkreis um sich herum mit einem schweren, unangenehmen und betäubenden Geruche erfüllt, so ist unser Argwohn ziemlich gegründet, wenn wir ihr eine Stelle unter den Giften anweisen. Allein diese Merkmale reichen noch lange nicht zu, uns unserer Sache zu versichern; denn einmal gibt es viele giftige Gewächse, welche nur einige dieser Eigenschaften, und diese nur in einem mäsigen Grade haben, und dann gibt es wieder andere, bei welchen wir sie nur zu gewissen Zeiten des Jahrs oder ihres Lebens, oder nur an einigen ihrer Theile bemerken, und noch andere tragen zu keiner Zeit des Jahrs eines dieser Merkmale an sich, und sind doch Gifte.

Auch hier kommt uns der natürliche Abscheu, den unvernünftige Thiere gegen alles äusern, was ihnen schädlich ist, als ein untrüglicher Führer, treflich zu statten, wenn wir bei der Anwendung desselbigen zu unserm Vortheile und auf unsern Leib nur die mindeste Behutsamkeit anwenden. Wenn gesundes, starkes und wohl gefüttertes Vieh auf einer Weide, an die es schon lange gewohnt ist, eine Art Pflanzen stehen läßt, und alle andern darneben und rings herum abfrißt, wenn es dieses zu allen Zeiten des Jahrs, so lange die Pflanze über der Erde ist, thut, so ist diese Art schon sehr verdächtig, wenn sie mehrere Arten Vieh, Rindvieh, Wollvieh und Pferde nicht fressen, so ist dieses Gewächs

www.dlibra.wum.edu.pl

schon sehr verdächtig, wenn sie es sogar in der Krippe und unter dem Heu liegen lassen, oder ausleſen, wenn es selbst Ziegen und Schweine verabscheuen, so verstärkt sich der Verdacht, und das noch mehr, wenn wir sichere Erfahrungen vor uns haben, daß Thiere, bei welchen List, Hunger, Krankheit, oder die Neuheit der Weide, an welche sie noch nicht gewöhnt waren, diesen Naturtrieb betrübt oder überwältigt hat, vor dem Genusse einer solchen Pflanze merklichen Schaden gelitten haben oder gar gestorben sind 93).

Der Arzt muß aber hier die äuserste Fürsicht anwenden, um keine Trugschlüsse aus seinen Versuchen zu ziehen, und, wie ich schon in der Einleitung erinnert habe, nie vergessen, daß selbst der körperliche Bau der Thiere, und die körperlichen Eigenschaften ihrer Theile in sehr vielen Stüken von dem Bau des menschlichen Leibes abweichen und das dem einen Thiere Gift sein kann, was dem andern unschädlich oder gar heilsam ist.

Wenn uns diese Merkmale auch nicht trügen, wie wir doch daran nie ganz gewis sein können, so fehlen sie doch zuweilen dem Arzte gänzlich, wenn die Pflanze nicht an ihrem natürlichen Standorte, wenn sie nicht gerade auf einer Weide wächst, auf welche vieles Vieh getrieben wird, und wenn er zu wenig davon hat, um an unvernünftigen Thieren weitere Versuche damit zu machen. Selbst die chemische Zerlegung, wenn sie wenigstens nach dem bisher gewöhnlichen und bekannten Verfahren angestellt wird, gibt ihm hier sel-

---

93) Von ihren Wirkungen auf Hornvieh I. Hacquet neue Sammlung nüzlicher Unterrichte der crainischen Gesellschaft des Akerbaus. B. I. 1779.

www.dlibra.wum.edu.pl

ten vieles Licht, weil die Scheidekunst, durch deren Beihülfe wir manche mineralische Gifte wohl zerlegen können, noch nicht so tief in das Innere der Pflanzen gedrungen ist, um aus ihrer Mischung mit Sicherheit auf ihre Arzneikräfte zu schliesen, und aus heilsamen und giftigen Gewächsen oft beinahe die gleichen Stoffe liefert. Was sie hier noch leistet, ist, daß sie uns einen Unterschied zwischen den verschiedenen Abtheilungen der Pflanzengifte zeigt, den wir aber ohne diese Umwege schon durch den Gebrauch unserer Sinne erfahren.

Hier muß also der Arzt nothwendig seine Zuflucht zur Kräuterkunde nehmen, aus dieser die Merkmale entlehnen, an welchen er die giftigen Gewächse erkennen kann, die verdächtige Pflanze, die ihm vorkommt, mit den Beschreibungen der gröſten Kräuterkundigen vergleichen, wenn er sie da gefunden hat, in den Jahrbüchern der Aerzte nachsehen, ob sie von ihrem Genusse schädliche oder gar tödliche Wirkungen aufgezeichnet haben, oder, wenn er sie nicht findet, ob sie nach botanischen oder andern Merkmalen mit einer solchen Pflanze nahe verwandt ist, deren giftige Eigenschaften entschieden sind.

Allein auch diese Merkmale verschwinden sehr oft vor den Augen des forschenden Arztes; sehr oft kann er nichts mehr von dem Gewächse zu sehen bekommen, das nach seiner, des Kranken oder seiner Freunde Vermuthung die Ursache der Zufälle ist, mit welchen er den Kranken kämpfen sieht; in dem Garten, in dem Walde, in welchem der Kranke die tödliche Pflanze gefunden zu haben, sich erinnert, trift er keine Spur mehr davon an; selbst in der Küche unter seinen Speisen, in seinen Zimmern findet er nicht das Mindeste davon; die allzumangelhafte Beschreibung, die ihm der

www.dlibra.wum.edu.pl

Kranke, oder diejenige, die um ihn sind, von dem verdächtigen Gewächse geben, lassen ihn auch im Dunkeln. Auch das, was der Kranke durch Erbrechen und Stuhlgang von sich gibt, enthält nichts, was ihn seiner Sache gewis versichert, ihm untrügliche Merkmale darstellt, an welchen er sie erkennen kann; denn gemeiniglich hat die Kraft der thierischen Verdauung die ursprüngliche Gestalt dieser Körper schon so verändert, daß sich der Kräuterkundige wohl vergebens bemühen würde, sie darnach zu unterscheiden.

Was soll also den Arzt in diesen Finsternissen leiten? Was soll ihm sagen, ob der Kranke mit den Wirkungen eines Giftes, ob er mit den Wirkungen eines Pflanzengiftes, ob er mit den Wirkungen dieses oder jenes Pflanzengiftes zu kämpfen habe? Hier müssen Wahrscheinlichkeiten, die Stelle der Wahrheit, und Muthmassungen die Stelle der Gewißheit vertreten; der Arzt muß sich nemlich hier, da ihm alle andere Wege abgeschnitten sind, aus den Zufällen selbst, welche er bei seinem Kranken beobachtet, Raths erholen, aus ihrer Beschaffenheit und Verbindung unter einander auf die Beschaffenheit und Art des Giftes schliesen, und, wenn er diese einmal erforscht hat, eine vernünftige Heilart darauf bauen.

Aber haben denn die Zufälle, welche auf den Genus giftiger Pflanzen erfolgen, etwas Eigenes, etwas Unterscheidendes von denen, welche die Wirkungen mineralischer oder thierischer Gifte sind? Denn daß und wie die Gifte überhaupt sich selbst in ihren Wirkungen von andern schädlichen Ursachen äuserlicher Zufälle unterscheiden, habe ich bereits gezeigt. Schwer ist es, auch einem geübten Arzte, diesen Unterschied zu sehen, der dem Arzt von gemeinem Schlage gänz-

www.dlibra.wum.edu.pl

lich entwiſcht. Nur ein geſchärfter unverwandter Blik in die innere Beſchaffenheit der Gifte, nur eine Aufmerkſamkeit auf alles, was bei dem Kranken vorgeht, die ſich durch nichts irre machen oder ſtören läßt, nur ein durchdringender Scharfſinn, der im Stande iſt, das Zufällige von dem Weſentlichen zu unterſcheiden, nur eine genaue und weit ausgedehnte Bekanntſchaft mit den Erfahrungen ſeiner Vorgänger kann dem Arzte hier zum Leitſtern dienen, durch deſſen Schein er in dieſer Finſternis mit einiger Sicherheit wandeln kann.

Die Wirkungen der thieriſchen Gifte verrathen ſich gemeiniglich durch einige Merkmale, die einem achtſamen Beobachter bald in die Augen fallen: das Schlangengift verräth ſich durch die Beſchaffenheit der Wunde, das Gift des tollen Thiers durch Waſſerſcheue und Wuth, das Gift der ſpaniſchen Fliegen durch ſeine Wirkung auf die Harnwege u. ſ. w.

Die Wirkung der Gasarten oder der durch ſie verdorbenen Luft beſteht meiſtens in einer plözlichen Beräubung oder Erſtikung, ſo daß man die Verunglükte auf der Stelle tod antrift, oder in einer langſamen Schwächung oder Lähmung der Nerven.

Alle dieſe Wirkungen kommen bei Pflanzengiften nur ſelten vor, und daher hält es eben ſo ſchwer nicht, zu entſcheiden, ob die Wirkungen eines vermuthlichen Giftes Wirkungen eines giftigen Gas oder eines giftigen Thiers, oder einer giftigen Pflanze ſind.

Aber wie laſſen ſich die Wirkungen der Pflanzengifte von den Wirkungen mineraliſcher unterſcheiden, da viele der lezten ſo nahe mit den Wirkungen der ſcharfen Pflanzengifte

www.dlibra.wum.edu.pl

übereinkommen, da beide äuſerſt ſchmerzhaftes Bauchgrimmen, Erbrechen und Bauchflüſſe erregen?

Bei den ſcharfen Pflanzengiften ſind dieſe Zufälle gemeiniglich etwas gelinder; deſto häufiger aber zeigen ſich Zukungen in verſchiedenen Theilen des Leibes, vornemlich in dem Geſichte, ein Aufſpringen der Sehnen, vornemlich an den Händen, Wahnwiz, und überhaupt die Zufälle, welche gemeiniglich im Gefolge einer Magenentzündung ſind. Dieſe Entzündung ergreift zwar z. B. bei den Hahnenfusarten, den ganzen Magen, bei dem Alraun wohl auch die Kehle, geht aber nicht leicht in trokenen Brand über, noch verurſacht ſie Löcher im Magen, wie z. B. der Arſenik r).

Die Wirkung der betäubenden Gifte zeichnet ſich noch durch andere Merkmale aus, die wir an den Giften anderer Naturreiche nicht wahrnehmen; und wenn der Arzt hier auch nicht aus den Nebenumſtänden in dem Verhalten des Kranken und andern, ſo wie ich ſie in der Einleitung angegeben habe, ſchlieſen kann, ſo zeigt ihm hier die Art und der Zuſammenhang der Zufälle, die ich unten beſchreiben werde, die Art und die Stärke des Feindes, den er zu beſtreiten hat, zu offenbar, als daß er noch länger ſtraucheln könnte.

Aber gibt es wohl Merkmale, an welchen wir, ohne einige andere Unterſuchung zu Hülfe zu nehmen, wenn wir auch einmal wiſſen, daß wir es mit einem Pflanzengifte zu thun haben, blos aus den Zufällen, die ſie erregen, ungezweifelt erkennen können, welche Art von Pflanzen die Urſache dieſes Uebels ſei?

---

r) Gallin a. a. O. S. 352.

www.dlibra.wum.edu.pl

Wenn man die alten griechischen und lateinischen, und selbst unsere alten teutschen Kräuterkundige und Aerzte zu Rathe zieht, so sollte man fast glauben, es seie ungereimt, noch zu zweifeln, ob wenigstens einige Gifte eine gewisse, bestimmte, ihnen ganz eigene Wirkung hervorbringen. Unsere Vorgänger in der Kunst schienen wenigstens so vest davon überzeugt zu sein, daß sie keinen Anstand nahmen, dergleichen Pflanzen nach diesen Wirkungen zu benennen; das zeigen die Namen Σαρδωη, den die Griechen, und Apium risus, den die Lateiner dem Gifthahnenfuse beilegten, weil sie auf seinen unfürsichtigen Genus öfters gewisse Verzukungen in den Muskeln des Gesichts, die sie in ihrer Sprache sardonisches Gelächter nennten, erfolgen sahen; der Name Altercum, den die Lateiner dem Bilsenkraut gaben, weil es öfters Zanksüchtigen Wahnwiz erregt, der Name Schlafkraut, Tollkraut u. dgl. den die Teutschen bald dem Stechapfel, bald der Wolfskirsche, bald dem Bilsenkraute beilegten, weil sie Schlaf und Tollheit auf ihren Gebrauch bemerkten, der Name Wuthbeere, den sie der lezten auch ertheilten, weil die damit Vergiftete öfters in wahre Wuth verfallen; der Name Schwindelhaber und Tollhaber, den der Sommerloch bei einigen teutschen Pflanzenkennern führt, weil er Schwindel und sogar oft Tollheit erregt, der Name der Liebesäpfel, mit welchem man die Früchte des Lycopersicon bezeichnet, weil man ihren gistigen Kräften vornemlich verliebten Wahnwiz zutraute u. m. a.

Allein die Wirkungen, von welchen die Pflanzen den Namen haben, sind einmal durchaus nicht so beständig, daß wir sie daran erkennen könnten. Die Zukungen im Gesichte zeigen sich nicht immer auf den Genus des Gifthahnenfuses,

www.dlibra.wum.edu.pl

zeigen sich nicht zu jeder Zeit der Krankheit, die er erregt; nicht immer erregt das Bilsenkraut Hader, nicht immer die Liebesäpfel schamlose Liebe, nicht immer die Wolfskirsche Wuth; und dann sind diese Wirkungen durchaus nicht den davon genannten Pflanzen ausschliesslich eigen; die Kraft, Zukungen im Gesichte zu erregen, haben alle übrige giftige Arten des Hahnenfuses; es haben sie viele andere scharfe und betäubende Gifte mit dem Hahnenfuse gemein, und alle betäubende Gifte machen Schlaf, und erregen Schwindel, Wahnwiz von allerlei Art, und öfters Wuth.

Kann man aber auch nach den eingeschränkten Einsichten in diesen Theil der Arzneikunst die Art des Pflanzengifts nicht errathen, dessen Wirkungen die Kranken martern, so kann ein aufmerksamer Arzt doch immer so viel daraus urtheilen, unter welche Ordnung von Pflanzengiften das gegenwärtige gehöre. Und das kann ihn auch in Rükſicht auf die Wiederherstellung seiner Kranken gänzlich beruhigen, weil er gegen ein betäubendes Gift, wie gegen das andere, gegen ein scharfes Pflanzengift, wie gegen das andere, gegen den Stechapfel, wie gegen das Bilsenkraut, gegen den Hahnenfus, wie gegen die Waldrebe, beinahe mit den gleichen Waffen zu streiten hat, und selbst wider die meisten Pflanzengifte überhaupt an den oben angeführten allgemeinen Rettungsmitteln, an den Brechmitteln, den Essig und andern Gewächssäuren, und auser diesen wider sehr viele am Zuker ein sehr kräftiges Gegengift findet.

Die Gifte des Pflanzenreichs sind aber dem Menschen deswegen gefährlicher, weil ihr auseres Ansehen Unwissende und Unachtsame so leicht täuscht, daß sie sie mit den unschuldigsten Speisen oder mit den heilsamsten Arzneimitteln verwechseln,

www.dlibra.wum.edu.pl

wechseln, und da Tod und Verderben äussern, wo sie Leben und Gesundheit zu erndten hoffen; ihre Kenntnis insbesondere verdient es, allgemeiner zu werden, weil sie den Landmann, den Koch, den Kräutermann, den Arzneihändler und Apotheker gegen Irrthümer sichern wird, die auf das Wohl ganzer Staaten einen zu starken Einflus haben, als daß es uns gleichgültig sein könnte.

Sie schaden gröstentheils nur dann, wenigstens nur dann als Gifte, wenn sie verschlungen werden; doch lehrt uns die Erfahrung, daß es auch solche gibt, welche, wie z. B. das Schlangengift, wenn sie durch eine Wunde beigebracht werden, tödten, innerlich genommen aber, unschädlich, oder doch nicht giftig sind; mehrere schaden auf beiderlei Arten zugleich, sowohl wenn sie innerlich genommen, als wenn sie äusserlich angebracht werden *).

---

*) Von einigen Pflanzenstoffen, welche unter den Giften eine Stelle zu verdienen scheinen, als z. B. von dem ausgedrükten Fruchtsafte der Cycas circinalis, mit welchem sich die Malaien die ihnen lästige Kinder vom Halse schaffen sollen, und der Frucht eines amerikanischen Baums, welche nach Rai giftig sein soll, von der Wurzel des Baums Bavana, welche verschlungen plözlich tödten soll — da hingegen die Frucht Mirabix sowohl dagegen als überhaupt ein Gegengift sein soll (Odoardo Barbosa bei Ramusio a. a. O. I. S. 303. b) — ist mir nicht bekannt, zu welcher Abtheilung sie gehören.

www.dlibra.wum.edu.pl

Erste Abtheilung.

Innere Pflanzengifte.

Die Pflanzengifte, welche, innerlich genommen, ihre unseligen Wirkungen über den ganzen Leib verbreiten, theilen sich in fünf Ordnungen.

Einige zeigen in ihrem Geschmak offenbar Schärfe, ohne in ihrem Geruch etwas widriges oder verdächtiges zu verrathen, dieses sind die scharfen Pflanzengifte.

Andere zeigen auf der Zunge keine heftige Schärfe; aber ihr häslicher Geruch macht sie schon verdächtig; dieses sind die betäubenden Gifte.

Andere haben die Charaktere und Wirkungen beider Arten in sich vereinigt; sie wirken als scharfe und betäubende Gifte zugleich, und sie sind die gefährlichsten.

Noch andere haben weder im Geruch noch im Geschmak etwas verdächtiges; allein nach einigen Erfahrungen zieht ihr häufiger Gebrauch Lähmungen nach sich; dies sind die lähmenden Pflanzengifte.

Noch andere löschen langsam und ohne auffallende Zufälle das Lebenslicht aus; es sind die auszehrenden Gifte t).

---

t) Unter welchen Abschnitt Rheede's Katu-Theka-Maruara gehöre, deren Genus Raserei erregt, müßte genauere Bestimmung der übrigen Zufälle, welche sie hervorbringt, offenbaren.

www.dlibra.wum.edu.pl

Erster Abschnitt.

Scharfe Pflanzengifte.

Sie zeigen sich, auser den allgemeinen Merkmalen, an welchen sich Pflanzengifte zu erkennen geben, dadurch, daß sie schon auf der Haut, noch mehr auf der Zunge, auf den Lippen, am Zahnfleische und im innern Munde ihre Schärfe untrüglich verrathen, wenn sie darauf gegossen oder daran gerieben werden, Röthe, brennenden oder stechenden Schmerzen, Blasen, Geschwulst, Entzündungen in diesen Theilen erregen, sie anfressen, die Oberhaut ablösen, oder auch zuweilen diesen Theilen alle Empfindung und Bewegung nehmen, so daß die Zunge, mit deren Spize man sie gekostet hat, eine Zeit lang starr und unempfindlich bleibt, und den Geschmak verliert, daß eine Art von hartnäkigem Speichelflusse darauf erfolgt. Kommt etwas davon in den Schlund, so schnürt sich dieser zusammen, und entzündet sich; wird gar ein solches Pflanzengift hinunter geschlungen, so folgt unauslöschlicher Durst, unerträgliches Drüken und Brennen im Magen, Entzündung desselbigen und der Gedärme, Magenkrampf, oder völlige Lähmung des Magens, Schluchzen, Mangel an Eslust, heftiges, hartnäkiges, oft anhaltendes, und zuweilen mit Blut untermengtes Erbrechen, heftiges Grimmen, das auch, wenn die übrigen Zufälle aufhören, noch lange zurükbleibt, äuserst ermattende, grausame, oft stinkende, zuweilen blutige Bauchflüsse, manchmal auch leere schmerzhafte Reize zum Stuhlgang, sehr oft Fieber und Mangel des Schlafs, zuweilen Unmachten, zuweilen Zukungen, bald in einzelnen Theilen, bald in mehreren, oder in dem ganzen Leibe zugleich, zuweilen Brennen im Kopfe, und tiefer Schlummer, oder unerträglicher Kopfschmerzen, öfters

www.dlibra.wum.edu.pl

Blutspeien oder andere Blutflüsse, zuweilen Wassersucht, kalte Schweisse, nnd nicht selten ein schneller Tod.

Nach dem Tode findet man in den Leichen Magen und Gedärme hin und wieder entzündet, und Brandflecken.

Ueberhaupt kommen die Wirkungen, die auf den Gebrauch eines solchen Pflanzengiftes erfolgen, mehr mit den Zufällen eines Entzündungsfiebers, und besonders mit den Zufällen einer Magenentzündung überein; dadurch zeichnen sie sich einem geübten Arzte deutlich vor den betäubenden aus: durch den Genus scharfer Pflanzengifte gerathen die Lebenskräfte in die äuserst lebhafte gewaltsamste Bewegung, und liegen erst dann unter, nachdem sie bis auf das Aeuserste übergespannt sind: die betäubenden Gifte stürmen sogleich auf ihre Quelle los, sezen die Werkzeuge der äuserlichen Sinnen auser Stand, Eindrüke anzunehmen und in die Seele überzutragen, schwächen die Reizbarkeit der Fleischfasern, und nehmen eben dadurch dem Leibe die besten Schuzmittel gegen diese seinem Feinde; hingegen auf den Genus scharfer giftiger Pflanzen folgt nicht leicht Betäubung, nur selten Wahnwiz und Schlummer, so daß man fast schliesen mus, sie seien, wenn sie sich auch zeigen, vielmehr Wirkungen der Zufälle, als unmittelbare Wirkungen der Gifte selbst; aber von den betäubenden Pflanzengiften erfolgt immer Betäubung und Schlummer, sehr oft Sinnlosigkeit, Schwermuth oder Wuth, da sie hingegen nur selten Erbrechen und Zukungen verursachen, die bei jenen so gewöhnlich sind. Die scharfen Pflanzengifte bringen nur selten offenbare Wirkungen in den Säften hervor, wenigstens sind auch diese nur mittelbare Folge ihrer Wirkungen auf die vesten Theile; aber von den betäubenden bemerken wir die Säfte gemeiniglich ungemein auf-

www.dlibra.wum.edu.pl

gelößt, und, wenn sie dem traurigen Auftritt durch den Tod nicht bald ein Ende machen, schon bei lebendigem Leibe Zufälle der anfangenden Fäulnis.

Bei den wenigsten dieser scharfen Pflanzengifte wirkt die schädliche Schärfe sehr merklich auf den Geruch, und schon dadurch lassen sich diese Gifte von den meisten betäubenden unterscheiden; allein man würde sehr irren, wenn man daraus den allgemeinen Schlus machen wollte, daß ihr Gift niemalen auf flüchtigen Theilchen beruhe; viele von ihnen verlieren alle ihre Schärfe, all ihr Gift, wenn sie zwo Stunden lang mit Wasser gekocht werden, ohne daß das Wasser eine schädliche Schärfe annimmt u); andere verlieren sie schon durch Troknen an der Luft x), und viele blos durch die natürliche Ausdünstung, so daß sie nicht zu allen Zeiten ihres Lebens, und sehr oft schon, wenn sie etwas älter werden, nicht mehr giftig sind y).

---

u) Das bemerkte Krapf (Exper. de nonnullor. ranunc. venenat. qualitate. S. 22.) vornemlich an den Arten des Hahnenfuses; was die Sache noch mehr erweist, ist, daß bei dem Destilliren alle Schärfe in das davon übergezogene Wasser geht.

x) Dis hat man schon längst an der Aronswurzel u. a. dgl. scharfen Wurzeln bemerkt; es gilt auch, wie es Krapf a. e. a. O. angemerkt hat, von den Arten des Hahnenfuses, welche, wenn sie auch das Vieh wegen ihrer Schärfe auf der Weide stehen läßt, unter dem Heu gerne von ihm gefressen werden.

y) So hat die Zeitlosenwurzel nur zu Anfang des Sommers ihre schädliche Schärfe; so ist auch der Hahnenfus weit schärfer, so lange er noch ganz jung, als nachdem er bereits in Samen geschossen ist. S. Krapf a. e. a. O. S. 13.

www.dlibra.wum.edu.pl

Die Aerzte haben sich schon längst sehr viele Mühe gegeben, zu erfahren, worinn sie eigentlich den Grund der schädlichen Schärfe zu suchen hätten, die sie an den Giften bemerkten: Galen und seine ihm nachbetende Schüler plagten sich Jahrhunderte lang damit, jedem dieser Gifte unter ihren vier qualitatibus cardinalibus und deren vier gradibus die rechte Stelle anzuweisen. Zu denen Zeiten, da man glaubte, den Grund von den Eigenschaften der Körper in der Gestalt der kleinsten Theilchen zu finden, dichtete man ihnen Spiese, Spizen, scharfe Eken an, rief die Zauberkräfte der Vergröserungsgläser zu Hülfe, und bildete sich ein, wenn diese dem Auge solche Theilchen entdekten, die man gerne zu sehen wünschte, man könne daraus alles erklären; man baute auf solche eingebildete Grundstüzen sinnreiche Gebäude scheinbarer Meinungen, die man aber eben so bald wieder über den Haufen fallen sahe, als man sie errichtet hatte.

Die chemische Sekte der Aerzte gerieth auf andere Irrwege; eben so von dem Erklärungsgeiste getrieben, als die Anhänger des unsterblichen des Cartes, suchten sie alle Wirkungen der Gifte sowohl als der Arzneimittel aus der Lehre von den Salzen abzuleiten; alle Schärfe mußte saurer oder laugenhafter Art sein, und, da sich in der Wirkungsart der giftigen Pflanzen mehr Aehnlichkeit mit Laugensalzen als mit Säuren zeigte, da die meisten Pflanzengifte ihr kräftigstes Gegengift an Essig fanden, was schien natürlicher, als der Schluß: Also muß die Schärfe der giftigen Pflanzen von der Art eines Laugensalzes sein? Allein bei aller Achtung für die Chemie möchte ich doch sehr zweifeln, daß sie uns auch in dem Zustande, in welchem sie jezt ist, in Stand sezt, so tief in die Mischung der Körper aus dem Pflanzen- und

www.dlibra.wum.edu.pl

Thierreiche einzudringen, daß wir daraus ihre wahre Beschaffenheit, ihre Kräfte, und die Art, wie sie eigentlich schaden oder nüzen, immer mit Gewisheit errathen können. Grose Scheidekünstler, welche den kühnen Entschluß gefaßt haben, diese Geheimnisse zu ergründen, haben an dieser Klippe gescheitert, oder doch fruchtlos gearbeitet. Wenn z. B. alle scharfen Pflanzengifte laugenhafter Art sind, wie es jene chemischen Aerzte behaupteten, welchen chemischen Beweis haben wir davon? Welches dieser scharfen Pflanzengifte macht, ehe es durch Fäulung verändert wird, mit Säuren Mittelsalz? Welches von ihnen schlägt Erden und Metalle aus ihren Auflösungen in Säuren nieder, wenn sie zu ihrer Fällung anderst Laugensalz nöthig haben? Und wenn der Saft, der aus der frischen Wurzel des Arons gedrükt wird, die blaue Farbe des Veilchensaftes in die grüne verwandelt z), warum erhielt Neumann aus der gleichen Wurzel durch trokenes Destilliren einen offenbar sauren Geist?

So mangelhaft aber auch immer hier unsere Kenntnisse sind, und so unsicher sie uns auf diesem unwegsamen Felde führen würden, so glaube ich doch so viel aus der Wirkungsart dieser Gifte und aus ihrem Verhalten zu unterschiedenen Auflösungsmitteln schliesen zu können, daß, einige wenige dieser Gifte ausgenommen, welche mehr die Eigenschaften eines Harzes offenbaren, die Schärfe der meisten unter ihnen mit der Schärfe der Salze zunächst verwandt ist. Nun lösen sich alle Salze in Wasser auf; ihre Theilchen vereinigen sich mit den Theilchen des Wassers; haben sie nur weniges Wasser, so werden sie dadurch nur desto wirksamer, sie drin-

z) Fränkische Samml. B. VII. St. 40. 1764. S. 298. 301.

www.dlibra.wum.edu.pl

gen leichter und geschwinder in die kleinsten Gänge, und verbreiten ihre Wirkung über den ganzen Leib; haben sie aber mehr Wasser, nimmt das Verhältnis des Wassers zum Salze zulezt so zu, daß ein Theilchen des Salzes in 100, 500, 600 und mehrere Theile des ganz milden Wassers eingehüllt ist, so ist die Schärfe des Salzes zulezt ganz unmerklich, und wirkt weder auf Zunge, noch auf andere Theile des Leibes mehr als Schärfe; sollte sich also nicht vermuthen lassen, daß reines Wasser, in groser Menge getrunken, vornemlich wenn es lau ist, und also die Stelle eines Auflösungsmittels desto besser vertreten kann, gegen diese Gifte sehr wirksam sein müsse?

Es ist aber keine blos theoretische Vorstellung, es ist Wahrheit, die sich auf vielfältige Erfahrungen gründet, wenn ich Wasser und wässerichte Getränke, lau und in groser Menge getrunken, als das kräftigste, in allen Fällen unschädlichste Gift, auch gegen diese Gifte anpreise, und allen, die das Unglük haben, von der Gewalt dieser Gifte zu leiden, anrathe, es durch Mund, Aster und andere Wege in Gestalt von Tränken, Klistiren, Gurgelwassern, Fusbädern und andern Bädern anzubringen. Krapf a) fand es unter allen Mitteln, die er versuchte, um die beissende Schärfe des Gifthahnenfuses zu mildern, am wirksamsten.

Auch die Stufe der Wärme, welche das Wasser hat, trägt viel zu seiner Wirksamkeit bei. Laues Wasser hat nicht nur die Kraft, schädliche Schärfe, wenn sie von der Art eines Salzes ist, geschwinder aufzulösen und unthätiger zu ma-

a) a. t. a. O. S. 104.

www.dlibra.wum.edu.pl

chen, als kaltes; es reizt zu gleicher Zeit, vornemlich wenn es in groſer Menge getrunken wird, den Magen zum Erbrechen, ohne doch, wie die meiſten andern Brechmittel, durch eigene Schärfe die Schärfe des Giftes zu verſtärken, und befördert dadurch, wenn man bei Zeiten, ſeine Zuflucht zu dieſem Mittel nimmt, die Hinwegſchaffung des Giftes aus dem Leibe, ehe dieſes ſeine unſeligen Wirkungen über das Gebiet des Mägens verbreitet.

Dieſe Wirkungen des Waſſers laſſen ſich ungemein verſtärken, wenn man ſchleimige Wurzeln, Kräuter oder Früchte, Eibiſch, Pappeln u. dgl. damit kocht, wenn man Honig darinn auflößt, wenn man den Kranken zu gleicher Zeit milde Oele, Baumöl, Mandelnöl u. dgl., wenn man ihn Milch in groſer Menge trinken, wenn man ihn viele Butter ſpeiſen läßt; dadurch werden die ſcharfen Theilchen des Giftes noch mehr eingehüllt, noch unſchädlicher gemacht, die Theile des Leibes, welche ſie unmittelbar berühren, dagegen geſchüzt, die gewaltſame krampfartige Bewegungen und Schmerzen, ſelbſt das Erbrechen und die Bauchflüſſe, welche ſie erregen, am ſicherſten gemildert und geſtillt, und die Wunden und Geſchwüre, die ſie machen, am beſten geheilt.

Bei ſehr vielen dieſer Gifte ſind Säuren, und insbeſondere Gewächsſäuren, Eſſig, der Saft von Limonen, Berberisbeeren u. a. ſaueren Früchten, von Sauerampfer, Sauerklee u. a. ſauren Kräutern, ſelbſt ſaure Molken in groſer Menge getrunken, ſehr mächtige Gegengifte; bei den Arten des Hahnenfuſes hingegen ſcheinen ſie dieſe Kraft ſo wenig zu behaupten, daß ſie vielmehr die Schärfe derſelbigen noch ver-

www.dlibra.wum.edu.pl

mehren b) und Houlston c) sogar Laugensalze, in vielem Wasser aufgelößt, empfiehlt.

Nach botanischen Merkmalen sind diese scharfen Pflanzengifte so sehr von einander unterschieden, daß es wohl nicht möglich ist, allgemeine Kennzeichen anzugeben, wenn man nicht die oben gedachte dahin zählen will. Ich werde sie daher unter gewisse Ordnungen zu bringen suchen, denen sich eher gemeinschaftliche Charaktere anweisen lassen, Ordnungen, die, wie ich glaube, nicht sehr gezwungen sind. I) Einige gehören unter die Rotte der Gurkenarten. II) Andere sind Zwiebelgewächse. III) Bei andern hat die Blumenkrone einige Aehnlichkeit mit einer Larve (Personatae). IV) Andere kommen der Gattung der Hundswinde nahe (Apocyna oder Contortae). V) Bei andern stehen die Blumen in Dolden beisammen (Umbellatae). VI) Andere kommen in einigen Merkmalen dem Hahnenfus nahe (Ranunculis affines). VII) Die Hahnenfusarten (Ranunculi). VIII) Die Wolfsmilcharten (Euphorbiae). IX) Die Hülsengewächse (Leguminosae). X) Pflanzen, deren Befruchtungstheile nur eine einfache Bedekung haben (Incompletae). XI) Bäume und Stauden.

I) Gurkenarten, Cucurbitaceae.

1) Koloquinte, Cucumis Colocynthis. Linn. Blackwell Herbar. Pl. 441.

Ihr eigentliches Vaterland ist noch unbekannt.

---

b) Krapf a. e. a. O. S. 28. auch Honig, Zuker, Wein, verstärkten sie.

c) Medical and philosophical Commentaries by a Society at Edinburgh, London 8. B. VI. 1779.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sie ist ein Sommergewächs, und kriecht mit ihren Ranken auf der Erde. Stengel, Blätter, und die Gabeln, die zwischen den Blättern und dem Stengel stehen, sind rauh; der Stengel ist gestreift; die Blätter stehen auf eigenen ziemlich langen Stielen bald auf jener, dann wieder auf der andern Seite des Stengels; sie sind bestaubt, haarig, auf ihrer untern Fläche weis gedüpfelt, und in viele Stüke gespalten. An ihren Blumen hat der Kelch fünf Zähne; die Krone ist gelblicht und in fünf Stüke getheilt; bei einigen bemerkt man drei Staubfäden, die sich in einen Staubbeutel verlieren, und diese hinterlassen keine Frucht; bei andern hingegen ist ein vollkommener in drei Stüke getheilter Staubweg, und diese lassen einen glatten, bald mehr, bald weniger kugelrunden, zuweilen etwas birnförmigen oder breit gedrükten, bald grösern bald kleinern, bald gelblichtgrünen und einförmigen, bald gestreiften oder buntschäkigen oder pomeranzengelben Apfel nach sich; sein Mark ist leicht, weis, schwammig und äuserst bitter, und in diesem liegen die kleine, harte, glatte, gemeiniglich weisse Samen mit scharfem Rande.

Die alten Aerzte gebrauchten das Mark dieser Früchte blos getroknet oder auf verschiedene Art zubereitet, häufig allein oder mit andern Arzneien zum Abführen; allein sehr leicht erregt es übermäsigen Stuhlgang und Erbrechen, grausame Bauchflüsse, Entzündungen, und darauf folgende Verschwürungen der Gedärme, und nicht sehr selten den Tod d).

---

d) 1) J. Bauhin a. a. O. II. 2. S. 235. 2) Nicolai System. mater. medic. P. II. L. I. Sect. I. C. VII. S. 44. 3) Stolpart van der Wiel Observ. Cent. I. Obs. 41. S. 173. 4) Plater Observat. S. 858.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ein einiger Apfel erregte sehr heftigen Stuhlgang e), mit welchem in einem andern Falle Blut und Häute abgiengen f), ein Quintchen der daraus bereiteten Sterntüchelchen noch überdis Unmachten g); ein Trank von drei Aepfeln richtete einen Menschen so zu, daß er nur noch durch übermäßigen Genuß von Oel gerettet wurde h).

2) Prophetengurken, Cucumis prophetarum Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 589.

Sie sind in Arabien zu Hause, und kommen der Koloquinte sehr nahe; aber ihre Blätter sind stumpf, gezakt, wie ein Herz gestaltet, und in fünf Lappen getheilt; ihre Frucht abwechselnd gelb und grün gestreift, und mit langen Stacheln besezt. Sonst kommen sie in ihrer Bitterkeit und heftigen Wirksamkeit mit der Koloquinte überein i).

3) Eselskürbisse, Springgurken, Momordica Elaterium Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 108.

Die Pflanze wächst im mittägigen Theile Europens wild, und gehört zu den Sommergewächsen; ihre Oberfläche

---

e) Der Aufgus davon Schelhammer Ephemer. Acad. Caesar. Natur. Curios. Cent. X. Obs. 32.

f) Ant. Musa Brassavolus de medicamentis tam simplicibus, quam compositis catharticis, quae unicuique humori sunt propria. Tigur. 1555. S.

g) M. B. Valentini Ephemer. Acad. Caesar. Nat. Curios. Dec. III. ann. 3. obs. 78.

h) Nik. Tulp Observat. medic. Amsterd. 1641. 8. B. IV. K. 16. S. 218. und B. V. K. 25.

i) Puise mater. venenat. regni vegetab. S. 154. 155.

www.dlibra.wum.edu.pl

ist ganz rauch und gleichsam mit steifen Borsten besezt; sie hat keine Gabeln, wie sie die meisten übrigen Gurkenarten haben, ihre Blumen haben eine unangenehme blos grünlicht-gelbe Farbe, einen in fünf Lappen gespaltenen Kelch und eine in fünf Stüke getheilte Krone. Die männlichen drei Staubfäden mit einem gemeinschaftlichen Staubbeutel; die weiblichen einen Staubweg mit einem in drei Abschnitte gespaltenen Griffel; diese sizen mit den männlichen an der gleichen Pflanze, und hinterlassen eine Frucht, die, wenn sie vollkommen reif ist, von selbst, oder, wenn sie, auch noch so leise, berührt wird, mit einer gewissen Schnellkraft auf pringt.

Ihre Wurzel sowohl als ihre Frucht hat einen Saft, der höchst bitter schmekt, und äuserst heftig auf den Stuhlgang treibt; ein Trank von den Früchten durch Kochen mit Wasser bereitet, erregte einen so heftigen Bauchfluß, daß er nur durch narkotische Mittel gehemmt werden konnte k); der Saft der Frucht verursachte in den Augen, in welche er durch Zufall gesprüzt wurde, heftige Entzündung l).

4) Schwarze Gurken, Mulothria pendula Linn. Plumier Icon. Pl. 66. Abb. 2.

Diese Pflanze wächst in Kanada, Virginien und Jamaika wild, und gehört auch zu den Sommergewächsen; sie hat Gabeln, wie die meisten übrigen dieser natürlichen Horde; ihre Blätter haben die Gestalt eines Herzens, sind in Lappen getheilt, und sizen auf eigenen Stielen den Gabeln

---

k) Foreſt a. a. O. B. XXII.

l) Ant. Muſa Braſſavolus Examen omnium ſimplicium, quorum uſus eſt in publicis officinis. Rom. 1536. fol.

www.dlibra.wum.edu.pl

gegen über; ihre Blumen haben einen in fünf Abschnitte zerschlissenen Kelch, und eine glokenförmige aus einem zusammenhängenden Stüke bestehende Krone, und sizen, jede auf einem eigenen fadenförmigen Stiele; oft findet man auf einer Pflanze lauter Zwitterblumen mit drei Staubfäden und einem Staubwege, zuweilen neben diesen noch männliche, zuweilen männliche und weibliche durch einander; die lezte und erste hinterlassen eine dreifächerichte, kleine, schwarze, ovale, glatte Beere, welche viele Samen in sich hat.

Diese Beere ist es, welche von den Schwarzen in Amerika für giftig gehalten wird m).

II. Zwiebelgewächse.

Sie halten alle mehrere Jahre aus; die junge Pflanze entspringt aus einem einigen Blatte; sie hat, ehe sie sich enthüllt, die Gestalt einer Walze oder einer Keule, und ist in einen markichten Körper eingeschlossen, der viel dicker als sie selbst ist, und den sie wagerecht nur auf einer Seite durchbohrt; ihre Wurzel ist fleischig, und gemeiniglich, wie eine Zwiebel, in einige dicht auf einander liegende Schuppen eingekleidet. Einige haben gar keinen Stamm, und Blume und Blätter kommen unmittelbar aus der Wurzel; andere hingegen haben einen Stamm; dieser ist aber meistens ganz einfach, und seiner ganzen Länge nach mit Blättern oder mit Schuppen besezt; die Blätter sind ganz ungetheilt und ohne Einschnitt; sie haben keine eigene Stiele, und diejenigen, die an dem Stengel sizen, sizen meistens abwechselnd;

m) Rottböll Act. litterar. univerſ. Havnienſ. I. S. 284.

www.dlibra.wum.edu.pl

ihre Blumen sind schön und ansehnlich; sie haben theils drei, theils sechs Staubfäden, welche um den einzelnen Fruchtknoten herum stehen, und mit der Krone zusammenhängen, und auf dem Griffel oft drei Narben; sie haben keinen eigentlichen grünen Kelch; ihre Krone besteht bald aus einer zusammenhängenden Haut, welche aber in sechs Stüke getheilt ist, bald aber besteht sie aus sechs unterschiedenen Blättchen, welche in zwo Reihen stehen; das Samengehäus, das jede Blume nach sich läßt, ist troken, und besteht aus drei Schalenstüken, welche, wenn die Samen zeitig werden, oben zuerst aufspringen; es ist innwendig in drei Fächer getheilt, und in diesen Fächern sizen die Samen, welche gemeiniglich glatt sind, in einer Reihe an der Scheidewand vest.

Das Gift dieser Pflanzen ist vornemlich in der Wurzel, und, kurz ehe die Blätter ausbrechen, am wirksamsten, zu andern Zeiten des Jahrs entweder ganz unthätig oder doch viel milder. Dahin gehören:

1) Die Kaiserkrone, Fritillaria imperialis Linn. Knorr thesaurus rei herbar. hortensisque. Pl. k und k. 1.

Ihre Wurzel ist gros und gelb, und besteht aus grosen, sehr diken und saftigen Schuppen; ihr Stamm ist ganz einfach, und wächst gemeiniglich gerade, gegen vier Schuhe hoch; er ist stark und saftig, und in der Mitte ohne Blätter; die Blätter sind ohne allen Einschnitt am Rande, und ohne allen Ansaz; sie sizen unten an dem Stengel abwechselnd bald auf dieser, dann wieder auf der andern Seite, zu oberst hingegen stehen sie wie ein Wirtel, rings um den Stengel herum. Ihre Blumen haben keinen angenehmen

www.dlibra.wum.edu.pl

Geruch; sie sind meistens einfach und nur selten gefüllt, und sizen, jede an einem eigenen Stiel, am Gipfel des Stengels beisammen rings um denselben herum, bilden meistens einen, zuweilen auch zween oder drei Kränze, und haben sechs Staubfäden; ihre Krone hat einige Aehnlichkeit mit der Gestalt einer Gloke, und ist bald gröser bald kleiner; ihre gewöhnliche Farbe ist feuerroth, man hat sie aber auch hellroth, hellgelb, blaßgelb, und gelb gestreift; sie besteht aus sechs Blättchen, von welchen jedes etwas über seinem untern Ende ein rundlichtes glänzendes Grübchen hat, das beständig mit einem Safte angefüllt ist; ihre Narbe ist dreieckig und gefurcht; ihr Samengehäus ist länglicht, und hat drei scharfe Eken, und innwendig flache Samen.

Sie ist ursprünglich in den Morgenländern zu Hause, wird aber häufig in Gärten gezogen.

Schon der ekelhafte Geruch der frischen Wurzel läßt besorgen, daß ein Gift darinn verborgen seie; noch mehr zeigt es der scharfe beissende und brennende Geschmak, den der daraus fliesende Saft, wenn man ihn blos mit der Spize der Zunge kostet, offenbart n); am deutlichsten zeigen dieses die Zufälle, welche der Genus dieser Wurzel bei einem Hunde hervorgebracht hat.

El. Rud. Camerer o) lies im Herbste 1678 einem Hunde mittlerer Gröse ungefähr anderthalb Loth von dieser Zwiebel eingeben; nach einer Stunde schien er müd und verdrüslich

---

n) 1) Joh. Bauhin Hist. plant. univ. B. II. S. 697. 2) Wepfer a. a. O. S. 52.

o) Bei Wepfer a. a. O. S. 225.

www.dlibra.wum.edu.pl

drüslich zu sein, und nachher erbrach er gelben zähen Schleim; bald erfolgten Zittern und Zukungen in den Gliedern. Um die volle Wirkung des Giftes zu sehen, schnitt Cämerer den Hund noch lebendig auf; er fand den Magen ganz zusammengeschnürt, und in demselbigen Stükchen von der Zwiebel, die aber schon erweicht, und beinahe ganz zu Schleim zergangen war; die Häute des Magens waren alle röthlicht oder vielmehr blauröthlicht; die Gedärme ganz leer, leicht entzündet und angefressen; Leber, Milz und Gekrösdrüsen rothblau, und die Galle zäh, der Milchsaft gelb und zäh, und in geringer Menge vorhanden; den andern Tag waren schon alle Eingeweide verfault.

Aber auch Beobachtungen an Menschen erweisen diese Schädlichkeit; so erzählt Rhodius p) von dem Bedienten eines teutschen Edelmanns zu Padua, daß, als er die Zwiebel dieser Kaiserkrone, klein geschnitten und in süsem Oel und Salz gebraten, kaum gespeißt hatte, er mit allen den Zufällen zu kämpfen gehabt habe, welche sonst auf den Gebrauch des Schierlings erfolgen, und kaum durch die kräftigsten Mittel wieder hergestellt werden konnte.

Ob gleich der Schriftsteller, von welchem ich diese Wahrnehmung entlehnt habe, die Mittel nicht nennt, durch welche er seinen Kranken wieder zurecht gebracht hat, so läßt mich doch die Analogie vermuthen, daß auch hier die angezeigte allgemeine Mittel am besten dienen werden.

---

p) Emendat. et not. ad Scribon. Larg. Patav. 1655. S. 266.

www.dlibra.wum.edu.pl

2) Gemeiner Schwerdel, Gladiolus communis Linn. Knorr a. a. O. B. I. Pl. A. 5.

Er wächst im mittägigen Theile Europens wild, und ist in unsern Gärten sehr gemein; seine Blätter sind schwerdförmig; seine Blumen stehen etwas aus einander, bald mehr auf einer, bald auf zwo Seiten, und haben drei aufwärts steigende Staubfäden und einen einfachen Staubweg; ihre hochrothe Krone sizt auf dem Fruchtknoten, hat das Ansehen eines aufgesperrten Rachens, und ist sehr tief in sechs ungleiche Stüke getheilt, von welchen die drei obern zusammenstosen.

Sollte wohl die Schärfe ihrer Wurzel Grund genug sein, diese Pflanze mit Puihn 9) unter den giftigen aufzustellen?

3) Schwerdlilie, Iris.

Sie zeichnen sich durch schwerdförmige Blätter, noch mehr aber durch ihre Blumen aus; diese haben drei Staubfäden und einen Staubweg mit drei Narben, welche das Ansehen von Blumenblättchen, und die Gestalt einer Mönchskappe haben, und in zwo Lippen getheilt sind; ihre Krone sizt auf dem Fruchtknoten auf, und besteht aus sechs ungleichen Blättchen, welche abwechselnd nach auswärts gebogen sind; an mehreren derselbigen bemerkt man in gewissen Theilen eine bedeutende Schärfe z. B.

α) teutsche Schwerdlilie, Iris germanica Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 69.

---

9) a. L. a. O. S. 24.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sie ist in Teutschland, Frankreich und in der Schweiz zu Hause, und hat glatte Blätter, die, wie eine Sichel, gekrümmt, und nicht so lang sind als der Blumenschaft; dieser trägt mehrere Blumen mit blauer Krone, deren auswärts gebogene Blätter mit Haaren besezt sind.

Sollte die Schärfe, welche ihre Wurzel, so lange sie frisch ist, besizt, ihre Stelle unter den Giften r) rechtfertigen?

β) Wasserschwerdlilie, Iris Pseudacorus Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 261.

Sie wächst in ganz Europa in Teichen und Wassergräben, und läßt sich leicht an ihren glatten blaßgelben Blumenkronen unterscheiden, an welchen die auswärts gebogene Blättchen kürzer als die Narben sind.

Ihre Blumen sind scharf s).

γ) Stinkende Schwerdlilie, Iris foetidissima Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 158.

Sie wächst in England, Frankreich und Italien wild, und hat in allen ihren Theilen einen höchst unangenehmen Geruch; ihr Blumenschaft ist auf der einen Seite gerundet, auf der andern scharfkantig, und so hoch, als die Blätter; ihre Blumen haben einen dreikantigen Fruchtknoten, dessen Kanten durch eine Furche der Länge nach entzwei getheilt sind; ihre Krone hat eine traurige blaue Farbe und eine ganz glatte Oberfläche; die äusern Blättchen derselbigen ha-

r) Buihn a. e. a. O.

s) Ebenders. a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

ben an ihrem schmälern Ende unten Falten; die innern sind sehr stark nach aufen gebogen, und länger, als die Narben.

Ihre Wurzel, Blumen und Samen sind sehr scharf [t]).

δ) Virginische Schwerdlilie, Iris virginica Linn. Jacquin Icon. plant. varior. Cent. II. fasc. X. t. 3.

Sie wächst an wässerichten Stellen wild, und zeichnet sich durch einen zweischneidigen Blumenschaft aus; ihre Blumen haben einen dreikantigen Fruchtknoten, und eine ganz glatte Krone.

Auch sie ist scharf [u]).

4) Tazette. Narcissus Tazetta Linn. Knorr a. a. O. B. I. Pl. N. 3.

Sie wächst in der Provence, in Spanien und Portugall an etwas feuchten Stellen nach der Küste zu wild, und wird wegen des angenehmen Geruchs ihrer Blumen häufig in Töpfen gezogen.

Ihre Blätter sind flach; ihre Blumen sizen, mehrere zusammen in einer Scheide, und haben sechs Staubfäden und einen Staubweg und um diese Theile herum einen aus einem zusammenhängenden Stüke bestehenden glokenförmigen gefalteten und abgestuzten Kranz, der dreimal kürzer als die Krone ist; diese sizt auf dem Fruchtknoten auf, und besteht aus sechs gleichen Blättchen.

Sie steht bei den Japanesen im Rufe eines Giftes [x]).

---

t) Ebendersf. a. e. a. O. S. 25.

u) Ebendersf. a. e. a. O.

x) Thunberg Flor. japon. S. 131.

www.dlibra.wum.edu.pl

5) Perſeylilie, Amaryllis ſarnienſis Linn. Ehret plant. ſelect. icon. Pl. 9. Abb. 3.

Sie iſt in Japan zu Hauſe, wird aber häufig in Perſey gezogen.

Ihre Blumen ſizen mehrere zuſammen, in einer Scheide, und haben ſechs ungleiche Staubfäden, welche an der Mündung der Röhre der Blumenkrone ſizen, und, ſo wie der Staubweg mit der dreiſpaltigen Narbe, eine aufrechte Stellung haben; ihre Krone ſizt auf dem Fruchtknoten, hat die Geſtalt einer am Rande umgerollten Gloke, und iſt ſehr tief in ſechs gleichbreit lanzenförmige Abſchnitte getheilt, welche, wie Stralen eines Sterns, auseinander laufen.

Auch ſie ſteht bei den Japaneſen im Verdacht eines Giftes y).

6) Prachtlilie, Glorioſa ſuperba Linn. Conenelin Hort. Amſtelaed. B. I. Pl. 35. Schneevogt Icon. plant. rar. Pl. 25.

Sie iſt in Malabar zu Hauſe.

Ihre Blätter verlieren ſich in Gabeln; ihre Blumen haben ſechs Staubfäden und einen Staubweg mit ſchiefem Griffel; die Krone umfaßt den Fruchtknoten, iſt umgebogen, und beſteht aus ſechs am Rande wellenförmig gekrausten und in eine lange Spize auslaufenden Blättern; ihr Samengehäus iſt troken und in drei Lappen getheilt; die Samen beerenartig.

---

y) Ebendeſſ. a. e. a. O. S. 132.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ihre Wurzel ist scharf, und soll schon in geringer Menge tödlich wirken z).

7) Meerzwibel, Scilla maritima Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 591.

Sie wächst an den Küsten des Mittelmeers.

Ihre Zwibel besteht aus fleischigen Häuten, welche bald roth bald weis sind; ihre Blätter stehen senkrecht und sind lanzenförmig; ihr Blumenschaft zeigt sich vor den Blättern, und ist sehr lang, und zwischen den Blumen, deren er viele trägt, mit gleichbreit-lanzenförmigen, in der Mitte gebrochenen, dann aufwärts gebogenen, und unten mit einem Sporen versehenen Deckblättern besezt; ihre Blumen haben sechs fadenförmige Staubfäden, einen Staubweg und eine Krone, welche bald abfällt, den Fruchtknoten umfaßt, und aus sechs weit aus einander stehenden Blättchen besteht.

Ihre Zwibel ist ausnehmend scharf; der Saft derselbigen ist jungen Hunden und Kaninchen, so wie der Brodteig, in welchen sie eingehüllt, im Bakofen war, Hühnern a) und Schweinen tödlich.

8) Röhrichter Affodill, Asphodelus fistulosus Linn. Gärtner de fruct. et semin. plant. Cent. I. Pl. 17. Abb. 6.

Er wächst in der Provence, in Spanien und Kandien wild.

---

z) F. Hermann bei Burmann Flor. indic. S. 82.

a) Puihn a. t. a. O. S. 78.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sein Stengel ist nakend; seine Blätter senkrecht, pfriemenförmig, gestreift und beinahe röhricht; seine Blumen haben sechs Staubfäden, welche nach unten zu breiter werden, und auf der sechs Klappen des Honigbehälters sizen, und einen Staubweg der unten zuerst von diesem Honigbehälter, und dann von der Krone umschlossen wird; diese ist in sechs Abschnitte getheilt.

Seine Wurzel ist ausnehmend scharf b).

9) Knoblauch, Allium sativum Linn.

Er unterscheidet sich durch seine flachen Blätter mit glattem Rande, durch die Zwibelchen in seinen Dolden, durch die drei langen Spizen an seinen Staubfäden und durch seinen eigenen Geruch leicht von andern Lauch- und Zwibelarten.

Seine Zwibel erregt Röthe und Blasen auf der Haut, und der daraus gedrükte Saft, soll einen Menschen, der ihn einnahm, getödtet haben c).

10) Zeitlosen, Herbstzeitlosen, Herbstblume, Lichtblume, Spinnblume, wilde Safranblume, Wiesensafran, Mattsafran, nakende Hure, Hundshode. Colchicum autumnale Linn. Knorr a. a. O. B. I. Pl. z. 1.

Sie wächst in ganz Europa häufig auf Wiesen, und ihre prachtvolle Blumen sind die lezte Zierde der grünenden Anger.

---

b) Ebendersf. a. e. a. O. S. 79.

c) Ebendersf. a. e. a. O. S. 77.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ihre Wurzel ist zu Anfang des Sommers saftig und fleischig; sie steht einen bis zween Zolle tief unter der Erde, und hat in ihrer Gestalt einige Aehnlichkeit mit einem umgekehrten Herzen; unter einem hellbraunen Häutchen hat sie weisses Fleisch; ihre eine Seite ist gewölbt und der Länge nach gestreift, die andere aber platt und mit einer halb cylindrischen Kerbe bezeichnet; in dieser Kerbe sizt eine dünne, weisse und ungetheilte Scheide mit einer stumpfen, grünlichten, gestreiften Spize, aus welcher die Blumen hervorkommen, unten wird diese Scheide breiter, diker und vester, und gibt sehr viele einfache Zasern von sich; dis ist die junge frische Wurzel, aus welcher im Herbste die Blumen hervorschiesen, und welche an der grosen Zwibel vest anwächst; sie ist nach dem Unterschiede ihres Alters in zwo, drei oder mehrere dunkelbraune Häute eingehüllt; aus jeder Scheide kommen im Herbste zwo bis sieben oder auch mehrere Blumen hervor. Diese Blumen sind immer ohne Geruch, und durch die Kunst der Gärtner zuweilen gefüllt; sie haben ein schönes Ansehen und mannigfaltige Farben, die aber immer in die weisse oder röthlichte spielen; ihre Krone, die aus einem zusammenhängenden Stüke besteht, hat eine sehr enge ost gegen zwölf Zolle lange Röhre, die sich nach oben zu immer mehr erweitert, und in sechs ovale Abschnitte theilt; in der Röhre dieser Krone sizen die sechs Staubfäden, die aus ihren Staubbeuteln einen gelben Staub ausstreuen, und drei fadendünne sehr lange und an ihrem Ende umgekrümmte Griffel, welche auf einem einzelnen Eierstok aufsizen.

Die Schönheit dieser Blumen ist jedoch von kurzer Dauer, nach wenigen Tagen verwelken sie, und dann fängt die Frucht an sich zu bilden. Die Kälte der Jahreszeit, zu

www.dlibra.wum.edu.pl

welcher dieses geschieht, würde dieser Absicht der Natur im Wege stehen, wenn sie nicht die weise Fürsicht gebraucht hätte, sie den Winter über unter der Erde zu verbergen, und ihr noch überdis eine Bekleidung von Blättern zu geben; diese kommen zu drei oder vier aus einer Zwibel, aber erst im Mai oder Brachmonat aus der Erde hervor; ihre Breite und Länge ist beträchtlich, ihre Oberfläche glatt, ihre Stellung aufrecht, ihre Gestalt fast, wie die Gestalt eines Eies, nur daß sie an beiden Enden spiziger sind; sie verlieren sich unten in eine lange Scheide, mit welcher ein Blatt in das andere gestekt ist; so wie die Blätter wachsen, so nimmt auch die Frucht zu, welche sie einschliesen; diese hat, wenn sie vollkommen reif ist, einigermasen die Gestalt einer Birne, ist runzelicht und innwendig in drei Fächer getheilt, in welchen sehr viele rundlichte, runzelichte und schwarzbraune Samen liegen.

Schon das, daß das Vieh diese Pflanze, die so häufig zu einer Zeit, da es an anderm grünen Futter schon ziemlichen Mangel hat, auf den Wiesen wächst, auf dem Felde stehen läßt, macht sie verdächtig; ihre Wurzel hat überdis, vornemlich, wenn sie zu Anfang des Sommers ausgegraben wird, einen ungemein scharfen und ekelhaften Geschmak d); ihr Saft macht, wenn man ihn nur kostet, die Zähne ganz stumpf e) und den Speichel unerträglich bit-

d) So fand ihn wenigstens von Störk Libell. quo demonstratur: Colchici autumnalis radicem non solum tuto exhiberi posse hominibus sed et usu ejus interno curari quandoque morbos difficillimos. Vindobon. 1763. S. 8.

e) Marges in Roux Iournal de medecine, de chirurgie &c. B. XXIII. Paris 1764. Iul. n. 2. S. 32.

www.dlibra.wum.edu.pl

ter f); die Spizen der Finger, mit welchen man die Wurzel hält, müssen davon eine Zeitlang die natürliche Empfindung g), und selbst der Dampf, der sich bei der Zubereitung des Zeitlosenessigs mit der Luft vermengt, reizt Nase, Schlund, Brust und Harnwege auf eine unangenehme Weise h), ihr Genuß verursacht Hunden starke Grimmen i), oder ist ihnen k), so wie dem Hornvieh l), welches davon eine harte Geschwulst des Bauchs, insbesondere der Magengegend, Aufhören des Wiederkauens, und Verstopfung bekommt m), gemeinen und Damhirschen tödlich; auf ihn erfolgen bei diesen Thieren Entzündungen und Zusammenschnürungen des Magens und der Gedärme n), Ablösung ihrer innersten Haut und Verhärtung der übrigen o), heftiges Erbrechen p) und Bauchflüsse, mit welchen zuweilen Blut abgeht q), Zittern

f) Ebenderf. a. e. a. O.

g) Störk a. e. a. O. S. 25.

h) Marges a. e. a. O. S. 29.

i) Fünf Stüke davon, ohne jedoch tödlich zu werden. Philoſoph. Transact. Vol. XXVI. 1712. S. 485. Ein anderer Hund wurde davon ganz blind. Medic. Muſeum. III. n. 5.

k) 1) Störk a. e. a. O. S. 21. 23. 2) Kratochvill diff. de radice colchici auctumnalis. Francof. ad Viadr. 1764. S. 48.

l) 1) Scopoli Flor. carniol. Vienn. 1760. S. 225. 2) Hacquet a. a. O. S. 14. ꝛc.

m) Hacquet a. a. O. S. 15. 16.

n) 1) Scopoli a. e. a. O. 2) Störk a. e. a. O. S. 23.

o) Störk a. e. a. O. S. 21—23.

p) Ebenderf. a. e. a. O. S. 18. 21.

q) Ebenderf. a. e. a. O. S. 20 ꝛc. 22.

www.dlibra.wum.edu.pl

und Zukungen in den Gliedern und in dem Unterleibe r), Beängstigungen s), Mattigkeit, Kraftlosigkeit t), und zähe, stinkende und unmäßige Schweiße u).

Dieses scheint auch der Grund zu sein, warum sie die Alten unter die scharfen Gifte rechneten, und noch Börhaave x) und Macbride y) ihren innerlichen Gebrauch gänzlich verwerfen.

Aber auch bei Menschen bringt sie, innerlich genommen, ähnliche gefährliche Wirkungen hervor; auf ihren Genus erfolgen Zusammenschnüren der Kehle z), Erstarren und Unempfindlichkeit der Zunge a), Brennen in den Lippen, stärkerer Zufluß des Speichels b), starker, ungewöhnlich häufiger und mit brennenden Schmerzen begleiteter Trieb auf den Harn c), leere Reize zum Stuhlgang, Brennen im Magen, unbeständige Schmerzen in den Gedärmen, unerträgliche Kopfschmerzen, Reiz zum Schluchzen, unmäßiger Durst,

---

r) Ebenderf. a. e. a. O. S. 19. 20.

s) Ebenderf. a. e. a. O. S. 20.

t) Ebenderf. a. e. a. O. S. 21.

u) Ebenderf. a. e. a. O.

x) Inſtitut. medic. §. 1137.

y) Methodical introduction to the theory and practic of phyſic. 1772. S. 601.

z) Börhaave bei Haller Hiſtor. ſtirp. Helv. indig. B. II. S. 125.

a) v. Störk a. e. a. O. S. 9. Verſ. 1.

b) Marges a. a. O. S. 33.

c) v. Störk a. e. a. O. S. 10. Verſ. 2. und S. 12. Verſ. 3.

www.dlibra.wum.edu.pl

verdorbene Eßluſt d), grauſame oft blutige Bauchflüſſe e) und zuweilen der Tod f).

Auch die Blätter ſind, ſo lange ſie nicht getroknet ſind, dem Hornvieh tödlich g).

Selbſt die Blumen haben eine ungemeine Schärfe; ihr Gebrauch zieht tödliche Mattigkeit und unerträgliche Schmerzen in den Gedärmen nach ſich; Garidel ſah h) darauf bei einer Magd, welche drei derſelbigen auf Anrathen eines Dorfarztes zu ſich genommen hatte, den Tod erfolgen.

Eben ſo haben die Samen eine giftige Schärfe; ihr Gebrauch tödtet Hühner, und erregt bei Menſchen heftiges Erbrechen mit Zittern und andern krampfichten Bewegungen, ſchnellem und kleinem Aderſchlag, Schmerzen im Unterleib i) grauſame Bauchflüſſe, Zukungen, Herzklopfen, unausſtehliche Bangigkeiten, und nicht ſelten den Tod k).

---

d) 1) Marges a. e. a. O. 2) v. Störk a. d. e. a. O. 3) Brookes natural hiſtory of vegetables. B. VI. Lond. 1763. S. 164.

e) 1) Brookes a. e. a. O. 2) Ludovici Pharmacia moderno ſeculo adplicanda. Diſſ. I. 1685. S. 112. 3) Val. Cordus Annot. in Dioſcorid. L. IV. C. 72. S. 394.

f) Bei einem geſunden ſtarken Bauren nach drei Tagen. Brookes a. e. a. O.

g) Hacquet a. e. a. O. S. 14.

h) a. a. O. S. 123.

i) Hopf Commentarien der neuen Arzneikunde. Tübingen 8. B. VI. S. 318.

k) 1) Siegesbeck Miſcellan. Vratislav. 1723. S. 679. 2) Peyer Paeonis et Phythagorae exercit. anatom. et medico-forenſ. Baſil. 1682. Exerc. 50. 3) Bei zween Kna-

www.dlibra.wum.edu.pl

Geschichte [l]).

Etliche kleine Knaben von drei bis vier Jahren spielten mit den glatten Blättern und runden Samenbehältnissen der Zeitlosen, öfneten sie, kosteten den darinn enthaltenen Samen, und genossen, weil er ihnen ziemlich süs schmekte, ziemlich viel davon. Bald darauf und noch währendem Spielen wurden sie sehr krank, und fiengen an, sich heftig zu erbrechen, und dadurch den Samen wieder von sich zu geben; ihre Eltern gaben ihnen einigemale hinter einander warme Milch; das eine Kind genas auch wieder, aber das andere starb geschwind unter dem Erbrechen dahin.

Gegen alle Zufälle, welche der unbedachtsame Genuß der verschiedenen Theile dieses Gewächses erregt, sind Essig und andere Pflanzensäuren in groser Menge genommen, ölichte, schleimige, und aus Milch [m]) zubereitete Klistire und Getränke häufig gebraucht, und nach Beschaffenheit der Umstände mit etwas Gewürz, oder auch, wenn die Zufälle zu gewaltsam sind, sparsam mit Mohnsaft versezt, die besten Rettungsmittel [n]).

---

ben Agricola Ammonius Medic. herbar. L. II. Basil. 1539. S. 90. 4) Bei einigen Kindern im bernischen Dorfe Schoren. Vicat a. a. O. S. 45. 5) Bei zwei Kindern in Oberkrain. Hacquet a. e. a. O. 6) Bei zwei andern Hopf a. e. a. O. S. 319. 320.

l) Siegesbek a. e. a. O.

m) Fleisiges Trinken kühwarmer Milch rettete ein Kind, das diese Samen zu sich genommen hatte. Hopf a. e. a. O. S. 318. 319.

n) Hacquet empfiehlt a. e. a. O. S. 19. u. f. bei dem Hornvieh Sauerampfer und den Absud von Tabak mit Wasser vermengt dagegen.

www.dlibra.wum.edu.pl

Dieser unläugbaren Erfahrungen ungeachtet, in welchen vornemlich die Wurzel dieser Pflanze giftige Schärfe äuserte, gab es doch schon in älteren Zeiten Aerzte, die sie als Arznei gebrauchten. Ich will von denen nicht sagen, die sie äuserlich als Anhängsel verordneten, oder als Salbe in den After schmieren liesen, und ihr unter dieser Gestalt vorzügliche Kräfte in Pest, Gicht, Stein und andern schmerzhaften Krankheiten zuschrieben o), nicht von denen, welche sie innerlich bis zu einem halben Lothe gebrauchten, um auf den Stuhlgang zu treiben p), aber das scheinen die Erfahrungen eines v. Störk q), Collin r), Ehrmann s), Marges t), Planchon u), anderer französischer x) und teutscher y) Aerzte zu zeigen, daß eben diese Wurzel zu Anfang des Sommers ausgegraben, und entweder geröstet z) oder

---

o) 1) G. W. Wedel de colchico veneno et alexipharmaco. Ien. 1719. 2) Wilhelmi Colchicum als ein Mittel wider die Pest. Leipzig 1721.

p) Jak. Prävot Medicin. pauper. et de venen. Francof. 1641. S. 36.

q) Libellus, quo demonstratur: Colchici autumnalis radicem &c.

r) 1) Ebendas. 2) Observation. B. II. art. I.

s) Diss. de colchico autumnali. Basil. 1774.

t) a. a. O. S. 20—27.

u) Ebendas. B. XXIII. S. 324 ꝛc. und B. XLI. S. 333.

x) Bei Hautesiers Recueil periodique des observations &c. B. II.

y) Die Verfasser der Comment. Lipf. B. XVII. Th. 2. S. 304.

z) So gebrauchte sie Ehrmann a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

durch Zusaz von Essig und Honig gemildert a), wo nicht mit glüklicherem b), doch mit eben so glüklichem Erfolge, als die Meerzwibel c), in der hartnäkigsten Wassersucht gegeben werden kann.

Wenn einige Aerzte den innerlichen Gebrauch dieser Wurzel wegen ihrer zu heftigen Schärfe verdammten d), oder, um schlimmere Folgen zu verhüten, genöthigt waren, von ihrem Gebrauche abzustehen e), so verwarfen sie andere, entweder blos durch den Geschmak f), oder durch Erfahrungen an gesunden g) und kranken h) Menschen geleitet, als

---

a) Dis ist das gewöhnliche Verfahren, das Störk zuerst vorgeschlagen hat.

b) Das behauptete Störk a. e. a. O.

c) Darinn stimmt die Meinung der Comment. Lipf. a. a. O. mit den Erfahrungen eines Collin und Planchon überein, die sehr oft einen Zusaz von andern Mitteln nöthig hatten, um ihre Absicht zu erreichen.

d) Wie Macbride a. e. a. O. und einige ältere Aerzte vor ihm.

e) Wie de Berge bei de Roux Iournal de medecine. B. XXII. S. 526.

f) vornemlich Kratochvill a. a. O. und H. v. Haller der a. e. a. O. S. 126. ihren Geschmak ganz mild und ohne Schärfe fand.

g) Krotochvill nahm sie a. e. a. O. ohne die mindeste Wirkung bis zu einem Lothe zu sich und v. Störk sah sie bei Trieste und sonst in Krain frisch und in groser Menge ohne allen Schaden speisen. Libellus quo continuantur experim. et obfervat. circa nova fua medicamenta. Vindob. 1765. S. 233.

h) 1) Planchon a. a. O. B. XXII. S. 526. 2) Medical. obfervat. and inquir. by a Society of phyficians in London.

www.dlibra.wum.edu.pl

unthätig und kraftlos. Wahrscheinlich beruht der grose Unterschied in diesen Beobachtungen auf der verschiedenen Jahrszeit, zu welcher die Wurzel ausgegraben worden i), auf ihrem Standorte k), auf ihrem verschiedenen Alter l) und auf der verschiedenen Zubereitung des Zeitlosenhonigs, oder andern Fehlern bei dem Gebrauche selbst m).

Eben diese Wurzel kann sehr wohl auch auf eine gute Stärke benuzt werden, wenn man sie wäscht, schabt, zu Brei stampft und ausdrükt, das ausgedrükte Mark mit Wasser verdünnt und rührt, das, was sich dabei zu Boden sezt, sammlet, und, nachdem man das darüber stehende Wasser abgegossen hat, ohne Hize troknet n).

Die Blätter dieser Pflanze, welche das Vieh auf dem Felde stehen läßt, und unter dem Futter ausliest, kann man zum

---

Lond. B. III. 1767. ohne alle harntreibende Kraft. Medical museum III. n. 5.

i) Maranta fand sie Method. cognosc. simplicium. Venet. 1559. S. 3. H. v. Haller kostete a. a. O. S. 126. die Wurzel im Herbst, auch v. Störk fand sie zu dieser Jahrszeit unschädlich, aber zu Anfang des Sommers sehr scharf a. e. a. O. S. 141.

k) Vielleicht ist sie deswegen an den meisten Orten giftig, in Krain aber unschädlich. v. Störk a. e a. O. S. 233.

l) Frisch fand sie Störk scharf, aber, nachdem sie einige Zeit gelegen hatte, geschmaklos und meelig. Libell. quo demonstratur: Colchici &c. S. 8.

m) Vielleicht liegt darinn der Grund, daß einige Aerzte den Zeitlosenhonig schädlich oder kraftlos, oder doch weit schwächer als Meerzwibelhonig fanden.

n) Parmentier Avantcoureur 1773.

www.dlibra.wum.edu.pl

zum Färben der Eier gebrauchen; eben damit kann man, wenn man sie entweder frisch quetscht, und das Vieh damit reibt, oder, wenn man es mit dem Wasser, worinn diese Blätter gekocht worden sind, wäscht, dem Hornvieh die Läuse vertreiben.

Die Türken giesen ihre Blumen mit einer Art Wein an, und berauschen sich in diesem Getränke.

Ich wage es nicht, nach dem Vorgang mehrerer ältern und neuern Aerzte, auch die Wurzeln anderer Zwibelgewächse der Narcissen, Hiacinthen, Lilien und Tulpen hieher zu zählen, weil ich in den Jahrbüchern der Aerzte kein Beispiel aufgezeichnet finde, wo der Genus derselbigen den Tod oder sonst bedeutenden Schaden gebracht hätte, sondern in mehrern blos Erbrechen und Bauchflüsse darauf erfolgt sind, welche sich bald wieder stillen liesen.

III. Personatae.

Diese, die in der Pracht ihrer Blumen zunächst an die vorhergehende gränzen, haben keinen oder doch nur einen schwachen Geruch, aber einen scharfen Geschmak. Ihr Stengel ist rund; ihre Blätter sizen wechselsweise an dem Stengel, oder kommen unmittelbar aus der Wurzel; ihre Blumen haben sowohl an dem Kelch als an der Krone mehrere Abtheilungen; die leztere besteht immer aus einem zusammenhängenden Stüke, und hat eine schöne Farbe; jede Blume hat vier bis fünf Staubfäden, und alle nur einen Staubweg; jede hinterläßt ein trokenes Samengehäus, das bei einer Art inwendig nur eine Zelle hat, und aus fünf Scha-

www.dlibra.wum.edu.pl

lenstüken besteht; bei den übrigen aber innwendig in zwei Fächer getheilt, und aus zwei Stüken zusammengesezt ist.

1) Läusekraut, Sumpfläusekraut, braun Läusekraut, Rodel, groser staudiger Rodel, Sumpfrodel, gros Fistelkraut, Pedicularis palustris Linn. Flor. danic. Pl. 225.

Es wächst in ganz Europa, vornemlich in den mitternächtlichen Theilen desselbigen auf feuchten Angern, wo es im Brachmonate blüht.

Seine Wurzel ist einzeln, dik und veste, sie geht im Herbst aus, und treibt nur einen einigen Stengel; dieser wächst aufrecht und bis zween Schuhe hoch, und theilt sich in sehr viele Aeste; seine Blätter sind glatt und gefiedert; sie bestehen aus mehreren, ungefähr 21 langen Blättchen; seine Blumen sizen jede auf einem eigenen Stiele, in den Winkeln, welche die Blätter mit dem Stengel oder den Aesten machen, und stehen, nach ihrem Gipfel zu, in einer lokern Krone beisammen; ihr Kelch ist in fünf ungleiche Abschnitte gespalten, und etwas weniges haarig, unten bauchig, oben aber von beiden Seiten zusammengedrükt; ihre Krone ist schön purpurroth, glatt und in zwei Lippen getheilt, von welchen die obere gewölbt und ungetheilt ist, in einen stumpfen Schnabel ausläuft, und sich zu beiden Seiten in einen feinen Stachel verliert, die untere aber schief steht. Jede Blume hat vier Staubfäden mit gelben Staubbeuteln, von welchen zween länger und zween kürzer sind; das Samengehäus, welches jede nach sich läßt, ist schief und rund, beinahe wie ein Ei, und verliert sich gleichsam in einem Schnabel; es ist voll ekiger und brauner Samen, welche in viele feine Häute eingehüllt sind.

www.dlibra.wum.edu.pl

Der brennend scharfe Geschmak dieser Pflanze o), der Widerwillen, den das Vieh dagegen äusert, da sie, Ziegen ausgenommen, alles andere auf der Weide stehen läßt p), und Hornvieh und Wollvieh, wenn es sie aus Hunger oder Krankheit frißt, Schaden davon leidet q), selbst der Ruf, in welchem sie bei den Alten, als ein giftiges Gewächs stund, verschaffen ihr einiges Recht unter dieser Abtheilung von Giften, ob wir gleich kein überzeugendes Beispiel von ihren giftigen Kräften auf den menschlichen Leib haben, so lange nemlich das Gegentheil noch nicht erwiesen ist r).

Die Mittel, ihren schädlichen Wirkungen Grenzen zu sezen, sind die allgemeinen, die ich oben angegeben habe, und vermuthlich kann auch sie, wie andere scharfe Gewächse, vornemlich in äuserlichen Krankheiten, welche dergleichen erfordern, gebraucht werden.

2) Gewöhnliches Gnadenkraut, Gratiola officinalis Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 411.

Es wächst im mittägigen Theile Europens, selbst in der Schweiz, in Teutschland, vornemlich in Oberteutschland und in Brabant wild, und hält mehrere Jahre aus.

---

o) Gleditsch vermischte physikal. botan. ökonomische Abhandlungen. Halle. 8. Th. III. 1767. S. 377.

p) 1) Ebendersf. a. a. O. 2) Gunner Flor. Norweg. B. I. 8. 43. n. 87.

q) Gunner a. a. O. Hornvieh, das aus andern Gegenden dahin gebracht wird, und die Weide noch nicht kennt, bekommt davon tödliches Blutharnen.

r) J. Bauhin a. a. O. B. III. Th. 2. S. 438.

www.dlibra.wum.edu.pl

Seine Blätter sind wie eine Lanzette zugespizt und am Rande wie eine Säge gezakt; seine Blumen sizen auf eigenen Stielen und haben vier Staubfäden, von welchen jedoch zween ohne Staubbeutel sind, und einen Staubweg, welcher unten von den Blüthendeken umschlossen wird; ihr Kelch besteht aus sieben Blättchen, von welchen zwei nach aussen zu abstehen; ihre Krone aber aus einem zusammenhängenden Stüke; sie ist aber in vier Abschnitte gespalten, übrigens unregelmäsig und rükwärts gebogen; jede Blume hinterläßt ein trokenes Samengehäus, welches inwendig in zwei Fächer getheilt ist.

Sie wirkt heftig auf Stuhlgang und soll schon tödliche Bauchflüsse erregt haben s).

Dessen unerachtet hat man sich dieses Krautes nicht äuserlich t), sondern auch innerlich u), so wie der Wurzel,

---

s) Puihn a. e. a. O. S. 20.

t) 1) A. Cäsalpin de plantis. S. 265. 2) Zwinger Theatr. prax. medic. Th. I. S. 531. 3) J. A. S. Zobel diss. de gratiola, ejusque usu praesertim chirurgico. Erlang 1783. 4. 4) Wendt vom Erlanger Krankeninstitut, 5te und 6ste Nachricht. S. 24. 5) Tissot bei J. A. Murray Apparat. medicam. Goetting. 8. B. II. Edit. alt. cur. Althof. 1794. S. 238. 6) Hufeland Iournal der praktischen Arzneykunde. B. I. H. 1. S. 89.

u) 1) Bürkel diss. de gratiola. Argent. 1738. 4. 2) Kosteriawsky diss. de gratiola. Vienn. 1775. 3) Coste und Willemot Essays botaniques, chymiques et pharmaceutiques sur quelques plantes indigénes substituées avec succès à des vegetaux exotiques, aux quels on a joint des observations nominales sur les mêmes objets. Nancy 1778. 8. S. 39—44.

www.dlibra.wum.edu.pl

in trokenem Pulver, in Wein, Milch oder Wasser, womit man sie anbrüht, oder, was beide lezte betrift, kocht, oder im eingedikten Saft, oder in dem durch Anbrühen mit Wasser daraus bereiteten Extrakte, als eines stark abführenden Mittels, um Würmer abzutreiben x), in mancherlei Arten der Wassersucht y), in Schwermuth und Raserei z), in allerlei venerischen Geschwüren, auch, wenn sie die Knochen angegriffen haben a), in Fallsucht, vornemlich wenn sie von Würmern kam b), in Hautkrankheiten c) und bei sehr starker Verschleimung und Reizlosigkeit d) mit ausnehmendem Erfolge bedient.

---

x) 1) Theodor Tabernämontanus Kräuterbuch B. II. S. 84. 2) Angelus Sala Essent. vegetab. Sect. 5. c. 9. S. 158. 3) Fr. Ehrhardt Beiträge zur Naturkunde ꝛc. B. II.

y) 1) A. v. Störk mediciniſch-praktiſcher Unterricht B. II. S. 36. 2) Rudolph bei C. B. Sommer de virtute et vi medica gratiolae officinalis Linnaei in curandis morbis tum internis tum externis Rigae 1796. 4. S. 17. ſelbſt in Bruſt- und Kopfwaſſerſucht. Sommer a. e. a. O. S. 20. 21.

z) 1) Lentin bei Hufeland a. e. a. O. S. 71. 2) A. v. Störk a. e. a. O. S. 32. 3) W. H. S. Buchholz Beiträge zur gerichtlichen Arzneikunde ꝛc. B. IV. 1793. 4) Chr. E. Fiſcher Verſuch einer Anleitung zur mediciniſchen Armenpraxis. Goettingen 1799. 8. n. 6.

a) A. v. Störk a. e. a. O. S. 50.

b) 1) Rudow bei Sommer a. a. O. S. 17. 2) Sommer ebendaſ. S. 17—19.

c) G. F. de la Vigne diſſ. de gratiola officinali Linnaei ejusque uſu praecipue in morbis cutaneis. Erlang 1799. 8.

d) Hufeland über die Natur, Erkenntniß und Heilart der Skrofelkrankheit. Jena 1795. S. 167.

www.dlibra.wum.edu.pl

3) Trompeterblume, Bignonia.

Diese Gesträuche sind auserhalb Europa, meist in den wärmern Theilen von Amerika zu Hause.

Ihre Blumen haben vier Staubfäden, von welchen zween kürzer sind, als die andern, einen Staubweg und einen becherförmigen in fünf Abschnitte gespaltenen Kelch; ihre Krone ist unten bauchig, der Schlund derselbigen glokenförmig und ihr Rand in fünf Abschnitte gespalten; jede Blume hinterläßt ein trokenes einer Schote nahe kommendes Samengehäus, welches inwendig in zwei Fächer getheilt ist, und mit einer Haut eingefaßte, dicht wie Fischschuppen auf einander liegende Samen in sich schließt.

Mehrere Arten dieser Gattung stehen in dem Rufe eines Giftes e), vornemlich aber trift dieses Loos

α) die kreuztragende Trompeterblume, Bignonia crucigera Linn. Plumier Icon. t. 58.

Sie wächst im mittägigen Theile von Amerika bis nach Virginien hin wild, und windet sich um andere Gewächse.

Ihr Stamm ist mit Stacheln besezt, und zeigt, wenn er nach der Quere entzwei geschnitten wird, die Gestalt eines Kreuzes, ihre Blätter stehen zu zwei oder drei Paaren zusammen, und haben Gabeln und die Gestalt eines Herzens; ihre Samengehäuse und stumpf und sehr gros; ihre Samen mit einer sehr breiten Haut eingefaßt.

β) Wurzelnde Trompeterblume, Bignonia radicans Linn. Schmidt Baumzucht. Pl. 42—44.

Auch sie ist in Amerika zu Hause.

---

e) Puihn a. e. a. O. S. 128.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ihr Stamm treibt aus den Knoten Wurzeln; ihre Blätter sind gefiedert, und die Blättchen eingeschnitten; ihre Blumen hochroth.

4) Fingerhut, purpurrother Fingerhut, brauner Fingerhut, Fingerhutblume, Fingerkraut, braunes Fingerkraut, Waldglöklein, Digitalis purpurea Linn. Blackwell a. a. O. Pl. XVI.

Man findet ihn in den meisten Gegenden Europens, vornemlich in Waldern, wo er vom Mai bis in den Brachmonat blüht. Er gehört unter die Sommergewächse und hat in allen seinen Theilen einen bittern Geschmak und eine sehr empfindliche Schärfe, welche Mund, Schlund und Magen anfrißt f).

Seine Wurzel ist zasericht, sein Stengel ekig, etwas weniges haarig, ziemlich dik, manchmalen über vier Schuhe hoch, und zuweilen röthlicht; selten theilt er sich, und dann gemeiniglich nur in zween Aeste. Seine Blätter sizen, jedes auf einem eigenen Stiele, wechselsweise an der Seite des Stengels; sie nähern sich in ihrem Umrisse einigermasen der Gestalt eines Eies, nur daß sie an beiden Enden in eine lange Spize auslaufen, und haben an ihrem Rande schief eingeschnittene Zähne, wie eine Säge; sie sind blaß, weich, und dicht mit feinen weichen Haaren besezt. Seine Blumen haben fünf Staubfäden, von welchen aber nur vier Staubbeutel tragen und fruchtbar sind; sie hängen alle an eigenen, kurzen, etwas haarigen Stielen, welche mit einem Blättchen besezt sind, nur an einer Seite des Stengels, und bilden an

f) Practical essays on medical subjects. S. 41.

www.dlibra.wum.edu.pl

der Spize desselbigen eine lange Aehre; ihr Kelch ist kurz, und in fünf Stüke getheilt, von welchen die oberen klein, die unteren aber ziemlich gros sind; ihre Krone ist gros, und fast ganz purpurroth; sie hat in ihrer Gestalt einige Aehnlichkeit mit einem Fingerhute; der untere Theil, welcher mehr fleischroth ist, stellt eine breite unten bauchige Röhre vor, oben aber theilt sie sich in vier kurze und rundlichte Abschnitte, von welchen der oberste einfach und ganz seicht ausgeschnitten, die beiden mittlern kleiner sind, und einen halben Kreis vorstellen, der unterste aber gröser, von der Gestalt einer Parabel, und mit runden, weissen und in einen Ring eingefasten Fleken bemalt ist. Seine Samengehäuse bestehen aus zwei Schalenstüken, und sind inwendig in zwei Fächer getheilt; in jedem derselbigen hängt an zwei besondern Rändern eine Menge von Samen, welche beinahe viereckig sind.

Nicht nur die Samen dieser Pflanze g), sondern auch das Kraut h) tödtet Truthüner, welche davon gleichsam berauscht werden, alle Fresluſt verlieren und in Zukungen fallen; auch Haushüner verlieren, wenn sie anhaltend von dem Kraute fressen, die Federn i); Hunde k) werden von Wasser, womit das Kraut angebrüht, oder worinn das Extrakt aus demselbigen aufgelößt ist, unruhig und niedergeschlagen, bekommen Bauchfluß, einen wankenden Gang und Zukungen,

---

g) Pennant Philosophical Transactions. B. 71. Th. 1. S. 70.

h) Salerne histoire de l'Academie des sciences à Paris pour l'ann. 1748. S. 84.

i) Schiemann diss. de digitali purpurea. Goetting. 1756. 4. S. 31. ꝛc.

k) Ebendersl. a. a. O. S. 20. ꝛc.

www.dlibra.wum.edu.pl

und fallen bald todt hin; das Vieh läßt dieſe Pflanze l), ob ſie gleich weder Geruch noch ſtarken Geſchmak hat, auf der Weide ſtehen.

Auch bei Menſchen frißt das Kraut, das Waſſer, das damit gekocht worden, der Saft, der daraus gedrükt iſt m), Mund, Schlund, Magen n), Zunge o) an, erregt Ekel p), gewaltſames Erbrechen q), krampfhaftes Zuſammenſchnüren der Kehle r), Schluchzen s), heftige Bauchflüſſe t), zuweilen Speicheſfluß u), Schwindel, Dunkel vor den Augen, fremde Farben x), ſtarken Harnfluß, kalte Schweiſſe, ſehr

---

l) Merz diſſ. de digitali purpurea ejusque uſu in ſcrophulis. Ien. 1790. §. 3.

m) 1) Lentin Beobachtungen einiger Krankheiten ꝛc. 1774. S. 167. 2) W. Withering account of the foxglove and ſome of its medical uſes with practical remarks in dropſy and other diſeaſes. Birmingham and Lond. 1785. 8. ins Teutſche überſ. von Michaelis. Leipzig 1786. 8. 3) Lettſom Memoirs of the medical Society B. II. 1772.

n) Börhaave Ind. hort. Lugd. 13. S. 308.

o) Practical eſſays on medical ſubjects. S. 41.

p) On aereal influences S. 49. 50.

q) 1) Ebenderſ. a. e. a. O. 2) Lentin a. e. a. O. 3) Buchwald Specim. medic. pract. botan. Hafn. 1720. S. 103.

r) Lentin a. e. a. O.

s) Ebenderſ. a. e. a. O.

t) 1) Ebenderſ. a. e. a. O. 2) Hiſtoire de l'acad. des ſcienc. à Paris pour l'ann. 1748. S. 84.

u) Practical eſſays &c. 2) Withering. 3) Schiemann. 4) Lentin a. d. a. O.

x) Withering und Schiemann a. d. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

langsamen Aderschlag y), Unmachten, Beängstigungen, Magenkrampf, Zukungen, und selbst den Tod z). Diese Bemerkungen mögen das Urtheil eines Börhaave a) rechtfertigen, welcher diese Pflanze unter die Gifte gezählt hat.

Die Zufälle, welche dieses Kraut verursacht, können durch die bei allen scharfen Giften heilsame Mittel gehoben werden. Milch mit Fönugrel gekocht, Mohnsaft b) und vornemlich blasenziehende Mittel c) haben hier vorzügliche Hülfe geleistet.

Allein, eben diese heftige Schärfe hat die Aerzte schon längst veranlaßt, ihr eine vortheilhafte Richtung zu geben. Sie haben entweder das Kraut frisch und blos gequetscht d) oder die Blumen mit Fett zu Salbe gemacht e), äuserlich in kropfartigen Geschwulsten, in allzulokern Geschwüren, im Podagra, in der englischen Krankheit gebraucht f). Andere haben das mit dem Kraute angegossene oder abgekochte Wasser g), oder den daraus gedrükten Saft h), oder das trokene

---

y) Von 90—54 und sogar bis 35 in einer Minute. 1) Lettsom. 2) Withering a. d. a. O. 3) Baker Medical Transactions. B. III. S. 292.

z) Bei einem achtjährigen Mägdgen. Practical essays &c. S. 43.

a) Bei Haller a. e. a. O. I. S. 143.

b) Withering a. a. O. S. 187.

c) F. A. Murray a. a. O. B. I. S. 732.

d) 1) Chirurgie pharmaceutique &c. S. 101. 2) Parkinson Theatr. of plants. S. 654.

e) Bate bei Rai Histor. univers. plantar. B. I. S. 767.

f) Chirurgie pharmaceutique &c. a. a. O.

g) 1) On aereal influences a. a. O. 2) Haller Hist. stirp Helvet. 2. 330.

h) 1) Lentin a. a. O. 2) Practical Essays &c. S. 40. 42.

www.dlibra.wum.edu.pl

Kraut in Pulver oder in Pillen, oder das Extract, oder die Tinktur in hartnäkigen und verzweifelten anererbten und andern kropfartigen, vornemlich skrophulösen Geschwulsten i), auch wenn sie schon in Geschwüre ausbrachen k), selbst in andern bösartigen Geschwüren l), in mancherlei Arten der Wassersucht m), vornemlich wenn die Haut blaß und kalt, der Aderschlag schwach und unterbrochen, und Verstopfungen im Spiele sind, in Engbrüstigkeit n) und Raserei o), in aktiven Blutflüssen p), selbst zuweilen q) in Fallsucht r), in

---

i) 1) On aereal influences a. a. O. 2) Practical Essays &c. a. d. e. a. O. 3) Quarin Animadverf. practic. S. 118. 4) Schiemann a. a. O. S. 39. 5) Merz a. a. O. S. 8. 6) Ferriar on the medical properties of the Digitalis purpurea or Foxglove. London 1779. 12.

k) 1) Lentin a. a. O. 2) Darwin Medical Transactions. B. III. S. 257. 279. 280.

l) Lentin a. a. O.

m) 1) Withering a. a. O. S. 192. 2) Darwin a. a. O. S. 274. 3) Simons und Warren medical journal. B. VI. 1785. n. 2. 4) Lyman Veckoskrift för Läkaren och Naturforskaren. B. IX. S. 185. 5) Thilenius medicinische und chirurgische Bemerkungen. S. 170. ꝛc.

n) 1) Withering a. a. O. S. 195. 2) Parkinson a. a. O. S. 654. 3) Darwin a. a. O. S. 282. 4) Baker ebendaf. S. 287.

o) Jones Medic. Comment. Dec. II. B. I. n. 3. S. 305. ꝛc. 2) Cox ebendaf. B. IV. n. 1. 3) Currie Memoirs of the medical Society of London. B. IV. n. 2.

p) 1) Currie. 2) Ferriar a. d. e. a. O. 3) Jones a. e. a. O. S. 313.

q) Nicht immer, Currie a. e. a. O.

r) Parkinson a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Lungenschwindsucht s) und in Gelbsucht t) innerlich, und insbesondere, wenn man mit dem Gebrauche so lange anhielt, bis sich die Oberhaut schuppenweise ablößte, mit glüklichem Erfolge verordnet.

Sollte wohl der gelbe Fingerhut, Digitalis lutea Linn. Jacquin Hort. Vindobon. II. Pl. 105. der in der Schweiz, in Italien und Frankreich wild wächst, und sich, auser der Farbe und geringern Gröse seiner Blumen, auch durch die spizige Krone, und die unter einem spizigen Winkel entzweigespaltene Oberlippe, und die pfriemen- oder lanzenförmige Blättchen ihres Kelchs von dem purpurrothen leicht unterscheiden läßt, hier u) eine Stelle verdienen?

Ich vereinige mit diesen Gewächsen, so sehr sie auch nach dem System davon getrennt sind, und daher eine eigene Abtheilung zu verdienen scheinen könnten, noch einige Pflanzen, die nach botanischen und andern Merkmalen betrachtet, zwischen dieser und der folgenden Abtheilung in der Mitte zu stehen scheinen.

5) Lobelie, Lobelia.

Die Arten, welche hier eine Erwägung verdienen, wachsen aufrecht, und haben ungetheilt lanzenförmige Blätter; ihre Blumen haben neben einem Staubwege fünf Staubfäden,

---

s) 1) Withering a. a. O. S. 205. 2) Baker a. a. O. S. 304. 3) Drake und Fowler bei Beddors Contributions to physical and medical knowledge. Briftol and London 1799. 8.

t) Mayer bei Richter chirurgische Bibliothek, B. V. S. 533.

u) Huth a. c. a. O. S. 127.

www.dlibra.wum.edu.pl

deren Staubbeutel etwas unter sich zusammenhängen, einen in fünf Abschnitte gespaltenen Kelch, und eine unregelmäsige oben der Länge nach getheilte Krone, welche auf dem Fruchtknoten sizt; sie hinterlassen ein trokenes Samengehäus, welches inwendig in zwei bis drei Fächer getheilt ist.

α) Tupa, Lobelia Tupa Linn. Feuillé Iournal de Perou. Paris 1714. 4. B. II. Pl. 29.

Sie wächst in Peru, und hat keine Einschnitte am Rande der Blätter; ihre Blumen hängen an Kämmen, welche aus Aehren zusammengesezt sind.

Sie hat in Kraut und Wurzel einen äuserst scharfen Milchsaft, der, wenn er in's Auge sprizt, blind macht; schon der Geruch ihrer Blumen erregt heftiges Erbrechen; sie wird daher für sehr giftig gehalten x).

β) Lobelie mit langen Blumen, Lobelia longiflora Linn. Jacquin Hort. Vindobon. B. I. Pl. 27.

Sie wächst in Jamaika wild, und hat gezahnte Blätter; ihre Blumen sizen auf sehr kurzen Stielen zur Seite, und haben eine Krone mit sehr langer fadendünner Röhre.

Ihre Blätter sind Pferden tödlich; ihr Saft ist äzend scharf, so daß, wenn man mit einem damit verunreinigten Finger an Auge oder Lippen kommt, Entzündung dieser Theile erfolgt; innerlich gebraucht erregt sie schreckliche Bauchflüsse, welche sich nicht selten mit dem Tode endigen; in den Leichen findet man dann die Gedärme brandicht y).

---

x) Feuillé a. a. O. S. 739.

y) Jacquin Select. stirp. americ. S. 219. 220.

www.dlibra.wum.edu.pl

Doch wird auch diese Art gegen die Lustseuche gebraucht z).

γ) Kardinalsblume, Lobelia Cardinalis Linn. Miller Illustrat.

Sie ist in Virginien zu Hause, und hält mehrere Jahre aus.

Ihre Blätter sind breit, und am Rande wie eine Säge gezakt; ihre Blumen sind gros, haben eine schöne rothe Krone, und sizen am Gipfel des Stengels in Aehren beisammen.

Auch sie ist scharf und äzend a).

δ) Heilsame Lobelie, Lobelia syphilitica Linn. Jacquin Icon. plant. rarior. II. fasc. IX. Pl. 21.

Auch sie wächst in Virginien in trokenen Wäldern mit Leimboden wild, und hält mehrere Jahre aus.

Ihre Blätter verlaufen sich in das Eirunde und sind am Rande, wie eine Säge, aber nur schwach, gezakt; ihre Blumen haben eine schöne blaue Krone, und an ihrem Kelche umgebogene Buchten.

Sie hat einen verdächtigen Geruch und einen scharfen Milchsaft b), und soll in zu starken Gewichten genommen, tödlich gewirkt haben c); doch wird das Wasser, das mit ih-

---

z) Linné Diss. Observat. in mater. medic. S. 6.

a) Puihu a. e. a. O. S. 141.

b) Kalm Kongl. Soensk. Vetensk. Academ. Handling för år 1750. S. 284.

c) Puihu a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

rer Wurzel gekocht wird, von den Einwohnern mit Erfolg gegen die Luſtſeuche innerlich gebraucht d).

e) Brennende Lobelie, Lobelia urens Linn. Bulliard Herbier de la France. Pl. 9.

Dieſes Sommergewächs wächſt in Spanien, Italien, Frankreich und ſelbſt in Teutſchland e) wild.

Seine Blätter ſind an der Grundlinie gleichſam angeklebt; die untern rundlicht und am Rande gekerbt, die obern lanzenförmig und am Rande, wie eine Säge, gezakt; ſeine Blumen hängen an Kämmen, ſind klein, und haben eine veilchenblaue Krone mit zween blaſſen Fleken an ihrem obern Gewölbe.

Auch dieſes iſt, vornemlich in der Wurzel, voll eines ſcharfen Milchſaftes, der im Munde Entzündung und Brand verurſacht f). Auch ſein Aufguß hat bei Landleuten, die ſich ſeiner in Wechſelfiebern bedienten, Erbrechen, Bauchflüſſe, Kolik, und ſogar Zukungen verurſacht g).

---

d) 1) Kalm a. e. a. O. 2) Bartram Appendix containing deſcriptions virtues and uſes of ſundry plants of theſe northarn parts of America and particular ly of the newly diſcovered Indian cure of the venereal diſeaſe g. lateiniſch bei Linné Amoenitat. academ. B. IV. S. 513. 3) Hiſtoire de la Societé de medecine à Paris B. IV. S. 343.

e) Puihn a. e. a. O.

f) Puihn a. e. a. O.

g) Bonte bei Vandermonde Iournal de medecine, chirurgie, pharmacie &c. B. XIV. Avr. 1761. n. 6.

www.dlibra.wum.edu.pl

6) Schweinsbrod, Saubrod, Waldrüben, Erdscheibwurz, Erdäpfel, Cyclamen europaeum Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 147.

Man findet es in der Tatarei, in dem mittägigen Theile Europens, auch in der Schweiz und in Teutschland an trokenen, schattichten und waldichten Orten, wo es im Ernde- und Herbstmonat blüht.

Seine Wurzel dauert mehrere Jahre aus; sie ist gemeiniglich ziemlich gros, fleischig, tellerrund, platt gedrükt, und zuweilen ungleich; seine Blätter kommen unmittelbar aus der Wurzel, jedes auf einem eigenen Stiele, der bald kürzer, bald länger ist; sie sind bald ganz kreisrund, bald mehr oder weniger herzförmig, und ekig, auch von verschiedener Gröse, entweder ganz einfärbig, oder in der Mitte schwarz oder weis gefleket, oder auf ihrer untern Fläche beständig oder nur gegen den Winter zu roth, oder mit purpurrothen, oder weissen oder gelben Adern gezeichnet. Ihre Blumen kommen ebenfalls auf eigenen nakenden Stielen, die, wenn die Blume abgefallen ist, sich, wie eine Schraube, zusammenrollen, unmittelbar aus der Wurzel; jede hat fünf vollkommene Staubfäden, deren Staubbeutel zusammenstosen, und nur einen Staubweg mit einer spizigen Narbe; ihr Kelch besteht aus einem zusammenhängenden Stüke, das aber oben in fünf Abschnitte gespalten ist, und umschließt die künftige Frucht; die Krone hat in ihrer Gestalt einige Aehnlichkeit mit einem Rade, und nur eine ganz kurze Röhre mit hervorragendem Schlunde; oben ist sie in fünf grose und lange Lappen getheilt, welche umgeschlagen sind; ihre Farbe ist, bald ganz weis, bald ganz röthlicht, bald ganz purpurroth, bald ist sie weis oder fleischroth und nur auf dem Grunde purpurroth,

bald

www.dlibra.wum.edu.pl

bald blaß purpurroth mit hellrothem oder purpurrothem Grunde. Sein Samengehäus ist kugelrund, und besteht aus fünf Schalenstüken, welche, wenn sie reif sind, oben aus einander springen; es hat inwendig nur eine Zelle, aber viele rundlichte und ekige Samen, welche in trokenem Marke liegen.

Die Wurzel dieses Gewächses hat, vornemlich wenn sie im Herbste ausgegraben wird, anfangs zwar einen milden und schleimigen, aber hintennach einen scharfen beissenden Geschmak, sie wirkt frisch, roh und untermischt mit ungemeiner Heftigkeit auf den Stuhlgang.

Schon diese Eigenschaften verschaffen diesem Gewächse einiges Recht auf eine Stelle unter dieser Klasse von Körpern, wenn es gleich bisher noch nicht durch einen tödlichen Erfolg auf seinen Gebrauch bestätiget ist; aber diese Eigenschaften verlieren sich bald, wenn die Wurzel unter der Äsche gebraten wird, so sehr, daß sie nun eßbar wird, und bekommen eine heilsame Richtung, wenn man sie entweder mit Fett vermischt und nur äuserlich gebraucht, da sie denn noch stark genug auf Stuhlgang und Würmer treibt, oder wenn man das Heftige ihrer Wirksamkeit durch Zusaz eines Gegengiftes, wie z. B. Essig und Honig sind, einschränkt

7) Zahnwurz, Bleiwurz, Plumbago europaea Linn. Plank Plant. medicin. icon. Pl. 95.

Ihre Wurzel dauert mehrere Jahre; ihr Stengel wird gegen drei Schuhe hoch; ihre Blätter sind rauh und in der Mitte breit, an beiden Enden aber spizig; sie umfassen den Stengel mit ihrer Grundfläche. Ihre Blumen stehen in den Winkeln der Blätter, und an dem Gipfel des Stengels in Ähren beisammen; jede Blume hat fünf vollkommene Staub-

www.dlibra.wum.edu.pl

fäden, deren jeder in der Krone auf einer Schuppe ruht, so daß alle Schuppen zusammen die Mündung der Krone verschliesen, und einen Staubweg, der an der Spize in fünf Stüke gespalten ist; ihr Kelch hat eine lange Röhre, und fünf lange Zähn; er ist von aussen mit Borsten- und Drüschen besezt, und dient dem künftigen Samen zur Bekleidung; ihre Krone ist gemeiniglich purpurroth, und hat die Gestalt eines Trichters mit einer langen Röhre. Ihr Samengehäus besteht aus fünf Stüken, und enthält nur einen einigen länglichten Samen.

Diese Pflanze ist in allen ihren Theilen, vornemlich aber in ihrer Wurzel, so äzend scharf, daß, wenn man sie nur in der Hand hält, sie dieselbige roth macht; Oel, das man damit zur Salbe gekocht hatte, erregte bei einem Mädchen, welches sich die Kräze damit heilen wollte, Entzündung der ganzen Haut, und hiziges Fieber h); ein anderes, welches sich in gleicher Absicht damit gerieben hatte, wurde gleichsam lebendig geschunden i).

Doch empfiehlt schon J. Bauhin k), und nach ihm Dale l) den äuserlichen Gebrauch der Pflanze bei Zahnschmerzen; Sumeire m) und Bouteille n) das Einreiben des damit getränkten Baumöls in der Kräze, das der erste

h) Garidel a. a. O. S. 368.

i) Sauvages Memoir. de l'Academ. des scienc. à Paris pour l'ann. 1739. S. 471.

k) a. a. O. B. II. S. 941.

l) Pharmacolog. S. 121.

m) Memoir. de la Societé de medecine à Paris B. III. S. 162.

n) Ebendas. S. 184. ꝛc.

www.dlibra.wum.edu.pl

auch im Kopfgrinde wirksam fand o), und Schreiber p) auch im tief gewurzelten Krebse anrühmt; auch ein französischer Wundarzt q) bediente sich des auf ihre Blätter gegossenen Baumöls, um tief gewurzelte, und, weil sie an Knochen angewachsen waren, für unheilbar gehaltene Krebse zu heilen, mit dem glüklichsten Erfolge; er schmierte es täglich dreimal auf, und sezte dieses so lange fort, bis der Kranke von dem Aufschmieren keinen lebhaften Schmerzen mehr fühlte.

IV. Contortae oder Apocyna, Pflanzen aus der natürlichen Ordnung der Hundswinde.

Ihre Wurzel dauert mehrere Jahre aus, und theilt sich unter der Erde in mehrere Aeste. Ihr Stamm schlingt sich (bei mehrern) von der rechten nach der linken Seite oder von Abend nach Morgen um die benachbarten Körper herum. Ihre jungen Sprossen sind, wie ein Kegel zugespizt, und ohne eine Bekleidung von Schuppen. Ihre Blätter sizen gemeiniglich abwechselnd, einmal auf dieser, dann wieder in einiger Entfernung davon auf der andern Seite des Stengels und der Aeste; in der Knospe sind sie offen und ein wenig vertieft. Ihre Blumen haben alle fünf vollkommene Staubfäden, und einen oder zween Staubwege; sie sizen gemeiniglich in Aehren, flachen Sträusen oder Dolden in den Winkeln der Blätter oder an dem Gipfel des Stengels und der Aeste beisammen; der Kelch besteht bei den meisten aus

o) a. a. O. S. 165.
p) Erkenntniß und Cur der Krankheiten S. 68.
q) Sauvages a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

einem zusammenhängenden Stücke, nur bei wenigen Arten aus fünf abgesonderten Blättchen; sonst hat er immer fünf Zähne, oder ist seicht in fünf Abschnitte gespalten; die Krone besteht immer aus einem Stüke, welches bald seichter bald tiefer in fünf gleiche Abschnitte gespalten ist; sie ist etwas von der linken nach der rechten Seite zu gekrümmt, und fällt bald ab; innerhalb dieser Krone findet man bei mehreren unter der Spize des Staubwegs fünf kleine Körperchen, welche den Schlund der Blume gleichsam verschliesen, und den Staubfäden zur Stüze dienen. Nur wenige dieser Pflanzen hinterlassen von jeder Blume eine Beere, oder nur ein Samengehäus, die meisten hingegen zwei trokene länglichte Samengehäuse, welche inwendig nur ein Fach haben, und mit einer feinen seidenartigen Wolle ausgestopft sind, in welcher die Samen liegen. Sehr viele von ihnen sind voll von einem milchweissen Safte; der Honigsaft in ihren Blumen ist den Insekten meistens gistig r).

1) Purgirwinde, syrische Winde, Scammonienwinde, syrische Scammonie, weisse Scammonie, Convolvulus Scammonea Linn. Plank a. a. O. Pl. 92.

Sie ist in Syrien, Mysien und Kappadocien zu Hause.

Ihre dike und von aussen bräunlichte Wurzel dringt tief in die Erde. Ihre Stengel sind zart und breiten sich weit aus. Ihre Blätter haben einigermassen die Gestalt eines Pfeils, dessen hintere Spizen abgestumpft sind; sie haben keinen braunen Rand, wie die Blätter der Zaunwinde, mit welcher diese Pflanze sonst sehr viele Aehnlichkeit hat. Ihre

r) Vulva a. a. a. O. S. 55.

www.dlibra.wum.edu.pl

Blumenstiele sind rundlicht, reichen über das Blatt hinaus, in dessen Winkel sie stehen, und tragen zwo bis drei Blumen mit einer sehr kleinen offenen Hülle, welche weit von dem Blumenkelche absteht; dieser besteht aus fünf kurzen Blättchen, und ist an den Seiten erweitert; ihre Krone hat etwas von der Gestalt einer Gloke, und ist oben gleichsam in Falten gelegt; ihr Staubweg hat zwo Narben. Jede Blume hinterläßt ein ganz trokenes Samengehäus, welches in zwei Fächer getheilt ist, und in jedem dieser Fächer zween Samen enthält.

Ihr Saft, der eingedikt und getroknet unter dem Namen: Scammoneum nach Europa gebracht, und noch von Aerzten, wiewohl lange nicht mehr so häufig als ehmals, innerlich als ein heftig wirkendes abführendes Mittel verordnet, auch wohl zur Verfälschung der Manna s) gebraucht wird, erregt durch seine ungeheure Schärfe öfters die heftigsten Bauchgrimmen, die abscheulichsten Bauchflüsse, eine Auflösung der Säfte, und sogar zuweilen den Tod t). Sollten vielleicht auf seine Rechnung die Todesfälle kommen, die man auf den Gebrauch der Ailhaudischen Pulver erfolgen u) sahe?

Ich halte mich nicht für berechtigt, auch andere Arten der Winde, deren Saft mit einiger Heftigkeit auf den Stuhlgang wirkt, mit Puihn x) zu den Giften zu zählen.

---

s) Gui Patin a. a. O. B. I. n. CXI. S. 228.

t) Amatus Lusitanus Comment. ad Cap. 171. L. IV Dioscoridis.

u) Brou Chasseignac Recueil periodique de la Societé de medecine de Paris. à Paris 8. B. IV. 1798. S. 330.

x) a. e. a. O. S. 36—38.

www.dlibra.wum.edu.pl

2) Egyptische Hundswinde, Periploca Secamone Linn. Prosp. Alpin aegypt. 133. Pl. 134.

Sie ist in Egypten zu Hause, und windet sich an andern Körpern hinauf.

Ihre zahlreiche Blumen stehen in Rispen beisammen, haben eine radförmige inwendig zotige Krone und fünf Staubfäden, deren jeder auf einem fadenförmigen Blättchen der Nebenkrone sizt. Sie hat einen brennend scharfen gelben Saft, welcher eingedikt heftig auf den Stuhlgang wirkt y).

3) Karibäische Hundswinde, Echites suberecta Linn. Jacquin stirp. american. pict. Pl. 33.

Diese Staude wächst in Jamaika und S. Domingo wild, und hat einen äzend scharfen Milchsaft, von welchem ein halbes Loth einen Hund in acht Minuten umbringt z).

Ihre Blätter sind beinahe eirund und stumpf mit einer steifen Spize; sie sind auf der untern Fläche blasser, und sizen auf etwas harigen Stielen; ihre grose und ansehnliche Blumen hängen an eigenen Stielen, welche durch ihre Vereinigung Traubenkämme bilden; sie haben eine gelbe trichterförmige Krone mit zotiger Röhre, aber ohne Nebenkrone, und hinterlassen, jede zween, lange gerade Fruchtbälge, in welchen die Samen mit einer Federkrone bekränzt sind.

Sie erregt Magenschmerzen, Uebelkeit, Mangel an Esluſt, Reiz zum Erbrechen, Zukungen in verschiedenen Thei-

---

y) Prosp. Alpin a. a. O.

z) Sloane Iamaic. II. Vorr. S. IX.

www.dlibra.wum.edu.pl

len, Auszehrung und Tod, und steht in Westindien im Rufe, daß sich das Gewicht davon so bestimmen lasse, daß Menschen nach Tagen, Monaten oder Jahren davon sterben a).

4) Cerbera.

Die Bäume dieser Gattung sind vornemlich im mittägigen Amerika zu Hause, und sind voll eines äzend scharfen Milchsaftes, der in groser Menge aus den Aesten fließt, wenn man Einschnitte darein macht. Ihre Blätter sizen wechselsweise an den Zweigen, und ihre Blumen theils in Aehren beisammen in den Winkeln der Blätter, theils in flachen Blumensträusen an der Spize der Zweige; jede hat fünf vollkommene Staubfäden und einen Staubweg; ihre Krone hat etwas von der Gestalt eines Trichters und besteht aus einem zusammenhängenden Stüke, das aber in mehrere Abschnitte gespalten ist; jede Blume hinterläßt eine Steinfrucht.

α) Gemeiner Schellenbaum, Ahovai, Cerbera Ahovai Linn. Weinmann Multilinguis Phytanthozooiconographiae Ind. Pl. 577. l. a.

Er ist in Brasilien zu Hause, wächst etwa so hoch als ein Birnbaum, und hat eine weislichte Rinde, und ein Holz von unerträglichem Geruche, der dem Knoblauchgeruch am nächsten kommt, und es zu Brennholz untauglich macht.

Seine Blätter sind im Umfange rund, wie ein Ei, und bleiben immer grün am Baume: seine Blumen haben einen Staubweg mit zwo geblätterten Narben und einen aus fünf Blättchen bestehenden Kelch. Jede Blume hinter-

a) Ebendas. a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

läßt eine fleischige stumpf dreieckige Steinfrucht, mit einem einigen eckigen Stein, in welchem ein einziger Kern liegt; sie ist weis, ungefähr so groß als eine Kastanie, und ihre Schale, wenn sie etwas älter wird, so hart, daß sie klingt.

Schon sein Holz verräth, wenigstens in Rücksicht auf Fische, eine giftige Eigenschaft; denn wirft man davon etwas in Wasser, worinn Fische sind, so werden sie dadurch so betäubt, daß sie sich mit der Hand fangen lassen; noch giftiger aber ist der Kern der Frucht, der in seinem Vaterlande für ein wenigstens bisher unbezwingliches Gift gehalten wird. Die Wilden nehmen ihn aus der Frucht heraus, und bringen dagegen kleine Steinchen hinein; dann bedienen sie sich dieser Früchte, wie die Mohren der Schellen, bohren sie durch, hangen sie reihenweise an Schnüre, mit welchen sie denn ihre Beine oder auch ihre Waffen schmüken.

B) Herzbaum, Mangas, Cerbera Manghas Linn. Odollam Rheede Hort. malabar. I. Pl. 39.

Er wächst auch in Indien, fünfzehen bis zwanzig Schuhe hoch.

Seine Blätter, welche an der Spize der Zweige ohne bestimmte Ordnung sizen, werden oft einen Schuh lang, und haben an ihrem Rande keinen Einschnitt; sie sind glatt, breit lanzenförmig, in die Quere stark geribbt, und von einem bittern beissenden Geschmak. Seine Blumen sizen an der Spize der Aeste in Traubenkämmen, die sich ungleich in Aeste theilen; ihr weislichter Kelch steht weit offen, und besteht, aus fünf Blättchen, welche die Gestalt einer Lanzette haben, und bald abfallen; ihre Krone ist weis, und hat eine Röhre, welche länger als der Kelch, inwendig eckig und mit feiner Wolle bekleidet ist, und eine in fünf Lappen getheilte

www.dlibra.wum.edu.pl

Mündung, welche kürzer als die Röhre sind; ihr Fruchtknoten ist entzweigespalten, ihr Griffel fadendünn, und beinahe kürzer, als die Röhre der Blumenkrone, ihre Narbe rund wie ein Ei und gespalten. Seine Früchte hängen an langen diken Stielen; sie sind rund wie ein Ei, und ungefähr so gros als ein Gänseei, auf einer Seite etwas breitgedrükt und mit einer kaum merklichen Nath bezeichnet; sie sind glatt, leicht und auf gelblichtgrünem Grunde sehr fein weis gedüpfelt; sie enthalten in einem Fleische, das, wie alle Theile des Baums, voll von einem scharfen und bittern Milchsafte ist, zwo Nüsse, welche zwo grosen Kastanien gleichen; und einen weissen Kern haben.

Eben diese Früchte sind es, welche, innerlich genommen, sehr gewaltsames Erbrechen erregen, und in ihrem Vaterlande in dem Rufe eines heftigen Giftes stehen, obgleich in Amboina die Blätter des gleichen Baums als Zugemüß gespeißt werden.

γ) Thevetie, Cerbera Thevetia Linn. Jacquin Stirp. americ. pict. Pl. 47.

Dieses Bäumchen ist vornemlich auf den karibäischen Eilanden zu Hause, und zeichnet sich leicht durch seine schmale, sehr lange, gleichbreite und gedrängt beisammenstehende Blätter, und durch seine gelbe wohlriechende Blumen von beiden vorhergehenden Arten der gleichen Gattung aus.

Der Rauch von seinem Holze erregt, wenn es brennt, leicht Blindheit b).

---

b) Oldendorp bei Puhn a. e. a. O. S. 59.

www.dlibra.wum.edu.pl

5) Oleander, Nerium.

Diese Gattung ist vornemlich in Indien zu Hause.

Ihre Blumen haben einen Staubweg mit einem Griffel, der an seiner Spize ausgehölt ist, und in der Mitte dieser Aushölung eine grüne kegelförmige Narbe trägt, und neben der Krone noch eine aus flachen dreispizigen Blättchen bestehende Nebenkrone. Jede Blume hinterläßt zween aufrechte Fruchtbälge mit federichten Samen.

α) Gemeiner Oleander, Nerium Oleander Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 531.

Dieses Bäumchen wächst von Kadix bis nach Ostindien an etwas feuchten Orten wild, und wird wegen seiner schönen Blumen häufig in Gärten und Töpfen gezogen.

Seine Blätter stehen immer zu drei, und sind lang und scharf zugespizt, bald breiter, bald schmäler; seine (zuweilen gefüllte) Blumen haben eine rothe, seltener eine weisse Krone.

Er ist in allen seinen Theilen sehr scharf; sein Laub ist Hunden, Maulthieren, Eseln, Ziegen, Schafen und den meisten Säugthieren tödlich, auch Menschen gefährlich, und erregt unerträgliche Bangigkeiten, Aufschwellen des Leibes, Unmachten, Entzündungen c).

β) Wohlriechender Oleander, Nerium odorum. Aiton Hort. kewens. I. S. 298. Rheede Hort. malab. IX. Pl. 1.

Er weicht von dem gemeinen nur darinn ab, daß seine Blumen stärker riechen, und ihre Nebenkrone in viele fadendünne Lappen zerschlissen ist.

---

c) Puihn a. e. a. O. S. 55. 56.

www.dlibra.wum.edu.pl

γ) Schneeweisser Oleander, Nerium divaricatum Linn.

Er hält nur zwei Jahre aus.

Seine Aeste sind auseinander gesperrt; seine Blätter sizen einander paarweise gegen einander über, und sind in der Mitte breiter, an beiden Enden aber schmäler und zugerundet; sonst kommt er mit dem gemeinen überein.

Er hat einen beissend scharfen Milchsaft d).

6) Rothe Plumierie, Plumeria rubra Linn. Catesby natural history of Carolina &c. London 1741. fol. Pl. 92.

Dieses Bäumchen wächst in Jamaika und Surinam wild, und hat dike Aeste, und grose eirund-länglichte Blätter; diese sizen auf eigenen mit zwei Drüschen versehenen Stielen und gleichen den Lorbeerblättern; seine Blumen haben einen sehr guten Geruch, und eine hochrothe trichterförmige Krone; sie sizen, meist zu zwei, am Gipfel des Stengels in Aehren beisammen; jede hinterläßt zween umgebogene Fruchtbälge, in welchen die Samen in einer eigenen Haut vestsizen.

Sie hat einen scharfen Milchsaft, und wird daher für giftig gehalten e).

7) Schmalblätterichte Camerarie, Cameraria angustifolia Linn. Plumier Icon. Pl. 72. Abb. 2.

Sie ist auch in dem wärmern Amerika zu Hause, und hat schmale gleichbreite Blätter; ihre Blumen haben eine

d) Ebendersf. a. e. a. O. S. 56.

e) Brown Civil and natur. history of Iamaica &c. S. 191.

www.dlibra.wum.edu.pl

Krone, welche etwas von der Gestalt eines Präsentirteller hat, und hinterlassen jede zween wagerechte Fruchtbälge, in welchen die Samen in einer eigenen Haut liegen.

Ihr Milchsaft ist so scharf, als der Saft der Wolfsmilch f).

8) Tabernämontane mit Citronenblättern, Tabernaemontana citrifolia Linn. Jacquin Stirp. americ. pict. Pl. 40.

Dieses Bäumchen wächst in beiden Indien wild, und ist voll eines äuserst scharfen Milchsaftes.

Seine Blätter stehen paarweise einander gegenüber, und sind eirund, und am Rande nach Wellenzügen aufgeworfen; seine Blumen sizen zur Seite in Dolden ähnlichen Knaueln beisammen, und haben eine Krone, welche etwas von der Gestalt eines Präsentirtellers hat; jede hinterläßt zween wagerechte Fruchtbälge mit einfachen Samen, welche im Mark liegen.

Sein Saft erregt, in stärkern Gewichten genommen, Wuth g); die Amerikaner bereiten sich daraus ein Mittel, dessen sie sich bedienen, um den Schlaf abzuhalten und munter zu bleiben, und, wenn sie mehr davon geben, ihren Soldaten Muth zu machen, daß sie mit Ungestümm über den Feind herfallen h).

9) Hundewürger, Cynanchum.

Die Arten dieser Gattung sind in wärmern Ländern zu Hause.

---

f) Puihn a. e. a. O. S. 57.

g) Ebendersf. a. e. a. O. S. 58.

h) Rolander bei Rottböll a. a. O. S. 228.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ihre Blumen sizen auf langen Stielen in einer Art von Dolde beisammen, und haben insgesamt fünf vollkommene aber kleine Staubfäden, und zween vollkommene Staubwege, welche unten von der Krone umschlossen werden, und sehr kurze Griffel haben; ihr Kelch ist sehr klein, und hat fünf Zähne; ihre Krone ist weis, oder spielt aus der weislichten in eine mattgrüne Farbe, und besteht aus einem zusammenhängenden Stüke, das aber in fünf Abschnitte gespalten ist; innerhalb dieser Krone haben sie noch ein cylindrisches Honigbehältnis, welches an seiner Mündung fünf Zähne hat. Jede Blume hinterläßt zwei länglichte trokene Samengehäuse, welche aus einem Stüke bestehen, und inwendig in kleine Fächer getheilt, aber mit feiner glänzender Wolle ausgefüllt sind, in welcher die Samen liegen.

Alle Arten sind voll eines scharfen Blasen ziehenden Milchsaftes.

α) Aufrechter Hundewürger, Cynanchum erectum Linn. Jacquin Hort. Vindobon. I. Pl. 38.

Diese Staude ist ursprünglich in Syrien zu Hause, und wächst, wenigstens auserhalb ihres Vaterlandes, selten über drei Schuhe hoch; sie hat eine aschgraue Rinde, und theilt sich in viele Aeste.

Ihre Blätter sind weich und glatt, sizen auf eigenen Stielen an den Knoten der Aeste einander gerade gegen über, und haben in ihrer Gestalt einige Aehnlichkeit mit einem Herzen.

Ihre Blätter, einem Hunde zu einem Quintchen gegeben, erregten bei ihm nach einer halben Stunde Erbrechen, wodurch er den gröſten Theil derselbigen wieder von sich gab;

www.dlibra.wum.edu.pl

nichts desto weniger überfielen ihn die grausamsten Zufälle, und er starb in einem Anfall von Zittern und Zukungen i).

Dieser Zufall läßt muthmassen, daß diese Pflanze auch auf Menschen giftig wirke, und wird, des Mangels an Erfahrungen, die an Menschen gemacht sind, ungeachtet, die ihr hier angewiesene Stelle rechtfertigen.

β) Blattloser Hundewürger, Cynanchum viminale Linn. Prosp. Alpin a. a. O. S. 190.

Er wächst in Afrika an der Küste wild k).

Sein Stengel windet sich um andere Körper herum, und hält mehrere Winter aus; er ist ganz ohne Blätter, aber seiner ganzen Länge nach mit Narben besezt, die immer eine der andern gerade gegen über stehen; seine Blumen haben einen sehr angenehmen Geruch.

γ) Hundewürger von Montpellier, Cynanchum monspeliacum. Cavanilles Plant. hisp. I. Pl. 60. Jacquin ic. rarior. plant. B. II. fasc. IX. Pl. 14.

Dieses Kraut wächst in Spanien und im mittägigen Theile Frankreichs wild, und schlingt sich um andere Körper herum; seine Blätter sind spizig, und stehen, was ihre Gestalt betrift, zwischen einem Herzen und einer Niere mitten inne; die Scheide, welche seinen Fruchtknoten umschließt, theilt sich oben in fünf weislichte Blättchen, welche inwen-

---

i) J. Bauhin a. a. O. II. S. 134.

k) Daß ihn Forskål in seiner egyptischen Pflanzengeschichte nicht angemerkt hat, macht vielleicht seine grösere Seltenheit in dem Theile von Afrika, den er zuerst bereist hat.

www.dlibra.wum.edu.pl

dig nach unten zu zween Säke haben, und mit ihrer Spize auf der Narbe liegen.

Auch diese Art ist voll eines scharfen Milchsaftes, der eingedikt oft statt Skammoneum gebraucht wird 1).

10) Hundekohl, Apocynum.

Seine Blumen haben fünf kleine, aber vollkommene Staubfäden, welche abwechselnd mit fünf unten aus kleinen Drüschen entspringenden Borsten stehen, und zween vollkommene Staubwege mit sehr kurzen Griffeln, ihr Kelch ist sehr klein und hat fünf Zähne; ihre Krone hat etwas von der Gestalt einer Gloke, und besteht aus einem zusammenhängen Stüke, welches ganz seicht in fünf Abschnitte gespalten ist. Jede Blume hinterläßt zwei aus einer zusammenhängenden Haut bestehende Samengehäuse, welche inwendig in kleine Fächer getheilt sind; in diesen liegen die Samen, breitgedrükt, wie die Schuppen auf der Haut eines Fisches, auf einander, und sind durch eine lange baumwollenartige Feder daran bevestigt.

α) Kanadischer Hundekohl, Apocynum androsaemifolium Linn. Curtis botanical Magazine. Pl. 280.

Seine Wurzel dauert mehrere Jahre, aber sein Stengel geht immer im Herbste darauf; dieser wächst übrigens aufrecht, und ungefähr drei Schuhe hoch. Seine Blätter sind im Umrisse rund, wie ein Ei, und auf ihren beiden Flächen glatt; seine Blumen stehen an der Spize der Zweige in unächten Dolden, und haben eine weisse Krone, und zwischen den Staubfäden purpurrothe Borsten.

---

1) Buhn a. e. a. O. S. 58.

www.dlibra.wum.edu.pl

Dieses Gewächs ist voll eines milchweissen Saftes, der auf Haut und Zunge ätzende Schärfe äußert. Schon seine Ausdünstungen erregen bei gewissen Leuten Aufschwellen des Gesichts und der Hände, und andere bekommen nur von dem Abreissen eines Zweigs die ganze Hand voll Blasen; von dem Milchsafte schwellen die Theile auf, die man damit überstreicht, und die Haut wird hinweggefressen, andern Leuten ist sie nicht nachtheilig; das Vieh läßt sie stehen; auch Fliegen und anderes Ungeziefer, welches seine Nahrung auf den Blumen dieser Pflanze sucht, stirbt davon m).

Sie ist, wie die folgende, in dem mitternächtlichen Theile von Amerika zu Hause.

β) Virginischer Hundekohl, Apocynum cannabinum Linn. Apocynum canadense ramosum, flore viridi albicante, siliqua tenuissima. Morison a. a. O. T. III. Sect. XV. T. III. f. 14.

Er ist nicht sehr von dem kanadischen verschieden. Sein Stengel ist röthlicht; seine Blätter sind mehr länglicht spizig, und auf ihrer untern Fläche mit ganz feiner Wolle bekleidet; seine Blumen sind sehr klein, und stehen nicht in unächten Dolden, sondern in Rispen beisammen; ihre Krone spielt aus der grünen in die weislichte Farbe; seine Samengehäuse sind sehr lang und dünn.

Auch diese Art hat einen ähnlichen scharfen Saft, und ihre Blumen sind den Insekten eben so schädlich.

Die Amerikaner bearbeiten ihre Stengel, wie Hanf, und die Franzosen gebrauchen die Samenwolle beider Arten zu Polstern.

γ) Ve-

m) Kalm a. a. O. B. III. S. 316–318.

γ) Venetianiſcher Hundekohl, Apocynum venetum Linn. Eſula rara e Lio Venetorum inſula. Lobel ic. ſtirp. I. S. 372.

Man findet ihn auf den Eilanden des adriatiſchen Meers.

Er hat in ſeinen botaniſchen Merkmalen und in ſeinen übrigen Eigenſchaften ſehr viele Aehnlichkeit mit beiden vorhergehenden Arten. Seine Wurzel greift bald weit um ſich; ſein Stengel wird ungefähr zween Schuhe hoch; ſeine Blätter ſind in der Mitte mehr breit, und nach beiden Enden mehr zugeſpizt, und gleichen den Weidenblättern; ſeine Blumen haben bald eine weiſſe, bald eine purpurrothe Krone.

Sollte wohl auch die mexikaniſche Art Trapezentli, deren Rai n) nach Hernandez erwähnt, nicht hieher gehören? Ihre Wurzel riecht, wie die Wurzel der Gichtroſe, und erregt, wenn ſie gekoſtet wird, Brennen in der Kehle, drei Quintchen davon blos geſtampft und mit Waſſer genommen, erregen Erbrechen und heftige Bauchflüſſe.

Ein Apocynum erectum, von welchem ein Ungenannter o) erzählt, daß es nicht nur überhaupt tödlich ſeie, ſondern insbeſondere oft Vieh, wenn es zufälliger Weiſe die Blüthen abbeiſſe, tödte, ſcheint eher einer andern verwandten, als dieſer Gattung anzugehören.

11) Aeſkulapie, Aſclepias.

Ihre Blumen ſtehen in einfachen Dolden beiſammen, und jede von ihnen hat fünf kleine Staubfäden, welche auf

n) Hiſt. plant. univ. II. 1089.

o) Voyage to Madeira &c. Edinburgh. 1792. S. 81.

www.dlibra.wum.edu.pl

fünf dichten, vertieften oben zusammenstosenden Blättchen sizen, und zween Staubwege mit sehr kurzen Griffeln; ihr Kelch ist sehr klein und hat fünf Zähne; ihre Krone ist weis, und besteht aus einem zusammenhängenden Stüke, das aber in fünf umgeschlagene Abschnitte gespalten ist. Jede Blume hinterläßt zwei lange, dike, runzlichte Samengehäuse, welche aus einem zusammenhängenden Stüke bestehen und innwendig in keine Fächer getheilt sind; darinn liegen die breitgedrükten Samen, wie die Schuppen auf der Haut eines Fisches, auf einander, und sind in feine glänzende Wolle eingehüllt.

α) Gröste Aesskulapie, Asclepias gigantea Linn. Beidel offhar in Egypten, Jacquin Stirp. americ. pict. Pl. 88.

Sie wächst in Amerika, Indien, Arabien und Egypten, ob sie gleich Forskål im lezten Lande nicht bemerkt hat.

Sie dauert mehrere Jahre aus, und wächst aufrecht, und gegen sieben Schuhe hoch. Ihre Blätter sind dik, flach, und länglicht oval, umfassen den Stengel mit ihrer haarigen Grundfläche, und sizen einander gerade gegen über.

Anderthalb Quintchen des Saftes von dieser Pflanze, innerlich genommen, sollen, nach der Beobachtung einiger arabischer Aerzte die grausamsten, oft tödliche Bauchflüsse erregen p), indem er weit schärfer ist, als die Milch des Euphorbiums. Der Genus dieses Gewächses soll, nach Rumpf's Versicherung in Amboina, eben sowohl als der Genus der

---

p) J. Bauhin a. a. O. S. 137.

www.dlibra.wum.edu.pl

Waldanemone, das Vieh tödten; doch fressen es, nach Forskål's q) Versicherung Schafe und Ziegen ohne Schaden, und die Indianer gebrauchen seinen Saft, um die Milch zum Gerinnen zu bringen. Auch die Araber verordneten seine getrokneten Blätter als Arzneimittel; die Malabaren gebrauchen das damit gekochte Wasser, oder den aus den Blättern gedrükten Saft, beide mit Oel vermischt, äuserlich in der Gicht, oder legen auch nur die mit Oel getränkte und über dem Feuer erwärmte Blätter auf die leidende Theile; das mit der Wurzel gekochte Wasser verordnen sie in Wechselfiebern und in Geschwulsten, welche ihre Frauen nach schweren Geburten bekommen, auch äuserlich um die Wunde damit auszuwaschen, gegen den Biß der Brillenschlange r).

Die Wolle, in welcher seine Samen liegen, kann man, wie die Wolle der Seidenpflanze, mit Baumwolle, Floretseide, oder anderer Wolle vermischt, zu allerlei Kleidungsstüken, Polster und Papier gebrauchen.

β) Syrische Seidenpflanze, Asclepias syriaca Linn. Plenk Icon. plant. medic Pl. 155.

Sie wächst in Virginien, auch in Astrachan an schattichten Stellen und an Salzseen wild, wird auch hier und da in Teutschland wegen der Seide ihrer Fruchtbälge im Grosen gezogen.

Sie weicht von der grösten Aeskulapie darinn ab, daß sie nicht so hoch wächst, ihr Stengel ohne alle Aeste, ihre Blätter ganz oval und auf der untern Fläche filzig sind, und ihre Blumendolden überhängen.

---

q) Flora aegyptiaco-arabica. edit. Niebuhr Havn. 1775 S. XCVII.

r) Rheede a. a. O. II. Pl. 31.

www.dlibra.wum.edu.pl

Mit ihren Blättern tödtet man, nachdem man sie mit Schmeer zu einer Art Kuchen gekocht hat, Hunde, Wölfe, Füchse und andere Raubthiere. Auch der Honigsaft ihrer Blumen ist Insekten tödlich s).

γ) Kurassavische Aeskulapie, Asclepias curassavica Linn. Sloane natur. hist. of Iamaica &c. II. Pl. 129.

Sie wächst in Kurassao wild und weicht von den beiden andern Arten nur darinn ab, daß ihr Stengel nur wenige Aeste treibt, ihre Blätter spizig, wie eine Lanzette und glänzend glatt, ihre Fruchtbälge zur Seite gezakt sind, und ihre Blumendolden einzeln zur Seite und aufrecht stehen.

Auch sie hat einen starken Milchsaft; ihre Wurzel wird in England für Ipekakuanha verkauft t).

V. Doldengewächse, Umbellatae.

Ihre Wurzel hält mehrere Jahre aus; bei vielen unter ihnen hat sie etwas von der Gestalt einer Spindel, und von aussen deutliche Ringe, aus welchen die Aeste in Absäzen entspringen; inwendig ist sie oft hol, und durch Querwände in Zellen getheilt. Ihr Stamm ist niemalen holzig; bei den meisten ist er rundlicht, hol und schwach; immer hat er, wo ein Blatt entspringt, eine Scheidewand, und inwendig ganze Lagen von Holzfasern, welche durch das Zellgewebe durchscheinen, und, wenn man sie durchschneidet, einen ölichten gefärbten Saft geben, da jenes nur einen wässerichten in sich

---

s) Kalm a. a. O. III. S. 259.

t) Sloane a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

hat; immer treibt er seine Aeste abwechselnd von einer Seite zur andern, und in der gleichen Ordnung stehen auch die Blätter. Diese sind nur bei einer einigen Art einfach, bei der übrigen sind sie aus kleinen durch einen gemeinschaftlichen Stiel mit einander vereinigten Blättchen zusammengesezt, und kommen aus einer häutigen Scheide hervor, durch welche sie mit dem Stengel vereinigt sind; vor ihrer Entwikelung sind sie zusammengelegt, und jedes Blatt oder Blättchen läuft in eine erhärtete Spize aus. Ihre Blumen stehen auf langen Stielen, welche gemeiniglich an der Spize eines kleinen Astes alle aus einem Mittelpunkte entspringen; die erste hier zu beschreibende Pflanze ausgenommen, theilt sich jeder Blumenstiel in viele kleinere, welche auf die gleiche Art aus dem grosen entspringen; und die ganze Stellung dieser Blumenstiele hat das äusere Ansehen eines Sonnenschirms. Jede Blume hat gemeiniglich vollkommene männliche und weibliche Befruchtungstheile zugleich, und hinterläßt daher meistens vollkommenen Samen; jede hat fünf Staubfäden mit gelblichten Staubbeuteln, welche mit der Blumenkrone auf einem drüsichten oder schwammigen Körper liegen, der unmittelbar auf dem Fruchtknoten sizt; dieser ist in zween Hügel getheilt, zwischen welchen die zween Griffel entspringen; bei den wenigsten dieser Pflanzen haben die Blumen einen eigentlichen Kelch; ihre Krone ist weis und fällt ab, so bald sie verwelkt ist; oft ist sie bei den äusern Blumen gröser, als bei den innern; sie besteht aus fünf abgesonderten Blättchen, welche gemeiniglich eine ungleiche Gröse haben, so daß diejenigen Blättchen, welche nach aussen zu stehen, gröser sind. Jede Blume hinterläßt zween Samen, welche, meist ganz ohne alle Bekleidung, anfangs oben mit einander verwachsen, aber doch durch einen Faden geschieden sind,

www.dlibra.wum.edu.pl

und, wenn sie ihre volle Zeitigung erhalten haben, aus einander gehen.

1) Sumpfnabelkraut, Wassernabelkraut, Hydrocotyle vulgaris Linn. Flor. Danic. Pl. 90.

Es wächst in ganz Europa an feuchten und überschwemmten Orten, in stehenden und fliesenden Wassern wild.

Seine Wurzel kriecht tief unter dem Wasser; unmittelbar aus ihr entspringen die Blätter; diese sizen auf langen haarichten und gefurchten Stielen, welche an der untern Fläche des Blattes beinahe in der Mitte desselbigen eingesenkt sind; sie sind einfach und in ihrem Umrisse rund, wie ein Kreis, und haben an ihrem Rande acht Ausschnitte. Seine Blumenstiele sind kürzer als die Blattstiele, sizen diesen gemeiniglich gegen über, und tragen nur eine kleine einfache Dolde von fünf Blumen; unter dieser Dolde sowohl als unter jedem einzelnen Blümchen steht eine Hülle von vier Blättchen; die Blättchen, aus welchen die Krone besteht, sind ungetheilt, und beinahe ganz von gleicher Gestalt und Gröse. Ihre Frucht ist flach, kreisrund, doch etwas breiter, und platt, nur daß sie noch eine Spur von drei Furchen hat; jeder Samen stellt die Gestalt eines halben Kreises vor, und ist breitgedrükt.

Es ist sehr scharf auf der Zunge; Schafe, welche es fressen, bekommen davon die Krankheit, welche die Schäfer die Fäule nennen, Entzündungen und Blutharnen, oder andere geschwinde und heftige Zufälle.

Diese Erfahrungen machen es sehr wahrscheinlich, daß sein innerlicher Gebrauch auch bei Menschen, wo nicht tödliche, doch sehr gefährliche Zufälle erregen werde.

www.dlibra.wum.edu.pl

2) Liebstökel vom Peloponnes, Ligusticum peloponnesiacum Linn. Jacquin Flor. austr. B. V. append. Pl. 13.

Es wächst auf den schattichten Gebirgen vom Peloponnes, Oestreich und Graubünden wild.

Seine Blätter sind vielfach gefiedert, und die kleinste Blättchen wieder auf die gleiche Weise eingeschnitten. Seine Blumendolden haben häutige allgemeine und besondere Hüllen, und bestehen aus gleich grosen Blümchen, an welchen die Blumenblättchen ungetheilt und eingerollt sind; zuweilen haben die Seitendolden keine fruchtbare Staubwege. Die Frucht ist länglicht, und hat zu beiden Seiten fünf Furchen und drei breitgedrükte Kanten; sie besteht aus zween Samen, der eine ist oval, und an dessen Seite hängt der andere mit einer Eke an; drükt man den Samen von der Seite, so zeigt das Herzchen fünf Eken; drükt man ihn aber von oben herab, nur vier, welche mit vier braunen Düpfelchen umgeben sind.

Es hat einen unangenehmen Geruch, und wird für giftig gehalten [u]).

3) Schwarzrothe Engelwurz, Angelica atropurpurea Linn. Cornuti Flor. canad. S. 198. Pl. 199.

Sie ist im mitternächtlichen Theile von Amerika, vornemlich in Canada, zu Hause.

Ihr Stengel ist schwarzroth, und mit eisgrauem Thau bekleidet. Ihre Blätter sind gefiedert; das äuserste Paar der Blättchen zusammengewachsen; das einzelne Blättchen an der

u) Puibn a. e. a. O. S. 63.

www.dlibra.wum.edu.pl

Spize sizt auf einem eigenen Stiele. Ihre Blumenbolden nähern sich der Kugelgestalt, haben allgemeine und besondere Hüllen, und bestehen aus lauter fruchtbaren Blümchen von gleicher Gröse, an welchen die Blumenblättchen ziemlich flach und einwärts gebogen sind. Ihre Frucht ist vest und rundlicht, hat aber doch Eken, und trägt noch die umgebogene Griffel.

Man hält sie in ihrem Vaterlande für ein unbezwingbares Gift x).

4) Rebendolde, Oenanthe.

Die hieher gehörenden Arten wachsen in mehreren Gegenden Europens an sumpfigen Stellen. Ihre grose Blumendolde, welche entweder gar keine Hülle oder statt derselbigen nur ein einiges Blättchen hat, und den Blättern gegen über oder an der Spize der Aeste entspringt, theilt sich gemeiniglich nur in drei kleinere; diese haben aber nur auf einer Seite des Stengels eine Hülle von drei bis zehen weissen und ziemlich breiten Blättchen; die Blumen, die im Umfange der Dolden-sizen, sizen auf langen Stielen, da hingegen die Stiele der mittlern Blumen ganz kurz und beinahe unmerklich sind; jene hinterlassen auch gemeiniglich keine, oder doch nur unvollkommene Samen; ihre Krone ist viel gröser, und die Blättchen derselbigen in ihrer Gröse weit mehr unterschieden, als bei den mittlern; alle diese Blumen aber haben einen Kelch, der auf dem Fruchtknoten aufsizt, und an der künftigen Frucht bleibt; er ist in fünf Abschnitte gespalten, von welchen die drei äusere bei den äusern Blumen sehr lang sind; an der Krone selbst ist das äuserste Blättchen viel

x) Cornuti a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

gröſer, als die übrigen, und an ſeiner Spize einwärts gebogen. Ihre Frucht, welche aus zween ganz entblösten Samen beſteht, und auſer dem Blumenkelche noch mit den Trümmern der Griffel geſchmükt iſt, ſtellt eine geſtreifte fünfeſige Pyramide vor; ſie hat einen gewürzhaften Geſchmak.

α) Waſſerfilipendul, Waſſerfilipendulwurz, holröhrichte Rebendolde, Oenanthe fiſtuloſa Linn. Flor. Dan. Pl. 846.

Sie wächſt in Waſſergräben und Sümpfen, wo ihre ausdaurende Wurzel tief in Waſſer und Schlamm kriecht; dieſe Wurzel hat ganze Büſchel von Faſern, und treibt auſer den Stengeln kriechende Sprôſſen; die Stengel ſelbſt ſind ſchwach, aufrecht, cylindriſch, inwendig hol und in Aeſte getheilt, die wie Arme ausgeſtrekt ſind; die unterſten Blätter ſind aus kleinern, und dieſe wieder aus drei bis vier Paaren noch kleinerer zuſammengeſezt, welche wieder in drei bis vier ſtumpfe Lappen getheilt ſind; an den wenigen Blättern, die an dem Stengel ſizen, ſind die Blättchen, aus welchen ſie zuſammengeſezt ſind, ſehr ſchmal, und beinahe fadendünn, und der gemeinſchaftliche Blattſtiel inwendig hol und röhricht. Ihre Blumenkrone iſt weis und nur von auſen etwas röthlicht.

Ob gleich der Saft, der aus Blättern und Zweigen dieſer Pflanze gedrükt wird, ziemlich unſchädlich iſt y), und ſogar der aus der Wurzel gedrükte Saft, einer Kaze, welcher man ihn in eine Wunde am Schenkel gos, nichts geſchadet hat z), ſo erregt doch ſchon der ſcharfe und ekelhafte

y) Wacher Act. helvet. B. IV. Baſil. 1760. Art. II. S. 81.

z) Ebenderſ. a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Geschmak dieses Saftes a), und der Widerwillen, den alles Vieh gegen das ganze Gewächs äusert b), einen starken Verdacht gegen dasselbige.

Dieser Verdacht wird durch die Zufälle, welche der unfürsichtige Genus desselbigen bei Menschen verursacht hat, vollkommen gerechtfertigt. Nach einigen Beobachtungen, die man an mehrern Menschen zugleich gemacht hat, hat er Zukungen c), Verdrehen der Augen, Kinnbakenzwang, Unmachten d), Sinnlosigkeit e), eine Art von Schlagflus f) und selbst den Tod g) verursacht; auch einen Hund hat eine ganze Wurzel innerhalb drei Tagen getödtet.

In den Leichen derer, welche dieses Gift getödtet hat, fand Vacher h) Magen und Gedärme, überhaupt alle Eingeweide, auch das Blut so, wie sie es in den gesündesten Menschen sind. Dieser Umstand, der widrige Geruch des aus der Wurzel gedrukten Saftes, und die Betäubung, welche sie neben den Zukungen hervorbringt, scheinen dieser Pflanze

---

a) Ebenderf. a. a. O.

b) Schreber Sammlung vermischter Schriften Th. III. S. 59.

c) 1) Van der Monde Iournal de medecine &c. B. X. 1758. Nov. 4. S. 430. 2) Vacher a. a. O. S. 69—72. 3) Alleyne New englifh difpenfatory. London 1733.

d) Vacher a. a. O. S. 69—71.

e) Ebenderf. a. a. O. S. 71.

f) Ebenderf. a. e. a. O.

g) Von fechs oder sieben und dreisig Soldaten starb einer. Vandermonde a. a. O. von siebenzehen drei. Vacher a. a. O.

h) a. a. O. S. 71.

www.dlibra.wum.edu.pl

ihre Stelle unter dieser Abtheilung von Giften streitig zu machen.

Auch in diesen Fällen der Vergiftung leisten Brechmittel i) und die übrigen Rettungsmittel, warme Milch, vieles laues Wasser und Oel getrunken und in Klistiren beigebracht, Essig mit Honig versüßt, und zulezt gelinde abführende Mittel, wie sie oben angegeben sind, die sicherste Hülfe k).

Geschichte.

Johann Midlane, ein Tischler von Havand in Hampshire, ein starker Mann von ungefähr acht und fünfzig Jahren, bekam den Rath, gegen eine scorbutische Krankheit, womit er schon lange geplagt war, und gegen welche er eine Menge Arzneien vergebens genommen hatte, Wassereppich zu gebrauchen. Statt des Wassereppichs aber sammlete man für ihn die Wurzeln dieser Nebendolde; man stampfte eine der gröſten in einem Mörser, und drükte den Saft durch Leinwand; es waren ungefähr fünf Löffel voll, die er, nachdem sie die Nacht über gestanden hatten, des Morgens um halb sechs Uhr bis auf den Bodensaz austrank. Ungefähr eine Stunde nachher gieng er in Geschäften in der Stadt herum, und kurz vor sieben Uhr, bei seiner Zurükkunft und nur noch ungefähr hundert Ruthen von seinem eigenen Hause, beklagte er sich zuerst, daß ihm übel wäre, und, da er dreisig Ruthen weiter gegangen war, wurde ihm so übel, daß er in eines Nachbarn Haus gehen mußte, um auszuruhen. Bald darauf wurde er durch zween Männer nach seinem eigenen

---

i) Vacher und Vandermonde a. d. a. O.

k) Watson Philosophic. Transact. B. XLIV. Th. 1. S. 239.

www.dlibra.wum.edu.pl

Hauſe gebracht, denen er ſagte, es wäre ihm, als wenn er den Gebrauch ſeiner Glieder verloren hätte. Man brachte ihn in ſeinen Stuhl, wo er ſehr über Schmerzen im ganzen Leibe, vornemlich im Kopfe, klagte; bald darauf litt auch ſein Magen, und er hatte ſtarken Reiz zum Erbrechen; bei dem zweiten Reize gab er ungefähr ein Nöſel einer hellen wäſſerichten Feuchtigkeit von ſich, bei dem erſten und dritten aber kaum etwas; dann bekam er auf einmal ſtarken Reiz zum Stuhlgang, und ungefähr in drei Minuten erfolgte dieſer wirklich; dann brachte man ihn, aber nur mit der gröſten Schwierigkeit, die Treppe hinauf zu Bette. Nun brachen die gewaltſamſten Zukungen bei ihm aus, die ihm ungefähr in einer Viertelſtunde den Gebrauch aller Sinnen nahmen, und in der gleichen Stärke bis an ſeinen Tod fortwährten, dieſer erfolgte noch vor neun Uhr, alſo ungefähr viertehalb Stunden, nachdem er den Saft zu ſich genommen hatte. Ein unmäſſiger Schweis begleitete alle dieſe Zufälle, auch hatte der Vergiftete einen ſtarken Schaum vor dem Munde, und den Unterleib ſtark aufgeſchwollen. Bald nach ſeinem Tode gieng ſehr viel durch den After ab, aber zuvor nichts.

Da der arme Mann den Saft zu ſich genommen hatte, ehe noch jemand in ſeinem Hauſe aufgeſtanden war, ſo konnte ſich niemand vorſtellen, woher das Unglük käme, und der Apotheker, der zu ihm berufen wurde, konnte folglich von dieſem Falle nur aus den Zufällen urtheilen. Als er kam, fand er den Kranken ſeiner Sinnen beraubt, und dieſer hatte noch überdis, ſo lange er bei Sinnen war, niemand die wahrſcheinliche Urſache ſeines Jammers geſagt. Er zapfte ihm inzwiſchen zwanzig Loth Blut ab, und bemühte ſich, ihm etwas von dem weinichten Aufguſſe der Brechwurzel in

www.dlibra.wum.edu.pl

den Mund zu bringen; allein seine Kinnladen waren so vest geschlossen, daß kaum ein Löffel voll hinunter kam, und das nur, da er von ungefähr von selbst den Mund öfnete l).

In Kumberland kocht das Landvolk diese Pflanze zu Brei, und schmiert den Pferden den Rüken damit ein, wenn er wund ist m).

Wenn sie einige Aerzte, als schweistreibendes Mittel verordneten, und sich auf das Ansehen eines Dioskorides beriefen, so schienen sie sie mit dem rothen Steinbrech zu verwechseln, den Dioskorides wahrscheinlicher Weise unter dem Namen Oenanthe verstanden hat.

Nach Herrn v. Haller's Muthmasung ist sie die Σαρδονιη der Alten.

β) Safrangelbe Rebendolde, Oenanthe crocata Linn. Blakwell a. a. O. Pl. 575.

Ihre Wurzel ist nicht unangenehm; sie besteht aus vier bis fünf kleineren länglichten diken Wurzeln, welche den Pastinakwurzeln gleichen, und, so wie der Stengel, voll eines safrangelben, säuerlichten und stinkenden Saftes sind. Ihr Stengel wächst drei bis fünf Schuhe hoch, und theilt sich in viele Aeste; er ist dik gestreift und rothgelblicht. Ihre Blätter haben einige Aehnlichkeit mit den Blättern des Schierlings, nur haben sie eine hellere Farbe; sie bestehen alle aus kleinen Blättchen, welche an einem gemeinschaftlichen Stiele einander gegen über stehen; bisweilen sind diese Blättchen ungetheilt, meistens aber theilen sie sich auf die

---

l) Watson a. a. O. B. L. Th. 2. S. 856.

m) Ebendersl. a. a. O. B. XLIV. Th. 1. S. 233.

www.dlibra.wum.edu.pl

gleiche Art in noch kleinere, glatte und gestrichelte Blättchen, welche an ihrem Rande eingeschnitten sind, und die Gestalt eines Keils haben. Die Stiele, auf welchen ihre kleinere Blumendolden stehen, haben hervorstehende Kanten und Streifen; die Blumen selbst eine ganz weisse Krone und braune Staubbeutel.

Ihre Wurzel tödete einen Hund innerhalb drei Tagen n); Stalpart van der Wiel empfand Uebelkeit und Schwindel, als er an dieser Pflanze roch o), und Ehret p) litt in einem verschlossenen Zimmer eben diese Zufälle davon. Nach einigen Erfahrungen erregt der innerliche Gebrauch ihrer Wurzel und Blätter auch bei Menschen Schwindel q), Zukungen, Raserei, Kinnbakenzwang, Ausfallen der Haare, zuweilen heftige Kopf- und Magenschmerzen, Bangigkeit, unerträgliche Hize im Halse und Magen, Nasenbluten, und sehr oft den Tod r). Eine Frau fiel von einer Schale voll des ausgedrükten Saftes in Schwindel, Sinnlosigkeit, Erbrechen und Zukungen, und starb vor Ablauf von drittehalb Stunden s).

---

n) Birch History of the royal Society of London. London B. IV. 1757. S. 342.

o) Observat. rarior. Cent. I. Lugd. 1687. S. 100.

p) Nach Watson a. e. a. O. S. 239.

q) Nach Lobeln J. Bauhin a. a. O. B. III. Theil 2. S. 193.

r) 1) Schreber Sammlung vermischter Schriften Th. VI. S. 263. 2) Watson a. d. a. O. 3) Stalpart van der Wiel a. a. O. Observ. XLIII. S. 182 ꝛc. 4) Graves medical facts and observations. B. VII. n. 27.

s) London medical journal. B. V. 1784.

www.dlibra.wum.edu.pl

5) Schädlicher Körbel, Scandix infesta Linn.

Dieses Sommergewächs wächst häufig in Egypten, und gleicht in seinen Blättern dem Gartenkörbel.

Sein Stengel ist rauh, hat keine Knoten an den Gelenken, und wächst aufrecht, und, wenigstens auserhalb seines Vaterlandes, kaum einen Schuh hoch. Seine Blumendolde theilt sich in fünf kleinere, welche gedrängt beisammen stehen, und die Gestalt einer halben Kugel, und unter sich eine Hülle von sieben spizigen und gerade ausstehenden Blättchen haben; an dieser Dolde sind die äusern Blumen gröser, als diejenigen, welche nach der Mitte zu stehen, und von allen zusammen hinterlassen in jeder kleinen Dolde nur ungefähr sechs Blumen vollkommene Samen; die Blättchen ihrer Krone sind ausgeschnitten, und kürzer als die Staubfäden, welche röthlichte Staubbeutel tragen. Jede fruchtbare Blume hinterläßt zween Samen, welche, wie eine Schusterpfrieme zugespizt sind; von diesen hat derjenige, der nach innen zu steht, eine rauhe Oberfläche, der äusere aber ist mit Stacheln besezt, welche deutlich aus Gelenken zusammen gesezt sind.

Nur der Beiname, den Zöga, Linné und Forskål diesem Gewächse beilegen, läßt mich muthmassen, daß es schädliche, vielleicht wohl gar giftige Eigenschaften habe; freilich scheint es meinem Verdacht zu widersprechen, daß es Forskål nicht unter die schädlichen Gewächse Egyptens zählt. So lange wir inzwischen keine Zeugnisse und Erfahrungen über seine Unschädlichkeit haben, ist es sicherer, es unter die giftigen, als unter die unschädlichen, zu rechnen.

6) Turbithseſel, Seseli Turbith Linn.

Es wächst in dem mittägigen Theile Europens wild.

www.dlibra.wum.edu.pl

Seine Blumendolden sind kugelrund und etwas steif, haben sowohl besondere Hüllen, als eine allgemeine, welche lezte aus einem zusammenhängenden Stüke besteht, und bestehen aus Blümchen von gleicher Gröse; jedes derselbigen hinterläßt eine eirunde rauhe Frucht, auf welcher noch die niedergebogene Griffel sizen.

Seine Wurzel ist voll eines scharfen Milchsaftes, welcher Erbrechen und heftige Bauchflüsse erregt r).

7) Thapsie, Thapsia.

Die hieher gehörigen Arten sind in wärmern Ländern zu Hause.

Ihre Blumendolden sind gros, und ganz ohne Hülle; die Blumen selbst insgesammt fruchtbar; ihre Krone gelb, und die Blättchen derselbigen ungetheilt, umgebogen, und alle von gleicher Gröse. Ihre Samen sind gros, länglicht, platt oben und unten ausgeschnitten, und zu beiden Seiten mit einer breiten Haut eingefaßt.

α) Wilder Turbith, Thapsia foetida Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 459.

Er ist in Spanien und Italien zu Hause, und hat einen häslichen Geruch.

Seine Wurzel ist dik und saftig. Seine Stengel werden gegen zween Schuhe hoch. Seine Blätter sind gros, dunkelgrün, und, wie die Blätter der gemeinen Möhre; sie bestehen aus mehreren kleinen Blättchen, welche da, wo sie entspringen, schmal und wieder in viele Abschnitte gespalten sind.

Die

r) Puihu a. e. a. O. S. 69.

www.dlibra.wum.edu.pl

Die Wurzel dieses Gewächses, welche vormals häufig statt der Turbithwurzel gebraucht worden ist, soll Erbrechen, und gefährliche, sogar tödliche Bauchflüsse u) erregen.

Sollte mit diesem wilden Turbith diejenige Art einerlei sein, welche Rai x) Thapsia salmanticensis sive tertia Clusii magna flore luteo I. B. nennt, und von welcher er erzählt, daß sich die alten Frauen zu Salamanka, ihrer Wurzel bedienen, um den Monatfluß zu erzwingen, daß sie aber mit solcher Heftigkeit über und unter sich wirke, daß sie sich dadurch in die gröste Gefahr stürzen.

β) Rauche Thapsie, Thapsia villosa Linn. Regnault Botanique mise à la portée de tout le monde, Pl. 383.

Sie ist in dem mittägigen Theile Europens zu Hause, und weicht vornemlich darinn vom wilden Turbith ab, daß ihre Blätter, und selbst die Stiele, worauf sie sizen, rauch sind; die Blättchen, woraus sie bestehen, sind gezähnt, und fliesen mit ihrer Grundfläche zusammen.

Auch ihre Wurzel ist voll eines scharfen Milchsaftes y).

γ) Apulische Thapsie, Thapsia Asclepium Linn. Thapsia tenuifolia, petiolis radiatis. Morison a. a. O. B. III. Pl. 18. Abb. 9.

Sie wächst in Apulien und in den Morgenländern wild, und weicht darinn von den andern Arten ab, daß ihr Sten-

---

u) Trew bei Blackwell a. a. O. Explic. Tabular. Cent V. T. 459.

x) a. a. O. B. I. S. 419.

y) Puihn a. e. a. O. S. 70.

www.dlibra.wum.edu.pl

gel fast ganz nakend, ihre Blätter aber gefingert, oder wie Stralen eines Sterns aus einander gebreitet, und die Blättchen, woraus sie bestehen, zweifach gefiedert, und zulezt so fein wie eine Borste sind.

Auch sie hat einen scharfen Milchsaft, welcher Erbrechen und heftige Bauchflüsse erregt z).

δ) Garganische Thapsie, Thapsia garganica Linn. Gouan Illustr. S. 18. Pl. 10.

Sie wächst in Afrika und in dem apulischen Berge Garganus wild, und unterscheidet sich dadurch von den vorhergehenden Arten, daß ihre Blätter gefiedert, und die Blättchen, woraus sie bestehen, wieder in lanzenförmige Querstüke gespalten sind.

Der Saft ihrer Wurzel, auch das Wasser, welches mit dieser gekocht wird, ist scharf, macht Erbrechen, und treibt sehr gewaltsam auf den Stuhlgang a).

Gehört wohl die Thapsia Caesalpina semine candido crasso I. B., welche Rai b) aufführt, und deren Milchsaft so scharf sein soll, daß, wenn man nur die Pflanze eine Zeit lang in den Händen hat, Hände und Gesicht davon aufschwellen, auch hieher?

VI. Pflanzen, die dem Hahnenfusse nahe kommen (Ranunculis affines).

Sie sind insgesamt ausdauernde Gewächse, und die Anemonenarten ausgenommen, theilt sich ihr Stengel immer

---

z) Ebendersf. a. e. a. O.

a) Ebendersf. a. e. a. O. S. 71.

b) a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

in Aeste. Ihre Blumen haben immer männliche und weibliche Befruchtungstheile zugleich; ihre Staubfäden hängen weder mit dem Kelche noch mit der Krone zusammen, ihre Anzahl ist, einige wenige Pflanzen ausgenommen, die hieher gehören, und deren Blumen nur fünf bis sechs Staubfäden haben, immer ziemlich beträchtlich; auch haben fast alle sehr viele Staubwege, und keine unter fünf, meistens mit kurzen Griffeln in ein Köpfgen vereinigt; ihre Krone besteht immer aus mehrern, wenigstens aus drei, zuweilen aus neun abgesonderten Blättchen, welche bald abfallen, und bald eine purpurrothe, bald eine gelbe, meistens aber eine weisse Farbe haben. Jede Blume hinterläßt eine ziemliche Menge von Samen, welche, ohne weitere Bedekung in einem rundlichten Köpfgen beisammen stehen.

1) Sonnenthau, Drosera.

Die hieher gehörende Arten wachsen allenthalben in stehenden Wassern wild, treiben ihre Blumenschäfte unmittelbar aus der Wurzel, haben in den Blumen einen in fünf Stüke getheilten Kelch, eine aus fünf Blättchen bestehende Krone, fünf Staubfäden und eben so viele Staubwege; und hinterlassen von jeder derselbigen ein trokenes Samengehäus, das an der Spize in fünf Schalenstüke aufspringt, und, ohne in Fächer getheilt zu sein, sehr viele Samen in sich schließt, welche an seinen Wänden vest sizen.

Sie sind so scharf, daß sie auf der Haut Blasen und Geschwüre erregen, und, besonders bei Schafen, wenn sie sie auf feuchten Weiden fressen, Auszehrung und tödlichen Husten nach sich ziehen c).

c) Buihn a. e. a. O. S. 74.

www.dlibra.wum.edu.pl

α) Rundblätterichter Sonnenthau, Drosera rotundifolia Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 432.

Ihre Blätter sind kreisrund.

β) Langblätterichter Sonnenthau, Drosera longifolia Linn. Salsirora s. Sponsa solis, s. Ros solis, s. Rorella. Thalius Hort. S. 116. Pl. 9. Abb. 2.

Ihre Blätter sind länglicht, oder nähern sich vielmehr der umgekehrt ovalen Gestalt, nur daß sie nach vornen zu spizig wie eine Lanzette auslaufen.

2) Wasserwegerich, breiter Wasserwegerich, groser Froschlöffel, Alisma Plantago aquatica Linn. Flor. dan. Pl. 561.

Er wächst allenthalben in stehenden Wassern wild.

Seine Wurzel gibt sehr viele dicht auf einander liegende Fasern von sich; sie ist weis, und, wie eine Zwibel, in mehrere Häute eingehüllt. Sein Stengel wächst aufrecht ohne Blätter, und zu einer beträchtlichen Höhe; die Aeste entspringen, immer mehrere aus einem Knoten des Stengels rings um diesen herum in einer Scheide von drei Blättchen; sie sind von ungleicher Länge, und theilen sich wieder auf die gleiche Art in Aeste, und diese zuweilen noch einmal in Zweige. Seine Blätter kommen unmittelbar aus der Wurzel; sie sizen auf langen Stielen, gleichen den Blättern des Wegerichs, und haben auf ihrer Oberfläche mehrere Ribben, welche nach der Spize zusammenfliesen. Seine Blumen sind, in Vergleichung mit der übrigen Pflanze, klein, aber desto zahlreicher; sie haben sechs Staubfäden und ungefähr zwanzig Staubwege mit einfachen Griffeln; ihr Kelch besteht aus dreiekigen abgesonderten Blättchen, und bleibt an der künsti-

www.dlibra.wum.edu.pl

gen Frucht; ihre Krone ist, ehe sich die Blume öfnet, rosenroth, nachher weis; sie fällt bald ab, ist im Umrisse kreisrund, und besteht aus drei runden Blättchen. Jede Blume hinterläßt zwölf bis zwanzig trokene und länglichte Samengehäuse, deren jedes nur einen Samen enthält, und welche alle zusammen ein stumpf dreiekiges Köpfgen bilden; sie sizen alle zusammen auf der Spize des Blumenstiels auf, welche in drei Zirkelschnitte getheilt ist.

Diese Pflanze äusert schon im Geschmak eine beträchtliche Schärfe; sie ist so heftig, daß sie eben daher von einigen Aerzten roh, frisch und blos gestampft äuserlich empfohlen worden ist, um in wassersüchtigen Geschwulsten Blasen zu ziehen, durch welche das Wasser ausfliesen kann d). Nach einer Nachricht, die uns M. Fabregow e) hinterlassen hat, hat ihr Genuß Hornvieh und andere Thiere getödet.

Wenn ihr einige Aerzte zusammenziehende und kühlende Kräfte zugeschrieben haben, so scheint sie die Aehnlichkeit in den Blättern zu einer Verwechslung mit gemeinem Wegerich verleitet zu haben.

3) Waldrebe, Clematis.

Ihre Blumen haben keinen Kelch, aber gegen sechzig Staubfäden mit breiten Stüzen; ihre Krone ist markig, und besteht aus vier bis fünf Blättchen, welche in ihrer Gestalt einige Aehnlichkeit mit einer Lanzette haben. Ihre Samen haben ungefähr die Gestalt eines Eies, und an ihrem obern

d) Ettmüller oper. omn. B. I. S. 437.

e) Description des plantes, qui naissent, ou se renouvellent autour de Paris 1740. IV. S. 43.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ende lange fadenartige Schwanze, welche der Rest der Griffel sind; sie vereinigen sich alle zusammen in ein walzenförmiges Köpfchen; die meisten Arten schlingen sich an benachbarten Körpern hinauf.

α) Gemeine Waldrebe, steigende Waldrebe, Lynen, Nyelen, Clematis Vitalba Linn. Jacquin Flor. austr. IV. Pl. 408.

Sie wächst in dem mittägigen Theile Europens, selbst in Teutschland in lebendigen Zäunen, denen sie schädlich ist.

Ihr Stengel schlingt sich bis sechs Schuhe hoch, und treibt paarweise Aeste. Ihre Blätter sizen auf eigenen Stielen, und bestehen aus fünf kleineren Blättchen, die an einem gemeinschaftlichen Blattstiele in einiger Entfernung an einander gegen über stehen und ziemlich spizig sind, übrigens aber in ihrem Umrisse die Gestalt eines Herzens, und an ihrem Rande entweder gar keine oder doch nur einige wenige Zähne haben. Ihre Blumen haben einen guten Geruch und eine weislichte, umgebogene, etwas haarige Krone.

Sie hat in allen ihren Theilen einen brennend scharfen Geschmak f), der auch in das davon gebrannte Wasser übergeht g), und erregt auf der Haut Blasen und Geschwüre h), eine Eigenschaft, welche nicht nur in einigen Gegenden Bettler benüzen, um sich durch die damit an den Schenkeln erregten Geschwüre die Barmherzigkeit anderer zu gewinnen, sondern auch die Aerzte zu ihrem Vortheil gebrau-

---

f) 1) J. Bauhin a. a. O. II. S. 126. 2) Haller a. a. O. II. S. 59.

g) Matthiol Comment. in Dioscorid. S. 951.

h) J. Bauhin a. c. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

chen, da sie das Kraut frisch und gequetscht statt eines Blasenpflasters auflegen i), die uns aber auch vermuthen läßt, daß ihr innerlicher Gebrauch die schädlichsten, und sogar tödliche Folgen nach sich ziehen müsse.

Diese ungezweifelte Schärfe hat aber weder Aerzte noch Andere abgehalten, sie innerlich zu genießen; zu Paris speißt man die jungen Sprossen zu Anfang des Frühlings als Zugemüß k) und anderwärts hält der Landmann einen davon angemachten Salat für einen Lekerbissen l). Schon die alten Aerzte verordneten den Samen bis zu einem Quintchen als abführendes Mittel m) und noch gebrauchen die Einwohner der hebridischen Eilande, nachdem sie sich wohl mit Butter verwahrt haben, den Aufguß der Pflanze in gleicher Absicht n).

Ihre Samenwolle läßt sich nach Schäfer's Erfahrungen sehr wohl auf Papier benuzen.

β) Brennwurzel, Waldreben, brennende Waldreben, Lienen, Leinen, Clematis Flammula Linn. Knorr a. a. O. I. Pl. C. 9.

---

i) 1) Nik. Chesneau observ. med. Paris 1672. S. 639. 2) M. Martin Description of the wastern Islands of Scotland. London 1716. S. 177. 178.

k) Memoir. de l'Acad. des scienc. à Paris pour l'ann. 1739. S. 473.

l) J. Rhodius observat. poster. Cent. III. nr. 96.

m) Rufus περι των φαρμακων καθαρτικων op. Clinch. London 1726. S. 10.

n) Martin a. a. O. S. 179.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sie wächst bei Montpellier, in Graubünden, und hier und da in Teutschland an lebendigen Heken, denen sie gleichfalls sehr schädlich ist.

Sie ist kleiner, zärter, niedriger, und schlingt sich immer von einer Seite zur andern. Ihre obersten Blätter sind ganz einfach, klein und an ihrem Rande, wie eine Säge, gezakt, und die Blättchen, aus welchen die untern zusammengesezt sind, wieder in drei Lappen getheilt, oder bestehen aus drei noch kleineren Blättchen. Ihre Blumen sizen auf eigenen ästigen Stielen, welche paarweise aus dem Stengel entspringen.

Auch diese Art hat in allen ihren Theilen o) eine brennende Schärfe, die in den Blumen selbst so heftig ist, daß sie die Lippen entzündet, wenn man sie daran bringt p), und auf der Haut Blasen erregt.

γ) Gerade weisse Waldrebe, aufrechte Waldrebe, Clematis erecta Linn. Jacquin Flor. austr. B. IV. Pl. 291. Flammula Iovis. Störk Libell. quo demonstratur, Flammulam Iovis posse tuto et magna cum utilitate exhiberi aegrotantibus. Vienn. 1769. Pl. 1.

Sie wächst in der Tatarei, in Ungarn, Oestreich, Wallis und bei Montpellier wild, und weicht durch folgende Merkmale von der gemeinen Waldrebe ab.

Ihr Stengel wächst drei bis vier Schuhe, und ganz gerade, in die Höhe; er ist blätterich, und treibt unten ge-

---

o) J. Bauhin a. a. O. II. S. 127.

p) 1) Ebendersl. a. a. O. 2) Petit Memoir. de l'Acad. de Paris pour 1732. S. 233.

www.dlibra.wum.edu.pl

meiniglich paarweise Aeste. Ihre Blätter sind groß und sattgrün, und entspringen einander gerade gegen über. Ihre Blumen stehen nach dem Gipfel des Stengels zu in Sträusen beisammen; bei den untern sind die Stiele einfach, und sizen in den Winkeln der Blätter einander gerade gegen über, bei den obersten aber sind sie in drei kleinere Stiele gespalten.

Ihre Blätter und noch mehr ihre Blumen haben auf der Zunge einen brennend scharfen Geschmak, und erregen Bläschen, Röthe und Geschwüre q).

Allein eben diese Pflanze ist es, welche Störk nicht nur äuserlich als Arzneimittel aufgestreut, in verschiedenen Arten von Geschwüren r), sondern auch innerlich als Extrakt oder Aufguß, der von den Blumen oder den Blättern zubereitet werden kann, in allerlei venerischen Zufällen, in Krebs, in mancherlei andern faulen, fliesenden und bösartigen Geschwüren, schwammigen Geschwulsten und in einer hartnäkigen Kräze sehr heilsam fand s).

d) Gerade blaue Waldrebe, ungarische Waldrebe, Clematis integrifolia Linn. Jacquin Flor. austr. B. IV. Pl. 363.

Sie wächst in der Tatarei und in Ungarn wild, und wird häufig in Gärten gezogen.

---

q) 1) Störk a. e. a. O. S. 9. 2) Petit a. e. a. O.

r) Störk a. e. a. O. S. 33.

s) Ebenderf. a. e. a. O. S. 34. Nicht so kräftig fand sie J. G. Oberteuffer bei Hufeland Journal der praktischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. B. IX. St. 3. S. 94.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ihre Wurzel ist ziemlich dik, und hat rothgelbe Zasern. Ihre Stengel wachsen gerade und gegen vier Schuhe hoch; sie sind hart, gestreift, ekig und etwas röthlicht, und haben an den Gelenken deutliche Knoten, an deren jedem immer zwei Blätter einander gerade gegen über stehen; diese Blätter haben kaum merkliche Stiele, und auf ihrer Oberfläche viele Ribben; sie laufen in eine scharfe Spize aus, und sind am Rande etwas wollig; auf ihrer Oberfläche sind sie dunkelgrün, auf der untern etwas heller. Jeder Ast schließt sich mit einer einigen ziemlich grosen und überhängenden Blume; diese hat eine dunkelblaue Krone, deren Blättchen umgebogen, und mit einer feinen Wolle eingefaßt sind. Ihre Staubfäden sind grünlicht, und tragen gelblichte Staubbeutel.

Ihre Blätter haben ebenfalls einen brennend scharfen Geschmak [51]). Die Menge dieses Gewächses auf einer Ungarischen Weide brachte bei den Feldzügen des Prinzen Eugen von Savoien eine Ruhr unter die Pferde, an welcher sie in grosser Anzahl darauf giengen [52]).

Es ist aus der Verwandschaft der äuserlichen Merkmale sehr wahrscheinlich, daß auch die übrigen, wenigstens einige von den übrigen Arten dieser Gattung eine ähnliche Schärfe besizen.

4) Portugiesisches Anemonröslein, gelbe Anemone. Anemone palmata Linn. Anemone cyclaminis, seu malvae folio, lutea. Morison II. Sect. 4. T. 25. f. 3.

Sie wächst in Portugall am Tagus wild. Ihre Wurzel ist knotig, ziemlich länglicht, vest, von aussen schwarz, in-

51) J. Bauhin a. e. a. O.

52) Targioni Toppetti Raggionamenti sull' agricoltura Toscana. Lucca 1759. S. 196.

www.dlibra.wum.edu.pl

wendig aber weis, nicht sehr zasericht und von einem unangenehmen ekelhaften Geschmak. Ihr Stengel ist ziemlich blattreich; ihre Blätter sizen auf langen Stielen, und haben in ihrer Gestalt eine entfernte Aehnlichkeit mit einem Herzen; an ihrem Rande sind sie wie eine Säge gezakt und ganz seicht in Lappen getheilt; sie sind übrigens ziemlich gros, hart und vest, auf ihrer obern Fläche sattgrün, auf der untern aber röthlicht. Ihre Blumen haben einen Kelch, und eine Krone von gelber Farbe, welche beide aus sechs bis neun Blättchen bestehen; jede von ihnen hinterläßt eine beträchtliche Menge von Samen, welche an ihrer Spize gleichsam einen Schwanz, aber keine weitere Bedekung haben.

Ihre Wurzel erregt auf der Zunge einen beissenden Schmerzen und in der Kehle eine zusammenschnürende Empfindung: ihre Blätter haben einen brennend scharfen Geschmak ff).

5) Küchenschelle, Kuhschelle, Küchenkraut, Windkraut, Osterblume, Schlottenblume, grau Bergmännlein, Lizwurz, Boksbart, Anemone Pulsatilla Linn. Pulsatilla Knorr a. a. O. I. A. 7.

Man findet sie in ganz Europa, vornemlich in den mitternächtlichen Theilen desselben, auf trokenen ungebauten Feldern, und an steinigen Hügeln, wo sie im April und Maimonate blüht.

Ihre Wurzel ist gros, holzig, braunschwarz, und inwendig weislicht. Ihre Blätter entstehen gröstentheils unmittelbar aus der Wurzel; sie haben ziemlich lange Stiele,

ff) J. Bauhin a. a. O. III. Theil II. S. 402.

www.dlibra.wum.edu.pl

und auf ihrer Oberfläche weiche weiſe Haare, welche unten ſehr dicht auf einander liegen; ſie ſind zum zweitenmale in kleine Blättchen getheilt, welche einander gegen über auf einem gemeinſchaftlichen Blattſtiele ſizen. Ihr Stengel wächſt zu einem halben Schuh hoch, iſt ohne alle Aeſte und an ſeinem untern Theile haarig, und hat nur einige wenige Blätter; dieſe kommen aus einer haarigen Scheide, ſind dicht mit weicher weiſſer Wolle bekleidet, wie eine Hand ausgebreitet, und bald ganz ungetheilt, bald in drei Abſchnitte geſpalten. Ihre groſe Blume ſteht einzeln an dem Gipfel des Stengels, und hat keinen Kelch; ihre Krone ſteht weit offen, und iſt aus ſechs haarigen und purpurrothen Blättchen zuſammen gezt, welche veilblau werden, wenn die Blume zu verwelken anfängt; ihre zahlreiche gelbe Staubfäden ſtehen mit den Staubwegen auf der Spize des Stengels, welche gedüpfelt iſt. Die leztern haben lange Griffel mit weiſſen ſeidenartigen Federchen und röthlichten Spizen: ihre Samen glänzen wie Silber.

Schafe und Ziegen freſſen ſie zwar ohne Schaden, auch Störk ſt) will keine Schärfe daran bemerkt haben. Vielleicht iſt die Pflanze in einer Gegend, und zu einer Zeit ihres Lebens milder, als zu der andern. So viel iſt wenigſtens nach den Erfahrungen der meiſten übrigen Aerzte gewis, daß Blätter, Stengel und Blumen, wenn ſie auch nur gekaut, oder mit der Spize der Zunge gekoſtet werden, eine ungemeine Schärfe äuſern u), und einen brennenden, eine

---

ſt) Libell. de uſu medico Pulſatillae nigricantis. Vindob. 1771. S. 9.

u) 1) Haller Hiſt. ſtirp. &c. II. S. 61. 2) Paulli Quadrip. botan. Argent. 1667. S. 123.

Zeit lang anhaltenden Schmerzen auf der Zunge verursachen; daß sie frisch auf die Hand gelegt, Röthe und Blasen v), daß der Dunst, der davon aufsteigt, wenn man die Blätter zwischen den Fingern zerreibt, Brennen erregt w); schon ihre Ausdünstungen sezen den Augen zu x1), und das von Blättern und Blumen gebrannte Wasser macht Erbrechen x2); so gar soll der innerliche Gebrauch eines Syrups, in dessen Mischung diese Pflanze kommt, und der gegen verschiedene Zufälle öfters für Veilchensyrup ausgegeben wird, Lungenschwindsucht verursacht haben x3).

Die Wurzel der gleichen Pflanze hat keine, oder doch eine geringe Schärfe, und vielmehr einen süslichten Geschmak x4). Sie ist es, welche die Alten vornemlich innerlich gebrauchten, um auf Speichel und Schweis, und nach ihrer Sprache, das Gift von dem Herzen zu treiben x5); Blätter und Blumen mischten sie unter die Niespulver x6), und mit Zuker zu einem Syrup gemacht, verordneten sie sie innerlich in Krankheiten der Lungen x7); allein dieser Ge-

---

v) 1) Matthiolus Kräuterbuch 2. B. C. 108. 2) Böfler de neglecto remediorum vegetabilium usu. Argent. 1732. 3) Paulli a. e. a. O.

w) Tournefort Histoire des plantes, qui croissent aux environs de Paris. Par. 1725. P. I. Herbat. II. S. 225.

x1) J. Bauhin a. a. O. III. Th. II. S. 401. und Böfler a. a. O. S. 4.

x2) Haller a. e. a. O.

x3) Hellwing Flora campana. Lipf. 1719. S. 86.

x4) Haller a. e. a. O.

x5) J. Bauhin a. e. a. O.

x6) Böfler a. a. O.

x7) Hellwing a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

brauch konnte leicht gefährlich werden. Mit gröſerm Vortheile bedient man ſich dieſer Pflanze und des daraus gebrannten Waſſers äuſerlich in allen Geſchwüren, wo ſich faules Fleiſch zeigt, und in Wunden bei Pferden y). Die Blumen kann man auch gebrauchen, um damit grün zu färben z).

6) Schwärzlichte Küchenſchelle, ſchwärzlichte Windblume, Anemone pratenſis Linn. Flor. Dan. Pl. 611. Pulſatilla nigricans. Störk Libell. de uſu medico pulſatillae nigricant. Vindob. 1771. cum icon.

Ihre Wurzel iſt länglicht, runzlicht, voll Zaſern von ungleicher Dike; Stengel, Blätter, Staubfäden, Staubwege und Samen ſind, wie bei der vorhergehenden; aber ihre Blumen ſind viel kleiner und hängen über. Die Krone iſt viel dunkler gefärbt, und beinahe ſchwarz, und die Blättchen derſelben an ihrer Spize umgebogen. Man findet ſie in Schonen und in mehrern Gegenden Teutſchlands, vornemlich bei Wien auf magern ſonnigen Feldern.

Sie hat nach den Erfahrungen des Hrn. von Störk a) wenn ſie auch nur gekaut wird, einen brennend ſcharfen Geſchmak, der lange nicht aus dem Munde zu bringen, aber in der Wurzel gelinder iſt. Dieſe durchdringende Schärfe geht ſelbſt in das davon gebrannte Waſſer über, und auch das Extrakt erregt, wenn es gleich anfangs herb ſchmekt, ſtechende Schmerzen, und ein ziemlich lange anhaltendes Brennen; allein eben dieſe Schärfe ließ Herrn von Störk ver-

y) J. Bauhin a. a. O.

z) Hellwing a. a. O. S. 93.

a) a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

muthen, daß er ihr leicht eine heilsame Richtung würde geben können; er glaubte wirklich von dem innerlichen Gebrauche des Extrakts in schwachen Gewichten, zu sieben bis vierzehn Granen mit Zuker, in tief gewurzelten Krankheiten der Augen, und von dem äuserlichen und innerlichen Gebrauche des mit dem trokenen Kraute angegossenen kochenden Wassers in stinkenden bösartigen Geschwüren glükliche Wirkungen gesehen zu haben, welche aber Herr Oberteuffer a. e. a. O. nicht wahrgenommen hat.

7) Anemone mit Narcissenblumen, Anemone narcissiflora Linn. Jacquin Flor. austriac. B. II. Pl. 159.

Sie wächst auf den schweizerischen, östreichischen und sibirischen Alpen wild, und hält mehrere Jahre aus. Ihre Wurzel ist holzig, zasericht, und in viele Scheiden eingehüllt. Ihre Blätter fühlen sich ganz rauh und weich an; die untersten sizen auf eigenen Stielen, und sind in fünf Lappen getheilt, deren jeder wieder in zween oder drei Abschnitte gespalten ist; die Blätter an dem Stengel sind dreifach, und wie eine flache Hand ausgebreitet. Ihre Blumen haben einen guten Geruch, und stehen zu sechs bis acht auf Stielen, deren jeder nur eine Blume trägt, in einer Art von Dolden beisammen; ihre Krone ist gewölbt und weis, aber von aussen etwas röthlicht; sie besteht aus sechs bis sieben Blättchen. Ihre Samen vereinigen sich in ein groses, rundes, und breit gedrüktes Köpfchen; J. Bauhin fand ihre Blätter zwar anfangs süs an Geschmak, aber hintennach sehr scharf b).

b) a. a. O. B. III. S. 860.

www.dlibra.wum.edu.pl

8) Wilde Anemone, Anemone sylvestris Linn. Curtis botan. Magaz. Pl. 54.

Sie wächst in Teutschland wild, und hält mehrere Jahre aus.

Ihre Blätter stehen aufrecht und sind eingeschnitten, und, wie der Stengel, und der rundlichte Samen rauh; ihre Blumen sizen auf einem nakenden Stiele, und haben eine weisse Krone, welche aus fünf Blättchen besteht.

Das Hornvieh läßt sie stehen, wenn es sie aber bei verdorbenem Naturtriebe frißt, bekommt es Ruhr, Bluthar-nen und Auszehrung davon c).

Ohne Zweifel haben mehrere Arten dieser Gattung das gleiche Recht, unter die scharfen Pflanzengifte gezählt zu werden; da ich aber keine Erfahrungen vor mir habe, die meine Muthmasung bestätigen könnten, so übergehe ich sie hier mit Stillschweigen.

9) Adonis vom Vorgebürge der guten Hofnung, Adonis capensis Linn. Burmann Pl. afric. Pl. 51.

Sie treibt ihre Blätter unmittelbar aus der Wurzel, jene sind doppelt dreifach, und bestehen aus steifen am Rande sägenartig gezakten beinahe herzförmigen Blättchen, deren Stiele mit Borsten besezt sind; ihre Blumenschäfte sind ohne Blätter, rundlicht und haarig, und tragen an ihrer Spize eine zusammengesezte Blumendolde mit allgemeiner und besondern Hüllen, welche aus sechs lanzenförmigen Blättchen bestehen.

---

c) Puihn a. c. a. O. S. 117.

www.dlibra.wum.edu.pl

bestehen. Die Dolden selbst bestehen aus drei äusern und drei innern Stielen, und einem in der Mitte; dieser trägt nur eine, die übrigen aber jeder vier Blumen; diese haben viele gleichbreite Staubfäden, davon jeder zween kleine eirunde Staubbeutel trägt, und viele in ein Köpfchen zusammengehäufte Staubwege, mit auswärts gebogenen Griffeln, welche so lang als die Staubfäden sind, und stumpfen Narben; ihr Kelch ist weislicht, und besteht aus fünf eirundlänglichten und vertieften Blättchen; ihre Krone ist weis, und noch einmal so lang als der Kelch und die Staubfäden, und besteht aus zehen lanzenförmigen Blättchen. Jede Blume hinterläßt viele nakende Samen.

Sie hat eine ätzende Schärfe [d]).

10) Dotterblume, Schmalzblume, Kuhblume, Bachblume, Mattenblume, Mosblume, gelbe Wiesenblume, Goldwiesenblume, Doktorblume, teutsche Kapern. Caltha palustris Linn. Knorr a. a. O. I. Pl. H. 2.

Sie wächst in ganz Europa an feuchten Orten, in Morästen, Sümpfen, an Bächen, und kleinern Wassern, die durch die Wiesen laufen, und blüht vom April bis in den Erndemonat. Ihre Wurzel hält mehrere Jahre nach einander aus, und besteht aus sehr vielen Zasern. Ihr Stengel ist glatt, wächst ungefähr einen Schuh hoch, und ist weder an Blättern, noch an Blumen sehr reich. Ihre Blätter haben eine glänzend glatte Oberfläche, und in ihrer Gestalt meistens eine Aehnlichkeit mit einer Niere, zuweilen mehr mit einem Herzen; an ihrem Rande sind sie spizig, wie eine

d) Puihn a. e. a. O. S. 119.

www.dlibra.wum.edu.pl

Säge gezakt, und nur diejenigen, welche unmittelbar aus der Wurzel kommen, haben eigene Stiele. Ihre Blumen sind gros, und sizen auf eigenen, aber kurzen Stielen; sie haben keinen Kelch, aber ungefähr hundert Staubfäden, und viele Staubwege ohne Griffel; ihre Krone ist von einer hohen glänzend gelben Farbe, und besteht gemeiniglich aus sechs, selten nur aus fünf rundlichten Blättern, welche an ihrem untern Ende weder Schuppen noch Grübchen haben. Jede Blume hinterläßt mehrere, ungefähr zwölf, Samengehäuse, die, wie die Stralen eines Sterns, gegen einander stehen, und eine grose Menge Samen in sich schliesen.

Ob sie gleich von Ziegen und von dem Hornvieh, und, so lange sie noch jung ist, gerne und ohne Schaden gefressen wird e) obgleich ihre noch ungeöfnete Blumen, ehemals statt der Kapern eingemacht und gespeist worden sind f), obgleich die Bienen aus diesen Blumen, wenn sie sich einmal geöfnet haben, Stoff zu Wachs entlehnen g), und viele Kräuterkundige nichts Schädliches an ihr bemerkt haben wollen h), so fand sie doch Haller von einer brennenden Schärfe i), und Erhard zählte sie unter die Gifte k).

VII. Hahnenfußarten. Ranunculi.

Eine natürliche Horde von Pflanzen, die sich schon längst durch ihre giftige Eigenschaften, und durch ihre, wie

---

e) Schreber Sammlung vermischter Schriften 3 Th. S. 11.
f) Erhard ökonom. Pflanzenhistorie I. B. S. 272.
g) Gleditsch a. a. O. II. S 140.
h) J. Bauhin a. a. O. III. Th. II. S. 470. u. f.
i) a. a. O. II. S. 82.
k) a. a. O. I. S. 272.

www.dlibra.wum.edu.pl

wohl etwas flüchtige, und durch Ausdünsten, Troknen, oder Kochen zu mildernde, oder zu bezwingende Schärfe, die alle Theile des lebendigen thierischen Leibs angreift, und beinahe aller Orten gemein ist, bei den Aerzten verdächtig gemacht hat [1]).

Die meisten von ihnen halten mehrere Jahre aus, und viele lieben einen feuchten Boden sehr. Ihre Blumen haben Kelch und Krone, und eine unbestimmte, aber immer beträchtliche Anzahl von Staubfäden und Staubwegen, welche weder mit dem Kelche, noch mit der Krone zusammenhängen; ihr Kelch fällt bald, nachdem die Blume aufgegangen ist, ab, und besteht meistens aus fünf, zuweilen nur aus drei Blättchen; ihre Krone ist glänzend, und glatt, bei den meisten gelb, bei einigen weis; sie besteht gemeiniglich aus fünf, zuweilen nur aus drei, und bei einer Art aus acht Blättchen, welche weit offen stehen, und rundlicht oder beinahe wie ein Herz gestaltet sind; jedes dieser Blättchen hat unten an seinem schmälern Ende ein kleines Schüpchen, oder ein glänzendes Grübchen. Ihre Staubwege haben nur ganz kurze, und krumme Griffel. Ihre Samen sind glatt, und stehen alle in einem rundlichten und stachlichten Köpfchen beisammen.

Ihr innerlicher Genuß zieht, wenn sie frisch sind, Entzündung des ganzen Magens nach sich [2]).

Das Vieh läßt sie auf der Weide unberührt stehen, frißt sie aber in der Krippe unter anderm grünen Futter, oder unter dem Heu gerne, und ohne Schaden.

---

1) Rich. Pulteney Transactions of the Linnéan society. London. 4. Vol. V. MDCCC. S. 14—20.

2) Sallin a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

1) Kleiner Sumpfhahnenfuß, langer Wasserhahnenfuß, gekerfter langer Wasserhahnenfuß, Speerkraut, klein Speerkraut, Gichtkraut, Brennkraut. Ranunculus Flammula. Flor. Danic. Pl. 572.

Er wächst in ganz Europa an feuchten sumpfigen Stellen, und blüht vom Mai bis in den Erndtemonat. Seine Wurzel ist lang, und rundlicht; sein Stengel, welcher theils aufrecht in die Höhe steigt, theils auf der Erde liegt, und oft zween Schuhe lang ist, theilt sich in ziemlich viele Aeste. Seine Blätter sind glatt; die untersten entspringen aus einem Stiele, der seiner ganzen Länge nach in der Mitte eine Vertiefung hat; sie sind an beiden Enden spizig; ihre Gestalt nähert sich bald mehr der Gestalt eines Eies, bald mehr der Gestalt einer Lanzette; meistens ist ihr Rand ohne Zähne. Die untern Blätter entspringen aus einer Scheide, und die obern sind sehr schmal. Seine zahlreichen Blumen haben einen haarigen Kelch; ihre Krone ist klein, gelb, und glänzend glatt; jedes Blättchen derselbigen hat an seinem untern Ende ein kleines Grübchen mit einem erhöhten Rande.

Er hat eine brennende Schärfe, die aber doch nicht zu allen Zeiten seines Pflanzenlebens gleich stark ist [m]), und erregt auf der Haut Blasen und Geschwüre, so daß ihn nicht nur an einigen Orten Bettler gebrauchen, um ihren Kindern damit künstliche Geschwüre zu erregen, durch welche sie sich das Mitleiden ihrer Nebenmenschen zu verschaffen suchen [m*]),

m) Wenigstens zieht er nicht immer Blasen. Martin a. a. O. S. 179.

m*) Haller Enumerat. methodic. ſtirp. Helvet. indigen. Goett. 1742. S. 323.

www.dlibra.wum.edu.pl

sondern auch an mehrern Orten die Aerzte statt des Blasenpflasters n). Die Pferde sollen, wenn sie dieses Kraut fressen, eine Krankheit der Leber bekommen, bei welcher dieses Eingeweide ganz mit Bläschen und Würmern angefüllt wird o), und Schafe, die ihn auf der Weide fressen, erleiden davon eine Entzündung der Gedärme, die sich mit dem Tode endigt p). Das darüber abgezogene Wasser erregt Erbrechen und kann als Gegengift gebraucht werden q).

2) Kriechender Hahnenfuß, Ranunculus reptans Linn. Flor. Danic. Pl. 108.

Er wächst in Rußland, Schweden, Teutschland und in der Schweiz an stehenden Wassern und auf nassen Wiesen wild, ist mit dem kleinen Sumpfhahnenfuse sehr nahe verwandt, und hat mit ihm auch seine Schärfe gemein r). Sein Stengel kriecht auf der Erde; seine Blätter sind schmal und gleichbreit.

---

n) 1) Die französischen Aerzte Petit Memoires de Paris pour l'année 1732. S. 272. 2) Haller a. e. a. O. 3) Die schwedischen Aerzte Chydenius Beskrifn af gamle Carleby Abo. 1754. S. 51. und Rosenstein von Kinderkrankheiten, übersezt durch Murray 3. Ausg. 1774. S. 428.

o) Haller histor. stirp. helver. indig. II. S. 79.

p) 1) Fabregow a. a. O. IV. S. 44. 2) J. Bauhin hist. plant. III. Th. 2. S. 865.

q) Withering bei R. Pulteney a. a. O. S. 16.

r) Puihn a. e. a. O. S. 121.

www.dlibra.wum.edu.pl

3) Groſer Sumpfhahnenfuß, groſer langer Waſſerhahnenfuß, groſer ſcharfer, langblätterichter Hahnenfuß, Speerkraut, Ranunculus Lingua Linn. Flor. Danic. Pl. 754.

Er wächſt mit den vorhergehenden, wiewohl etwas ſeltener, an den nemlichen Orten, und blühet im Brachmonat. Sein Stengel wächſt aufrecht, und bis zween Schuhe hoch, er iſt rundlicht, filzig, und inwendig hol, und treibt einige Aeſte. Seine Blätter ſind lang, ſpizig, und zuweilen ganz mit einer ſehr feinen Wolle bekleidet, ſie entſtehen aus Scheiden, und haben keine eigene Stiele; ihre Geſtalt nähert ſich der Geſtalt einer Lanzette, und ihr Rand iſt entweder ganz glatt und gleich, oder wie eine Säge gezakt. Seine Blumen ſind ziemlich gros, und ſizen auf den Gipfeln der Aeſte; ihr Kelch iſt glänzend glatt, und jedes Blättchen hat an ſeinem untern Ende ein kleines Schüpchen. Die Anzahl ihrer Staubfäden geht zuweilen bis auf hundert. Unter ſeinen Samengehäuſen arten einige aus, und ſtehen gleichſam als Schuppen zwiſchen den übrigen.

Auch dieſe Art hat eine brennende Schärfe s), die in Blättern und Samen noch gröſer iſt, als bei der erſten Art, und taugt daher, wenigſtens ſo lange ſie friſch iſt, nicht zum Futter für das Vieh ff).

4) Scharbok, Scharbokskraut, Blatterkraut, wild Löffelkraut, Meyenkraut, Feigwarzenkraut, klein Schölkraut, kleine Schölwurz,

---

s) 1) Haller Hiſt. ſtirp. II. 6. S. 78. 2) J. Bauhin a. a. O. III. 2. S. 865.

ff) Gleditſch verm. Abhandl. III. S. 377.

www.dlibra.wum.edu.pl

Schwalbwurz, Sternblümlein, Goldsternblümlein, Schmalzsternblume, Erdgerste, Biberhödlein, Pfaffenhödlein, Feigblättern Eppich. Ranunculus Ficaria Linn. Chelidonium minus, Blackwell a. a. O. Pl. 15.

Sie wächst in allen Gegenden Europens an schattigen Orten auf schwammigem Boden, auf saftigen gut gedüngten Wiesen in Ueberfluß, und blüht vom Merz bis in den Maimonat. Ihre Wurzel ist von aussen gemeiniglich braun, und hat einen ekelhaften, und zusammenziehenden Geschmak; sie besteht aus vielen Klümpchen, welche durch Zasern unter sich verbunden sind. Ihr Stengel ist schwach, und liegt auf der Erde auf; selten wird er über einen Schuh lang; er treibt hin und wieder Aeste, und ist zuweilen röthlicht. Ihre Blätter sizen auf ziemlich langen Stielen, und haben einigermassen die Gestalt eines Herzens; sie sind bald gröser, bald kleiner, und öfters zunächst an dem Stiele mit einem braunen Fleken gezeichnet; ihr Rand ist bald ganz gleich und glatt, bald aber hat er Einschnitte, und Winkel. Ihre Blumen haben nur ungefähr zwanzig Staubfäden, und gemeiniglich eine mittlere Gröse, und sizen einzeln auf langen Stielen in den Winkeln der Blätter. Ihr Kelch besteht aus drei, ihre Krone hingegen aus vier bis neun, gemeiniglich aber aus acht Blättchen; diese sind gelb, glänzend glatt, und in ihrem Umfange rund, wie ein Ei; jedes von ihnen hat an seinem untern Ende ein länglichtes Schüppchen.

Ihre Wurzel hat, vornemlich ehe die Pflanze blüht, eine beträchtliche Schärfe, die auch in das davon gebrannte Wasser übergeht; sie beißt auf der Zunge, und hat einen herben, anfangs sauren, nachher aber bitterlichten, ekelhaften

www.dlibra.wum.edu.pl

Geſchmak; wenn ſie friſch, und geſtampft eine Zeit lang auf die Haut gelegt wird, ſo erregt ſie Blaſen und Geſchwüre, und ihr Saft in die Naſe gezogen, Nieſen t). Sie verliert aber alle Schärfe, wenn die Blumen zu verwelken anfangen, oder wenn ſie gekocht wird u); dann hat ſie einen ſchleimigen und etwas kühlenden Geſchmak. Die ältern Aerzte ſchreiben ihr auch ſolche Kräfte zu, und Börhaave verordnet das damit gekochte Waſſer innerlich; ſo wie andere eine daraus zubereitete Salbe äuſerlich, in der Goldader; das daraus gebrannte Waſſer zählte man vormals unter die Waſchwaſſer, und ſchon mehrmalen hielt der unwiſſende Pöbel die im Winter und Frühling durch anhaltenden Regen entblöſte Wurzeln für ein vom Himmel gefallenes Getreide x). Aus eben dieſer Wurzel lehrt Parmentier eine Art Stärkmehl bereiten y).

Die übrigen Theile der Pflanze ſind ohne alle Schärfe z). Die Blätter haben einen krautartigen, etwas kühlenden Geſchmak, und werden in Upland als Zugemüſe gekocht a), an andern Orten aber auch mit Zuker, Wein oder als Salat

---

t) Krapf a. e. a. O. S. 95.

u) Krapf a. e. a. O. S. 95.

x) J. Geſner Phytograph. ſacr. general. P. I. Tigur. 1760. S. 31.

y) Avantcoureur 1733. und Memoire ſur cette queſtion indiques diverſes vegetaux, qui pourront ſuppléer en tems de diſette à ceux, qu'on employe communement à la nourriture des hommes et quelle doit en être la préparation. Paris 1773.

z) Krapf a. e. a. O. S. 95.

a) Linné Macell. olitor. S. 127.

www.dlibra.wum.edu.pl

mit Essig b) angemacht und gespeist; vormalen gebrauchte man sie gegen den Scharbok. Die Blumen sind, weil sie sich früh zeigen, der Bienenzucht sehr zuträglich c).

5) Gifthahnenfuß, Wasserhahnenfuß, brennender Hahnenfuß, bösester Hahnenfuß, Wasserepich, Feigblättern Eppich, Froschpfeffer. Ranunculus sceleratus Linn. Flor. Danic. 570.

Man findet ihn in ganz Europa an Wassergräben und Sümpfen. Seine Wurzel besteht aus einer grosen Menge dünner, langer, weisser, und senkrecht laufender Fasern. Diese vereinigen sich in einen Samen, der gleichsam in Scheiden eingehüllt ist. Sein Stengel ist dik, von aussen grün, inwendig aber weis; er ist hol, und vornemlich bei einer erwachsenen Pflanze nach der Wurzel zu schwammig. Er wächst aufrecht, zuweilen bis auf zween Schuhe hoch, und theilt sich in viele Aeste; seine Blätter sind alle glatt, die untersten sizen auf langen Stielen, und sind in drei Stüke getheilt, von welchen die beiden äusern wieder entzwei gespalten, das mittlere aber in drei kleinere Abschnitte gespalten ist; die obern sind schmäler, aber gleichfalls in drei Lappen getheilt, welche, wie die Finger einer Hand, ausgebreitet sind; die obern sind einfach, und nur ganz seicht in drei Abschnitte gespalten; die obersten sind ganz unzertheilt, und im Umfange rund, wie ein Ei. Seine Blumen sind klein, und haben ungefähr zwanzig Staubfäden; ihr Kelch ist umgeschlagen; ihre Krone ist blaßgelb, und jedes ihrer Blättchen hat an seinem

b) Fr. Ehrhart bei Baldinger neues Magazin für Aerzte. B. IV. H. 4. S. 312.

c) Gleditsch a. a. O. II. S. 142.

www.dlibra.wum.edu.pl

untern schmalen Ende ein kleines Grübchen, welches mit einem schmalen Wulste eingefaßt ist. Er ist das einige Samengewächs unter der ganzen Gattung.

Alle seine Theile haben eine ungemeine Schärfe, die Wurzel d), wann sie nicht im Maimonat ausgegraben e), getroknet, oder mit Wasser gekocht wird f); der Stengel vornemlich, wenn er noch jung ist, oder, wenn man die Spize desselbigen prüft g); die Blätter h), sie mögen roh sein i), oder gestampft k), oder zwischen den Fingern zerrieben werden l), vornemlich der daraus gedrükte Saft m), oder ein damit gemachter Aufguß n); die Blumen, und in diesen vornemlich die Staubwege o), und das darüber abgezogene Was-

---

d) Scharf Ephemerid. Acad. Caes. Nat. Curios. Decur. III. ann. 2. 1695. S. 107.

e) Dann ist sie ganz mild und unschädlich. Krapf a. e. a. O. I. Erf. S. 12.

f) Krapf a. e. a. O. 2. Erf. S. 13.

g) Derjenige Theil, der zunächst an der Wurzel ist, ist mild, und wenn die Pflanze etwas älter wird, saft- und geschmaklos, und unschädlich. Krapf a. e. a. O. Erf. 3. S. 13. 14.

h) Getroknet oder zwo Stunden lang mit zwölf bis sechzehn Theilen Wassers gekocht, sind sie ganz ohne Schärfe. Ebendersf. 17. Erf. S. 21. 19. Erf. S. 21. 22.

i) Krapf a. e. a. O. 4. Erf. S. 13. 14. 18.

k) Ebenderf. a. e. a. O. 6, 8—12. Erf. 14. 23. Erf. S. 15—19. 23.

l) Ebendersf. a. e. a. O. 15. Erf. S. 20.

m) Ebendersf. a. e. a. O. 16. 24. Erf. S. 20. 24.

n) Ebendersf. a. e. a. O. 21. 22. Erf. S. 22. 23.

o) Ebendersf. a. e. a. O. 5. 7. 13. Erf. S. 15—19.

www.dlibra.wum.edu.pl

ſer o*), erregen auf der Haut Juken p), Schmerzen q), Brennen r), Röthe s), Blaſen t) und Geſchwüre u); machen, wenn ſie in den Mund kommen, Zunge und Schlund rauh x), und erzeugen in dieſen Theilen hartnäkige Schmerzen y), ein unerträgliches Brennen z), Röthe a), Entzündung b), Abſchälen der Oberhaut c) und Sprünge d), äuſerſt häufigen Zufluß des Speichels e), verdorbenen Geſchmak f),

---

o*) Tilebein bei L. Crell chemiſche Annalen St. X. 1785. S. 313—321.

p) Krapf a. e. a. O. 6. 7. Erf. 15. 16.

q) Wenn ſie länger darauf liegen bleiben. Ebenderſ. a. e. a. O. 8—10. 13 Erf. S. 16—18.

r) Wenn ſie länger darauf liegen bleiben. Ebenderſ. a. e. a. O. 8—13. Erf. S. 16. 18.

s) Nach und nach. Ebenderſ. a. e. a. O. 6. Erf. S. 17.

t) Nach zwölf Stunden die Blätter. Ebenderſ. a. a. O. 6. Erf. S. 16. noch eher die Blumen. 7. Erf.

u) So wohl auf einer geſunden, als auf einer warzigen Haut Ebenderſ. a. e. a. O. 9—13. Erf. S. 17—19. das von den Blumen länger nicht zuheilt. Ebenderſ. a. e. a. O. 10. Erf. S. 17.

x) Ebenderſ. a. e. a. O. 1. 4. 5. 16. Erf. S. 12. 14. 15. 20.

y) Ebenderſ. a. e. a. O. 4—5. 16. 21. Erf. S. 14. 15. 20. 22.

z) Ebenderſ. a. a. O.

a) Wenn ſie länger in dem Munde bleiben. Ebenderſ. a. e. a. O. 45. Erf. S. 14. 15.

b) Wenn ſie länger im Munde bleiben. Ebenderſ. a. e. a. O. 4. 5. 21. Erf. S. 14. 15. 22.

c) Ebenderſ. a. e. a. O.

d) Ebenderſ. a. e. a. O. 4. 5. Erf. S. 14. 15.

e) Ebenderſ. a. e. a. O. 4. 5. 16. Erf. S. 14. 15. 20.

f) Ebenderſ. a. e. a. O. 4. 5. Erf.

www.dlibra.wum.edu.pl

einen ſtumpfen, manchmalen einen ſtechenden Schmerzen in den Zähnen g), Schmerzen und Röthe an dem Zahnfleiſche, und zuweilen ein Bluten aus demſelben h). Schon wenn man die Theile dieſer Pflanze zwiſchen den Fingern reibt i), oder ſonſt handthiert k), oder im Mörſer ſtößt l), oder mit kochendem Waſſer angießt m), oder mit Waſſer kocht n), reizen die flüchtigen Dünſte, Schlund, Naſe und Augen, und drüken aus ihnen Schleim o) und Thränen p) aus. Hat man das Unglük gehabt, etwas von dieſer Pflanze hinunter zu ſchlingen, ſo erfolgen brennende, anhaltende q) und zuweilen gleichſam krampfichte Schmerzen in der Kehle r), grauſame Magenſchmerzen und Bangigkeiten s), und eine völlige Unthätigkeit des Magens t), Schluchzen u), lange anhalten-

---

g) Ebenderſ. a. e. a. O.

h) Ebenderſ. a. e. a. O. 4. Erf. S. 13. 14.

i) Ebenderſ. a. e. a. O. 15. Erf. S. 20. 22.

k) Ebenderſ. a. e. a. O.

l) Ebenderſ. a. e. a. O. 14. S. 19.

m) Ebenderſ. a. e. a. O. 21. Erf. S. 22.

n) Ebenderſ. a. e. a. O.

o) Wenn man die Pflanze in groſer Menge an einem engen Orte ſtößt. Ebenderſ. a. e. a. O. 14. Erf. S. 19.

p) Ebenderſ. a. e. a. O. 14. 15. 21. Erf. S. 19. 20. 22. und das noch mehr, wenn ein Theil der Pflanze an dieſe Theile gebracht wird.

q) Ebenderſ. a. e. a. O. 24. Erf. S. 24.

r) Ebenderſ. a. e. a. O.

s) Scharf a. a. O. S. 108.

t) So daß die ſchärfſten Brechmittel ohne Wirkung waren. Scharf a. e. a. O.

u) Scharf a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

de Bauchschmerzen x), leichte Ohnmachten y), Verdrehen der Augen z), Zukungen in dem übrigen Gesichte a), in dem Unterleibe b), und in den Gliedern c), kalte Schweise d) und nicht selten der Tod e).

Diese Zufälle, gegen welche Brechmittel, laues Wasser, und Milch in groser Menge getrunken, und überhaupt die Heilart, die ich gegen die Wirkungen scharfer Pflanzengifte vorgeschrieben habe f), die beste und sicherste Hülfe verschaffen, vornemlich aber die kramfichten Zukungen in dem Gesichte, welche so oft auf den Genus dieser Pflanze erfolgen,

---

x) An verschiedenen Orten. Krapf a. e. a. O. 23. Erf. S. 23.

y) Ebenderf. a. e. a. O.

z) Scharf a. e. a. O.

a) Dahin gehört vornemlich das sardonische Gelächter, wie es die alten Aerzte nannten, welches Scharf a. e. a. O. auf den Genuß dieser Pflanze beobachtete, eine Wirkung, die zu einer ihrer Benennungen: Herba Sardonia Anlas gegeben hat.

b) In seinen innern Theilen. Krapf a. e. a. O. Verf. S. 23.

c) Scharf a. a. O. S. 108.

d) Scharf a. e. a. O. bei zween Italiänern, die das Kraut mit Essig angemacht, als Salat speiseten.

e) Ebenderf. a. e. a. O. und Amat. Lusitanus Annot. in Dioscor. S. 276.

f) Nur nüzen hier, nach den Erfahrungen eines Krapfs a. e. a. O. S. 26. u. f. Essig, Honig, Zuker, mineralische Säuren so gar nichts, daß sie vielmehr die schädliche Schärfe dieses Gewächses verstärken; selbst Oel, Milch, Butter schwächen sie nicht, wenn sie nicht in ungleich gröserer Menge genommen werden.

www.dlibra.wum.edu.pl

machen es sehr wahrscheinlich, daß dieser Hahnenfuß eben diejenige schädliche Pflanze seie, welche Dioscorides, und mit ihm die übrige griechischen Aerzten unter ihrer Σαρδονιη verstanden haben.

Inzwischen konnten weder die grausamen Wirkungen, welche sie auf den menschlichen Leib gehabt hat, noch der Widerwille, welchen das Vieh dagegen äusert, da es sie auf der Weide stehen läßt, und nur in der Krippe unter anderm Futter g), oder unter dem Heu frißt h), auch selbst die Krankheiten i), und das Sterben, welche auf ihren Genus unter den Schafen erfolgten k), und die schädlichen Kräfte, die sie auf einen Hund äuserte l), die Menschen abhalten, auch diese Pflanze zu ihrem Vortheile gebrauchen zu wollen.

---

g) 1) Schreber Samml. vermischter Schrift. III. S. 71. 2) Gleditsch de method. botan. Lipſ. 1742. S. 49.

h) Durch Ausdünstungen an der freien Luft und Austroknen verlieren alle Theile der Pflanze, selbst der ausgedrükte Saft alle Schärfe. Krapf a. e. a. O. Erf. S. 20 21.

i) Ihrem Genusse schreiben die Hirten das so genannte kalte Feuer zu, da das Vieh auf einmal nicht mehr fressen will, zittert und schauert, und unter dem Bauche stark aufgelaufene Adern bekommt. Schreber a. e. a. O.

k) Schreber a. e. a. O.

l) Das Erstemal litt er von einem Lothe des Saftes, den man ihm, nachdem er drei Tage lang nur weniges Brod, und gar kein Wasser bekommen hatte, eingab, nichts, weil man ihm sogleich darauf vieles Wasser zu saufen gab; da man ihm aber nach zween Tagen den Saft wieder, und zwo Stunden darauf gar kein Wasser gab, so bekam er Bangigkeit und Erbrechen; er wurde unruhig, und heulte, und unerachtet man ihm nun Wasser

www.dlibra.wum.edu.pl

Ich will davon nicht sagen, daß die Bettler in England und Schweden, die auf den Jahrmärkten herumfahren, sich ihres Saftes bedienen, um sich oder ihren Kindern Geschwüre in die Beine zu äzen, wodurch sie das Mitleiden anderer betrügen m); auch Aerzte bedienten sich ihrer statt eines Blasenpflasters, das sie vornemlich in hizigen Krankheiten auf die Handwurzel legten n), und andere empfehlen das davon gebrannte scharfe Wasser äuserlich in faulen, auch in holen Geschwüren, vornemlich in solchen, welche verhärtete Seitenwände haben o). Auch sogar den innerlichen Gebrauch dieses Gewächses, welches durch Austroknen, und durch anhaltendes Kochen mit einer genugsamen Menge Wassers alle Schärfe verliert p), und dagegen einen angenehmen süslichten Geschmak bekommt, preisen einige nicht nur, nach dem Vorgang der morlachischen Hirten, die es wie Kohl kochen, als eine angenehme Speise, sondern auch unter der Gestalt eines Trankes als ein versüssendes Arzneimittel in Husten und Katarrhen, wenn sie Schär-

---

genug gab, so erleichterte ihn dies doch nicht; er erbrach sich noch immer, krümmte sich zusammen, und brachte die Nacht äuserst unruhig zu; man schos ihn todt, und fand, da man ihn noch warm zergliederte, seinen Magen zusammen geschnürt, hin und wieder entzündet, hochroth und auf seiner innern Fläche angefressen. Krapf a. e. a. O. 25. 26. Erf. S. 25. 26.

m) Linné Flora Suecica Edit. II. Holm. 1755. S. 194. n. 499.

n) 1) Fierovanti Tesoro della vita humana Lib. IV. c. 14. 2) Krapf a. e. a. O. S. 105.

o) Krapf a. e. a. O. S. 30.

p) Wann zwo Hände voll davon mit einem Pfunde Wasser zwo Stunden lang gekocht werden. Krapf a. e. a. O. S. 12.

www.dlibra.wum.edu.pl

se zum Grunde haben q), und selbst den ausgedrükten Saft mit gemeinem Wasser verdünnt in Krankheiten der Harnwege und Geschwüren der Lunge r).

6) Virginischer Hahnenfuß, Ranunculus abortivus Linn.

Er ist in Virginien und Kanada zu Hause, und kommt dem nächst vorhergehenden, vornemlich in Beziehung auf Schärfe s) sehr nahe. Sein Stengel trägt gemeiniglich nur drei kleine Blumen; seine Blätter sizen auf eigenen Stielen. Die untersten, welche zahlreicher sind, und unmittelbar aus der Wurzel kommen, haben die Gestalt eines Herzens, und sind am Rande gekerbt; die obern sind dreifach und ekig, und sizen auf sehr kurzen Stielen.

7) Illyrischer Hahnenfuß, Ranunculus Illyricus Linn. Jacquin Flor. austr. B. III. Pl. 222.

Man findet ihn in Oeland, Oestreich, Ungarn, Italien, und Languedok, und zwar von verschiedener Grösse. Seine Wurzel ist knollig, die übrigen Theile ganz wollig; sein Stengel trägt viele Blumen mit blaßgelber Krone; seine Blätter entspringen immer zu drei aus einem Punkte des Stengels; sie haben einen ganz gleichen und glatten Rand, und beinahe die gleiche Breite, nur daß sie in der Mitte etwas

---

q) Ebendersf. a. e. a. O. S. 22.

r) Das gekochte Wasser, Ebendersf. a. e. a. O. S. 103. Ein halbes Quintchen des ausgedrükten Saftes mit zwölf Loth Wasser S. 27.

s) Buhn a. e. a. O. S. 121.

www.dlibra.wum.edu.pl

was breiter, und an beiden Enden spizig sind. Er hat in allen seinen Theilen mit dem Rübenhahnenfuse die gleiche Schärfe t).

8) Rübenhahnenfuß, knolliger Hahnenfuß, kleiner Hahnenfuß, Taubenfuß, Drüswurz, Brennkraut. Ranunculus bulbosus Linn. Flor. Danic. Pl. 551.

Er wächst in ganz Europa häufig auf Weiden und an Heken; an trokenen und sonnigen Orten ist er kleiner, einfacher, haariger, und mehr blaß; an angebauten Orten hingegen, und auf frischen Weiden wächst er gröser und höher, und ist mehr glatt und blumenreich. Seine Wurzel hat die Gestalt einer runden Rübe; sein Stengel wächst aufrecht, und zuweilen bis zween Schuhe hoch, oder auch noch höher; er ist inwendig hol, und treibt viele Aeste, welche wie ein Arm ausgestrekt sind. Seine untersten Blätter sind in drei Stüke getheilt, wovon jedes auf einem eigenen Stiele sizt; die äussern sind wieder in drei Abschnitte gespalten; das mittlere bis auf die Mitte wieder in drei Stüke getheilt; die obern Blätter sind gröser und länger, sizen jedes auf einem eigenen Stiele, und theilen sich ebenfalls in drei Lappen. Seine Blumen haben ungefähr sechzig Staubfäden und einen glatten in ein mattes Gelb spielenden Kelch, der anfangs weit offen steht, aber nachher umgeschlagen wird; ihre gelbe Krone hat einen starken Gummiglanz, und jedes ihrer Blättchen an seinem untern schmalen und grünlichten Ende eine entzwei gespaltene Schuppe.

---

t) Krapf a. e. a. O. S. 93.

www.dlibra.wum.edu.pl

Auch dieſe Art iſt in allen ihren Theilen, wenn ſie nicht getroknet, veraltet oder abgekocht ſind u), in ihrer Wurzel x), in ihrem Stengel y), in ihren Blättern z), in ihren Blumen a) und in ihren Samen b) eben ſo ſcharf c), ja noch ſchärfer, als der Gifthahnenfus d), und erregt auf der Haut e), auf der Zunge f), in dem Zahnfleiſche, und an den Zähnen g), in dem Magen und Gedärmen, wenn ſie in dieſe Theile kommt, und durch ſie auch in dem übri-

---

u) 1) Krapf a. e. a. O. 2, 8, 10, 20. Erf. S. 69. 73. 74. 78. 2) J. Bauhin a. a. O. III. Theil II. S. 418.

x) In dem knolligen Theile vornemlich, ſo lange die Pflanze blüht. Krapf a. e. a. O. 1, 2, 4, 6. Erf. S. 69. 70. 72. In dem Würzelchen vornemlich, ehe ſie blüht. Ebenderſ. a. e. a. O. 2. 5. Erf. S. 70. 71.

y) Wenn er nicht bereits holzig iſt, oder die Natur gerade mit der Bildung der Blumen, oder Zeitigung des Samens beſchäftiget iſt. Krapf a. e. a. O. 1. 2. Erf. S. 69.

z) Wann ſie nicht blaß, oder ſaftlos ſind. Krapf a. e. a. O. 1. 2. 3. 15. Erf. S. 69. 70. 76.

a) Vornemlich in den Staubwegen. Krapf a. e. a. O. 1. 2. 3. 12. 13. Erf. S. 69. 70. 74. 75.

b) Doch nicht ſo ſcharf, als die übrigen Theile. Krapf a. e. a. O. 20. Erf. S. 78.

c) Nach dem Zeugniſſe aller Schriftſteller. J. Bauhin a. e. a. O. u. a.

d) Krapf a. e. a. O. 1. 15. Erf. S. 69. 70. 100.

e) 1) Krapf a. e. a. O. 3—7. 10. Erf. S. 70—74. 2) J. Bauhin a. e. a. O. 3) Petit Memoires de l'Academie des ſciences à Paris pour l'année 1732. S. 233.

f) Krapf a. e. a. O. 12. 20. Erf. S. 74. 75.

g) Krapf a. e. a. O. 1. Erf. S. 69.

www.dlibra.wum.edu.pl

gen Leibe die gleichen Zufälle, wie jener h), und in einem weit höhern Grade i). Selbst ihre Ausdünstungen schaden Nase und Augen auf die gleiche Weise k).

Auch diese Art, deren Wurzel boshaftige Bettler mit Drachenblut vermischen, und sich an die Waden oder Schenkel schmieren, um sich daselbst Geschwüre zu erregen l), kann, wie der Gifthahnenfus, innerlich und äuserlich gebraucht werden. Schon Tragus empfahl sie äuserlich statt der Blasenpflaster, und sie hat vor den Blasenpflastern diesen Vorzug, daß sie leicht zu haben, und unter dem Sande lange frisch zu erhalten ist, daß sie geschwind, anhaltend, und ohne Schmerzen, und ohne den Umlauf der Säfte zu beschleunigen wirkt m). Ihre Blumen färben mit Alaun auf Wolle pomeranzengelb, wenn sie aber ganz kurz damit gekocht werden, citronengelb n).

9) Alpenhahnenfuß, Ranunculus alpestris Linn. Jacquin Flor. austr. B. II. Pl. 110.

Er ist auf den schweizerischen und östreichischen Alpen zu Hause. Seine Wurzel ist ziemlich gerade, und giebt viele zarte und saftige Fasern von sich; sein Stengel wird ohngefähr drei Zolle hoch, hat seiner ganzen Länge nach nur eines oder das andere schmale, weisse Blättchen, und trägt höchstens eine, selten zwo Blumen. Seine Blätter sind glänzend

---

h) Krapf a. e. a. O. 12. Erf. S 75.
i) Krapf a. e. a. O. 1. 13. 15. Erf. S. 69. 75. 76.
k) Krapf a. e. a. O. 9. 15. 20. Erf. S. 74. 76. 78.
l) J. Bauhin a. e. a. O.
m) Krapf a. e. a. O. S. 99. 104. 105.
n) Rutty a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

glatt, und kreisrund, mit einer kleinen Bucht; sie sind seicht in drei Lappen getheilt. Seine Blumen haben einen blaßgrünen Kelch mit einem breiten weissen und glatten Saume, und eine weisse Krone, deren Blättchen die Gestalt eines Herzens haben. Sein Samenköpfchen ist lang-und rund, beinahe wie ein Ei.

Er hat eine sehr grose Schärfe o), und erregt auf der Haut Blasen p); auch das davon gebrannte Wasser treibt mit Heftigkeit auf den Stuhlgang q). Die Jäger auf den Alpen gebrauchen ihn gegen den Schwindel r).

10) Blumenreicher Hahnenfuß. Ranunculus polyanthemos Linn. Ranunculus polyanthemos simplex, Lobel. Icon. I. S. 666.

Er wächst in ganz Europa, vornemlich in den kältern Gegenden desselbigen, in Wäldern und auf Grasbeden. Seine Wurzel ist knollig und rund, und giebt viele Zasern von sich; seine Stengel sind aufrecht, ziemlich weitschweifig in Aeste zertheilt und blumenreich; jeder von diesen steht auf einem eigenen Stiele, zertheilt sich wieder in schmale an der Spize verhärtete Lappen, und hat an seinem Rande Zähne, welche abwechselnd gros und klein sind. Seine Blumen stehen auf seicht gefurchten Stielen; ihr Kelch ist haarig und anfangs weit offen, schlägt sich aber mit der Zeit um; ihre Krone hat eine gelbe Farbe, und einen Gummiglanz. Er ist

---

o) Herr v. Haller Hist. stirp. Helvet. indig. II. S. 71.

p) Jak. Constant de Rebecque. Atrium medicinae Helvetiorum. Geneu. 1691 obs. 20

q) Konr. Gesner nach Herrn v. Haller a. e. a. O.

r) Herr v. Haller a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

scharf und zieht auf der Haut Blasen; zu J. Bauhin's *) Zeiten bediente sich desselbigen ein Arzt statt eines Blasenpflasters.

11) Brennender Hahnenfuß, scharfer Hahnenfuß, gemeiner Hahnenfuß, Schmalzblümlein, Pfännlein. Ranunculus acris Linn. Bulliard Herbier de la France. Pl. 109.

Er wächst in ganz Europa häufig auf Wiesen, und noch häufiger auf Weiden. Seine Wurzel ist länglicht, läuft in die Quere, und treibt viele gerade Zasern. Sein Stengel ist inwendig hol, und wächst aufrecht; zuweilen bleibt er niedrig, und treibt keine Aeste, meistens aber wächst er höher, theilt sich in viele Aeste, und hat viele Blätter; diese sind etwas haarig und haben auf ihrer untern Fläche einen braunen Fleken, der von dem Stiele an nach der Spize des Blattes zu, immer breiter wird; die untern haben keine eigene Stiele; sie sind ziemlich gros, beinahe fünfekig, und bis an den Stiel in drei Lappen getheilt, von welchen sich die äusern wieder in zwei, der mittlere aber in drei Stüke mit drei Zähnen am Rande spält; die obern Blätter kommen aus einer Scheide, und theilen sich in breite Lappen, die am Rande wie eine Sage gezakt, und bei den obersten Blättern ganz schmal, und wie eine Hand ausgebreitet sind. Seine Blumen sizen auf Stielen, welche mit vest angedrükten Haaren bekleidet sind, und haben einen glänzenden, weit offen stehenden Kelch, der, wenn die Blume verwelkt, umgeschlagen ist, und bald abfällt. Die Blättchen, aus welchen er besteht, sind durch einen schwarzen Strich in der Mitte gleich-

*) Hist. plant. III. Th. II. S. 416.

www.dlibra.wum.edu.pl

sam entzwei getheilt; ihre Krone hat einen starken Gummiglanz, und die Blättchen derselbigen an ihren schmälern Enden eine Schuppe.

Er kommt, in Absicht auf die Schärfe aller seiner Theile mit dem Rübenhahnenfuse überein t); nur sind seine Staubwege noch schärfer, als bei diesem u), und äusert mit ihm auf alle Theile, die er berührt, die gleichen Wirkungen x). Man hat daher schon längst seinen äuserlichen Gebrauch an die Stelle der Blasenpflaster empfohlen y), obgleich die Geschwüre, die er macht, viel schwerer heilen z), und selbst der äuserliche Gebrauch in dem Theile, den er berührt, unausstehliches Brennen a), so gar Ohnmachten b) und Unbeweglichkeit der Gelenke, auf die er gelegt wurde c) erregt haben soll. Ein Knabe von acht Jahren hatte, um sich vom Fieber zu befreien, etwas davon auf die Handwurzel gelegt; er bekam davon Wassersucht und einen Wasserbruch, und an der Stelle, auf welche das Kraut gelegt worden war, ein langs nicht heilendes Geschwür d); zween andere Knaben starben von dem Genusse der Wurzeln noch in derselbigen Nacht an

---

t) Krapf a. e. a. O. S. 90.

u) Ebenders. a. e. a. O.

x) Ebenders. a. e. a. O.

y) 1) Fr. Hofmann opuscul. medic. practic. Dec. II. Diss. IX. S. 523. 2) Nic. Chesneau a. a. O. L. I. C. I. S. 5. 3) Störk annus medic. II. S. 123. 4) Miscell. Vratislau. 1719. Mon. August.

z) Störk a. e. a. O.

a) Muralto chirurgische Schriften. Bas. 1711. Beob. 59.

b) Muralto a. a. O.

c) Miscell. Vratislau. a. e. a. O.

d) J. J. Plenk Toxicolog. S. 198.

www.dlibra.wum.edu.pl

Zukungen e). Doch rühmt man auch im Roz der Pferde dieſe Art als ein ſehr kräftiges Mittel, wenn man ſie friſch ſtampft, und vier und zwanzig Stunden lang hinter die Ohren legt f).

Allein dieſer Hahnenfus verliert ſeine Schärfe, wie ich bereits von den übrigen Arten geſagt habe, leicht. Schon wenn er in Gärten gepflanzt wird, oder von ſelbſt auf angebautem Boden wächſt, wird er ganz mild g). Ueberhaupt verlieren alle dieſe Gewächſe, wenn ſie in einen, ihrem natürlichen Standort gerade entgegen geſezten Boden verpflanzt werden, wo nicht alle, doch einen groſen Theil ihrer ſchadlichen Schärfe.

12) Akerhahnenfuß, Feldhahnenfuß. Ranunculus arvenſis Linn. Fl. Danic. Pl. 219.

Er wächſt in ganz Europa, vornemlich in den mittägigen Gegenden deſſelbigen, ſehr häufig auf Aekern, welche naſſen Thonboden haben.

Er gehört unter die Sommergewächſe; ſeine Wurzel beſteht aus kurzen Faſern, welche aus einem kleinen Knollen entſpringen. Sein blätter- und blumenreicher Stengel iſt glatt, liegt auf der Erde auf, wird manchmalen einen Schuh lang, und verbreitet ſich in viele Aeſte. Seine Blätter ſind blaß und ſein zertheilt; die unterſten ſizen auf langen Stielen und theilen ſich in drei Lappen, deren jeder wieder ſeinen

e) Mediciniſch chirurgiſche Zeitung herausgegeben von Hartenkeil und Metzler. Salzburg s. 1792. B. II. S. 79.

f) Nach einer von Willis entlehnten Nachricht. Haller a. a. O. II. S. 72.

g) Krapf a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

eigenen Stiel hat; die äusern dieser Lappen sind wieder in zween, der mittlere aber in drei schmale Abschnitte gespalten. Seine Blumen sind klein, und haben nur ungefähr fünfzehn Staubfäden; ihre Krone ist blaßgelb und jedes Blättchen derselbigen hat an seinem untern Ende eine kleine Schuppe. Jede Blume hinterläßt ungefähr acht runde, flache Samen, die ein stachlichtes Köpfchen bilden, und unter welchen die äusern gröser sind, als die innern.

Obgleich Wurzel h) und Samen i) dieser Art ohne schädliche Schärfe sind, so äusern doch die Blätter k), vornemlich der daraus gedrükte Saft l), und Blumen, und in diesen vorzüglich die Staubwege m), eine ungemeine Schärfe, und auf der Haut n), auf der Zunge o), an den Lippen p) und in dem innern Munde q) eben die Zufälle, wie der Rübenhahnenfus. Zwei Lothe von dem aus dem Kraute ausgedrükten frischen Safte haben einen kleinen Hund, dem man drei Stunden lange nachher kein Wasser gab, nach häufigem Erbrechen, unmäßigem Stuhlgang und krampfhaften Bewegungen, innerhalb drei Tagen getödet, und nach seinem

---

h) Krapf a. e. a. O. 15. Erf. S. 85.

i) Ebenderf. a. e. a. O. 1. Erf. S. 79.

k) Ebenderf. a. e. a. O. 2. Erf. S. 80.

l) Dieser ist noch schärfer, als der Saft des Rübenhahnenfuses. Krapf a. e. a. O. 8. Erf. S. 82. 106.

m) Ebenderf. a. e. a. O. 4—7. Erf. S. 80—82.

n) Ebenderf. a. e. a. O. 3—7. Erf. S. 80—82.

o) Ebenderf. a. e. a. O. 1. 2. 4. 8. Erf. S. 79—82.

p) Ebenderf. a. e. a. O. 8. Erf. S. 82.

q) Ebenderf. a. e. a. O. 1. 2. 4. 8. Erf. S. 79—82.

www.dlibra.wum.edu.pl

Tode fand man Schlund und Magen ganz entzündet, angefressen und voll Brandbläschen r).

Von zween andern, welche sechs Loth dieses Saftes bekommen hatten, starb der eine innerhalb vier Minuten ganz ruhig, der andere mit Zukungen, Erbrechen und heftigem Bauchflusse in achtzehn Stunden s). Sieben Schäfe, welche die Pflanze auf der Weide gefressen hatten, starben davon beinahe plözlich t).

13) Stachlichter Hahnenfuß, Ranunculus muricatus Linn. Skuhr botanisches Handbuch 152.

Er wächst im mittägigen Theile Europens in Wassergräben und an feuchten Orten wild, und ist mit dem Ackerhahnenfuse nahe verwandt, hat auch, wie dieser, stachlichte Samen; aber sein Stengel ist weitschweifig, und seine Blätter glatt und einfach, und nur in stumpfe Lappen getheilt. Er ist eben so scharf, als der Gifthahnenfus u).

14) Grasartiger Hahnenfuß. Ranunculus gramineus Linn. Bulliard a. e. a. O. Pl. 125.

Seine Wurzel besteht aus Knollen oder ganzen Bündeln kleiner Wurzeln. Sein Stengel wächst aufrecht, und oft gegen zween Schuhe hoch; er ist ganz durch vest, zäh und

---

r) Ebenders. a. e. a. O. 10. Erf. S. 23.

s) J. Brugnone Memoir. de l'Academie des scienc. à Turin 4. pour les ann. 1788 et 1789. S. 112.

t) Ebenders. a. a. O. S. 110.

u) Puihn a. e. a. O. S. 124.

www.dlibra.wum.edu.pl

rundlicht. Seine Blätter sind gestreift, und ihrer ganzen Länge nach beinahe gleich breit, nur daß sie an beiden Enden spizig zulaufen, beinahe wie Grasblätter; sie sind übrigens unzertheilt, lang, schmal, und brüchig; die obern sind kleiner als die untern, und diese sizen gemeiniglich auf eigenen Stielen. Seine Blumen haben eine gelbe Krone. Er findet sich auf den pyrenäischen Gebirgen, und in Frankreich auf trokenen Wiesen. In der Wurzel hat J. Bauhin x), und eine noch beträchtlichere Schärfe in der Blüthe wahrgenommen.

15) Ranunkel. Ranunculus asiaticus Linn. Miller Illustrations ic. Pl. 216.

Sie ist ursprünglich in Asien und Mauritanien zu Hause, und die fruchtbare Stammmutter einer fast unzählbaren Menge von Spielarten, welche in Gärten gezogen werden. Ihre Wurzel besteht aus mehreren kleinern rübenförmigen Wurzeln. Ihr Stengel wächst aufrecht, theilt sich unten in einige Äeste, und ist ganz wenig haarig, und, so wie die Blumenstiele, rundlicht. Ihre Blätter sind ziemlich dik blaßgrün und auf ihrer untern Fläche, so wie an ihrem Stiele, etwas haarig; die untersten sind einfach und in spizige Lappen getheilt, welche an ihrem Rande Einschnitte haben; die obern Blätter sind dreifach, und oft ist jedes ihrer Stüke wieder dreifach; die Stüke, aus welchen sie bestehen, sind in drei Abschnitte gespalten und eingeschnitten. In ihren Blumen ist der Kelch nicht umgeschlagen, und die Krone bald weis, bald hochroth; überhaupt zeigt sich in Absicht auf Farbe und Vervielfältigung der Blumen bei dieser Art eine unüberseliche Mannigfaltigkeit.

x) a. a. O. B. II. Th. 2. S. 566.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ihre Blätter haben einen unangenehmen und beissend scharfen Geschmak y); vielleicht verliert sich diese Schärfe, wenigstens bei ihren Spielarten, so wie bei andern giftigen Gewächsen, durch die Cultur. Wenigstens haben weder Arzt noch Gärtner von dem Schaden, den dieses in Blumengärten so gemeine Gewächs gestiftet habe, etwas aufgezeichnet.

16) Wasserhahnenfuß, weisser Wasserhahnenfuß, Ranunculus aquatilis Linn Flor. Danic. Pl. 376.

Er wächst in ganz Europa in kleinern Wassern, deren Oberfläche er in den Monaten Mai, Brachmonat, Heu- und Erndemonat mit seinen weissen Blumen gänzlich überdekt. Sein langer Stengel schwimmt im Wasser, und gibt ganze Bündel von Wurzelzasern, und diesen gerade gegen über Blätter von sich; diese, wenigstens diejenigen, die unter dem Wasser sind, theilen sich in sehr viele gleichlaufende, sehr lange, sehr feine und haarzarte Stüke; diejenigen hingegen, die über dem Wasser sind, sind nicht so getheilt, und ihr Stiel senkt sich an der untern Fläche des Blatts beinahe in den Mittelpunkt desselbigen ein. Seine Blumenstiele entspringen in den Winkeln der Blätter aus der nemlichen Scheide, aus welcher die Blattstiele hervorkommen; sie sind ganz entblößt, und jeder von ihnen trägt nur eine einige Blume; diese ist nicht sehr groß, und hat zwanzig bis dreisig Staubfäden und eine weisse Krone; jedes Blättchen der Krone hat an seinem untern, schmälern und gelben Ende ein Grübchen, welches in einen erhöhten Ring eingefaßt ist. Seine Samengehäuse sind runzlicht, und rund, wie ein Ei.

---

y) J. Bauhin a. a. O. B. III. Theil 2. S. 863.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sein Kraut ist, vornemlich ehe sich die Blumen öfnen, scharf z): doch ist diese Schärfe nach der Verschiedenheit des Standorts von verschiedener Stärke a); am schärfsten sind die Blumen selbst b), besonders so lange sie noch ganz frisch sind c); sie erregen alsdann auf der Haut Blasen d), und, unter die Nase gehalten, Juken und heftiges Niesen e); aber auch diese Art verliert durch Troknen ihre Schärfe f); bei Ringwood in England wird sie Schweinen und Kühen als gewöhnliches, und einige Zeit des Jahres hindurch beinahe als einiges Futter gegeben, bei welchen sie sich sehr wohl befinden g).

17) Hahnenfuß mit Ahornblättern, groser weisser Hahnenfuß, weisser Hahnenfuß, weisser Alphahnenfuß, weisse Trollblume, Fidertsche. Ranunculus platanifolius Linn. Flor. Dan. Pl. 111.

Er wächst in Teutschland, in der Schweiz und in Italien in Alpengegenden. Seine Wurzel ist in Scheiden eingehüllt, und gibt eine Menge weisser, rundlichter Zasern und Borsten von sich. Sein Stengel wächst aufrecht und bis

---

z) Krapf a. e. a. O. S. 83.

a) Ebenders. a. e. a. O. Bei Schönbrunn war er kaum scharf, bei Trieste und Wien nach Baumgarten zu war er äuserst scharf. Krapf a. e. a. O.

b) Ebenders. a. e. a. O. S. 83. 96.

c) Ebenders. a. e. a. O. S. 96.

d) Ebenders. a. e. a. O. S. 83.

e) Ebenders. a. e. a. O. S. 96.

f) Ebenders. a. e. a. O.

g) R. Pulteney a. a. O. S. 19. 20.

www.dlibra.wum.edu.pl

vier Schuhe hoch; er ist inwendig hol, und theilt sich in Aeste, die, wie ein Arm, ausgestrekt und da, wo sie entspringen, mit drei schmalen Deckblättern besezt sind. Seine Blätter sind glatt, schön grün geadert, und an ihrem Ende eingeschnitten; sie theilen sich in drei spizige Lappen, die, wie eine flache Hand, ausgebreitet, und von welchen die äusern wieder entzwei getheilt sind. Seine ansehnlichen Blumen stehen einzeln an den Gipfeln der Stengel, und haben eine sehr grose Menge Staubfäden; ihr Kelch ist klein, fällt bald ab, und spielt in eine matte Purpurfarbe; ihre Krone ist schneeweis; die Blättchen derselbigen sind rund, an ihrem Rande, wie eine Sage, gezakt, und an ihrem untern Ende mit einer stumpfen Schuppe besezt. Seine Blatter haben einen scharfen Geschmak, der aber doch milder ist, als bei den übrigen Arten h).

18) Breynischer Hahnenfuß, Ranunculus Breynii. Cranz Fasc. stirp. Austriac. II. Pl. 4. Abb. 2.

Seine Wurzel hat einen unten etwas zugespizten Knollen, aus welchem die Zasern auslaufen, und treibt viele haarige Stengel. Diese werden höchstens drei Zolle hoch, und tragen nur eine Blume; an diesen Stengeln sizt nur ein einiges Blatt, das, wie eine flache Hand, ausgebreitet ist, und drei ganz dünne Zähne hat; die übrigen entspringen unmittelbar aus der Wurzel, und sind bis auf die Hälfte in drei Lappen, und diese wieder in kleinere Stüke getheilt. Seine Blumen sind, in Vergleichung mit der übrigen Pflanze, gros, und haben einen sehr haarigen Kelch, der sich mit

h) J. Baubin a. a. O. III. S. 859.

www.dlibra.wum.edu.pl

der Zeit zurük legt; ihre Krone hat eine gelbe Farbe, und einen Gummiglanz; auch die Spize des Blumenstiels, auf welcher die Staubfäden aufsizen, ist mit Wolle bekleidet. Er hat vornemlich in den Blumen, eine ziemliche Schärfe, und übertrift darinn, wenn er zur Blüthezeit untersucht wird, beinahe den Gift- und Rübenhahnenfuß; er macht auf der Haut Blasen; doch verliert auch er, wenn er in Gärten gepflanzt wird, den gröften Theil seiner Schärfe i).

19) Hahnenfuß mit Eppichblättern, Ranunculus sardous. Cranz Fasc. stirp. Austr. II. S. 84. Ranunculus alter Ioach. Camerarii. Andr. Matthiol de plantis epitome. 1586. S. 381.

Er bleibt ziemlich klein; seine Wurzel besteht aus vielen kleinen, weissen, fadendünnen, senkrechten Würzelchen, welche zur Seite einige wenige Zasern von sich geben, sie treibt sehr viele dike Blätter, welche den Eppichblättern ähnlich sehen, und, so wie der Stengel, sehr haarig sind; meistens sind sie in drei Lappen, und zuweilen nur ganz seicht, getheilt; einige sind bald tiefer, bald seichter in Querstüke gespalten. Seine Blumen haben einen wolligen, gelblichten, umgeschlagenen Kelch und eine gelbe Krone, und jedes Blättchen der lezten an seinem untern Ende eine kleine drei- oder viereKige Schuppe. Seine Samen haben eine gerade nicht gebogene Spize; sie sind breit gedrükt, und bilden ein rundes Köpfchen. Durch diese Merkmale, durch die Wolle, welche die ganze Oberfläche der Pflanze bekleidet, und durch die

i) Krapf a. e. a. O. S. 92.

www.dlibra.wum.edu.pl

häufigen tiefen Einschnitte an den Blättern zeichnet sich diese Art von dem Giftbahnenfuse aus.

Obgleich die Wurzel k), und die Blätter, welche unmittelbar aus dieser hervorkommen l), obgleich der untere Theil des Stengels m), die Blumenkrone, der Blumenkelch und die Staubfäden n), obgleich die Samen o), und, wenn die Pflanze einmal diese zur Zeitigung gebracht hat p1); die ganze Pflanze keine beträchtliche Schärfe mehr äusert; so haben doch die Staubwege eine brennende Schärfe, die auf der Zunge lang anhaltenden Schmerzen p2), und auf der Haut, wenn sie zwölf Stunden lang darauf gelegen haben, eine Blase erregen p3), aber auch diese verlieren alle Schärfe, wenn sie etwas älter und troken sind p4).

Es ist wahrscheinlich, daß auch die übrigen Arten dieser Gattung eine ähnliche schädliche Schärfe besizen; wenn diese nicht durch die Veränderung ihres natürlichen Standorts, und durch die Cultur gemildert wird. Wenigstens ist bisher das Gegentheil noch von keiner Art, als von dem pyrenäischen, pyrenaeo (Jacquin Miscellan. austr. I. Pl. 18. Abb. 1.) dem goldgelben, auricomo (Flor. danic. P. 665.) dem scheichenden, repente (Flor. Danic. P. 795.) und dem wolligen,

---

k) Ebenderf. a. e. a. O. 1. S. 87.
l) Ebenderf. a. a. O. 2. Erf. S. 87.
m) Ebenderf. a. e. a. O.
n) Ebenderf. a. e. a. O. 3. Erf. S. 88.
o) Ebenderf. a. e. a. O. 5. Erf. S. 88.
p1) Ebenderf. a. e. a. O.
p2) Ebenderf. a. e. a. O. 4. Erf. S. 88.
p3) Ebenderf. a. e. a. O. 7. Erf. S. 89.
p4) Ebenderf. a. e. a. O. 4. Erf. S. 88.

www.dlibra.wum.edu.pl

lanuginoso (Flor. Danic. Pl. 397.) Hahnenfuse ungezweifelt durch sichere Erfahrungen und Zeugnisse erwiesen.

VIII) Wolfsmilcharten. Euphorbiae, s. Tithymali.

Alle Gewächse dieser Abtheilung sind voll von einem scharfen, milchweissen Safte, der, wo man sie auch verwundet, so gleich herausfließt. Die meisten unter ihnen halten mehrere Jahre aus; ihre Wurzeln sind lang und nicht sehr zertheilt; sie haben auch nur wenige Aeste. Ihre Stengel sind rundlicht und saftig. Ihre Blumen sizen auf eigenen Stielen und haben beständig Staubfäden und Staubwege zugleich; der Kelch derselbigen hat einigermassen die Gestalt einer Gloke, und ist unten bauchig; er besteht aus einem zusammenhängenden Stüke, das erst oben in vier bis fünf Abschnitte gespalten ist. Ihre Krone spielt meistens auch in die grünlichte Farbe, und besteht aus vier bis fünf Blättchen, welche abwechselnd mit den Abschnitten des Kelchs und zwischen denselbigen stehen. Die Anzahl ihrer Staubfäden geht von zwölf bis auf vierzig, gemeiniglich ist sie drei- oder viermal so stark, als die Menge der Blättchen an der Blumenkrone; sie stehen meistens in mehrern Reihen unter einander, so, daß wenn man oben in die Blume hinein sieht, man gemeiniglich nur einen geringen Theil derselbigen gewahr wird; sie bestehen gleichsam aus zwei Gelenken, und jeder von ihnen trägt zween Staubbeutel an seiner Spize; ihr Eierstok hängt an einem eigenen Stiele, und zwar, wenn sich die Blume schon längst geöfnet hat, zur Blume heraus; er endigt sich mit drei Griffeln, die an ihrer Spize zween

umge-

www.dlibra.wum.edu.pl

umgekrümmte Haken haben. Jede Blume hinterläßt ein trokenes Samengehäus, das aus drei Schalenstüken besteht, und in drei Fächer getheilt ist, deren jedes einen Samen enthält.

Ausser der süssen und rauhen Wolfsmilch (Euphorbia dulcis und hirta) ist es von allen übrigen Arten dieser Gattung äuserst wahrscheinlich, und von den meisten durch Erfahrung erwiesen, daß sie eine schädliche Schärfe haben, die bei einigen Arten q1) und in einigen Theilen q2) schwächer, in andern stärker, und in dem milchweissen Safte am stärksten ist. Bienen, die es wagen, den Honigsaft ihrer Blumen zu saugen, gehen öfters davon zu Grunde r). Ihr Saft erregt äuserlich auf die Haut gebracht, Geschwulst s), schmerzhafte

---

q1) So schrieb schon Galen seinem Tithymalo Characiae und Myrsinitae, dann dem Cyparissiae, nachher dem Paraliae, und dann erst dem Helioscopio, die gröste Schärfe zu, de simplicium medicamentorum facultatibus, Paris 1547. L. VIII. S. 263. So hält man zu unsern Zeiten die Springkörner für eine der schärfsten.

q2) So ist insgemein der Saft am schärfsten; alsdann Blätter und Früchte; meistens ist die Wurzel gelinder.

r) Palladius de Re rustica L. IV. c. 15. Edit. Gesner. S. 949. Und wenn sie auch die Schafe ohne Schaden ihres eigenen Lebens fressen, so sind doch die aus ihrer Milch zubereiteten Käse ein Gift für den Menschen. Targioni Toppetti a. a. O. S. 159. 213. Ein ähnlicher Fall ereignete sich späterhin zu Rom mit Ziegenkäse; ein Fehler, den man, an dem ausnehmend beissenden Geschmak der Käse und an einer gewissen gelblichten Feuchtigkeit, die sich inwendig in denselben sammlet, leicht erkennen kann.

s) Bei einem Frauenzimmer, die sich das Gesicht damit schminken wollte. Ehrhard ökonomische Pflanz. Hist. VII. B. S. 292.

www.dlibra.wum.edu.pl

Entzündung t), Blasen u) und Geschwüre x) auf das geschlossene Augenlied gelegt, Entzündung des Auges und Blindheit y), und wenn er hinunter geschlungen wird, Brennen z) und Entzündung a) der Kehle und des Magens, das erschrecklichste Erbrechen b), die grausamsten Bauchflüsse c), Blutstürze aus der Lunge d), allgemeine Wassersucht e) und den Tod f).

Ein Theil dieser schädlichen Schärfe verliert sich, wenn die Theile dieser Pflanze etwas älter sind, noch mehr, wenn sie in Essig eingeweicht, oder mit Essig versezt werden. Dieser ist das kräftigste Gegengift gegen diese Gewächse und ihre Säfte, das, auser den oben angegebenen allgemeinen Rettungsmitteln gegen die scharfen Gifte aus dem Pflanzenreiche, den schädlichen Folgen derselbigen auf den menschlichen Leib am mächtigsten widersteht.

---

t) Ebenderf. a. e. a. O.

u) Ebenderf. a a. O. S. 291.

x) Nach dem Zeugnisse der meisten Aerzte, die es gebrauchten, um Warzen und andere ungleiche Erhöhungen auf der Haut hinweg zu äzen. Galen und Ehrhard a. d. a. O. Vogel Hist. mat. med. Francof. et Lipf. 1760. S. 238. und der Erfahrung der Bettler, die sich damit Geschwüre in die Haut äzen, Ehrhard a. e. a. O.

y) Tim a Güldenklee a. a. O. Hall. S. 43.

z) Nach Tourneforts Erfahrung, Ehrhard a. e. a. O.

a) Ebenderf. a. e. a O.

b) Die Wurzel bei einem Bauren, Ledelius Ephem. Acad. Caesar. Nat. Curios. Dec. II. ann. 10. S. 33.

c) Vogel a. e. a. O.

d) Ledelius a. a. O.

e) Siegesbeck Miscell. Vratisl. 1721. II. S. 192.

f) Ledelius a. a. O. S. 34.

www.dlibra.wum.edu.pl

Es ist aber auch dasjenige Mittel, dessen sich noch alte kluge Aerzte bedienten, wenn es ihnen darum zu thun war, diese giftigen Kräfte in Heilskräfte umzuschaffen, und selbst den innerlichen Gebrauch dieser Säfte sicherer zu machen. Nur gewissenlose Marktschreier oder Waghälse von Aerzten mögen es versuchen, diese Gewächse, ohne eine solche Fürsicht zu unsern Zeiten innerlich zu verordnen. Ob es mir gleich höchst wahrscheinlich ist, daß alle Arten dieser Gattung, die süse und die mit Haaren besezte (Euphorbia dulcis und hirta) ausgenommen, vornemlich diejenige, deren Blätter weder Runzeln noch eine Bekleidung von Haaren haben, eine schädliche Schärfe haben; so werde ich hier doch nur derjenigen gedenken, von deren Schärfe ich gültige, auf eigene, oder andere Erfahrung gegründete Zeugnisse vor mir habe.

1) Wahre Euphorbie. Euphorbia antiquorum. Blackwell a. a. O. Pl. 339.

Sie ist in Ostindien und Arabien zu Hause, und gehört unter die Stauden. Ihre Wurzel ist weis, zasericht und gerade. Ihr Stamm ist sehr saftig, breitgedrükt dreieckig; an den Eken hat er knotige Einschnitte, und an jedem dieser Einschnitte zween starke, steife, glänzende, und nach unten stehende Stacheln; er besteht aus deutlich abgesezten Gelenken, wächst acht bis zehen Schuhe hoch, und treibt viele Aeste, welche von dem Stamme abstehen; bei den Spielarten sind sie bisweilen aufrecht, oder schlingen sich, haben gemeiniglich drei, zuweilen auch vier Eken, und an ihrer Spize einige wenige Blätter. Ihre Blumen sind weislicht, röthlicht, oder grünlichtgelb, und fallen bald ab.

Von dieser und den zwo folgenden Arten erhalten wir das Euphorbium der Aerzte, das in rothgelblichten bald run-

www.dlibra.wum.edu.pl

den, bald mehr eckigen Körnern von verschiedener Gröse zu uns gebracht wird, und die Mischung eines harzigen Schleims hat. Auf Kohlen gestreut, gibt es einen angenehmen Geruch von sich. Sehr oft ist es mit Sand und andern Unreinigkeiten vermischt, und dann spielt es in eine schwärzlichte Farbe.

Dieses Euphorbium hat eine beisende Schärfe g) es frißt, wenn es aufgestrut wird, alle veste Theile des Leibes, selbst die Knochen h) an; auf der Haut erregt es Röthe und Blasen i), schon als Niespulver in die Nase gezogen, verursachte es eine ungeheure Geschwulst des Hauptes, eine Entzündung des Gesichts und des innern Mundes, und eine Harnstrenge; mit der Spize der Zunge getostet, frißt es diese an k); eine Zeit lang in dem Munde gehalten, entzündet und zernagt es alle Theile des innern Mundes l) und hinunter geschlungen, hat es von Zeit zu Zeit wieder kommende Zukungen m), in einem andern Falle die schmerzhaftesten grausamsten Bauch-

---

g) Nach dem Urtheile aller, schon der ältesten griechischen Aerzte. Spielmann Instit. mater. med. Argentor. 1774. S. 482.

h) Daher wurde es schon von den ältesten Zeiten her in Krankheiten der Knochen gebraucht, und auf die angegriffenen Knochen gestreut, um das angefressene hinweg zu äzen. Ebendes. a. a. O.

i) Auch in dieser Absicht gebrauchten es die Aerzte zuweilen äuserlich.

k) Spielmann a. e. a. O.

l) New Dispensatory. Lond. 1765. S. 140.

m) Tulpius Observat. medic. Amstel. 1672. L. I. C. XV. S. 32.

www.dlibra.wum.edu.pl

flüsse n) mit dem heftigsten Erbrechen, einem Brennen in dem Schlunde und Magen, einem unauslöschlichen Durste, kalte Schweise und Ohnmachten; und noch in einem andern eine Ruhr veranlaßt, die sich nur mit dem Tode endigte o); auch wird es noch heut zu Tage als Reizmittel gemisbraucht und Fußboden oder Bette mit seinem Pulver bestreut p); die Hottentotten scheinen den Saft verschiedener Gewächse dieser Gattung zu Pfeilgift zu gebrauchen q); Citronensaft soll das wahre Gegengift gegen seine Schärfe sein r).

Der ungeheuren Schärfe dieses Saftes ungeachtet fressen doch nach Forskål die Kamele die frische Pflanze in Arabien ohne Schaden.

2) Canarisches Euphorbium. Euphorbia Canariensis Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 340. Abb. 1.

Es wächst auf den kanarischen Eilanden wild. Sein Stamm wird in seinem Vaterlande bis zwanzig Schuhe hoch, und bei alten Gewächsen holzig: er ist vollkommen viereckig, seiner ganzen Länge nach beträchtlich, aber gleich dik, und ganz ohne Blätter; an seinen Eken hat er viele dike Warzen,

---

n) Tim. a Güldenklee a. a. O. L. VII. Cas. VII. S. 277.

o) In Pillen von einem Quakfalber Alex. Benedictus Pract. L. XII. C. XVII.

p) Vyl a. e. a. O. Erste Samml. nr. 7.

q) le Vaillant Voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne Espérance, dans les années 1780—1785. Paris 4. B. II. 1790. S. 57.

r) Thevenot Histoire de l'Académie des sciences à Paris pour l'ann. 1685.

www.dlibra.wum.edu.pl

aus deren jeder zwo gekrümmte, rükwärts gebogene, glänzend schwarze, und von einander abstehende Dornen entspringen; die lezten aber verlieren sich öfters bei alten Stämmen. Seine Aeste haben mit dem Stamm die gleiche Gestalt, zuweilen haben sie fünf Eken; sie sind saftig, und breiten sich oft drei Schuhe weit im Umfange aus. An ihrer Spize sizen die Blumen, welche eine grünlichtgelbe Farbe haben.

Von dieser Art bekommen und verordnen die englischen Aerzte den verdikten Saft unter dem Namen Euphorbium, der mit den Säften der übrigen Arten einerlei Schärfe, doch aber innerlich genommen keinen Schaden angerichtet haben soll[s]).

3) Gemeines Euphorbium. Euphorbia officinalis Linn. Blackwell Pl. 340.

So lange es noch jung ist, ist es grünglänzend und saftig, wenn es aber älter wird, so wird es holzig und weislicht. Sein Stamm wird drei bis vier Schuhe hoch, ist dik, und so, wie die Aeste, ganz ohne Blätter. Er hat, so lange er jung ist, zehen, acht, auch zuweilen sechs Eken, die entweder durch die ganze Länge des Stammes und der Aeste laufen, oder sich in der Mitte endigen, oder daselbst erst anfangen; an diesen Eken sizen in einer kleinen Entfernung von einander steife spizige Dornen, die immer zu zween aus einem Punkte entspringen, und mit den Spizen von einander abstehen; zu unterst treibt er rundherum viele zarte zaserichte Würzelchen, die sich wieder in Aeste theilen; etwas weiter oben, und der ganzen Länge des Stammes nach entspringen ohne bestimmte Ordnung viele Aeste, welche anfangs

s) Forestus Observ. et Curat. medicin. L. XXX.

www.dlibra.wum.edu.pl

wagerecht stehen, nachher aber sich gerade in die Höhe richten, zunächst an dem Stamme schmal sind, nachher aber immer breiter werden, und sich, so wie der Stamm selbst mit einer stumpfen Spize endigen. Seine Blumen sizen nach dem Gipfel des Stammes und der Aeste zu, an den Eken zwischen den Dornen ganz platt auf. Es ist in Arabien, Ethiopien, und den heissern Gegenden von Afrika zu Hause. Vor diesem gebrauchte man gemeiniglich den verdikten Saft unter dem Namen Euphorbium in den Apotheken.

4) Ostindisches Euphorbium, Indianische staudenartige Wolfsmilch. Euphorbia Tirucalli. Commelin Hort. Amstelodam. I. Pl. 14.

Man findet es in Arabien und Ostindien wild. Sein Stamm wird bis zwanzig Schuhe hoch, und bei alten Gewächsen holzig; er ist saftig, ohne Stacheln, und beinahe ganz ohne Blätter; er wächst aufrecht, und ist fadendünn, doch so, daß er sich von unten nach oben immermehr, beinahe wie ein Kegel, zuspizt; seine Aeste haben mit dem Stamme die nemliche Gestalt, eine glatte Oberfläche, und eine dunkelgrüne Farbe; sie treiben wieder Aeste, bestehen aus deutlich abgesezten Gelenken, und haben an ihrer Spize einige kleine abfallende Blätter; sie stehen weit von dem Stamme ab, laufen unordentlich durch einander, und bilden an dem Stengel einen Bauch. Sein milchweisser Saft hat eine brennende Schärfe t), und die Araber glauben noch Forskäls Bericht, er mache blind.

t) Rheede a. a. O. VIII. S. 85.

www.dlibra.wum.edu.pl

5) Kuraſſaiſches Euphorbium, Euphorbia tithymaloides Linn. Jacquin ſtirp. amer. pict. Pl. 138.

Dieſe Staude iſt gleichfalls ohne Stacheln, ihre Blätter ſind eirund, und ſtehen zweizeilig abwechſelnd, bald auf einer, dann wieder auf der andern Seite; ihre Blumen ſind klein und ſcharlachroth.

Auch ihr Milchſaft iſt ausnehmend ſcharf, doch bedienen ſich die Aerzte des mit dem Kraute, vornemlich aber mit dem Stengel abgekochten Waſſers in der Luſtſeuche, und die Frauen bei Verſtopfung des Monatfluſſes innerlich u).

6) Runde Wolfsmilch, Teufelsmilch, Euphorbia Peplus Linn. Weinmann a. a. O. Pl. 492.

Dieſes Sommergewächs wächſt in ganz Europa häufig in Wäldern, und von ſelbſt in Kohlgärten wild; gemeiniglich blüht es im Mai, und oft noch zum zweitenmale im Chriſtmonat. Sein Stengel liegt auf der Erde darnieder, treibt viele Aeſte, und wird bis auf einen Schuh lang. Seine Blätter ſizen auf eigenen Stielen, gröſtentheils ohne beſtimmte Ordnung; ſie haben die Geſtalt eines umgekehrten Eies, und einen ganz glatten und gleichen Rand; da, wo die Blumenſtiele entſpringen, ſtehen ſie zu drei um den Stengel herum, und zunächſt an den Blumen zu zwei; hier haben ſie eine ganz ſtumpfe Spize, und ihre Geſtalt nähert ſich der Geſtalt eines Herzens. Seine Blumenſtiele ſtehen in der nemlichen Ordnung, wie bei Doldengewächſen; die groſe

u) Jacquin a. e. a. O. S. 149.

www.dlibra.wum.edu.pl

Dolde theilt sich in drei kleinere, und diese sind wieder entzweigespalten. Die Blättchen der Blumenkrone haben ganz spizige Hörnchen.

Wurzel und Samen haben eine starke Kraft den Stuhlgang zu treiben. Die erste wird in Holstein in der Wassersucht x) bis zu einem Quintchen, und die lezten wurden von ältern Aerzten in ähnlichen Absichten häufig verordnet y).

7) Springkraut, Springkörner, Purgierkörner, breitblättrichte Wolfsmilch, oder Cataputia. Euphorbia Lathyris Linn. Weinmann a. a. O. Pl. 490. a. b.

Es wächst in Frankreich, Italien, und an den Gränzen der Schweiz nach Italien zu am Rande der Aeker. Es hält zwei Jahre hinter einander aus, und ist eine der schönsten Arten dieser Gattung, und ganz glatt und meergrün. Sein Stengel ist inwendig hol, wird bis zween Schuhe hoch, und treibt oben einige Aeste, die wie Arme ausgestrekt sind. Seine Blätter sizen ohne eigene Stiele einander gerade gegen über, haben einen ganz glatten Rand, sind lang, oval und stumpf, und ihre Mittelribbe verliert sich zulezt in eine Granne; da, wo die Blumenstiele ausgehen, werden sie spizziger, und stehen zu vier, zunächst unter den Blumen aber zu zwei; seine Blumendolde theilt sich in vier Hauptäste und in der Mitte sizt auf einem eigenen Stiele eine einzelne Blume; diese Aeste sind wieder in zween kleinere getheilt, deren jeder eine einzige Blume trägt; ihr Kelch spielt aus dem Weissen in ein mattes Purpurroth, und ist in vier oder fünf

x) Buchwald a. a. O.

y) J. Bauhin a. a. O. III. Th. 3. S. 670.

www.dlibra.wum.edu.pl

Abschnitte gespalten; die Blättchen ihrer Krone haben zwei stumpfe Hörnchen. Die Anzahl ihrer Staubfäden beläuft sich bis auf acht und dreisig. Seine Frucht ist glatt.

Alle Theile dieser Pflanze, vornemlich aber der Saft und Samen, treiben unmäsig stark auf den Stuhlgang, und erregen heftiges Bauchgrimmen, Bauchflüsse und Erbrechen z); auch Thiere, selbst die stärkern Arten, bekommen von dem Genusse des Samens die heftigsten Bauchflüsse und Erbrechen a). Schon das Brod, das in einem damit geheizten Ofen gebaken wird, führt sehr stark ab b).

Man hat aber dessen ungeachtet, nicht nur äuserlich den verdikten Saft in einem bleiernen Mörser mit dem Kalke, der bei der Vermischung des versüsten Sublimats mit Kalkwasser zu Boden fällt, oder auch mit schwarzem Blei gerieben, im Krebse angerühmt c); sondern es hat auch Wagehälse genug gegeben, welche Theile dieser Pflanze innerlich verordneten; sie gaben die Samen von zween bis zehn Granen, um Erbrechen zu erregen d) oder den an der Luft getrokneten Saft zu einem halben Quintchen in der Lustseuche e); auch soll mit dem Safte die Manna von Briancon verfälscht

---

z) Haller a. a. O. II. S. 7.

a) Sprögel a. a. O. S. 12.

b Flagellarius Med. method. S. 44.

c) Haller a. a. O. II. S. 8.

d) 1) Rufus a. a. O. S. 18. 2) Mayerne in Praxeos Mayernianae in morb. intern. praecipue gravioribus et chron. Syntagmate. Lond. 1690. c. 3. 3) Flagellarius a. a. O. S. 27.

e) Flagellarius a. a. O. S. 43.

www.dlibra.wum.edu.pl

werden f). Unglükliche Dirnen stürzen sich auch öfters durch den Gebrauch des Samens in die gröste Gefahr ihres Lebens, ohne ihre verdammenswürdige Absichten zu erreichen g).

8) Wolfsmilch, deren Stengel sich nach der Sonne wendet. Euphorbia helioscopia Linn. Weinmann a. a. O. Pl. 489. f. d.

Sie wächst in ganz Europa auf gebautem Grunde, als ein beschwerliches Unkraut, auch am Wege, auf Weiden, und an andern feuchten Orten in Menge, und blüht vornemlich im Mai und Brachmonat, aber auch zuweilen noch im Christmonat. Sie geht im Herbste darauf, und hat eine zaserichte Wurzel; ihr Stengel ist glatt, etwas weniges geschlungen, übrigens aber aufrecht; er treibt nur wenige Aeste, die wie Arme ausgestrekt sind. Ihre Blätter sind glatt und stehen auf breiten Stielen; sie haben einigermasen die Gestalt eines Keils und an ihrem Rande Zähne, wie eine Säge; da, wo die Blumenstiele ausgehen, sizen sie zu fünf rund um den Stengel herum, unmittelbar unter den Blumen aber zu zwei, und hier haben sie mehr die Gestalt eines Eies.

Ihre Blumen stehen in Dolden beisammen; die grose Dolde theilt sich in fünf kleinere, diese in drei, diese abermal in drei und diese zulezt in zween Aeste; ihre Krone ist grün, und die Blättchen derselbigen rundlicht ohne Hörnchen.

---

f) Gui Patin a. a. O. B I. n. CXI. S. 228.

g) Haller a. a. O. II. S. 9.

www.dlibra.wum.edu.pl

Linné h) und Hagström i) fanden sie brennend scharf und bitter; sie erregt unter dem Wollvieh öfters Bauchflüsse, und wenn sie auch von diesem, oder von Hornvieh, und Ziegen ohne Schaden gefressen wird, so theilt sie doch ihrem Fleische, und ihrer Milch einen sehr häslichen Geschmak mit k). Indessen sollen ihre Samen, wenn sie unter den Getreidsamen kommen, unschädlich seyn l), und Haller fand auch den Milchsaft der Pflanze nicht scharf m), den doch Linné, statt der spanischen Fliegen und als Aezmittel in Warzen und andern Auswüchsen der Haut, auch in Zahnschmerzen empfiehlt n).

9) Warzige Wolfsmilch. Euphorbia verrucosa. Weinmann a. a. O. Pl. 491. f. d.

Sie wächst aber etwas seltener, als die vorhergehenden Arten, in den Morgenländern, in Italien, in Frankreich, in der Schweiz und in Schwaben, auf Bergen und in Wäldern, und blüht im Mai und Brachmonat.

---

h) Flora Suecica n. 425. S. 163.

i) Abhandl. der Königl. Schwed. Akademie der Wissenschaften übersezt von Käſtner 1750. Viertelj. II. Stük 3. S. 103. 104.

k) Hagström und Linné a. d. e. a. O.

l) Wählin Abhandlung der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften, übers. von Käſtner 1771. Vierteljahr I. St. 2. S. 36. wenigstens erregten sie keinen Krampf.

m) a. a. O. S. 10.

n) a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sie hält zwei Jahre lang aus, und hat mehrere dünne Wurzeln, die sich in eine einzige holzige, ziemlich lange, von aussen schwarze und inwendig weisse Wurzel vereinigen. Diese Wurzel treibt mehrere dünne, zähe, zuweilen röthlichte Stengel, welche einen bis zween Schuhe hoch werden, und nur einen oder den andern Ast von sich geben. Ihre zahlreichen Blätter stehen nicht auf eigenen Stielen; an ihrem Rande haben sie Zähne, wie eine Säge, und sind beinahe rund, wie ein Ei, nur daß sie an beiden Enden spiziger zulaufen; so lange sie noch jung sind, sind sie ganz fein behärt, nachher aber ganz glatt; da, wo die Blumenstiele entspringen, sizen sie zu fünf rund um den Stengel, unmittelbar unter der Blume aber zu zwei, diese sind mehr rund, wie ein Ei, oder sie haben vielmehr vier stumpfe Eken. Ihre langen Blumenstiele bilden eine Dolde; diese theilt sich in fünf kleinere Dolden, jede von diesen wieder in drei, und diese zulezt in zween Aeste; ihre Blumenkrone ist gelb, und die Blättchen derselbigen rund. Ihre Frucht ist ganz mit kleinen, fast unmerklichen Stacheln und Körnern besezt. Ihr Milchsaft ist scharf o).

10) Breitblätterichte Wolfsmilch, Euphorbia platyphyllos Linn. Jacquin Flor. austr. B. IV. Pl. 376.

Dieses Sommergewächs zeigt sich ziemlich häufig in England, Frankreich, Teutschland und in der Schweiz, auf Aekern und an Wegen. Es blüht im Brach- und Heumonat, und hat einen widrigen Geruch und eine holzige Wurzel. Sein Stengel ist glatt, und wächst gerade, manchma-

o) Haller a. a. O. II. S. 10.

www.dlibra.wum.edu.pl

len bis auf vier Schuhe hoch, und treibt gemeiniglich viele Aeste. Seine zahlreichen und grosen Blätter stehen abwechselnd, zu beiden Seiten des Stengels und der Aeste, weit von denselbigen ab, auf breiten Stielen; sie sind glatt und an ihrem Rande, wie eine Säge, gezakt, an beiden Enden scharf zugespizt und in der Mitte etwas breiter. So lange sie noch jung sind, haben sie einen rothen, aus feinen Strichen zusammen gesezten Flek. Da, wo die Blumenstiele entspringen, stehen sie zu fünf, und unmittelbar unter den Blumen zu zwei; diese haben mehr die Gestalt eines Herzens, und auf ihrem Rüken der Länge nach in der Mitte einen Strich von Haaren. Ihre Blumen sizen theils auf langen Stielen, die alle aus den Winkeln der Blätter entspringen, und sich wieder in drei kleinere theilen; theils stehen sie an dem Gipfel des Stengels und der Aeste in Dolden beisammen; diese theilen sich in fünf kleinere, diese in drei und zulezt in zween Aeste. Ihre Blumenkrone spielt aus der gelben in die grünlichte Farbe, und die Blättchen derselben sind breit, unzertheilt und etwas rund. Ihre Frucht ist mit kleinen Stacheln besezt, und enthält kleine, länglichte und blaue Samen.

Schon der widrige Geruch dieser Pflanze, der noch zu der so nahen Verwandschaft mit Gewächsen, deren giftige Natur entschieden ist, hinzu kommt, macht es sehr wahrscheinlich, daß auch sie die Natur eines Gifts habe.

11) Kleine Wolfsmilch, Eselsmilch, Euphorbia Esula Linn. Weinmann a. a. O. Pl. 487. nr. d.

Sie wächst in Arabien, Frankreich, Teutschland und in den Niederlanden auf Weiden und unfruchtbaren Wiesen

www.dlibra.wum.edu.pl

häufig wild, und blüht vom April bis in den Brachmonat. Sie hält mehrere Jahre aus, und treibt mehrere glatte und blätterreiche Stengel, welche ungefähr einen Schuh hoch werden, und aus den Winkeln der Blätter viele, zum Theil Blumenreiche, Aeste von sich geben. Ihre Blätter sind schmal und da, wo die Blumenstiele entspringen, sizen sie zu fünf oder acht rund um den Stengel herum; hier sind sie etwas breiter und umgeschlagen; zunächst unter den Blumen sizen sie zu zwei und sind breit, haben mehr die Gestalt eines Herzens, und verlieren sich in eine Granne. Ihre Blumen stehen in einer lokern Dolde beisammen, welche sich wieder in eine unbestimmte Anzahl kleiner Dolden theilt, die immer wieder entzwei gespalten sind. Ihre Krone hat eine dunkelgelbe Farbe, und die Blättchen derselben zwei Hörnchen.

Ihre saftvolle Wurzel erregt, wenn sie auf die Haut gelegt wird, auf derselbigen Röthe und brennende Schmerzen; innerlich genommen, treibt sie unmäßig stark auf den Stuhlgang, und man hat Fälle, da sie tödlich war p); gelinder wirkt sie, wenn sie alt ist, oder in Essig, oder Wein eingeweicht, oder abgekocht wird q). Das frische Kraut gestampft und auf den Unterleib gelegt, hat Aufschwellen und den kalten Brand, und um den Hodensak geschlagen, eine

---

p) Mit Wasser gekocht und unter der Gestalt eines Klistiers gegeben, in Zeit einer halben Stunde. Buchholz Traité historique des plantes, qui croissent dans la Lorraine et les trois Evechés. B. II. Nancy 1763. S. 315. Einen andern Fall erzählt L. Schröck Ephemerid. Acad. Caesar Nat. Curios. Dec. II. Ann. 10. obs. 13.

q) Haller a. a. O. II. S. 9.

www.dlibra.wum.edu.pl

ungeheure Geschwulst verursacht r); der daraus gedrükte Saft aber, als Waschwasser gebraucht, das Gesicht angefressen, daß es sich abschälte, und ein neues Häutchen nachwuchs s) und bei geschlossenen Augen an das Augenlied gebracht, Entzündung der Augen verursacht, die sich mit einer vollkommenen Blindheit endigte t). Ihre Samen äusern auf die Fische eine stark betäubende Kraft; sie treiben auch sehr stark auf den Stuhlgang; in dieser Absicht werden sie im Felde und auf dem Lande gebraucht.

Dieser schlimmen Wirkungen ungeachtet, gebrauchten die Aerzte den Saft dieser Pflanze nicht nur äuserlich entweder unvermischt, um Warzen zu vertreiben, oder mit Schwefel und andern Mitteln vermischt, in der Krätze u), sondern auch innerlich in Fiebern x). Chomel sezte den verdikten Saft, mit welchen auch wohl die Manna von Briancon verfälscht wird x*), dem Scamonium an die Seite, aber er gebrauchte die Fürsicht, seine Schärfe durch die Beimischung von Laugensalz zu mildern y) und Fabricius von Hilden ein Extrakt daraus zu machen z). Die Rinde der saftvollen

---

r) Scopoli Flor. Carniolic. S. 435.

s) Erhart a. a. O. VII. S. 292.

t) Tim. a Güldenklee a. a. O. B I. 21. Fall.

u) Cardanus in Consil. 35. pro mantuano Opp. omn. Lugd. 1663. B. IX. S. 181. Gui Patin a. e. a. O.

x) Breßlauische Samml. 1721. M. May. S. 563.

x*) Gui Patin a. e. a. O.

y) Histoire des plantes usueles. S. 24.

z) Observat. Cent. VI. observ. 84.

www.dlibra.wum.edu.pl

saftvollen Wurzel gab man bis zu ℈j in Wassersucht a), aber die Wurzel selbst bis zu ʒj in Fiebern b). Es fressen auch die Ziegen, ihre Blätter, aber ihre Milch bekommt davon die Kraft, stark auf den Stuhlgang zu treiben, und von ihrem Safte nährt sich die Raupe einer eigenen Art von Dämmerungsfaltern, Sphinx Euphorbiae..

12) Cypressenwolfsmilch. Euphorbia Cyparissias Linn. Jacquin Flor. austr. B.V. Pl. 435.

Sie wächst sehr häufig in Languedok, in der Schweiz und in Teutschland an Wegen, auf Hügeln, und andern troknen Stellen, vornemlich auf magern Weiden. Ihre Wurzel ist holzig, dik und zasericht und treibt mehrere Stengel, welche einen bis zween Schuhe hoch werden, sich erst oben in Aeste theilen und dicht mit Blättern bekleidet sind; diese sind an den Aesten, welche keine Blumen tragen, so dünn, als eine Borste, an dem Stengel selbst aber etwas breiter alle aber noch sehr schmal, und den Blättern des Leinkrautes so ähnlich, daß, ehe sie blüht, auser dem Milchsafte, der aus dieser Pflanze fließt, so bald ein Blatt abgebrochen wird, zwischen beiden kein Unterschied zu merken ist; selbst diejenigen, die, öfters zu zehen, unmittelbar unter der Blumendolde sizen, haben die nemliche Gestalt, nur diejenigen zwei, die zunächst unter den Blumen sizen, sind breiter und nähern sich mehr der Gestalt eines Herzens. Ihre Blumen stehen in einer Art von Dolde beisammen, die sich immer wieder in mehrere kleinere, und diese zulezt in zwei theilen; ihre Krone

---

a) Potier nach Haller a. e. a. O.

b) Buchholz a. e. a. O. I. S. 329.

www.dlibra.wum.edu.pl

spielt aus dem Gelben in das Grüne; ihre Blättchen stellen einen halben Mond mit zwey Hörnchen vor.

Sie hat mit der kleinen Wolfsmilch die nemlichen Kräfte, und wird von den Schriftstellern häufig damit verwechselt; nur wirkt sie etwas gelinder; ihr Saft mit etwas Wasser verdünnt, hat einer Kaze, welcher man ihn eingos, nicht das Mindeste geschadet c).

13) Sumpfwolfsmilch. Euphorbia palustris Linn. Weinmann a. a. O. 488. b.

Sie wächst in der Schweiz, in Teutschland, in den Niederlanden und in dem mittägigen Theile Schwedens an sumpfigen Stellen, und hält, als eine Staude, mehrere Jahre aus. Ihre Wurzel ist sehr dik, ihr Stengel sehr breit und in Aeste getheilt, welche keine Blumen tragen. Ihre Blätter sind oval und stumpf, oder mehr spizig; sie haben an ihrem Rande scharfe Zähne, wie eine Säge, und werden nach oben zu nach und nach immer kleiner; sie tragen in ihren Winkeln blattreiche Aeste und Blumendolden; unter den lezten stehen fünf oder mehrere Blätter ringsherum; die zwei Blätter, die zunächst unter den Blumen stehen, sind mehr rund, wie ein Ei. Ihre Blumendolden sind gemeiniglich in mehrere kleinere, und diese wieder meistens in drei entzwei gespaltene Aeste getheilt; ihre Blumenkrone ist gelb, und die Blättchen derselben stumpf. Ihre Frucht ist ganz mit Warzen besezt.

Sie ist sehr scharf und äzend, und treibt, innerlich genommen, sehr stark auf den Stuhlgang; inzwischen wird

c) Sprögel a. a. O. S. 14.

www.dlibra.wum.edu.pl

sie doch von einigen statt der Turbithwürzel angerathen, und von den Bauren als ein abführendes Mittel d) gebraucht.

14) Irrländische Wolfsmilch. Euphorbia Hiberna Linn. Tithymalus Hibernicus vasculis muricatis. Dillen. Hort. Elthamensis. Pl. 290. Abb. 374.

Sie wächst auf den pyrenäischen Gebirgen, in Oestreich, in Irrland und in Sibirien wild. Ihre Wurzel hält mehrere Jahre aus. Ihr Stengel ist ganz einfach und ohne alle Aeste. Ihre Blätter haben eine ziemliche Breite und einen ganz glatten Rand; die zwei aber, die zunächst unter den Blumen stehen, sind oval; ihre Blumendolden sind in sechs kleinere getheilt, und diese wieder entzweigespalten. Ihre Samengehäuse stehen aufrecht, und sind dicht mit kleinen Warzen besezt.

Sie ist so scharf, daß, wenn man sie nur eine Zeit lang in der Hand hält, sie auf den Stuhlgang treibt e). Wirft man etwas von der frischen Wurzel blos gestampft in Wasser, so tödet sie Fische f).

15) Französische Wolfsmilch. Euphorbia Characias Linn. l. c. l. Jacquin Icon. pl. rar. Pl. 89.

Sie wächst in Spanien, Italien, Frankreich und Teutschland wild. Ihre Wurzel ist dik, und holzig, und treibt vie-

d) J. Bauhin a. a. O. III. Th. II. S. 671.

e) Birch a. a. O. III. S. 423. Auch Asche spricht von ihren schädlichen Wirkungen. Philos. Transact. n. 245. auch vermittelst ihrer Samen fängt man, indem man sie ins Wasser wirft, Fische. Puihn a. e. a. O. S. 132.

f) Puihn a. e. a. O. S. 102.

www.dlibra.wum.edu.pl

le Stengel. Diese sind einen Zoll dik, werden bis vier Schuhe hoch, und treiben alle Jahre neue Aeste; die jährigen Aeste sind nach oben diker, etwas rauh und unter den Blättern in die Quere mit Narben besezt; der blumentragende Ast entspringt zu Anfang des Frühlings aus der Spize der Aeste, und geht zu Grunde, da inzwischen unten zu seinen beiden Seiten neue Aeste hervorkommen. Ihre Blätter sind an beiden Enden spizig und in der Mitte breiter, mit glattem Rande; sie sind grün, umgebogen und beinahe wie Leder; nach oben zu sind sie breiter und stumpfer, da, wo die Blumenstiele ausgehen, sizen ihrer mehrere, welche aber sehr klein sind, rings um den Stengel herum; zunächst unter den Blumen sizen zwei, die von den Blumenstielen ganz durchstochen werden, und leicht entzwei gespalten sind. Ihre Blumen haben eine feuchte und purpurrothe Krone, welche aus vier Blättchen besteht; ihre Fruchtknoten sind mit ganz feinen Haaren besezt.

Ihr Saft hat eine äzende Schärfe, und erregt auf der Haut Blasen g); er wird aber doch, nachdem man ihn im Herbst gesammlet und nachher verdikt hat, von einigen Aerzten als Laxirmittel gebraucht h).

16) **Kleine Wolfsmilch mit dem Mandelblatte.** Euphorbia amygdaloides Linn. Weinmann a. a. O. Pl. 488. f. c.

Sie wächst in Frankreich und Teutschland wild und blüht im Maimonat. Ihr Stengel ist holzig und wird bei

---

g) J. Bauhin a. a. O. III. Th. II. S. 672.

h) Ebendersf. a. e. a. O. S. 671.

www.dlibra.wum.edu.pl

drei Schuh hoch. Ihre Blätter sind stumpf, und gleichen den Mandelblättern sehr; diejenigen zwei, welche zunächst unter den Blumen stehen, sind beinahe kreisrund, und von den Blumenstielen gleichsam durchbohrt. Ihre Blumendolden theilen sich in mehrere kleinere, die immer wieder entzweigespalten sind; der Kelch der Blumen spielt aus dem Grünen in ein mattes Gelb, und die Krone aus dem Schwarzen in das Grüne.

Sie hat mit den vorhergehenden Arten, vornemlich in Samen und Wurzel, die nemliche Schärfe; dieser ungeachtet, werden auch diese hin und wieder, als Purgiermittel gebraucht, und die lezte ist vor mehreren Jahren zu Paris als ein geheimes Fiebermittel verkauft worden.

17) Waldwolfsmilch, Bergwolfsmilch, Euphorbia sylvatica Linn. Jacquin Flor. austr. B. IV. Pl. 375.

Man findet sie in den mittägigen Gegenden Europens, selbst in der Schweiz und in Oberteutschland, ziemlich häufig an Wegen und in Wäldern wild, wo sie im Maimonat blüht. Ihre Wurzel treibt viele Blätter; diese haben ungefähr die Gestalt eines Eies und eine wollige untere Fläche; sie kommen mit denen gänzlich überein, welche an dem Stengel sizen; aus den Winkeln eines jeden von den lezten entspringt ein Ast, der an seinem Gipfel eine kleine und ungleiche Dolde von ungefähr drei Blumen und zunächst an dieser zwei Blätter einander gegen über trägt; ihre gröste Blumendolde steht an dem Gipfel des Stengels, und hat einige nicht sehr merkliche Blätter unter sich; sie theilt sich in fünf kleinere, und diese sind immer wieder entzwei gespalten. Ihre Blu-

www.dlibra.wum.edu.pl

men haben fünfzehn Staubfäden und unmittelbar unter sich zwei ziemlich spizige Blätter, welche ungefähr die Gestalt eines Herzens haben, einander gerade gegen über stehen, und unten so mit einander verwachsen sind, daß der Blattstiel mitten durch geht. Die Blättchen ihrer Krone gleichen einem halben Monde mit spizigen Hörnern. Ihre Frucht ist glatt; sie hat einen stinkenden Geruch i) und dieser verstärkt den Argwohn, den schon die nahe Verwandschaft mit Arten, deren giftige Natur entschieden ist, vornemlich mit der irrländischen Wolfsmilch erregt.

18) Kleinste Wolfsmilch, Steinmilch. Euphorbia exigua acuta Linn. Oeder Flor. Dan. Pl. 592.

Dieses Sommergewächs ist in Teutschland, in der Schweiz, in Italien, Frankreich und Spanien auf Weiden, auf Aekern und in Gärten ein sehr gemeines Unkraut und blüht vom Brachmonat bis in den Herbstmonat. Seine Wurzel ist sehr klein und treibt einen niedrigen Stengel, der sich in sehr viele Aeste verbreitet; seine untern Blätter sind klein und schmal, und sizen ohne eigene Stiele, bald dünn und weit auseinander, bald gedrängt, beisammen an den Aesten; drei, welch länger sind, und sich in eine schmale und steife Spize endigen, stehen unmittelbar unter der Blumendolde, und zwei, welche breit und spizig sind, und sich einiger Massen der Gestalt eines Herzens nähern, unmittelbar unter den Blumen selbst; die Blättchen der Blumenkrone haben die Gestalt eines halben Mondes mit sehr spizigen Hörnern. Auch diese Art treibt mit ungemeiner Heftigkeit auf den Stuhlgang k).

---

i) Haller a. a. O. II. S. 8.

k) J. Bauhin a. a. O. III. Th. I. S. 664.

www.dlibra.wum.edu.pl

19) Mauritaniſche Wolfsmilch ohne Blätter. Euphorbia Mauritanica Linn. Tithymalus aphyllus Mauritaniae, Dillen. Hort. Eltham. Pl. 289. Abb. 373.

Sie iſt an der Küſte von Afrika zu Hauſe. Ihr Stengel ohne Stacheln wächſt gerade bis vier Schuhe in die Höhe, behält ſeiner ganzen Länge nach den gleichen Durchmeſſer und hält mehrere Jahre aus; er iſt zart, ſchwach, ſaftig und hellgrün, und hat nur an ſeiner Spize einige länglichte, glatte und ungetheilte Blätter, welche abwechſelnd einmal auf dieſer, dann wieder auf der andern Seite ſtehen. Ihre Blumen ſtehen an dem Gipfel der Aeſte in kleinen Trauben beiſammen, und haben eine gelblicht grüne Krone, welche aber bald abfällt. Ihr Saft hat einen äuſerſt ſcharfen, beinahe äzenden Geſchmak [1]).

20) Wolfsmilch mit Oleanderblättern. Euphorbia Neriifolia Linn. Seba theſaur. I. Pl. 9. Abb. 1.

Sie iſt in Oſtindien zu Hauſe. Ihr Stengel iſt ſtark und gerade, wächſt bis ſechs Schuhe hoch, hat ungleiche Ecken, welche in einer ſchiefen Richtung mit Knoten beſezt ſind, und treibt nach ſeinem Gipfel zu Aeſte; dieſe ſind mit gekrümmten Dornen bewafnet, und haben an ihren Enden einige länglichte, ziemlich breite und zugerundete Blätter, welche den Blättern des Oleanders gleichen, und im Herbſte hervorkommen, im Frühling aber abfallen; worauf die Blumen folgen, welche veſt an den Aeſten aufſizen, und eine

1) J. Bauhin a. a. O. III. S. 676.

www.dlibra.wum.edu.pl

grünlicht weisse Krone haben. Ihr Saft hat eine brennende Schärfe m).

21) Italianische Wolfsmilch. Euphorbia epithymoides Linn. Jacquin Flor. austr. B. IV. Pl. 344.

Sie wächst in Italien wild. Ihre grose Blumendolde theilt sich in fünf kleinere, und diese wieder in zwo, welche in ein rundes Blättchen eingehüllt sind; ihre Blätter sind lanzenförmig, doch an dem Ende stumpf, und auf der untern Fläche rauh: ihre Frucht ist mit purpurröthlichen Borsten besezt.

Der Genus ihrer Wurzel hat einen plözlichen Tod verursacht n).

Unter diese Gattung scheint auch das Pisgras zu gehören, welches in einer sauren und kalten Gegend hinter dem Vorgebürge der guten Hofnung, im Artaquasthale wächst, und, wenn es von jungem nicht daran gewöhntem Vieh gefressen wird, oft tödliche, Harnstrenge erregt, wenn es nicht stark darauf gejagt, oder damit gefahren wird; in dem Harn und der Harnröhre solcher Thiere findet man etwas wie Käsklumpen o).

---

m) Rheede a. a. O. II. S. 84.

n) P. Boccone curiose Anmerkungen. Leipzig 1694. 12.

o) A. Sparrmann Resa til Goda Hopps-Udden södra polkretsen och omkring jördklot et samt til Hottentott of Cafferlanden Aren 1772—1776. Stockholm 1783. S. 267.

www.dlibra.wum.edu.pl

IX. Hülsengewächse.

Sie sind auser Europa zu Hause, und tragen Hülsen, und vielfache Blätter; ihre Blumen haben neun bis zehen zu unterst unter sich verwachsene Staubfäden, welche den einzelnem Staubweg umgeben, und einen aus einem zusammenhängenden Stüke, bestehenden Kelch; ihre Krone, besteht aus vier an Gröse und Gestalt von einander, sehr verschiedenen Blättchen, einem obern oder dem Fähnchen, zwei Seitenblättchen, die sich einander ziemlich gleich und ähnlich sind, und einem untern, oder dem Schifchen.

1) Abrus, Abrus precatorius Linn. Konni. Rheede Hort. malabar. VIII. Pl. 39.

Diese Pflanze wächst in Indien, Egypten und dem wärmern Theile von Amerika wild, und gehört unter die Stauden. Ihre Blätter sind abgebrochen gefiedert, und bestehen aus zahlreichen einförmigen länglichten und stumpfen Blättchen. Ihre Blumen haben neun nur oben auf dem Rüken aus einander klaffende Staubfäden, und auf dem Staubwege eine kopfförmige Narbe, ihr Kelch ist seicht in vier Lappen getheilt, von welchen der oberste breiter ist; ihre Hülse ist länglicht, breitgedrükt und inwendig durch Scheidewände so dünn als Spinnengewebe, in Fächer getheilt, und enthalten viele beinahe kugelrunde weisse, gelbe, am häufigsten scharlachrothe Samen mit einem schwarzen Fleken.

Diese Samen erregen sehr gewaltsames Erbrechen, Beängstigungen, Zukungen, und wohl zu 3—4 Stüken, den Tod p).

---

p) Sloane hist. of Iamaic. I. S. 180.

www.dlibra.wum.edu.pl

2) Schwerdförmiger Dolichos, Dolichos ensiformis Linn. Gara mareka. Rheede Hort. malab. VIII. Pl. 44.

Er ist in Jamaika, Java und andern Inseln des indischen und atlantischen Meers zu Hause, und wächst beinahe aufrecht. Ihre Blumen haben zehen Staubfäden, von welchen neun beinahe nur an ihren Staubbeuteln frei und unverwachsen sind, und an ihrem Staubwege eine etwas haarige Narbe; an der Krone hat das Fähnchen unten zwo länglichte, gleichlaufende, harte Erhöhungen, welche die Seitenblättchen unten zusammen drüken. Ihre Hülsen sind groß, schmal, glatt, länglicht, und inwendig durch Scheidwände in mehrere Fächer getheilt, haben die Gestalt eines Säbels mit drei scharfen Kanten, und enthalten weisse Samen, die noch in ein eigenes Häutchen eingehüllt sind q).

3) Krallenförmiger Dolichos, Dolichos unguiculatus Linn. Jacquin Hort. Vindob. I. Pl. 23.

Er wächst in Barbados wild, und weicht von dem Vorhergehenden darinn ab, daß sich sein Stengel um andere Körper herum windet, daß seine Hülsen sich in Köpfgen zusammenhäufen, beinahe walzenförmig sind, und an ihrer Spize einen hohlen Haken haben, und daß seine Samen ohne Häutchen sind. Seine Früchte sollen roh ungesund, und dem Vieh ein Gift sein r).

---

q) Browne civil and. nat. histor. of Jamaic. S. 291.

r) Puihn a. e. a. O. S. 134.

www.dlibra.wum.edu.pl

X. Pflanzen mit einfacher Blumendeke (Incompletae).

Sie halten alle mehrere Jahre lang aus, und einige unter ihnen haben wenigstens in ihrem Vaterlande holzige Stengel. Ihre Blätter haben immer eigene Stiele oder Scheiden, und bei den meisten einen eingeschnittenen Rand und eine glatte Oberfläche. Ihre Blumen haben entweder einen Kelch und keine Krone, oder eine Krone und keinen Kelch; die Anzahl der Staubfäden ist niemahlen unter sechs; bald sind sie mit den Staubwegen in der nemlichen Blume, bald aber in ganz verschiedenen Blumen; in dem lezten Falle hat die Blume nur einen Eierstock und das Samengehäus ist ganz troken und inwendig in drei Fächer getheilt, deren jedes nur einen Samen enthält, oder der Same liegt einzeln und blos in einem Balge, oder dem verwelkten Kelch: in dem ersten Fall hingegen sind mehrere Staubwege vorhanden, von welchen jeder eine rothe Beere nach sich läßt. Diese Gewächse theilen sich in acht Gattungen.

I. Aron (Arum). II. Wasserpfeffer (Polygonum Hydropiper). III. Arabische Winde (Saelanthus). IV. Brechnus (Jatropha). V. Wunderbaum. VI. Kroton (Croton). VII. Dioskorische Pflanze (Dioscorea). VIII. Orant (Orontium).

1) Aron. Ihre Wurzel ist saftig, fleischig, mehlig und ziemlich gros, und treibt keinen Stengel. Ihre Blumen haben eine grose grüne Scheide, welche aus einem Stüke besteht, und in ihrer Gestalt viele Aehnlichkeit mit einer

www.dlibra.wum.edu.pl

Mönchskappe hat; sie ist auf der einen Seite hoch gewölbt, auf der andern aber offen, und fällt bald ab; innerhalb dieser Scheide, in ihrer Mitte steht eine aufrechte Säule, die unten unmittelbar auf dem Blumenstiele aufsizt, und sich oben in eine Keule endigt; zu unterst ist sie rund, und mit einer Menge von Staubwegen besezt, die nur einen ganz kurzen Griffel haben; über diesen sizen kurze Wärzchen, welche oben mit kurzen Haaren besezt sind; weiter oben bemerkt man eine Menge diker viereckiger Staubbeutel, welche keine Fäden haben, und in vier Fächer getheilt sind; über diesen stehen wieder runde Wärzchen, aus welchen nach unten zu krumme Fäden auslaufen; aber der oberste dikere Theil der Säule ist ganz entblöst. Die Staubwege lassen eine Menge runder Beeren nach sich, in welchen viele Samen sind.

1) Schlangenkraut, gemeines Schlangenkraut, Schlangenwurz, kleine Drachenwurz. Arum Dracunculus Linn. b. l. Bulliard Herb. de la France. Pl. 73.

Seine Wurzel ist beinahe kreisrund, ziemlich groß, und von aussen buchsgelb, inwendig aber schneeweis; sie treibt zur Seite mehrere kleine Knollen. Sein Stengel wächst gerade bis vier Schuhe hoch, wird einen Zoll dik und drüber, und ist seiner ganzen Länge nach, wie eine Schlange am Bauche, gefleft; er besteht gleichsam aus zusammen gerollten Häuten. Seine Blätter sizen auf schwammigen Stielen, und haben eine glänzend glatte Oberfläche; sie sind so lang, als die Blumenscheide, und theilen sich in mehrere Blättchen, welche, wie die Zähen an einem Fuse gestaltet, an beiden Enden zugespizt, in der Mitte aber breiter sind, und einen ganz glatten und gleichen Rand haben. Seine Blu-

www.dlibra.wum.edu.pl

men sizen auf sehr dünnen Stielen, und haben einen sehr widrigen Geruch. Die Scheide ist von aussen grasgrün, inwendig aber purpurroth; sie wird zuweilen gegen einen Schuh lang, und ist immer länger, als die Säule, an welcher die Befruchtungstheile stehen; diese ist ganz schwarzroth und ebenfalls ziemlich gros. Seine Beeren sind saftvoll und röthlicht, und haben runde Samen. Seine Wurzel hat einen brennend scharfen Geschmak *).

2) Amerikanische Aronswurz. Arum Dracontium. Blackwell a. a. O. Pl. 269.

Sie ist in Amerika zu Hause, und von dem Schlangenkraute vornemlich dadurch unterschieden, daß ihre Blätter länger, als die Blumenscheide, und diese kürzer als die Keule ist, an welcher die Befruchtungstheile sizen.

3) Egyptische Aronswurz. Kolokasia. Arum Colocasia Linn. Arum Aegypticum Catesby a. a. O. Pl. 45.

Sie wächst in Malta, Kandien, Cypern, Syrien und Egypten an wässerichten Orten. Ihre Wurzel ist weis, knollig und gleichsam gedoppelt, so daß sie in der Mitte einen engen Hals hat, und, zur Seite giebt sie Zasern von sich. Ihre Blätter sizen zu drei oder vier beisammen, jedes auf einem eigenen Stiele, welcher mitten an die untere Fläche des Blatts angewachsen ist; sie sind glatt, ziemlich dik, im Umfange rund wie ein Ei, ausgeschweift und unten etwas ausgeschnitten, übrigens aber unzertheilt.

---

*) J. Bauhin a. a. O. II. S. 783.

www.dlibra.wum.edu.pl

Die ganze Pflanze hat einen sehr scharfen Geschmak t), vielleicht hat sie diesen nicht zu allen Zeiten ihres Lebens und nicht in jedem Boden, oder verliert ihn durch das Austroknen an freier Luft; wenigstens ist ihre Wurzel in vielen Gegenden nicht nur gesotten oder unter der Asche gebraten, sondern auch roh eine gewöhnliche Speise u); auch ihre zartern Stengel und Blätter genießt man als Salat und Zugemüß.

4) Aron mit dreilappigen Blättern. Arum trilobatum Linn. Miller Illustr. ic. Pl. 52. Abb. 2.

Es ist in Zeilon zu Hause, und hat eine beissende Schärfe x). Seine Blätter sind wie ein Pfeil gestaltet, und in drei Lappen getheilt; seine Blumensäule ist scharlachroth.

5) Aron mit Pfeilblättern. Arum sagittaefolium Linn. Jacquin Hort. vindob. II. Pl. 157.

Es wächst in Brasilien, Jamaika und Barbados wild, und hat roh gleichfalls eine für Menschen und Vieh gefährliche Schärfe y). Seine Blätter sind schwarzgrün, pfeilförmig und dreieckig; die Ecken aber aus einander gesperrt und spizig; die Blumen stehen auf eigenen Schäften, welche kürzer als die Blattstiele sind.

---

t) J. Camerarius Hort. medic. et philosoph. Francof. 1588. S. 22.

u) J. Bauhin a. a. O. II. S. 791.

x) Puihn a. e. a. O. S. 145.

y) Voyage to the Madeira-Island &c. S. 83.

www.dlibra.wum.edu.pl

6) Aronskraut, gemeine Aronswurz, Zehrwurz, kleine Natterwurz, Pfaffenpint, teutscher Ingwer. Arum maculatum Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 228.

Er wächst in den mittägigen Theilen von Europa, auch in der Schweiz und in Teutschland wild, und blüht im Maimonat. Seine Wurzel ist knollig, mehlig, klebricht und fleischig, und giebt viele Zasern von sich. Seine Blätter kommen unmittelbar aus der Wurzel; sie haben ungefähr die Gestalt eines Spondons oder Pfeils, und auf einer glänzend glatten Oberfläche zuweilen weislichte oder braune Fleken, oder dergleichen Adern. Seine Blumenscheide ist sehr gros, aufgetrieben, gerade und weisgrünlicht. Die Säule, an welcher die Befruchtungstheile stehen, stellt eine blutrothe Keule vor; die Beeren sind scharlachroth, und enthalten in einem gleich gefärbten Safte einen oder zween harte Samen, deren Oberfläche ein nezförmiges Gewebe hat.

Die ganze Pflanze hat, wenn man sie nur kostet, eine beissende brennende Schärfe, die sich lange nicht auf der Zunge verliert; sie ist in den Blättern heftiger, als in der Wurzel, und an dieser ihrem fleischigern Theile stärker als in den Zasern z); in dem Halse erregt sie ein anhaltendes und vestsizendes Brennen a), und ein Aufgus der frischen Blätter

---

z) Haller a. a. O. II. S. 160.

a) Dieses Kunstgriffes bediente man sich vormals, um den Schmarozern ihr Handwerk recht sauer zu machen, indem man ihnen vor der Tafel etwas von dieser Wurzel beibrachte. Matthiol Comment. in Dioscorid. L. II. C. 162. S. 595.

www.dlibra.wum.edu.pl

mit Wein hat einen tödlichen Magenkrampf b) verursacht c). Da aber ihre schädlichsten Theile von flüchtiger Art sind, und bei der Destillation mit dem Wasser über den Helm gehen d), so verlieren sie schon einen grosen Theil ihrer Schärfe, wenn sie lange liegt und austroknet e), und da, nach einigen Versuchen, ihre Schärfe an die laugenhafte Schärfe zu gränzen scheint f), so finden wir auser den allgemeinen Mitteln, die schädliche Kraft scharfer Gifte zu entkräften, in den Säuren, vornemlich in Essig, nicht nur das angemessenste Gegengift g), sondern auch das beste Mittel, um der Schärfe dieses Gewächses eine heilsame Richtung zu geben h).

Durch einen oder den andern Kunstgriff gemildert, mit Wein oder Essig zubereitet i), mit Wasser oder Weingeist zum Extrakt gemacht k), wird es ein vortrefliches Mittel, die vesten Theile gelinde zu reizen l), und, ohne zu erhizen, ist es geschikt,

---

b) Cranz Mater. med. et chirurg. Vienn. 1762. Theil 3. S. 29.

c) Haller a. a. O.

d) Geoffroi Mater. med. III. S. 125.

e) Cartheuser Mater. med. S. 402. 403.

f) Wenigstens färbt der Milchsaft aus der frischen Wurzel und den frischen Blättern den Veilchensaft grün. Fränkische Sammlungen ꝛc. a. a. O.

g) Cranz a. a. O.

h) Pharmacop. Wurtemberg. Stuttg. 1754. S. 21.

i) Ebendas. oder mit noch einmal so vieler Seife und Galle gekocht. Rosen von Rosenstein von den Kinderkrankheiten. I. Ausg. 1774. S. 556.

k) Geßner Fränk. Sammlungen a. a. O.

l) Geßner a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

schikt, die Säfte und vornemlich den Schleim aufzulösen und zu verdünnen m). In Fehlern des Magens n), in einer zähen Verdikung der Säfte o), in gehindertem Auswurf aus Brust und denen daher rührenden Krankheiten p), in der englischen Krankheit q), in dem Verfall der Stimme r) leistet es zuweilen sehr gute Dienste. Auch wird die Wurzel äuserlich in starken Aufgüssen, oder als Meissel in bösartigen Geschwüren mit gutem Nuzen gebraucht s).

Mit der frischen Wurzel kann man abgestandenen Wein wieder gut machen, um kräftigen Essig daraus zu verfertigen t); eben daraus kann man durch Troknen eine Art Stärkmehl zubereiten, das mit der Fecula der Alten einerlei ist u). In vielen Ländern ist sie, nachdem man ihr durch Ausdrüken des Safts ihre Schärfe genommen hat, ein gewöhnliches Nahrungsmittel im Winter x); in andern Ländern bedient man sich ihrer statt der Seife y) oder mischt sie

---

m) Ebendeſſ. Schwaben zur Arzneygelahrheit und Naturkunde. I. B. Nördling. 1769.

n) Birkmann in seinem Magenpulver.

o) Haller a. a. O.

p) 1) Hill Mat. med. S. 596. 2) Detharding Method. med. S. 153. 3) Geßner a. d. a. O.

q) Rosen von Rosenstein a. a. O.

r) Burggraf Lexic. univers. medic. I. S. 1097. 1098.

s) Cranz a. a. O.

t) Lepechin de acetificatione. Argentor. 1766. S. 11.

u) Avantcoureur 1773.

x) In Slavonien. Anguillara Degli simplici. Venet. 1561. S. 128. in Bamberg. Burggraf a. a. O. S. 1095.

y) Navier Amoliſſement des os. S. 75.

www.dlibra.wum.edu.pl

wenigstens unter die gemeine Seife. Die Beeren kann man in der Färberei zu rother Farbe gebrauchen z).

7) Virginische Aronswurz. Arum Virginicum Linn.

Sie wächst in Virginien an feuchten Orten wild, und hat sehr viele Aehnlichkeit mit der gemeinen; nur daß sich ihre Blätter mehr der Gestalt eines Herzens nähern, und eine schärfere Spize und stumpfere Eken haben. Ihre Wurzel soll zuweilen so dik werden, als ein Mensch um die Lenden herum. Frisch ist sie ebenfalls scharf, und brennt, so wie die Beeren, wie Feuer auf der Zunge. Die Amerikaner werfen viele Wurzeln in eine Grube zusammen, deken sie mit Erde zu, und zünden über derselben eine Zeit lang ein groses Feuer an, so werden sie so esbar und wohlschmekend, als Bataten; oder sie kochen auch ihre Kolben mit den Beeren und verzehren sie als eine angenehme Speise a).

8) Eirundes Aron. Arum ovatum Linn. Arum aquaticum. Rumpf Herbar. Amboin. V. Pl. 108.

Es ist in Indien zu Hause, und zeichnet sich durch seine eiförmig-länglichte Blätter, und durch seine rauhe Blumenscheide aus.

Wenn die Pflanze schon hoch genug gewachsen ist, so läßt sie das Vieh stehen; ist sie aber noch zart und niedrig,

---

z) Ehrhard ökonomische Pflanzenhistorie 5 B. S. 201. In Poitou weichen die Bauerfrauen die Stiele drei Tage lang ein, kochen sie dann zu einem Teig ein und bleichen ihre Leinwand damit. Ebendas.

a) Kalm Reise ꝛc. Th. II. S. 270. 426. Th. III. S. 67.

www.dlibra.wum.edu.pl

wie dieser Fall im Frühling zutrift, wenn das Vieh zum erstenmal auf die Weide kommt, so frißt es sie, aber mit tödlichem Erfolge, denn sie ist ein tödliches Gift, das auch nur gekostet, Aufschwellen und Auszehrung verursacht, und ehemals manchen Weissen und Schwarzen, wenn sie ihre Blätter mit denen des egyptischen Arons verwechselten, das Leben gekostet hat, selbst ihr äuserlicher Gebrauch erfordert Behutsamkeit; man legt die gekochten Blätter auf Wunden, welche davon schnell heilen, und wäscht mit Wasser oder Milch, womit man Kraut und Wurzel gekocht, und sie zur Helfte und bis zu einer gewissen Dike abgeraucht hat, Morgens und Abends die Geschwüre aus. Ueberhaupt aber verliert auch sie ihre Schädlichkeit durch Abkochen; die Zuckersieder kochen die Wurzel frisch, nachdem sie blos geschält ist, mit dem dritten Theile ungelöschten Kalkes, und tropfen sie so in den Zuker, wenn er nicht dik werden und anschiesen will b).

9) Aronsbaum, Arum arborescens Linn. Plumier descr. des plant. de l'Amerique. Par. 1693. Pl. 51. und Pl. 60.

Seine Wurzel treibt einen geraden, grünen, holzigen Stamm, der bis sieben Schuhe hoch wird und in Gelenke abgetheilt ist. Seine Blätter stehen an dem Gipfel des Stamms, sind hellgrün, länglicht und beinahe wie ein Pfeil gestaltet; aus ihrer Mitte kommt dicht an dem Stamm eine lange blaßgrüne, und weisgeflekte Blumenscheide hervor, die Anfangs aufrecht, nachher aber wagerecht steht, und zulezt ganz unter sich hängt; sie gleicht der Blumenscheide des gemeinen Aronkrautes gänzlich, nur daß die Staubwege nur

b) Rottböll a. a. O. I. nr. VI. S. 300.

www.dlibra.wum.edu.pl

auf einer Seite des Kolbens stehen; unten ist sie aufgetrieben, in der Mitte enge zusammen geschnürt, oben aber wieder ausgebreitet.

Das ganze Gewächs ist voll von einem sehr scharfen Safte, doch genieſt man seine Stengel, nachdem man sie etliche Mal mit kochendem Wasser, wie andere grüne Zugemüse, begossen hat.

10) Aronswurzel mit Blumen ohne Blätter. Arum seguinum Linn. Jacquin stirp. Americ. pict. Pl. 229.

Sie hat gleichfalls Amerika zu ihrem Vaterlande. Ihre Wurzel treibt einen holzigen, ziemlich aufrechten Stamm, der aus deutlich abgesezten Gelenken besteht. Ihre Blätter sizen oben an dem Stamme, und sind länglicht, beinahe wie ein Ei, nur daß sie an den Enden spizig zulaufen. Ihre Blumen sind wie bei den übrigen Arten. Der Saft, mit welchem die ganze Pflanze angefüllt ist, hat eine giftige Schärfe, und soll, wenn man ihn nur mit der Spize der Zunge kostet, auf einige Zeit eine Sprachlosigkeit verursachen c).

Ohne Zweifel verdienen noch mehrere Arten dieser Gattung hier eine Stelle; da ich aber keine Erfahrungen vor mir habe, welche mich davon ganz gewis versichern könnten, so habe ich sie inzwischen mit Vorsaz ausgelassen.

Sollte wohl auch Pothos palmata Linn. Jacquin ic. plant. rar. B. V. Fasc. VI. Pl. 20. von den westindischen Inseln, die sich wie Epheu an den Wänden hinauf windet,

c) Sloane a. a. O. I. S. 168.

www.dlibra.wum.edu.pl

und so wohl dadurch als durch ihre handförmige Blätter, die vier Staubfäden in jeder ihrer Blumen, die vier Blättchen, woraus die Krone derselbigen besteht, und die zweisamigen Beere von den Aronsarten unterscheidet, hieher gehören? Sie ist wenigstens so scharf, daß, wenn man sie nur kostet, sie den Mund entzündet, und zehen Tage lang allen Geschmak nimmt c*).

II. Wasserpfeffer, scharfes Flöhkraut, scharfes Pfersingkraut, brennendes Pfersingkraut, Mükenkraut, Pfauenkraut, Pfauenspiegel. Polygonum Hydropiper Linn. Hydropiper. Blackwell a. a. O. T. 119.

Er wächst in ganz Europa an feuchten Orten, vornemlich häufig in Wassergräben; er ist ein Sommergewächs, und blüht im Erndemonat. Sein Stengel ist wenigstens nach oben zu aufrecht, und wird manchmalen zween Schuhe hoch; er hat deutliche Gelenke, die durch Knoten unterschieden sind. Seine Blätter sind breit, glatt und ohne Fleken, und nähern sich ziemlich der Gestalt eines Eies, nur daß sie an beiden Enden zuweilen spizig zulaufen. Seine Blumen stehen ohne eigene Stiele an der Spize der Aeste in dünnen Aehren beisammen; jede von ihnen hat sechs Staubfäden und einen Eierstok mit einem entzweigespaltenen Griffel; ihre Krone ist weis oder röthlicht, und theilt sich oben in vier oder fünf stumpfe Abschnitte. Jede Blume hinterläßt einen einigen glänzenden und breitgedrükten Samen, der etwas dreiseitig ist. Auser Blättern und Blumen sizt an Stengel und Aesten

c*) Rai a. a. O. III. S. 587.

www.dlibra.wum.edu.pl

eine Art kurzer, breiter, gleichsam abgehauener, bald weislichter, bald röthlichter Scheiden; diejenigen, die in den Theilungswinkeln des Stengels sizen, haben an ihrem Rande Haare.

Er hat eine äzende anhaltende Schärfe, die seinen innerlichen Gebrauch gefährlich macht d), desto nüzlicher ist er zum äuserlichen Gebrauche in wässerichten Geschwulsten e), in alten Geschwüren mit harten Rändern und faulem Fleische f) und das damit gekochte Wasser als Klistier eingesprizt in Stuhlzwang und Ruhr g); so auch in Wunden, Geschwulsten und Geschwüren der Pferde. Die Aerzte dehnten aber seinen Gebrauch noch weiter aus. Sie gaben ihn mit Wasser oder Wein angegossen oder gekocht, zuweilen auch mit Korinthen oder Sauerampfer gemildert, als ein harntreibendes Mittel, vornemlich bei phlegmatischen Leuten in der Wassersucht h), und als ein eröfnendes Mittel in Verstopfungen der Eingeweide, in Gelbsucht i), Ruhr und Stuhlzwang k). Einige empfehlen selbst das von dieser geruchlosen Pflanze abgezogene etwas scharfe Wasser in Krankheiten der Harnwege, in welchen es aber vor dem gemeinen Wasser nicht

---

d) Haller a. a. O. II. S. 257.

e) Die frischen Blätter, oder das damit abgekochte Wasser. Chomel Histoire des plantes usuelles. Paris 1731. B. I. S. 648.

f) Das Kraut blos gestampft. Chomel a. a. O.

g) Chomel a. a. O. S. 647.

h) Chomel a. e. a. O.

i) Chomel a. a. O.

k) Chomel a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

viel vorzügliches leisten wird. Mit seinem Kraute kann man gelb färben [1]).

III. Arabische Winde. Saelanthus. Forskähl a. a. O. S. 34.

Ihre Wurzel ist knollig, und hält so, wie die Stengel, mehrere Jahre aus; die lezten sind fleischig, glatt, grün, und voll, bestehen aus deutlichen abgesezten Gelenken, und theilen sich immer wieder entzwei; sie winden sich um benachbarte Körper herum, und hängen sich durch ihre Gelenke daran vest, welche bald dem Blatte gegen über, bald in der Mitte zwischen zwei Blättern entspringen. Die Blumenstiele haben fleischige Nebenblättchen. Die Blumen selbst haben keine Krone, aber einen Staubweg, dessen Eierstok, wie ein Krug gestaltet, der Griffel fadendünn, und die Narbe spizig ist; der Staubfäden sind vier mit länglichten Staubbeuteln, an welchen unten eine Saftgrube ist; ihr Kelch sizt auf dem Eierstoke, fällt bald ab, und besteht aus einem Blättchen. Jede Blume läßt eine ovale Beere nach sich, die, wenn sie reif wird, roth ist, und einen einigen schwarzen Samen mit einer häutigen Rinde nach sich läßt. Die beiden Arten, deren ich hier gedenke, wachsen häufig in dem glüklichen Arabien.

1) Vierekige arabische Winde, Saelanthus quadragonus.

Ihre Stengel und Blattstiele sind vierekig. Die Glieder, aus welchen die ersten bestehen, sind ganz gerade und

---

1) Linné de Plant. tinctor. S. 17.

www.dlibra.wum.edu.pl

ungefähr zween Zolle lang, auf dieſen ſizen die Blätter wechſelsweiſe auf eigenen Stielen; ihre Nebenblättchen ſind wie ein Herz geſtaltet, halb zuſammengelegt, ſteif, glatt und etwas geadert, an ihrem Rande, wie eine Säge gezakt und ungefähr drei Zelle lang: ſie ſizen den Blättern gegen über. Ihre Blumen ſizen auf eigenen rundlichten glatten Stielen den Blättern gegen über an den Gipfeln der Aeſte in Dolden beiſammen; ihr Kelch iſt ganz glatt und die Staubfäden ſtehen ſeinen Blättchen gerade gegen über. Ihre Saftgrube beſteht in einem erhöhten Ringe. Ihre Beere hat ungleiche Erhöhungen.

In Arabien hält man ſie für giftig, wenigſtens äuſert ſie auf der Hand und Zunge eine brennende Schärfe, wenn ſie unmittelbar davon berührt werden.

2) Arabiſche Winde mit esbaren Beeren. Saelanthus glanduloſus Forsk.

Ihre Stengel ſind rundlicht; ihre Blätter ſizen auf Stielen, welche oben flach, unten aber rundlicht ſind, einander gerade gegen über; ſie ſind fleiſchig, ſteif, im Umfange beinahe rund, wie ein Ei, nur etwas zu ſpizig, und an ihrem Rande, wie eine Säge, gezakt. Ihre Nebenblättchen ſind noch ſpiziger, unter ſich gebogen und an ihrem Rande häutig. Ihre weisgrüne Blumen ſtehen auf Stielchen, in unächten Dolden beiſammen, die, wie der untere Theil des Kelchs, mit Drüschen beſezt ſind. Ihre Staubfäden ſind veſt an dem Griffel angedrükt. Ihre Saftgrube iſt in vier Lappen getheilt. Ihre Beeren ſind weich und können ohne Schaden gegeſſen werden. Ihre Wurzeln ſchmeken anfangs zwar ſüs, laſſen aber einen brennenden Geſchmak auf der Zunge zurük.

www.dlibra.wum.edu.pl

IV. Brechnus. Iatropha.

Alle Arten, die hieher gehören, sind in dem mittägigen Theile von Amerika zu Hause; sie dauren mehrere Jahre, und haben einen holzigen Stengel, welcher sieben bis vierzehen Schuhe hoch wird, und sich in Aeste theilt. Ihre Blumen haben gemeiniglich keinen Kelch; einige derselbigen haben zehen Staubfäden, welche in eine Säule vereinigt, und einer um den andern länger und kürzer sind, und keine Spur von Staubwegen haben; ihre Krone besteht aus einem zusammenhängenden Stüke, und hat einigermasen die Gestalt eines Trichters. Andere hingegen auf der nemlichen Pflanze haben nur einen Staubweg mit drei entspeigespaltenen Grifseln, aber keine Spur von Staubfäden; ihre Krone steht weit offen, und besteht aus fünf Blättchen; diese lezte hinterlassen ein trokenes Samengehäus, welches inwendig in drei Fächer getheilt ist, in deren jedem ein Samenkorn sizt.

1) Amerikanischer Brechnusbaum, amerikanischer Purgiernusbaum, schwarzer Purgiernusbaum, schwarze Purgiernus, Purgiernus. Iatropha Curcas Linn. Jacquin Hort. Vindob. III. Pl. 63.

Sein Stamm ist stark, und wird bis vierzehen Schuhe hoch. Seine Blätter haben eine scharfe Spize, und nähern sich der Gestalt eines Herzens, nur daß sie schärfere Eken haben. Seine grasgrüne Blumen stehen in einer Art von Dolden an dem Gipfel der Aeste beisammen; sie haben alle einen Kelch, der, wie die Krone, bei allen aus fünf Blättchen besteht. Seine Samengehäuse hängen unter sich; aber die Samen selbst sind glatt und schwarz, und haben,

www.dlibra.wum.edu.pl

wie die Samen des gemeinen Wunderbaums, einen weissen, fetten und ölichten Kern, der süslicht scharf und ekelhaft schmekt.

Diese Samen, die von den alten Aerzten in der Absicht, auf den Stuhlgang zu treiben, häufig gebraucht worden sind, zu unsern Zeiten aber, wegen ihrer äuserst gewaltsamen Wirkung von wahren Aerzten nicht mehr gebraucht werden, haben sowohl an sich, als in dem daraus gedrukten Oele, und dem davon zubereiteten Extrakte eine ausnehmende Schärfe. Sie erregen äuserst heftiges Erbrechen, übermäsigen Stuhlgang, die grausamsten Bauchschmerzen; sie entzünden und fressen auch so gar den Magen und die Gedärme m) an. Nach Bancrofts n) und Ives o) Versicherung beruht diese schädliche Schärfe nur auf zwei dünnen weissen und häutigen Blättern, die den Kern der Nus mitten entzwei theilen; sondert man diese ab, so kann man diesen Kern ohne allen Schaden speisen.

2) Französische Purgiernus. Iatropha multifida Linn. B. Chr. Vogel Suppl. Dec. ic. plant. rar. Trew Pl. 14.

Ihr Stamm ist weich, dik und bis zehen Schuhe hoch. Ihre Aeste sind grau. Ihre Blätter sizen auf starken Stielen an allen Seiten der Aeste, und sind in neun bis zehen Lappen getheilt; auf ihrer obern Fläche sind sie glatt und

---

m) Gleditsch alphabetisches Verzeichniß der gewöhnlichen Arzeneygewächse. Berlin 1769. S. 312.

n) Natural History of Gujana, Lond. 1769. S. 34. 35.

o) Reise nach Indien und Persien in einer fr. Ueberf. von Dohm. Leipzig 2. Th. 1775.

www.dlibra.wum.edu.pl

hellgrün, auf der untern aber bestäubt. Auser diesen zeigen sich noch viele Nebenblättchen, die in viele Abschnitte gespalten sind. Ihre Blumen sizen auf langen Stielen an dem Gipfel der Aeste in grosen Dolden beisammen, und haben eine glänzend schaulachrothe Krone. Ihre Samen haben mit dem Samen des amerikanischen Brechnusbaums einerlei Kräfte, und das mit ihren Blättern abgekochte Wasser erregt Durchlauf und Erbrechen, und soll ein Gegengift des Manchinellbaums sein. Aus den Blättern und ihren Stielen fließt ein scharfer bitterer Saft; wenn man darein schneidet p).

3) Cassava, Cassada, Manihot. Iatropha Manihot Linn. Manihot Theveti, Yucca et Cassavi. Merianin Surinam. 4. Abb. 4. 5.

Ihre Wurzel ist länglicht, beinahe wie ein Kegel, ungefähr einen Schuh lang, und fünf oder sechs Zolle im Umfange dik; sie hat weiches, saftiges und mehliges Fleisch. Ihr Stengel wird vier bis sieben Schuhe hoch; er ist knotig, mit einer aschgrauen Rinde bekleidet, und inwendig voll Mark; oben theilt er sich in einige kurze, dünne und grüne Zweige. Ihre Blätter stehen auf langen Stielen an Stengel und Aesten zu beiden Seiten abwechselnd; sie sind ganz glatt, und in sieben Lappen getheilt; welche, wie die Finger an einer Hand, ausgestrekt sind; diese sind in der Mitte breiter, und an beiden Enden zugespizt, und haben alle einen ganz glatten und gleichen Rand, den mittelsten ausgenommen, welcher zu beiden Seiten eine Aushölung hat.

Roh ist die Wurzel ein schnell tödendes Gift, das gewaltsame Zukungen, ein Aufschwellen des Unterleibes, und

p) Dillenius Hort. Eltham. S. 217.

www.dlibra.wum.edu.pl

ein geschwindes Nachlassen aller zum Leben nothwendigen Bewegungen des Leibes verursacht q). Ihr ausgedrükter Saft, welcher den Geruch und das Ansehen von Mandelmilch hat, mit Weinsteinsalz aufbraußt und davon milder wird r), ist, ehe er gegohren hat, selbst wenn er äuserlich angebracht wird, auch Schafen, Schweinen und Federvieh tödlich, obgleich die auf solche Art umgekommenen Thiere ohne Schaden gespeist werden; aber, eben dieser Saft, wenn er mit Pfeffer an Wildpret gekocht wird, giebt eine angenehme und gesunde Brühe. Die besten Gegengifte sind Brechmittel, Laugensalze, vornemlich feuerveste, Orlean, der ausgedrükte Saft des grosen Basilienkrautes, Pfeffer und der gegohrne Geist aus Zuker.

Inzwischen ist eben diese Wurzel, welcher in ihrem Vaterlande, ohne den geringsten Schaden davon zu leiden, Agutis, Hirsche und Schweine begierig nachgehen s), in vielen Gegenden von Amerika, auch bei den Einwohnern eine sehr gewöhnliche Speise, denn durch Gährung, und schon von selbst innerhalb sechs und dreisig Stunden verliert sich das Gift, noch schneller durch Kochen. Man reibt sie in dieser Absicht auf grosen kupfernen Reibeisen zu feinem Mehle, aus

---

q) Clark Medical facts and observations. B. VII. n. 25.

r) Bajon Memoires pour servir à l'histoire de Cayenne et de la Gujane françoise, dans les quels, on fait connoître la nature du climat de cette contrée, les maladies, qui attaquent les Européens nouvellement arrivées, et celles, qui regnent sur les blancs et les noirs, des observations sur l histoire naturelle du pays et sur la culture des terres. à Paris. 8. B. II. 1778.

s) Rozier Observations sur la Physique &c. &c. 1772. Decembr.

www.dlibra.wum.edu.pl

welchem der Saft ausgedrükt wird; dieses Mehl bringt man auf grose Eisenbleche über ein schwaches Feuer, und macht ganz runde bis vier Linien dike Kuchen von verschiedener Gröse daraus; auf diesen Blechen wird es gebaken, und auf seiner Oberfläche braun, und kann sich nun viele Monat lang süs und gut erhalten t). Durch die Gährung giebt eben diese Wurzel auch ein starkes Getränk Pereno.

V. Gemeiner Wunderbaum, Celnus, Agnus castus. Ricinus communis Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 148.

Er ist in beiden Indien, in Afrika, und in dem mittägigen Theile Europens zu Hause, und dauert in seinem Vaterlande, wo er meistens zu einem Baum von mittlerer Höhe, wächst, mehrere Jahre aus: in Teutschland geht er gemeiniglich in einem Jahre aus. Sein Stengel ist meistens glatt und grün, zuweilen auch roth, und in seiner Höhe und Dike verschieden, so wie sich auch in Absicht auf die Gröse der ganzen Pflanze ein vielfältiger Unterschied zeigt. Seine Blätter sind gros und glänzend grün, und sizen auf langen Stielen, welche unten mit Drüschen besezt und beinahe in der Mitte des Blattes angewachsen sind; sie sind in Lappen getheilt, die an ihrem Rande wie eine Säge gezakt und, beinahe wie die Finger an einer Hand, ausgestrekt sind.

---

1) 1) Bancroft a. a. O. S. 41. u. f. 2) Herbert de Cafface amarae Surinamensis radice. Marburg 1753. 3) Fermin Description generale historique de la colonie de Surinam B. I. 1769.

www.dlibra.wum.edu.pl

Seine Blumen haben keine Krone; einige von ihnen, die gemeiniglich oben sizen, haben keine, wenigstens keine vollkommene, Staubwege, aber eine grose Menge von Staubfäden, die in einem Haufen vereinigt sind, und mit gelbem Staube stark angefüllte Staubbeutel haben; bei diesen ist der Kelch in fünf Stüke getheilt; andere hingegen haben keine Staubfäden, aber einen Staubweg mit drei entzweigespaltenen Griffeln; bei diesen ist der Kelch in drei Stüke getheilt, und diese hinterlassen ein trokenes Samengehäus, welches inwendig in drei Fächer getheilt ist, deren jedes einen Samen enthält.

Dieser Same ist zwar vormals häufig in der Absicht, auf den Stuhlgang zu treiben, von den Aerzten gebraucht worden; allein er wirkt äuserst heftig, erregt die grausamsten Bauchflüsse, das hartnäkigste Erbrechen und in Magen und Gedärmen Entzündungen, welche leicht in tödlichen Brand übergehen. Selbst die Häute, in welche er eingewikelt ist, und das Oel, das daraus gedrükt, und in Amerika häufig in Lampen, und innerlich gegen Würmer und in der Bleikolik u) gebraucht wird, äusert diese Kräfte. Der Same selbst hat inzwischen einer Kaze gar nichts, und einem Hunde nur wenig geschadet x).

VI. Kroton, Croton.

Die hieher gehörigen Pflanzen aus dieser Gattung finden sich nur in wärmern Ländern, und haben ihre männliche

u) Bancroft a. a. O. S. 36.

x) Hillefeld a. a. O. S. 30.

www.dlibra.wum.edu.pl

und weibliche Befruchtungstheile in verschiedenen Blumen. Die männlichen unter diesen haben acht bis fünfzehen Staubfäden, einen walzenförmigen Kelch mit fünf Zähnen an seiner Mündung und eine aus fünf Blättchen bestehende Krone; die weiblichen keine Krone, aber einen aus vielen Blättchen bestehenden Kelch, und einen Fruchtknoten mit drei entzweigespaltenen Griffeln; diese hinterlassen trokene Samengehäuse, welche inwendig in drei Fächer getheilt sind, und in jedem derselbigen einen Samen enthalten.

1) Färberkroton, Maurelle, Croton tinctorium Linn. Burmann ind. Pl. 62. Abb. 1.

Dieses Sommergewächs findet sich in Indien, Arabien und im mittägigen Frankreich.

Seine Blätter sind rauh, saltícht, rautenförmig und ausgeschweift; seine Blumen haben acht unten zusammengewachsene Staubfäden, und sowohl an ihrem Kelche als an ihrer Krone fünf Blättchen, welche an den lezten lanzenförmig sind.

Der Lakmus, welcher daraus bereitet wird, besizt eine gewisse Schärfe, welche ein Brennen im Schlunde verursacht y). Stammt diese Schärfe ursprünglich von der Pflanze, und verdient sie daher, hier aufgeführt zu werden?

2) Molukkanischer Purgirholzbaum, malabarischer Purgirkörnerbaum, Purgirkörner, Croton Tiglium Linn. Grana Tiglia und Lignum moluccanum in den Apotheken,

---

y) Puihn a. e. a. O. S. 148. 147.

www.dlibra.wum.edu.pl

Cadel avanacu, Rheede Hort. malabar. II. Pl. 33.

Dieser Baum wächst in Ostindien wild, und wird häufig an der malabarischen Küste gepflanzt. Seine Rinde ist fein aschgrau; sein Holz, wie es nach Europa kommt, nachdem es einige Jahre gelegen hat, und getroknet ist, blaß, sehr leicht, und ohne sonderlichen Geruch. Seine Blätter sind glänzend glatt, beinahe eirund, nur daß sie eine scharfe Spize haben, ihr Rand ist wie eine Säge gezakt. Ihre männlichen Blumen haben aber zehen bis funfzehn Staubfäden, welche unten in eine Säule zusammengewachsen sind, der Samen ist länglicht, beinahe wie ein Ei, und etwas kleiner als eine Haselnus, glatt, schwarzgrau und mit einer dünnen Schale bekleidet.

Holz und Samen haben, vornemlich so lange sie frisch sind, einen ekelhaften, scharfen und äzenden Geschmak; sie treiben mit dem äussersten Ungestümm auf den Stuhlgang, erregen heftiges Erbrechen, grausame Bauchschmerzen und die gefährlichsten Entzündungen des Magens und der Gedärme, mit ihren Folgen. Indessen sind sie doch von den ältern Aerzten als abführende Mittel gebraucht worden, und vielleicht verlieren sie auch, wenn sie einige Jahre lang aufbewahrt worden sind, etwas von ihrer schädlichen Wirksamkeit.

VII. Dreiblätterichte Dioskorische Pflanze, Dioscorea triphylla Linn. Rumpf Herb. amboin. V. Pl. 128.

Sie ist in Malabar zu Hause und hat dreifache Blätter; ihre Blumen haben keine Krone, sondern nur einen in

sechs

www.dlibra.wum.edu.pl

sechs Abschnitte getheilten Kelch; die männlichen sechs Staubfäden; die weiblichen einen Staubweg mit drei Griffeln; jede der lezten hinterläßt ein breitgedrüktes trokenes Samengehäus, das inwendig in drei Fächer getheilt ist, und in jedem derselbigen zween häutige Samen enthält.

Der Saft ihrer Wurzel ist ausnehmend scharf, und erregt auf der Haut ein Juken und ein Abschälen des Oberhäutchens; innerlich genommen aber Bangigkeiten und Schwindel z).

VIII. Orant, Orontium aquaticum Linn. Catesby a. a. O. I. Pl. 82.

Es wächst in Virginien und Kanada in stehenden Wassern und an Quellen und hält mehrere Jahre aus.

Sein Blatt ist eiförmig und ohne Ribben; seine Blumen ohne Kelch und Griffel; sie sizen auf einer walzenförmigen Kolbe, welche sie gänzlich bedeken, haben sechs Staubfäden, einen Staubweg, und eine aus sechs Blättchen bestehende Krone, und hinterlassen jede einen Fruchtbalg, der nur einen Samen in sich hat.

Obgleich seine Wurzel, unter der Asche gebraten, und seine Samen, nachdem sie wohlgetroknet und einigemal mit Wasser ausgekocht sind, von den Eingebohrnen häufig und ohne Schaden genossen werden, so besizen doch beide roh eine giftige Schärfe a).

---

z) Puibn a. e. a. O. S. 156.

a) Kalm a. e. a. O. III. S. 54.

www.dlibra.wum.edu.pl

XI. Bäume und Stauden.

Ich rechne hieher alle scharfen Gifte des Pflanzenreichs, welche einen holzigen, über Winter dauernden Stamm haben, und nicht so nahe mit einer der vorhergehenden Abtheilungen verwandt sind, daß sie unter ihnen eine Stelle verdienen könnten.

1) Daphne.

Die Arten, welche hieher gehören, sind alle Staudengewächse. Ihre Blumen haben keinen Kelch, aber eine Krone, welche unten röhricht ist, sich oben flach ausbreitet, in vier Abschnitte spaltet, über dem Fruchtknoten verwelkt, und die acht Staubfäden in ihrem untern Theile verschließt. Jede Blume hat einen Staubweg mit einem einfachen Griffel, und hinterläßt eine Beere mit einem Samen.

a) Kellerhals, gemeiner Kellerhals, Kellerschall, Kellerkraut, Läusekraut, Seidelbast, Zeidelbast, Wolfsbast, Zeiland, Scheislorbeeren, Rechbeeren, Bergpfeffer, falscher Pfefferstrauch, Brennwurz. Daphne Mezereum Linn. Knorr a. a. O. I. Pl. k. 6.

Dieser Strauch ist in ganz Europa, vornemlich aber in den kältern Gegenden desselbigen in Wäldern sehr gemein, und wird auch wegen des guten Geruchs seiner Blumen, die sich oft schon im Hornung, selten noch im Maimonat zeigen, in Gärten häufig gezogen.

Sein Stengel treibt viele Aeste, welche mit einer grauen, zähen und glänzenden Rinde bekleidet sind. Seine Blätter sind zart, glänzend glatt und sattgrün, und kommen gemeiniglich der Gestalt eines Eies ziemlich nahe, nur daß sie zuweilen an beiden Enden mehr zugespizt sind. Mitten

www.dlibra.wum.edu.pl

durch ihre Oberfläche läuft der Länge nach eine erhöhte Ader; sie zeigen sich erst, wenn die Blumen verwelken, an dem Gipfel des Stengels und der Aeste, an welchen sie auf einem kaum merklichen Stiele zu beiden Seiten sizen, sie fallen aber bald wieder ab. Seine Blumen kommen bald auf dieser, dann wieder auf der andern Seite des Stengels, und der Aeste zu drei aus einer Knopse, und bilden daselbst eine Art von Aehren, fallen aber bald wieder ab; sie haben einen angenehmen, aber starken Geruch; jede sizt auf einem eigenen sehr kurzen Stiele; der untere Theil der Krone ist mit Haaren bewachsen; diese ist übrigens zäh, vest, und gemeiniglich purpurroth, zuweilen, aber selten, weis. Seine Beeren werden im Brachmonat reif; sie sind rund, wie eine Kugel, und von einer schönen scharlachrothen Farbe. Ihr Same hat beinahe die Gestalt eines Eies, nur daß er etwas spiziger ist.

Alle Theile dieses Gewächses, Wurzel b), Rinde c), Blätter d) und vornemlich die Beeren e) haben eine ganz ungemeine Schärfe, und erregen, wenn sie auf die Haut ge-

---

b) Petit Memoires de l'Acad. de Paris pour l'ann. 1732. S. 233.

c) Guerin de vegetabilibus venenat. Alsatiae. S. 30.

d) Matthiol Kräuterbuch L. IV. C. 126. S. 428.

e) 1) Bradley New improvements of Planting and Gardening. Lond. 1729. S. 96. 2) Linné Flor. Suec. II. S. 128, n. 338. 3) Act. Helvet. B. V. S. 331. 4) Miscellan. Vratislau. 1718. mens. Februar. 5) Maur. Hofmann Ephemerid. Acad. Caes. Natur. Curios. Cent. V. et VI. observat. 46. S. 297. 6) Ritter Nov. act. Acad. Natur. Curios. T. III. App. S. 234.

www.dlibra.wum.edu.pl

legt werden, Röthe und Blasen f), wenn sie aber hinunter geschlungen werden, grausames g), lange anhaltendes h) Brennen in dem Munde, Schlunde, und der Kehle, oft eine wahre Entzündung dieser Theile, einen unauslöschlichen Durst i), das heftigste Erbrechen k), hartnäkige, langweilige l) und grausame m) Bauchflüsse, Bauchschmerzen, die noch lange nachher bleiben n), schlaflose Nächte, hizige Fieber, unbeschreibliche Entkräftung, Abschälen des Oberhäutchens an dem ganzen Leibe o), und nicht selten den Tod p). Schon die Ausdünstungen der Blumen erregen zuweilen in einem verschlossenen Zimmer Ohnmachten q). So gar der Rauch des Holzes, in welchem sie ihr Fleisch geräuchert hatten, tödete nach Zukungen und einer bangen Empfindung, als wenn sie erdrosselt würden, einige Soldaten in Korsika r).

---

f) Matthiol, Petit, Guerin a. d. a. O.

g) Bradley, Ritter und Hofmann a. d. a. O. Plözlich, so daß es durch kaltes Wasser kaum zu mildern war. Ritter a. a. O.

h) Zwölf Stunden lang. Bradley a. a. O.

i) Hofmann und Act. Helvet. a. d. a. O.

k) Ebendersf. und Act. Helvet. a. d. a. O.

l) Sechs Wochen lang. G. W. Wedel Ephem Acad. Caes. Nat. Curios. Dec. II. A. 2. Obs. 146. S. 322. 323.

m) G. W. Wedel, J. M. Hofmann, Ritter und Act. Helvet a. d. a. O.

n) Ritter und Miscell. Vratisl. a. d. a. O.

o) von vier Beeren J. M. Hofmann a. a. O.

p) Mehrere solche Beispiele bei Tragus Hist. plantar. Augsburg 1630. III. 752. und Linné a. a. O.

q) Lange Tentam. med. physic. de remed. Brunf. domest. Brunsu. 1766. S. 273.

r) Sage Analyse des trois regnes de la nature. I. S. 249.

www.dlibra.wum.edu.pl

Bei dem Rindvieh erregt der Genus der Beeren einen blutigen Stuhl; Wölfen und Hunden s) aber sind sie gar tödlich, und die Blumen meiden die Bienen sorgfältig t).

Erste Geschichte.

Man gab einem Wassersüchtigen von dieser Pflanze ein, und auf einmal überfiel ihn ein unaufhaltbarer Bauchfluß mit unerträglichen Schmerzen, und sechs Wochen hinter einander hatte er, unerachtet man die kräftigsten Mittel dagegen gebrauchte, täglich das gewaltsamste Erbrechen u).

Zweite Geschichte.

Eine Mutter gab ihrer Tochter zwölf Grane von den Beeren dieser Pflanze; in kurzer Zeit bekam sie einen Blutsturz und blieb darinn x).

Indessen hat doch auch dieses Gewächs seinen Nuzen. Es verdient nicht nur wegen seiner schönen, wohlriechenden Blumen eine Stelle in Gärten und Pflanzungen; sondern es verfertigen auch die Mahler aus seinen Beeren eine schöne rothe Farbe, und die russischen Frauenzimmer sind eitel genug, sich mit dieser scharfen Schminke die Wangen zu entzünden, um ihrer verwelkten Schönheit neues Leben y) zu geben. An einigen Orten hat man die verruchte Gewohnheit, dem Brandewein durch ihre Beimischung eine gröfere

---

s) Lange a. a. O. S. 171. 173.

t) Gleditsch verm. Schriften II. S. 139.

u) G. W. Wedel a. e. a. O.

x) Linné a. e. a. O.

y) Flor. igric. S. 60.

www.dlibra.wum.edu.pl

Stärke zu geben: nüzlicher aber bedient man sich ihrer, Wölfe und andere Raubthiere zu tödten.

Der Arzt zieht aber wohl den wichtigsten Vortheil davon, vornemlich wenn er bei dem äuserlichen Gebrauche stehen bleibt. Ihre Wurzel, als ein Haarseil durch die Ohren gezogen, leistet in Krankheiten der Augen gute Dienste z); das damit gekochte Wasser ist in krebsartigen Geschwüren a), wenn sie damit ausgewaschen werden, auch in podagrischen Knoten, so lange sie noch frisch sind, von sehr gutem Nuzen b). Ihrer frischen Rinde bedient man sich in Norwegen äuserlich in der Gicht c), und sie soll, nach einigen Nachrichten, selbst Kopfgeschwulsten zertheilen, und ihre Wiederkunft verhindern d). Matthiol sah, daß die grünen Blätter, die man blos quetschte, in dem Hüftweh eine sehr gute Wirkung hatten, indem sie auf den schmerzhaften Ort gelegt, eine Blase zogen e). Allein die Aerzte giengen noch weiter; das Beispiel der Lappen, welche zwo bis drei Beeren verschlingen f), um ein Geschwür in dem Schlunde zum Aufbruch zu bringen, oder das Beispiel der Finnen, die, um Husten, Wechselfieber g) und Auszehrung zu heilen, neun bis

---

z) Barbeirac Formul. medic. S. 451.

a) Perry Nervous Diseases. S. 343.

b) Hill Management of the Gout 1771. S. 58.

c) Gunner a. a. O. nr. 22.

d) Versuch über den Gebrauch und die Wirkungen der Seidelbaströinde. Strasburg 1768.

e) Kräuterbuch. Frf. am Mayn 1600. S. 427.

f) Montin Medic. Lapp. Lulens. S. 20.

g) Herkmans Hauhisök. S. 63.

www.dlibra.wum.edu.pl

sieben und zwanzig Grane von dem Samen einnehmen g*), möchte wohl ihren innerlichen Gebrauch bei andern europäischen Völkern noch nicht rechtfertigen. Die Aerzte liesen die Blätter kauen, um Schleim und Speichel auszuführen h); sie gaben das mit der Rinde, oder mit den Blättern, oder mit den Samen, oder allen zusammen gekochte Wasser, als ein stark abführendes Mittel in Wassersucht, und in venerischen Knoten, oder liesen anstatt dieses gekochten Wassers sechs bis acht Samenkörner nehmen i); einige von ihnen waren so behutsam, die heftige Schärfe dieser Mittel durch die Beimischung einer Pflanzensäure, oder eines Schleims zu mildern, und ein neuerer Schriftsteller rühmt die Rinde mit Fleischbrühe gegeben, als ein kräftiges Mittel gegen die fallende Sucht k).

Die Mittel, den schlimmen Folgen dieses Gifts vorzukommen, sind eben diejenigen, die ich gegen die scharfen Gifte überhaupt anzegeben habe.

β) Spanische Daphne, Daphne Thymelaea Linn. Gerard Flor. prov. Pl. 17. Abb. 2.

Sie wächst in Spanien, bei Montpellier und in Italien wild, und weicht vom Kellerhalse darinn ab, daß ihre Stengel ganz einfach sind, und ihre Blumen in den Winkeln der Blätter nicht gerade zu drei sizen, und eine gelblichte Krone haben.

Sie ist noch schlimmer, als der Kellerhals l).

---

g*) Hartmann om ju gangbare Sjukdom. S. 594.
h) Matthiol a. a. O.
i) Matthiol a. a. O.
k) Versuch über den Gebrauch ꝛc. ꝛc.
l) Puihn a. e. a. O. S. 84.

www.dlibra.wum.edu.pl

γ) Alpendaphne, Daphne alpina Linn. Schmidt östreichische Baumzucht I. Pl. 19.

Sie wächst auf den östreichischen, italiänischen, savoischen und schweizerischen Alpen wild, und unterscheidet sich dadurch, daß ihre Zweige immer zu zwei entspringen, und gedüpfelt sind, daß ihre Blätter etwas stumpf, und so lange sie jung sind, zotig, nachher aber nur auf der untern Fläche filzig sind, und daß ihre Blumen in ganzen Haufen beisammen sizen, und eine blaßgelbe oder weisse Krone haben.

Auch sie ist scharf [m]).

δ) Tartonraira, Daphne Tartonraira Linn. Chamelaea alpina incana. Lobel ic. Abb. 371.

Sie ist in der Provence zu Hause, und unterscheidet sich leicht dadurch, daß ihre Blätter eiförmig, nervenreich, und auf beiden Flächen mit feinem, weichem, weislichtem Haare bekleidet sind, und ihre Blumen in ganzen Haufen in den Winkeln der Blätter sizen. Auch sie ist scharf [n]).

ε) Pontische Daphne, Daphne pontica Linn. Thymelaea pontica citrei foliis. Tournefort voyag. III. S. 180. Abb.

Sie wächst im Pontus wild, und ist ebenfalls scharf [o]). Ihre Blätter sind eiförmig, doch laufen sie nach beiden Enden etwas spizig zu; ihre Blumen sizen zur Seite auf eigenen Stielen, deren jeder zwo Blumen trägt.

---

m) Ebenderf. a. e. a. O. S. 85.

n) Ebenderf. a. e. a. O. S. 84.

o) Ebenderf. a. e. a. O. S. 85.

www.dlibra.wum.edu.pl

ζ) Immergrüner Kellerhals. Daphne Laureola Linn. Jacquin Flor. Austriac, B. II. Pl. 183.

Er wächst in Italien, Oestreich, in der Schweiz, in Frankreich und England wild, ist sehr dauerhaft gegen die Kälte, und wird nicht leicht über drei Schuhe hoch. Seine Zweige haben eine graue, glänzende und sehr zähe Rinde; seine vesten, dicken Blätter stehen ohne deutliche Stiele rund um die Zweige herum; sie sind länglicht und glänzend, auf ihrer obern Fläche dunkelgrün, auf der untern aber matter und fallen nie ab. Seine Blumen zeigen sich meistens im Hornung mit den Blumen des gemeinen Kellerhalses büschelweise, zwei bis fünf Stüke neben einander p) zwischen den Blättern auf sehr kurzen grünen Stielen; sie haben eine grüngelbe Krone, weisse Staubfäden mit schön gelben Staubbeuteln, einen hellgrünen Eierstok, weissen Griffel und eine gelbe Narbe. Seine Beeren sind klein, länglicht rund, anfangs grün, nachher aber, wenn sie zeitig werden, schwarz, und fallen im Heumonat ab.

Er hat in allen seinen Theilen mit dem gemeinen die nemliche Schärfe q). Die Rinde erregt, wenn man sie kaut, eine Entzündung des Schlundes r); sein Kraut, innerlich genommen, verursacht das gewaltsamste Erbrechen und alle Zufälle einer Entzündung des Magens und der Gedärme, die sich zuweilen mit dem Tod endigte. Selbst das Oel, das aus den Beeren gedrükt wird, ist zwar anfangs mild,

---

p) 1) Haller Hist. stirp. Helvet. I. S. 439. 2) P. F. V. Memorie de l'Acad. di Cortona Rom. B. II. 1744.

q) S. Pauli Quadripartit. Botan. Argentor. 1667. S. 366.

r) Gazette salutaire 1761, c. 22, Dec. n. 52.

www.dlibra.wum.edu.pl

erregt aber nachher eine sehr starke Entzündung im Halse, die mehrere Stunden dauert s).

Geschichte.

Ein Mann von 62 Jahren, von hiziger Gemüthsart, mager, aber blutreich, nahm in einer Brühe ungefähr einen Skrupel vom Pulver dieses Krauts; kaum hatte er sie getrunken, so bekam er heftiges Erbrechen; sein Aderschlag war vollgespannt, hart und nachlassend; der Leib verstopft, übrigens weich anzufühlen; bei diesen Zufällen starb der Kranke am neunten Tage.

7) Schweizerischer Kellerhals. Daphne Cneorum Linn. Jacquin Flor. austr. V. Pl. 426.

Man findet ihn auf den pyrenäischen Gebirgen, in Italien, in der Schweiz, in Ungarn, Oestreich und andern Gegenden Teutschlands.

Er wird kaum einen halben Schuh hoch, theilt sich aber doch in mehrere Aeste. Seine Blätter stehen gedrängt an dem Gipfel der Aeste beisammen; sie sind glatt, länglicht, in der Mitte breiter, als an beiden Enden, und laufen nach vorne zu in eine steife Spize aus. Seine Blumen sizen in den Winkeln der obersten Blätter in einer Art von Dolde beisammen, und haben spizige Nebenblättchen unter sich; ihr Geruch ist stark und angenehm; die Krone ist purpurroth, und hat eine lange Röhre, die Staubfäden stehen in zwo Reihen unter einander. Seine Blätter sind scharf t).

---

s) Swieten Comment. in Aphorism. Boerhaavii I. S. 638. II. S. 132.

t) Haller a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

9) Italiänischer Kellerhals. Daphne Gnidium Linn. Regnault Botanique mise à la portée de tout le monde. Pl. 328.

Er wächst in Spanien, Languedok und Italien wild. Seine Stengel liegen auf der Erde. Seine Blätter fallen im Herbste ab; sie sind glatt, und ihrer ganzen Länge nach ziemlich von gleicher Breite, nur daß sie sich nach vorne zu in eine scharfe Spize verlieren. Seine Blumen zeigen sich zweimal im Jahre, haben einen guten Geruch, und stehen in den Winkeln der obersten Blätter gedrängt in einer Art von Dolden beisammen; oben sind sie roth. Seine Beeren sind anfangs grün, nachher roth, und wenn sie verdorren, schwarz.

Er hat vornemlich in seinen Beeren eine ausnehmende Schärfe, die seinen Gebrauch äuserst gefährlich macht, und durch die heftigsten Bauchflüsse und Entzündungen der Gedärme schon tödlich gemacht hat u). Seine Rinde kann wie diejenige des gemeinen, äuserlich gebraucht werden u*).

Sollte wohl hier auch die stinkende Daphne, Daphne foetida Linn. aus den Eilanden des Südmeers eine Erwähnung verdienen? Sie wird auch ins Wasser geworfen, um Fische daraus zu fangen.

2) Zeilaud. Cneorum tricoccum Linn. Gärtner de fruct. et semin. plant. Cent. V. Pl. 70. Abb. 4.

Dieser Strauch wächst in Languedok und Spanien in grobem Sande wild, wird nicht leicht über drittehalb Schuhe

u) Matthiol a. a. O. S. 1264—1266.

u*) Chr. H. Haschke Diss. super Daphnes Gnidii usu epispastico pauca quaedam. Francof. ad Vindr. 1780. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

hoch, und treibt auf allen Seiten Aeste, welche stark belaubt sind. Sein Holz ist blaßgelb; seine Blätter haben keine eigenen Stiele und fallen nie ab. Seine Blumen haben nur drei Staubfäden und einen Staubweg; sie stehen einzeln in den Winkeln der Blätter, und zeigen sich im Maimonat; ihr Kelch hat drei Zähne; ihre Krone ist blaßgelb, und besteht aus drei Blättchen von gleicher Grösse; jede Blume hinterläßt eine dreiknöpfige Beere. Er hat mit dem italiänischen Kellerhals seine Schärfe gemein x).

3) Giftbaum. Amyris toxifera Linn. Toxicodendrum foliis alatis, fructu purpureo pyriformi sparso. Catesby a. a. O. I. Pl. 40.

Dieser kleine Baum wächst in Karolina und den Bahamainseln wild. Der Stamm hat eine leichte, weiche Rinde; die Blätter sind oft sieben bis acht Ellen lang, und bestehen aus mehreren kleinen und ganz flachen Blättern, welche an einem gemeinschaftlichen Stiele, aber auf eigenen Stielchen einander wechselsweise gegen über sizen. Seine Blumen hängen an Traubenkämmen beisammen, und haben acht Staubfäden, und einen Staubweg mit einer viereckigen Narbe; ihr Kelch hat vier Zähne, und ihre Krone besteht aus vier länglichten Blättchen. Seine Früchte gleichen einer Birne, haben eine schöne Purpurfarbe, und inwendig einen langen harten Stein, und werden häufig von den Vögeln gefressen. Aus dem Stamme fließt ein tintenschwarzer Saft, den die Einwohner für giftig halten y), und der, wenn er

x) Matthiol a. e. a. O.
y) Catesby a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

auch nur auf die bloſe Haut kommt, eine brennende Schärfe zeigt y*).

Wenn dieſe Behauptung in der Erfahrung gegründet iſt, wie es die Uebereinſtimmung des Baums mit den Arten des Sumachs, die ich nun anführen werde, vermuthen läßt; ſo ſcheint er hier ſeine Stelle zu verdienen.

4) Rhus, Sumach.

Seine Blätter ſind gemeiniglich aus mehreren kleinen zuſammen geſezt, welche wieder auf einem Stielchen ſizen. Seine weisgrünlichten Blumen ſizen in kleinen Büſcheln in den Winkeln der Blätter; auf der einen Pflanze blos männliche, auf der andern blos weibliche. Alle haben einen Kelch, der in fünf Stüke getheilt iſt, und eine Krone, die aus fünf Blättchen beſteht; die männlichen haben fünf Staubfäden, die weiblichen einen Eierſtok mit drei Griffeln, und die lezten hinterlaſſen eine Beere mit einen einigen breitgedrükten Samen. Alle Arten, deren ich hier gedenke, finden ſich in dem mitternächtlichen Amerika. Sie haben alle einen milchweiſſen z) oder gelblichtbraunen a) Saft, von ſehr widrigem Geruch b), der nicht nur auf Leinwand ſchön glänzend, und dauerhaft ſchwarz färbt c), ſo daß die Züge, die damit gezeichnet werden, nicht nur nicht verlöſchen, ſondern ſo gar

---

y*) Märter Phyſikaliſche Arbeiten der einträchtigen Freunde zu Wien. Iahrg. II. Q. 1. 1786. S. 74.

z) Philoſoph. Transact. Vol. II. P. I. Art. 27. S. 157. ꝛc.

a) Kalm a. a. O. II. S. 318. von dem wurzelnden Sumach.

b) Philoſ. Transact. und Kalm a. d. e. a. O.

c) Ebendaſ.

www.dlibra.wum.edu.pl

bei jeder Wäsche schwärzer werden [d]) und selbst die Buchstaben, die man damit auf Papier schreibt, sehr lange halten.

Schon die Ausdünstungen dieser Gewächse, wenn sie der Wind entgegen bläst [e]), oder man sich in einer damit angefüllten Luft befindet [f]), oder Zweige davon unter die Nase hält [g]), erregen besonders, wenn man schwizt [h]), eine schmerzhafte Geschwulst des Gesichts, der Hände und oft des ganzen Leibes mit häufigen Bläschen [i]), die erst mit Abschälen der Oberhaut vergehen; zuweilen verursachen sie ein so heftiges Aufschwellen der Augen, daß man etliche Tage lang nicht sehen kann [k]), manchmal aber nur ein Jucken in den äusern Theilen des Auges, das verschiedene Tage anhält [l]). Die

---

d) 1) Von dem wurzelnden Sumach behauptete dieses Kalm a. e. a. O. II. S. 318. 2) Vom Gift- und Firnisbaum Monti Act. Instit. Bonon. B. III. S. 165. ꝛc.

e) Kalm a. e. a. O. II. S. 229. 319.

f) 1) Kalm a. e. a. O. 2) Fontana Abhandlung über das Viperngift, die amerikanischen Gifte, das Kirschlorberngift und einige andere Pflanzengifte, aus dem französischen übers. Berlin 1787. 4. S. 337. 338. 3) Göze dritte kleine Harzreise. S. 192. ꝛc.

g) 1) Kalm a. e. a. O. 2) Monti a. e. a. O. 3) Arduini Memorie di osservationi e d' esperienze sopra la coltura e gli usi di varie plante che servir possono all' economia Padua 1766.

h) Kalm a. e. a. O.

i) 1) Kalm a. e. a. O. 2) Monti a. e. a. O. 3) Rossi a. a. O. S. 5—10.

k) Kalm a. a. O. II. S. 229.

l) Das sich zuweilen erst den andern Tag zeigt. Kalm a. a. O. II. S. 231.

www.dlibra.wum.edu.pl

nemlichen Zufälle ereignen sich von dem Rauche des brennenden Holzes m), die noch stärker werden, wenn man das frische Holz entweder selbst, oder die Hand eines andern berührt, der sich damit beschäftigt hat n). Schmiert man den Saft auf die Hand, so erregt er Blasen o), zuweilen aber macht er sie so hart, wie gargemachtes Leder, so daß nach einigen Tagen die Oberhaut, wie kleine Schuppen, los geht p).

Obgleich alle diese Uebel von selbst, oder doch auf den Gebrauch ganz einfacher Mittel verschwinden q), ja sich bei vielen Leuten wohl gar nicht, bei andern aber merklich zeigen r), die Ausdünstungen Vögeln ganzlich unschädlich sind s) und der aus den Blättern gedrükte Milchsaft roh und eingedikt Tauben, Meerschweinchen und Kaninchen weder, wenn

---

m) Kalm a. a. O. II. S. 229. 319.

n) Kalm a. a O. II. S. 229.

o) 1) Kalm a. a. O. II. S. 232. 2) F. Fontana a. e. a. O.

p) 1) Kalm a. a. O. II. S. 319. 320 2) Doffin Institutes of Experimental Chymistry. Lond. 1759. 3) F. Fontana a. e. a. O.

q) Kalm a. a. O. II. S. 232.

r) Viele Leute können in den Baum schneiden, die Rinde abschälen, das Holz zwischen den Händen reiben, daran riechen, den Saft auf die bloße Haut streichen, u. d. ohne die mindeste Ungelegenheit zu empfinden. In einer Familie kann ein Bruder, oder Schwester mit dem Baume umgehen, wie sie will, da die andern ihm nicht nahe kommen dürfen. Kalm selbst fühlte keine Beschwerlichkeit davon, so lange er nicht schwizte: sein Bedienter aber bekam alle Zufälle in ihrer ganzen Stärke, à. a. O. II. S. 229. 231. 319.

s) Monti a. a. O. B. IV. S. 84.

www.dlibra.wum.edu.pl

er ihnen auf die entblößte Haut gestrichen, noch wenn er ihnen allein oder mit Brodkrumen eingegeben wurde, nachtheilich wirkte s*), und ob man endlich gleich kein sicheres Zeugnis hat, daß sie jemals den Tod verursacht haben t), so lassen doch diese Zufälle, die blos auf den äuserlichen Gebrauch erfolgen, und die ausnehmende Schärfe des Saftes vermuthen, daß diese Pflanze sowohl als ihr Saft, innerlich genommen, unvermeidlich tödlich seyn werden, und also hieher gerechnet zu werden verdienen.

α) Firnisbaum, Vernisbaum, Giftesche. Rhus vernix Linn. Toxicodendron foliis alatis, fructu rhomboide. Dillen. Hort. Eltham. Pl. 292. Abb. 377.

In seinem Vaterlande wächst dieser Baum wohl auf zwanzig, auser demselben aber nicht über zehen Schuhe hoch, und hat eine grose Markröhre und eine weiche Rinde, die bei jungen hin und wieder feuerrothe Stellen hat, bei ältern aber bräunlicht und weis gedüpfelt ist. Die Blätter sind ganz glatt und hellgrün; sie bestehen aus mehreren, oft drei und zwanzig kleineren Blättchen; welche an einem gemeinschaftlichen, seiner ganzen Länge nach gleichbreiten Stiele einander gegenüber stehen, länglicht zugespizt sind und an ihrem Rande keine Zähne haben; gemeiniglich werden sie im Herbste roth. Auf dem einen Stamm haben die Blumen nur männliche, auf dem andern nur weibliche Befruchtungstheile.

Er

---

s*) J. Fontana a. e. a. O.

t) Kalm a. e. a. O. II. S. 232.

www.dlibra.wum.edu.pl

Er wirkt heftiger und gewisser als der folgende u). Seine Ausdünstungen erregen Kopfschmerzen und Aufschwellen der Lippen u1), schon wenn man den Saft nur aus einem Gefässe in das andere gießt, noch mehr, wenn man ihn umrührt oder kocht; die Leute, die ihn zu sammlen haben reiben sich daher, vornemlich unmittelbar zuvor, Gesicht und Hände mit Oel, in welchem Fleisch und Schweinesfett gekocht worden ist, und waschen sich, wenn sie am Morgen die Arbeit vorgenommen haben, Nachmittags den ganzen Leib mit heissen Wasser, worinn ein wenig von der äusern Schale der Wallnüsse, von der Rinde der Fichte, etwas Salpeter und Beerenmelde gekocht worden ist, in einem zinnernen Beken, bedeken sich bei der Arbeit das ganze Gesicht mit einem leinernen Sak, an welchem nur zwei Löcher für die Augen sind, und tragen Handschuhe, die bis an den Ellenbogen gehen; treffen sie diese Maasregeln nicht, so schwellen sie mit Röthe und Schmerzen über den ganzen Leib auf u2); Kinder, die sich unter diesem Baume aufhalten, bekommen über den ganzen Leib einen Ausschlag u3). Einen Arbeiter,

---

u) 1) Kalma a. O. II. S. 229—231. 319. 2) Jos. del Papa Philos. Transf. n. 274. und Trattati varii. Firenze 1734.

u1) E. Kämpfer Amoenitat. exotic. politico-physico-medic. Lengov. 1712. Fasc. V. S. 794.

u2) Du Halde Description generale, historique, chronologique, politique et physique de la Chine. à Paris 1735. fol. S. 337.

u3) J. G. Gleditsch Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin. 8. B. IV. 1779. S. 310. auch, K. Fr. Elz diss. de toxicodendro. Vitemberg. 1806.

der das Gartenmesser in den Mund nahm, womit er zuvor einige Zweige dieses Baums abgeschnitten hatte, schwoll das Gesicht sehr auf x).

β) Wurzelnder Sumach, Giftbaum, der an den Gelenken seiner Zweige Wurzeln schlägt. Rhus radicans Linn. Toxicodendron triphyllon glabrum. Du Hamel Traité des arbres et arbustes, qui se cultivent en France en pleine terre. B. II. 1755. Pl. 98.

Es wächst derselbe nicht viel über zween Schuhe hoch, und macht nur einen starken Busch. So lange er noch jung ist, wurzelt er sich mit den Zweigen leicht auf der Erde an, und an den ältern sieht man öfters zwischen den Blättern kleine röthlichte Fäden, die, so bald sie die Erde berührten, zu Wurzeln werden würden. Seine Blätter sind ganz glatt, dunkelgrün, und wenn sie hervorbrechen, haben sie eine rothe Einfassung; sie bestehen aus drei kleinern Blättchen, welche oval sind, an ihrem Rande keinen Einschnitt haben und jedes wieder auf einem eignen Stielchen sizt. Seine Blumen zeigen sich im Heumonat zwischen den Blattstielen, und tragen auch an dem einen Stamm nur männliche, an dem andern nur weibliche Befruchtungstheile. Seine Beeren sind troken, glatt, gestreift und hellgrün, und enthalten einen breitgedrükten Samen.

Er wirkt schwächer, als der Firnisbaum, und auf viele Leute äuserlich gar nicht y). Ein mit Wasser daraus be-

---

x) Du Roi Harbkesche wilde Baumzucht 2. Band 1772. S. 308.

y) Kalm a. a. O. II. S. 319.

www.dlibra.wum.edu.pl

reitetes Extrakt haben, sogar Dufresnoi z), Wattecamps, van Mons, und Blangy a), und (doch mit ungleichem Erfolge) Mangrat a1) in Lähmung der untern Glieder sehr wirksam gefunden; doch erregte auch dieser bei drei Gärtnern, welche einen alten Stock davon aus einem eisernen Topfe auszuziehen hatten, da sie schwitzten, Juken und Ausschlag über den ganzen Leib, und bei einem andern, der einen Zweig davon abgerissen, und mit der gleichen Hand zufällig an die Ruthe kam, eine schnelle und schmerzhafte Entzündung und Geschwulst dieses Gliedes a2). Auch seine Ausdünstungen erregten bei mehreren Leuten die oben erwähnten Zufälle a3).

γ) Eichenblättrichter Giftbaum. Rhus Toxicodendron Linn. Edera trifolia Canadensis. Bulliard a. e. a. O. Pl. 143.

Er kommt sehr stark mit dem wurzelnden Sumach überein, nur wächst er nicht so buschig, sondern vielmehr wie ein Baum und wird auf fünf Schuhe hoch. Seine

---

z) Bei Fourcroy Medecine eclairée par les sciences physiques, &c. B. IV. S. 90. S. auch Th. Horsfield experimental dissertation on the Rhus vernix, Rhus radicans, and Rhus glabrum commonly known in Pensilvania by the names of Poison-ash, Poison-oike and common Sumach. Philadelph. 1798. 8.

a) Van Mons Act. de la Soc. de medec. chirurg. et pharmacie, établie à Bruxelles. à Bruxelles. T. II. 1800.

a1) Bei Delametherie journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts B. LI. S. 370.

a2) Gleditsch a. e. a. O.

a3) Willemet bei Delametherie a. e. a. O. S. 369, 370.

www.dlibra.wum.edu.pl

Blätter sizen auf einem langen grünröthlichten Stiele und sind auf ihrer untern Fläche feinhaarig und stark geadert; die Blättchen, aus welchen sie bestehen, haben, wie die Eichenblätter, an ihrem Rande drei Einschnitte.

Sein Saft hat einem Hunde und einem Huhn, denen man ihn mit Fleisch oder mit der Wurzel eingegeben, oder in die Schenkelblutader eingesprüzt, nichts geschadet; nur bei dem Hunde erregte er leichte Zukungen, die sich aber bald wieder von selbst verloren b); doch sollen die Blätter blos äuserlich an den After gebracht, einen tödlichen Brand an diesem Theile erregt haben; auch verursachten die blosen Ausdünstungen sämmtlichen Bewohnern eines Hauses, das einen solchen Baum in seiner Nähe hatte, so lange die warme Witterung dauerte, alle Jahre über den Leib Ausschlag mit Röthe, Juken, Entzündung, Geschwulst, Bangigkeit, Fieber und Schlaflosigkeit c); und ein Tropfen seines Saftes, der auf die Haut fiel, Entzündung und Geschwulst an Arm und Kopf, welche sich auf den Gebrauch warmer Bäder verloren d).

5) Aezender Lorbeerbaum, Litsi Laurus caustica. Molina Saggio della storia naturale del Chili. Bologna 1782. 8. S. 176.

Er wächst in ganz Chili, erreicht eine mittlere Höhe, und bleibt immer grün; seine Blätter sind runzlicht, oval,

---

b Rossi a. a. O. S. 5 – 10.

c) 1) Gleditsch a. e. a. O. S. 277 – 303. 2) Nouveaux Memoir. des scienc. et belles lettres. à Berlin, pour l'ann. 1777. nr. 6.

d) Pornai Giornale per servaire alla storia ragionata della Medicina. Venez. 4. B. I. 1783. S. 83.

www.dlibra.wum.edu.pl

dunkelgrün, und ungefähr einen Zoll lang, und sizen alle in ungleicher Höhe an den Zweigen; seine Blumen sind sehr klein, und haben keinen Kelch, aber eine in vier Abschnitte gespaltene Krone, drei Honigdrüsen mit zwo Borsten, welche den Fruchtknoten umgeben, und neun Staubfaden, von welchen die innern mit Drüschen besezt sind; sie hinterlassen eine trokene Beere.

Der Baum ist voll eines grünlichten sehr scharfen Saftes, und im Sommer selbst in seinen Ausdunstungen so gefährlich, daß, wenn auch Manche wenig davon leiden, andere doch, wenn sie sich nur in seinem Schatten aufhalten, sogar, wenn sie nur unter dem Baume hingehen, an den unbedekten Theilen des Leibes Geschwulst und scharfe Blasen bekommen.

Sein Holz, das anfangs weis ist, aber wenn es ausgetroknet ist, schön roth wird, und gelbe und braune Fleken bekommt, wird, weil es nach dem Troknen sehr vest wird, und unter dem Wasser nicht fault, sondern hart wie Eisen wird, häufig zum Bauen von Häusern und Schiffen gebraucht e).

6) Blindmachender Baum. Excoecaria Agallocha Linn. Arbor excoecans. Rumpf a. a. O. B. 2. Pl. 79. 80.

Dieser Baum ist in Amboina zu Hause, wo er an felsichten Ufern wächst, und auf einer Wurzel nur männliche, auf der andern aber nur weibliche Blumen trägt. Beide haben weder Kelch noch Krone, sondern zeigen sich in ei-

e) Molina a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

nem ganz nakenden Käzchen; die männlichen haben drei Staubfäden, die weiblichen aber auf einem Eierstok mit drei Grifseln; und diese hinterlassen ein trokenes Samengehäus mit drei Körnern.

Er ist voll von einem scharfen, milchweissen Safte, den er weit um sich herum sprizt, wenn man darein haut. Dieser Saft erregt in allen Theilen des Leibes, die er berührt, heftige Schmerzen, und wenn er in die Augen sprizt, eine äuserst schmerzhafte Entzündung nebst Geschwulst in denselbigen, die, wenn man nicht bald hilft, zulezt in Blindheit ausartet; eine Wirkung, welche einst die holländischen Matrosen, da sie Brennholz zu hauen an das Ufer geschikt wurden, zu ihrem gröstен Schaden erfuhren f).

Von eben diesem Baume hat man sonst das sogenannte Aloeholz, Adlerholz oder Paradiesholz abgeleitet, das, weil es von den ältern Aerzten äuserlich als ein nervenstärkendes Mittel gebraucht wurde, noch in unsern Apotheken aufbewahrt wird, und, wenn es gut und ächt ist, einen erquikenden Geruch, einen gewürzhaften und etwas scharfen Geschmak, eine bräunlichte und schwärzlichte Farbe und ein dichtes Gewebe, nebst einem ziemlichen Gewicht hat.

7) Gummiguttäbaum. Stalagmitis cambogioides. J. A. Murrey Commentat. Soc. scient. Goetting. Goetting. 4. B. IX. 1789. S. 173—179.

Dieser Baum wächst in Siam und Zeylon wild, und erreicht eine mittlere Höhe. Sein Stamm ist aufrecht, und

f) Rumpf a. a. O. S. 237.

www.dlibra.wum.edu.pl

ungefähr so dik als ein Mann um den Leib, hat eine weislicht graue und etwas gerissene Rinde, und theilt sich in Aeste, und diese wieder in Zweige, welche einander gerade gegen über entspringen, und aus einander gesperrt, mit einer braunen Rinde bekleidet, an ihrer Spize vierkantig und der Länge nach runzlicht, sonst aber glatt, grün und etwas dik sind. Seine Blätter sizen auf eigenen diken, steifen, sehr kurzen Stielen nach zwo Seiten der Zweige, immer zwei einander gegen über, stehen von den Zweigen ab, haben einen ganz glatten Rand und sind eiförmig, doch dabei spizig, auch wohl umgekehrt eiförmig, seicht geadert, lederartig, steif dunkelgrün, und auf beiden Flächen glatt. Seine Blumen sizen an Kämmen in den Winkeln der Blätter oder an der Wurzel, welche sie nach dem Abfallen zurük lassen, auf sehr einfachen aufrechten, gegliederten, viereckigen, dünnen, mit einer braungrünen Rinde bekleideten bald abfallenden Stielen und keulenförmigen gedrängt oder zu zwei stehenden, aufrechten, sehr einfachen und weislichten Stielchen ohne Deckblätter; sie haben einen weissen Kelch, welcher bald abfällt, und aus vier, selten aus sechs runden steifen Blättchen besteht, eine gelbweisse zu unterst blaß rosenrothe, weit offen stehende Krone, welche noch einmal so groß ist, als der Kelch, und auch aus vier, selten aus sechs umgekehrt eiförmigen am Rande mit steifen Haaren eingefaßten Blättchen besteht, und gegen dreisig in fünf Rotten vertheilte, keulenförmige, beinahe vierkantige abgestuzte, fleischige aufrechte, kurze weislichte Staubfäden, welche so lang, als die Krone sind, auf einem fleischigen, vierkantigen und weislichten Hälter sizen, und fruchtbare Staubbeutel tragen; einige Blumen, die auch wohl hier und da ganze Traubenkämme ausmachen, haben nur eine schwache Spur von Griffel und Narbe, andere aber einen

www.dlibra.wum.edu.pl

vollkommenen Staubweg mit glatten kugelrunden Fruchtknoten, aufrechten, kurzen und diken Griffel, und einer nebst dem Griffel an der Beere bleibenden Narbe, welche in drei bis vier umgekehrt herzförmige, etwas lederartige weit offen stehende Lappen getheilt ist; jede dieser lezten hinterläßt eine glatte, kugelrunde und weislichte, nur auf einer Seite rosenroth schattirte Beere, welche zuweilen noch einmal so groß als eine grose Kirsche ist, drei länglichte weißlichte Samen mit drei stumpfen Kanten in sich hat, und, wenn man, ehe sie zeitig ist, darein schneidet, einen Saft von sich gibt, der anfangs weis ist, wie Milchrahm, aber an der Luft bald eine citronengelbe Farbe annimmt.

Aus diesen Beeren fließt das sogenannte Gummigut, das in Gestalt eines gelben oder gelbrothen, trokenen, harzigen Schleims zu uns kommt, welches zwar anfangs nur harzig schmekt, nachher aber, wenn man es kauet, die heftigste Schärfe verräth. Wenn es verschlungen wird, verursacht es das grausamste Erbrechen, die schmerzhaftesten Bauchflüsse und Entzündungen der Gedärme, fürchterliche Ohnmachten und zuweilen einen langsamen Tod, wenn auch der Arzt durch Gegengifte seine Kräfte zu schwächen sucht g).

Geschichte.

Ein Barbierer gab einem Manne ein ganzes Quintchen rohen Gummigut ein; er bekam davon das grausamste Erbrechen, die übermäsigsten Stuhlgänge, schrekliche Ohnmachten, nebst andern Zufällen: man ris ihn zwar dem Tode aus dem

---

g) Paullini Ephem. Acad. Caesar. nat. Curios. Dec. I. A. VIII. S. 139.

www.dlibra.wum.edu.pl

Rachen; er führte aber doch ein ſieches Leben und ſtarb bald darauf.

Einem Kaninchen, das zuvor zehen Grane Operment ohne Erfolg bekommen hatte, gab man achtzehen Grane Gummigut in Waſſer aufgelößt; nach einigen Stunden fiel es in einen Schlummer, von welchem es nicht wieder erwachte. Den andern Morgen ſchien es tod zu ſein; als man es öfnete war der Magen voll Speiſe, und die zotige Haut gieng von ſelbſt von der andern ab. Hin und wieder war der Magen, noch mehr aber die dünnen Gedärme entzündet, die Galle war braunröthlicht, dünn, und in groſer Menge vorhanden; in dem Herzen war nur weniges flüſſiges Blut h). Auch einem Hunde, welchem etwas davon in die Adern geſprüzt wurde, koſtete der Verſuch das Leben i).

Inzwiſchen kann eben dieſer Saft in der Hand eines klugen Arztes in hartnäkigen nnd langwierigen Krankheiten, die einen ſtarken Reiz in den Gedärmen erfordern, und wo die Lebenskräfte noch nicht zu ſehr geſchwächt ſind, als in Bauchwaſſerſucht, Gicht, Schwermuth, Engbrüſtigkeit u. d. vornemlich gegen Würmer, und insbeſondere gegen Bandwürmer, trefliche Dienſte leiſten, wenn man die Behutſamkeit gebraucht, ihn nur in ſchwachen Gewichten von drei, bis höchſtens zehen Granen zu geben, und ihm eines ſeiner Gegengifte als eine Säure oder die Auflöſung eines feuerveſten Laugenſalzes in Waſſer beiſezt, oder, welches am beſten zu ſein ſcheint, nur den ſchleimigten Theil, welcher weit gelinder wirkt, mit Waſſer auszieht und dieſen allein gebraucht. Dem Mahler thut er zur gelben Farbe die beſten Dienſte.

---

h) Hillefeld a. a. O. S. 27. 28.

i) Birch Hiſtory of the royal Society B. IV. S. 177.

www.dlibra.wum.edu.pl

8) Elephantenlausbaum, Cajou. Anacardium occidentale Linn. Jacquin Stirp. americ. pict. Pl. 121.

Dieser Baum wächst in beiden Indien wild, und treibt oben viele Aeste; seine Blätter sind glatt, auf beiden Flächen grün und rund wie ein Ei; sie haben an ihrem Rande keine Einschnitte und sizen auf eigenen Stielen. Seine Blumen sizen an dem Gipfel der Aeste; sie haben zehen Staubfaden, von welchen aber nur neun mit Staubbeuteln versehen sind, nebst einem runden Eierstok mit gebogenem Griffel, und zwo langen borstenartigen Narben, welche auseinander stehen; ihr Kelch ist grün und in fünf Stücke getheilt; ihre Krone ist roth, und besteht aus fünf umgebogenen Blättchen. Seine Frucht ist ganz besonders gestaltet; unten nemlich sizt auf einem eigenen Stiele ein fleischiger, gleichsam gewundener und von aussen glatter Körper, der rund wie ein Ei, und so gros als ein Gänsei ist, und glänzend purpurrothes mit Gelb vermischtes, und inwendig weisses Fleisch enthält; auf der Spize desselben sizt eine Nus vollkommen von der Gestalt einer Niere; die äusere Schale derselbigen ist hart, und besteht aus zwo Häuten, zwischen welchen ein schwammiges Wesen und ein scharfer beissender Saft enthalten ist; der Kern, der darinnen liegt, hat gleichfalls die Gestalt einer Niere. Man speist ihn in Jamaica häufig, nachdem man ihn zuvor in heisser Asche gebraten und dadurch ein brennend scharfes Oel heraus gezogen hat, das man wider die Hühneraugen und Warzen auf der Haut gebrauchen kann. Es ist nicht zu zweifeln, daß so wohl dieses Oel, als der scharfe Saft zwischen der Schale der Nus, innerlich genommen, die Wirkungen eines Giftes äusern werden; wirklich zerfrißt er, ob ihn gleich

www.dlibra.wum.edu.pl

das andere Geschlecht in Surinam als Schminke gebraucht, Mund und Lippen k); wäscht man die Hände nicht, womit man die Frucht handthierte, so erregen sie in allen Theilen des Leibes, welche man damit berührt, Juken und äuserst schmerzhafte brennende Geschwulst l).

9) Brennende Palme. Caryota urens Linn. Seguaster major, Rumpf a. a. O. I. Pl. 14.

Diese Palme wächst in Ostindien wild. Ihre Blätter sind aus mehrern kleinern zusammengesezt, welche wieder aus kleinern bestehen, die wie ein Keil gestaltet und gleichsam schief abgeschnitten sind; sie stehen, wie die ersten, an einem gemeinschaftlichen Stiele einander gegenüber. Ihre männlichen und weiblichen Blumen sind zwar von einander abgesondert, aber beide in einem gemeinschaftlichen Kelch beisammen; bei beiden ist die Krone in drei Stüke getheilt. Die männlichen Blumen enthalten sehr viele Staubfäden, die weiblichen aber nur einen Staubweg. Diese hinterlassen eine Beere mit zween Samen, welche eine brennende und beissende Schärfe haben, und innerlich genommen tödliche Wirkungen äusern würden m). Uebrigens speist man die Spizen ihrer Blätter, als Zugemüs gekocht, ohne Schaden, und macht aus dem Mark des Stengels eine Art von Sagumehl.

---

k) Rolander bei Rottböll a. a. O. S. 290.

l) Schriften der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde. B. V. S. 478—480.

m) Rheede, Hortus Malabaricus I. S. 16.

www.dlibra.wum.edu.pl

10) Feigenbaum, Ficus.

Die Arten dieser Gattung sind ausserhalb Europa in den wärmern Gegenden der übrigen Welttheile zu Hause, und gröstentheils Bäume, die, wenn sie auch Kälte nicht ertragen können, doch unter einem milden Himmelsstriche mehrere Jahre aushalten; ihre Aeste und Zweige entspringen abwechselnd bald an dieser bald an jener Seite. Auch ihre Blätter sizen alle in ungleicher Höhe und auf eigenen Stielen an den Zweigen; ihre Blumen sind in einen fleischigen kugelrunden oder birnförmigen vestansizenden oder an einem eigenen Stiele hängenden Behälter eingeschlossen, dessen innere Fläche sie durchaus bedeken; diese Blumen haben keine Krone, aber einen aufrechten in 3 - 5 gleiche und lanzenförmige Abschnitte getheilten Kelch; einige haben drei borstenförmige Staubfäden, welche so lang als der Kelch sind, andere neben diesen noch die Spur eines Staubwegs, welche einwärts gedreht ist und bald abfällt, und noch andere zwar keine Staubfäden, aber einen ovalen Fruchtknoten, so gros als der Kelch, mit einem pfriemenförmigen einwärts gebogenen, zur Seite in den Fruchtknoten eingesenkten Griffel, und zwo ungleichen, scharf zugespizten und rükwärts gebogenen Narben; diese hinterlassen einen nakenden rundlichten und breitgedrükten Samen; einige Behälter enthalten nur Blumen von der ersten und zweiten, andere nur solche von der dritten, und wieder andere Blumen von allen drei Arten.

Alle Arten dieser Gattung haben einen scharfen ekelhaften Milchsaft, welcher die Milch zum Gerinnen bringt, in sich [m*]), vornemlich aber steht der

---

m*) K. P. Thunberg diff de genere ficus Upsal. 1786. t. §. 8. Dissert. acad. B. II. S. 275.

www.dlibra.wum.edu.pl

α) Giftfeigenbaum, Ficus toxicaria Linn. in den Ruf eines Giftes n).

Er wächst in Sumatra wild, und zeichnet sich durch seine filzigen Fruchtbehälter, die so gros als eine Pflaume sind, und auf einem diken auch filzigen Stiele stehen, und durch seine herzförmigen Blatter aus, welche auf der untern Fläche mit weissem Filze bekleidet sind, und am Rande mehrere winkelichte Buchten haben, aus.

11) Indischer Elephantenlausbaum, Semecarpus Anacardium Linn. Gärtner a. a. O. Cent. III. Pl. 40. Abb. 1.

Dieser Baum wächst in Indien in trokenen Wüsten und Wäldern wild. Seine Blumen haben fünf Staubfäden, einen Staubweg mit drei Grifseln, und eine Krone, welche aus fünf Blättchen besteht, und den Fruchtknoten umfaßt; jede Blume hinterläßt eine herzförmige Steinfrucht, welche auf einem grosen fleischigen Hälter sizt, und nur einen Samen enthält. Der schwarze Saft, der in dem zellichten Marke der weichen Schale stekt, hat eine äzende Schärfe o).

12) Behennusbaum, Guilandina Moringa Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 386.

Dieser Baum wächst in mehreren Theilen Asiens, in Egypten und Amerika. Er ist ohne Stacheln, die Blätter meist zweifach gefiedert und die untersten Blättchen, woraus diese bestehen, dreifach. Seine grosen Blumen haben einen

---

n) Garein bei Puihn a. e. a. O. S. 165.

o) Puihn a. e. a. O. S. 71.

www.dlibra.wum.edu.pl

in fünf Abſchnitte getheilten Kelch, und eine aus fünf Blättchen beſtehende Krone, von welchen das obere gröſer iſt, als die übrigen, einige zehen Staubfäden, von welchen aber nur fünf fruchtbar ſind; einige nur einen Staubweg, andere beide zugleich; dieſe zwo lezten hinterlaſſen eine lange an beiden Enden zugeſpizte dreikantige, aus drei Schalenſtüken beſtehende Hülſe; in dieſer liegen viele dreiekige Samen mit einer harten weislichten Schale, und einem ölichten bittern Kerne p). Dieſer Kern bringt, wenn er gleich unter der Preſſe ein mildes Oel gibt, in Uebermas genoſſen, Erbrechen und Bauchflüſſe, bis zur Ermattung und kalten Schweiſſen hervor q).

13) Scharlachrothe Bauhinie, Bauhinia coccinea. König Naturforſcher St. XXI. S. 111.

Sie wächſt in Pegu in ſehr hohen Wäldern. Ihr Stamm iſt kaum eine Hand dik, hat eine dunkelgrüne fein geriſſene Rinde, ſchlingt ſich bis an die Gipfel der höchſten Bäume, und theilt ſich, ſo wie er dieſe erreicht hat, in viele Zweige, die ſich in die oberſten Aeſte und die Krone der andern verwiteln; ihre Blumen haben drei Staubfäden, einen Staubweg, einen vor dem Eröfnen der Blüthe abfallenden in fünf Abſchnitte geſpaltenen Kelch, in welchen die Krone eingeſenkt iſt, und eine feuerrothe weit offen ſtehende Krone, welche aus länglichten, unten ſehr ſchmal zulaufenden Blättchen, von denen das obere weiter abſteht, beſteht; jede Blume hinterläßt eine ſchmale über einen Finger lange Hülſe.

---

p) Brückmann Diſſ. praeſ. L. Heiſter de nuce Been. Helmſtad. 1780.

q) Amatus Luſitanus Curation. medic. 63. Cent. 6.

www.dlibra.wum.edu.pl

Die Hülse schmekt etwas bitter, und verursacht eine tödliche Ruhr, wird aber häufig und ohne Schaden genossen, nachdem sie einigemal mit Wasser ausgekocht ist r).

14) Pfauenspiegel, Poinciana pulcherrima Linn. Jacquin stirp. Amer. pict. Pl. 120.

Dieser Baum wächst in beiden Indien wild, und ist mit Stacheln besezt, welche immer zu zween stehen; seine Blätter sind zwiefach zusammengesezt, und haben unten an ihrem gemeinschaftlichen Stiele, und oben am äuersten Paare der Blättchen wieder ein Drüschen; seine Blumen haben zehen lange insgesammt fruchtbare Staubfäden, einen Staubweg, einen aus fünf Blättchen bestehenden Kelch, und eine aus eben so vielen Blättchen, von welchen das oberste gröser, als die übrige ist, bestehende Krone; sie hinterlassen eine breitgedrükte Hülse. Die Samen sollen in Surinam von den Sklaven zum Abtreiben der Kinder gebraucht werden s).

15) Immergrüner Azedarach. Melia sempervirens Linn. Commelin Hort. Amstelaed. I. Pl. 76.

Er ist in Zeylon zu Hause, und behält seine Blätter beständig; diese sind zweifach gefiedert, und etwas runzelicht, und bestehen zulezt meist aus sieben kleinern Blättchen; seine Blumen haben einen in fünf Abschnitte gespaltenen Kelch, eine weisse, blaue oder röthlichte aus fünf Blättchen bestehende Krone, einen Staubweg, und zehen Staubfäden in eine Röhre zusammen gewachsen, die an den Zähnen ihrer

r) König a. e. a. O.

s) S. Merianin Surin. S. 45.

www.dlibra.wum.edu.pl

Mündung die Staubbeutel trägt; sie hinterlassen eine Steinfrucht, deren Stein in fünf Fächer getheilt ist, und in jedem derselbigen einen Samen enthält. Man hält ihn für giftig; seine Früchte, ob sie gleich den ganzen Winter über am Baume sizen, werden von den Vögeln nicht genossen; mischt man ihr Fleisch mit Schmeer, und wirft es so Hunden vor, so kommen sie davon um t).

16) Schlingbaum, Viburnum.

Seine Blumen haben fünf Staubfäden, einen Fruchtknoten mit drei Griffeln, einen in fünf Stüke getheilten, auf dem Fruchtknoten-aufsizenden Kelch, und eine weisse, in fünf Abschnitte gespaltene Krone, und hinterlassen eine geschlossene Steinfrucht, die nicht in Fächer getheilt ist, und nur einen Samen enthält.

α) Wilde Lorbeeren, Viburnum Tinus Linn. Skuhr botanisches Handb. Pl. 81.

Diese Art ist in Portugall, Spanien und Italien zu Hause, und häufig in unsern Gewächshäusern anzutreffen. Ihre Blätter sind eiförmig und ohne allen Einschnitt am Rande, und auf ihrer untern Fläche an den Vertheilungen der Adern in Aeste mit feinen kurzen Haaren und Drüschen besezt. Ihre Früchte, haben einen brennend scharfen Geschmak, und erregen, wenn sie genossen werden, Entzündung des Mundes und Schlundes, Bauchgrimmen und Durchfälle u).

β) Un-

t) Rheede a. a. O. 4. S. 109.

u) Puihn a. c. a. O. S. 74.

www.dlibra.wum.edu.pl

β) Unächte Kassine, Viburnum calsinoides Linn. Ph. Miller Garden. Diction. Pl. 83. Abb. 1.

Sie ist im mitternächtlichen Theile von Amerika zu Hause. Ihre Blätter sind glatt, und am Rande umgerollt und fein gekerbt, und sizen auf scharfkantigen Stielen, die keine Drüschen haben; die untersten sind umgekehrt eiförmig, weiter oben sind sie eiförmig, und noch weiter oben lanzenförmig; ihre Blumen stehen in flachen Sträusen beisammen. Ihre Blätter erregen, wenn sie in einer nur etwas zu grosen Menge genommen werden, Erbrechen, und heftige, sogar tödliche Bauchflüsse x).

17) Breitblätterichter Spillbaum, Euonymus latifolius Linn. Jacquin Flor. austr. 3. Pl. 289.

Er ist in ganz Europa gemein. Er hat breite eiförmige, vest aufsizende, am Rande sägenartig gezakte Blätter; seine Blumen stehen in dreitheiligen Rispen beisammen, und sizen auf eigenen Stielen; die gemeiniglich wieder in drei kleinere getheilt und länger als das Blatt sind, in dessen Winkel sie stehen; sie haben fünf Staubfäden, einen Staubweg, einen meist in fünf Abschnitte gespaltenen Kelch, und eine aus fünf Blättchen bestehende Krone, und hinterlassen ein trokenes fünfekiges, gefärbtes Samengehäus, das aus fünf Schalenstüken besteht, inwendig in fünf Fächer getheilt ist, und in jedem derselbigen einen in ein besonderes Häutchen eingehüllten Samen enthält. Seine Früchte erregen heftiges Erbrechen und Bauchfluß y).

---

x) Ebendersf. a. e. a. O.

y) Ebendersf. a. e. a. O. S. 54.

www.dlibra.wum.edu.pl

18) Bocconie, Bocconia frutescens Linn. Trew plant. select. Dec. I. Pl. 4.

Sie wächst in Neuspanien und Jamaika wild, theilt sich in viele Aeste, und hat grose filzige Blätter mit vielen Buchten am Rande, und an der Spize der Aeste Blumentrauben; ihre Blumen haben keine Krone, aber einen aus zwei Blättchen bestehenden den Fruchtknoten umfassenden Kelch, ungefähr zwölf Staubfäden und einen Staubweg mit entzweigespaltenem Griffel; sie lassen ein eiförmiges, aus zwei Schalenstüken bestehendes, einer Schote ähnliches trokenes Samengehäus zurük, das inwendig nicht getheilt ist, und nur einen kugelrunden Samen in sich hat. Sie ist voll von einem gelben sehr scharfen Safte, mit welchem man Warzen hinweg äzen kann z).

19) Kugelbeeren, Doliocarpus.

Die Arten dieser Gattung sind in Surinam zu Hause, und haben gezahnte Blätter; ihre Blumen haben einen gewürzhaften Geruch, einen aus drei Blättchen bestehenden Kelch, eine aus drei in Falten gelegten Blättchen bestehende Krone, sehr viele auf dem Fruchthälter sizende Staubfäden und einen Staubweg mit mehr oder weniger entzweigespaltener Narbe; jede derselbigen hinterläßt eine kugelrunde Beere, auf welcher noch der Griffel sizt, und welche, ohne inwendig in Fächer getheilt zu sein, zween Samen in sich hält; sie erregt ein Juken und Brennen im Halse, Erbrechen, Fieber, Aufschwellen, Raserei, und bei den Schwarzen oft einen vorsezlichen Tod a).

---

z) Ebendersf. a. e. a. O. S. 95.

a) Rolander 1) bei Rottböll Act. litter. universf. Hafnienf. B. I. S. 294. 2) Kongl. Svenska Vetenfk. Acad. Handling. för ar 1756. S. 256. ꝛc.

www.dlibra.wum.edu.pl

α) Senkrechte Kugelbeeren, Doliocarpus ſtricta, Rolander Kongl. Svensk Vetenſk. Academ. Handling för ar 1756. Pl. 9. Abb. 2.

Ihre Stengel ſtehen ſenkrecht; ihre Blätter ſind eirund-lanzenförmig; ihre Blumen ſtehen an der Spize der Zweige.

β) Schlingende Kugelbeere, Doliocarpus volubilis. Rolander a. e. a. O. Abb. 1.

Ihr Stengel ſchlingt ſich an andern Körpern herauf; ihre Blätter ſind eiförmig; ihre Blumen ſizen an eigenen Stielen, die nur eine Blume tragen, zur Seite der Zweige; ihre Beeren ſind roth.

20) Kalmie, Kalmia.

Die Arten dieſer Pflanze wachſen im mitternächtlichen Theile von Amerika wild, und tragen ihre Blumen in flachen Sträuſen, die Blumen haben zehen Staubfäden und einen Staubweg, einen in fünf Abſchnitte getheilten Kelch, und eine rothe tellerförmige Krone, welche an ihrem Saume unten in fünf Falten gelegt iſt, und hinterlaſſen ein trokenes Samengehäus, welches inwendig in fünf Fächer getheilt iſt, und in jedem derſelbigen viele Samen enthält.

Ihre Blätter ſind zwar Hirſchen und anderem Wilde ein angenehmes und heilſames Futter, aber Pferden, Woll- und Hornvieh, wo nicht tödlich, doch äuſerſt ſchädlich, ſogar ſoll das Fleiſch von Vieh, welches ſie gefreſſen hat, bei Hunden, tödliche Zufälle veranlaſſen b). Sollte ſie daher nicht unter den Giften, vielleicht aber unter einer andern Abtheilung derſelbigen, ihre Stelle verdienen?

b) Kalm a. e. a. O. II. S. 43. und III. S. 149.

www.dlibra.wum.edu.pl

α) Breitblätterichte Kalmie, Kalmia latifolia Linn. Trew a. e. a. O. Pl. 38. Abb. 1.

Ihre Blätter sind eiförmig oder elliptisch, und sizen theils ohne bestimmte Ordnung, theils zu drei an den Zweigen; ihre Blumensträuse aber an der Spize.

β) Schmalblätterichte Kalmie, Kalmia anguſtifolia Linn. Trew a. e. a O. Abb. 2.

Ihre Blätter sind lanzenförmig, glatt und ohne starke Ribben, haben einen glatten Rand, und bleiben sizen; ihre Blumensträuse sizen zur Seite in den Winkeln der Blätter.

Hieher scheinen auch folgende Gewächse zu gehören:

1) Ogg, dessen Ives c) gedenkt.

Aus einer Wurzel entspringen gemeiniglich mehrere Stämme, welche buschig und sechs Schuhe hoch, oder auch noch höher wachsen. Ihre Blätter sind weich und saftig, oben blaß und glänzend grün, unten aber weis und wollig. Ihre Aeste sind weich und schwammig. Ihre Blumen stehen in Dolden an den Gipfeln der Stämme und Aeste; sie haben keinen Kelch; ihre Krone ist schön purpurroth und saftig; sie hat ungefähr die Gestalt einer Gloke, und besteht aus einer zusammenhängenden Haut, welche in sechs wagerechte Abschnitte getheilt ist; jede hat sechs Staubfäden, die unten durch eine Haut mit einander verbunden sind, oben aber einen runden, flachen und sternförmigen Staubbeutel haben. Jede hinterläßt eine länglichte, fleischige Frucht, welche un-

---

c) Reise nach Indien und Persien in einer freien Uebersezung von Dohm, Leipzig 1775. 2 Th. S. 425.

www.dlibra.wum.edu.pl

gefähr drei Zolle lang, ist, und in einer feinen Wolle viele und schwarze Samen enthält. Alle Theile der Pflanze geben, wenn man sie verwundet, einen scharfen milchweissen Saft von sich. Die Einwohner von Ostindien gebrauchen ihn entweder allein, oder mit Oel zu einer Salbe gemacht, äuserlich gegen die Krätze.

2) Milchheke.

Eine Staude, die auf der Küste Koromandel zu Zäunen gebraucht wird, und nach der Beschreibung Ives d) hieher zu gehören scheint. Sie hat eine holzige Wurzel, und breitet sich nach allen Seiten aus. Ihr Stamm ist aber nicht sehr holzig, und hat ein weisses, lokeres Holz mit grauer gerissener Rinde. Sie wächst sehr buschig; ihre kleinen Aeste sind aufrecht, und bestehen aus runden, grünen, brüchigen Gelenken, welche ungefähr die Dike einer Tabakspfeife und eine Länge von drei bis sechs Zollen haben, und voll von einem äuserst scharfen Safte sind, den sie bei der mindesten Verlezung von sich geben. Dieser Saft schmekt zwar süslicht, aber wo er nur die Haut berührt, entstehen sogleich Blasen.

Büffel und Ziegen fressen ihre Zweige ohne Schaden. Die Kohlen von ihrem Holze sind sehr gut zu Schiespulver, und die Pflanze überhaupt ist in Ostindien ein sehr geschäztes Mittel gegen die Lustseuche.

3) Muccomucco nach Bancroft e).

Dieser Baum wächst in Guiana allenthalben im Wasser. Sein Stamm wird acht bis zehen Schuhe hoch, und hat

---

d) a. a. O. 2. Th. S. 380.

e) a. a. O. S. 104. 105.

www.dlibra.wum.edu.pl

öfters deutlich abgesezte Gelenke; nach oben zu wird er sehr spizig, so daß er nur zehen Linien im Durchmesser hat, und zu oberst bildet er eine Krone von achtzehn bis zwanzig Schuhen im Durchmesser. Er hat eine glatte, hellbraune Rinde, und ein weiches schwammiges Mark. An seinem Gipfel trägt er breite ovale Blätter, jedes auf einem grünen Stiele, deren zween oder drei beisammen stehen; diese Blätter ziehen auf der Haut Blasen. Die Sklaven gebrauchen sie, um sich krank zu machen, indem sie dieselben über Nacht auf den Fuß binden, der den Tag darauf zu einer ungeheuren Gröse aufschwillt. Die Indianer bedienen sich derselbigen in Augenentzündungen; sie legen sie auf die Augenlieder, so sammlet sich eine Menge Wasser, und die Entzündung zertheilt sich.

4) Der Baum Bollen. Molina a. e. a. O. S. 177.

Dieser sehr schöne Baum wächst in Chili und hat einen Saft von gelber sich in die grüne ziehender Farbe; seine Sprossen erregen das fürchterlichste Erbrechen; dennoch gebrauchen sie die Aerzte zu einem halben Skrupel in Pulver und mit Wasser, um Erbrechen und Stuhlgang zu bewirken.

5) Frutex excaccans bei Rumpf a. a. O. IV. S 129.

Er wächst auf den Inseln des indischen Meers in Hainen, an Wäldern, in Thälern und auf Feldern, und gibt, wenn man da die Zweige schneidet, oder mehrere Blattstiele abreißt, noch schärferen Milchsaft, als der blindmachende Baum, der nach dem Troknen bläulicht wird.

www.dlibra.wum.edu.pl

6) Monaca bei Marcgrav und Piſo.

Sie iſt eine Staude, und in Braſilien zu Hauſe, und trägt ein dreiekiges Samengehäus, das mit dem zurükbleibenden Kelch bekränzt iſt, und einige Aehnlichkeit mit Wachholderbeeren hat; ihre Blumen riechen nach Veilchen. Ihre Wurzel ſchmekt bitter und ſcharf, und erregt heftiges Erbrechen und Bauchfluß, wie Wolfsmilch, welcher ſich dieſe Pflanze überhaupt zu nähern ſcheint f).

7) Tangaräa bei Piſo.

Auch dieſe Gattung von Stauden iſt in Braſilien zu Hauſe, ſie hat ſtark geaderte Blätter, und trägt ihre Blumen in Dolden; beide hält man für ſehr ſchnell wirkende Gifte g).

α) Rothe Tangaräa.

Ihre Blumen haben eine rothe Krone; ihre Wurzel halten die Einwohner für das ſicherſte Gegengift der Blätter und Blumen.

β) Gelbe Tangaräa.

Ihre Blumen haben eine goldgelbe Krone; ſie ſo wohl als Blätter und Samen wirken ſo heftig, daß, wenn man ſie auch nur obenhin koſtet, Aufſchwellen des Leibs, Verluſt des Bewuſtſeins, Schwindel und Unmachten, und, wenn man nicht aufs Behendeſte dagegen arbeitet, der Tod erfolgen ſoll.

---

f) Rai hiſt. plant. univ. II. 1612.

g) Ebenderſ. a. e. a. O. 1784.

www.dlibra.wum.edu.pl

8) Ein Gewächs, dem Lorbeerbaum ähnlich h).

Auch nur gekostet erregt es eine tödliche Fallsucht; sein Saft, wenn er ins Auge sprüzt, Blindheit.

Vielleicht gehört auch
das grose Schölkraut, Chelidonium majus Linn. Flor. Dan. Pl. 542. hieher.

Dieses in ganz Europa gemeine, ausdaurende Kraut hat einen eigenen schweren Geruch. Seine Wurzel theilt sich in Aeste, und hat, so lange sie frisch ist, eine braunröthlichte Farbe, welche aber nach dem Troknen in die schwarze übergeht. Stamm und Blätter sind sehr saftig; die Blumen sizen Doldenweise, und haben einen aus zwei Blättchen bestehenden Kelch, der wie die gelbe aus vier Blättchen bestehende Krone bald abfällt, sehr viele auf dem Fruchtboden aufsizende Staubfäden, und einen Staubweg; sie hinterlassen eine schmale gleichbreite Schote, in welcher die Scheidewand, woran die Samen liegen, mehrere Löcher oder Fensterchen hat. Es ist voll eines gelben Saftes, der in der Wurzel noch stärker gefärbt ist, als in andern Theilen.

Dieser Saft ist wenigstens so scharf, daß er zum Hinwegäzen der Warzen von mehreren Wundärzten empfohlen worden ist, doch haben sich die Aerzte nicht blos auf den

---

h) Strabo Γεωγραφ. βιβλ. ιέ. 722. „Ἠν δε ὁμοιον τηδαφνη φυτον, οὐ το γευσαμενον, των ὑποζυγιον ἀπεθνησκε μετα ἐπιλιψιας και ἀφρον· ἀκανθι δε τους καρπους επι της γης ἐρωμενη καθαπερ οἱ σικυοι πληρης ἠν ὀπουτουτου δε ρανιδες ες ὀφθαλμους ἐμπεσουσε παν ἀπελυφλουν ζωον.

www.dlibra.wum.edu.pl

äuſerlichen Gebrauch eingeſchränkt, ſondern ſo wohl den rohen als den eingedikten Saft, das mit Waſſer aus der Pflanze bereitete Extrakt, das mit Kraut und Wurzel abgekochte Waſſer, das trokene Pulver der lezten als wurmtreibendes, abführendes, harn- und ſchweistreibendes und auflöſendes Mittel in Krankheiten der Augen und der Haut, in Gelb- und Waſſerſucht, in Wechſelfiebern, in der nervichten Auszehrung innerlich gebraucht i).

Sollten wohl einige Gräſer k) und grasähnliche Gewächſe, die mehr dem Viehe, wenn es ſie frißt, als dem Menſchen, mehr auf eine mechaniſche Weiſe, wie z. B. Phalaris arundinacea Linn. (Flor. danic. Pl. 259.) oder durch darinn niſtelnde Inſekten, wie z. B. mehrere in ſtehendem Waſſer oder ſonſt auf feuchten Grunde wachſende Arten des Rindgraſes ſchaden, und wohl zuweilen den Tod bringen mögen, hier eine Stelle verdienen?

---

i) S. davon ausführlicher 1) Creuzbauer diſſ. de radicis chelidonii majoris ad ſolvendos pellendosque cholelithos efficacia Argentor. 1785. 4. 2) Th. Ad. J. de Schallern diſſ. qua chelidonii majoris virtus medica novis observationibus firmatur. Erlang 1790. 4.

k) Buihn a. e. a. O. S. 26.

www.dlibra.wum.edu.pl

Zweiter Abschnitt.

Betäubende Pflanzengifte.

Wie die scharfen Pflanzengifte sich durch ihre Schärfe, die sie auf Haut und Zunge äusern, verrathen; so hat die Natur auch diesen betäubenden Giften Merkmale eingeprägt, die auf einen andern unserer Sinne eben so kenntlich wirken: ich meine den Geruch. Diese Pflanzen haben zwar selten einen starken, aber doch meistens, vornemlich in eingeschlossener Luft, einen widrigen, verdächtigen Geruch, der, wenn man sich lange in einer mit ihren Ausdünstungen erfüllten Luft aufhält, den Kopf einnimmt, stumpfe Schmerzen in demselbigen erregt, und zu aller Bewegung träg macht. Ihr äuserliches Ansehen, oder doch die Farbe ihrer Blumenkrone, ist gemeiniglich traurig und weder auf der Haut noch im Munde zeigen sie die Spuren einer Schärfe. Viele unter ihnen sind vielmehr von einem süsen oder doch angenehmen und verführerischen Geschmak. Schon ihre Ausdünstungen haben auf die Werkzeuge der äuserlichen und innerlichen Sinnen eine nachtheilige Wirkung. Der Mensch, der das Unglük hat, in einer damit angefüllten Luft eine Zeit lang zu verweilen, bekommt Schwindel, wird gefühllos gegen den Eindrut äuserer Gegenstände, vornemlich solcher, die auf Gesicht und Gehör wirken; er verliert selbst den freien Gebrauch der Seelenkräfte, und fällt, bei einer ungemeinen Trägheit zu aller Bewegung, in eine unüberwindliche Nei-

www.dlibra.wum.edu.pl

gung zum Schlafe. Noch stärker sind diese Zufälle, wenn diese Gifte innerlich genommen und hinunter geschlukt werden, ob sie gleich nach dem verschiedenen Alter, Geschlechte, und der übrigen Beschaffenheit des Leibes, auf welchen sie wirken, theils stufenweise, theils in ihrer Art verschieden sind.

Wie die scharfen Pflanzengifte alle bewegende Kräfte der belebten Maschine in die gewaltsamste Thätigkeit sezen, und alsdann zu Boden schlagen, nachdem sie sie durch eine überspannte Heftigkeit ermüdet haben; so stürmen diese betäubenden Gifte sogleich auf die Quelle aller Bewegung und Empfindung los, machen alle Sinnen stumpf, sezen die Seele gleichsam, wenigstens auf einige Zeit, auser aller Gemeinschaft mit dem Leibe, schwächen ihre meisten Kräfte, vornemlich das Gedächtnis, verwirren andere, wie die Einbildungskraft, erregen Wahnsinn von allerlei Art, der oft in die grausamste Wuth ausartet, Unempfindlichkeit und Gleichgültigkeit gegen alle äuserliche Gegenstände, Schwachheit und mancherlei Fehler des Gesichts, oder auch gänzlichen Verlust desselbigen, und mancherlei andere Fehler, bisweilen auch einen gänzlichen Verlust der Sprache. Sie vermindern die Kräfte, die von den Nerven abhängen, überhaupt, und verursachen ein Aufspringen der Sehnen an den Muskeln der Vorderhand, Zittern in den Gliedern, Lähmung oder Krämpfe, Zukungen derselben, eine völlige Lähmung der einen Hälfte des Leibes, einen tödlichen Schlagfluß, oder eine unüberwindliche Schlafsucht.

Schon unter diesen Zufällen zeigen einige unläugbar von ihrer nachtheiligen Wirkung auf die Reizbarkeit der Muskelfasern, die sie ungemein schwächen. Sie offenbart sich

www.dlibra.wum.edu.pl

aber auch daraus, daß der Aderschlag sehr schwach, und überhaupt die Kräfte des Herzens erstaunend vermindert werden, daß das Athemholen schwer und bang ist, die Verdauung sehr Noth leidet, der Magen sehr oft, auch durch starke Gewichte heftiger Brechmittel, nicht zum Erbrechen zu bringen ist, und daß die Ausleerungen des Leibes nicht in ihrer rechten Ordnung sind. Ihre Wirkung erstrekt sich aber auch auf die Säfte selbst, von einigen ist es entschieden, und von den übrigen läßt es die Analogie vermuthen, daß sie die Säfte ungemein verdünnen und auflösen, daher kommen zum Theil die fiebrischen Zufälle, die öfters in dem Gefolge dieser Uebel sind; daher kommen die Ohnmachten, die Röthe, oder schwarzbraune Farbe in dem Gesicht, oder einem andern Theile des Leibes, die übergehenden Geschwulsten des Unterleibes und der Gelenke, die Entzündungen in dem Magen und dem Gedärmen, die so oft in Brand übergehen, der unauslöschliche Durst und die Trokenheit der innern Theile des Mundes, die Wasserscheue, die sich hier manchmalen einfindet, und der kalte Schweis, der sich gemeiniglich zeigt, ehe noch der Tod den ganzen Auftritt beschließt. Und allerdings haben die Ohnmachten, die Bangigkeiten, die Schlagflüsse, und andere der schon genannten Zufälle, wenigstens einen Theil ihrer Entstehung, dieser Wirkung zu verdanken. Sie zeigt sich vornemlich in den Leichnamen solcher Unglüklichen; oft strömt das Blut mit Gewalt zu Nase, Mund und Ohren heraus; alle Blutgefässe, vornemlich diejenigen, welche in den Hirnhäuten sind, strozen von äuserst dünnem Blute. Der Leib geht in sehr kurzer Zeit nach dem Tode mit dem abscheulichsten Gestanke in Fäulung; er läuft entsezlich auf, wird an einigen Stellen schwarzblau, oder bekommt über und über runde schwarzblaue Brandflekn. Den erzählten Zufällen ge-

www.dlibra.wum.edu.pl

sellen sich zuweilen noch andere bei, die als Wirkungen aus einem, oder dem andern derselbigen fliesen. Sie zeigen sich aber niemals in den nemlichen Kranken und zu der nemlichen Zeit und niemalen in der nemlichen Ordnung alle beisammen.

Obgleich ein unbehutsamer Gebrauch dieser Gifte von den schädlichsten Folgen ist, so kann sie doch der kluge Arzt da sehr wohl gebrauchen, wo die Nerven überhaupt, oder an einzelnen Theilen empfindlich und schmerzhaft gereizt sind, wo das ganze System in Zerrüttung und in der heftigsten Bewegung ist; als in unleidlichen Schmerzen, in Krämpfen, Zukungen und krampfichten Zufällen; wenn er sich auser Stande sieht, ihre wahre Ursache zu entkräften, und aus dem Wege zu räumen, oder doch zu befürchten hat, daß, bis dieses geschieht, der Kranke unter der Macht dieser dringenden Zufälle erliegen könnte, vornemlich wenn er ihre allzuheftige Wirkung durch den Zusaz eines Gegengifts einschränkt, oder, da ihre Wirkung gröstenTheils auf flüchtigen Bestandtheilen beruht, einen Theil von diesen durch das Einkochen über dem Feuer davon jagt. Ein Vortheil, den sich vornemlich unsere neuern Aerzte treflich zu Nuzen gemacht haben.

Wie den Folgen von den Ausdünstungen dieser Pflanzen zuvorzukommen sei, habe ich bereits berührt. Hat aber der Kranke etwas von diesen Giften verschlungen; so muß die erste Sorge dahin gehen, dieses wieder aus dem Leibe zu schaffen. Hier leisten also auch wieder Brechmittel gute Dienste, die, da die Reizbarkeit des Magens sehr geschwächt ist, in einem etwas stärkeren Gewicht, als gewöhnlich, gegeben, und so oft wiederholt werden müssen, bis Erbrechen erfolgt; bei starken Leuten hilft sich zuweilen die Natur selbst durch

www.dlibra.wum.edu.pl

dieſen Weg; alsdann iſt ſie nur durch Reizen des Schlundes mit einer Feder, durch häufiges, laues, wäſſerichtes oder öhlichtes Getränk, durch abführende Mittel, durch ſcharfe, vornemlich Tabaks- oder andere Klyſtire, die durch Seife geſchärft ſind, zu unterſtüzen. Dieſe Mittel müſſen ſo lange gebraucht und wiederholt werden, bis man gewis iſt, daß nichts mehr von dem Gifte in dem Magen, oder in den Gedärmen iſt.

Läßt aber die Macht, und die Art der Zufälle, und die Zeit, welche ſeit dem Genuſſe des verdächtigen Körpers verfloſſen iſt, vermuthen, daß das Gift bereits aus dem Magen und den Gedärmen in die Milch- und Blutgefäſſe übergegangen ſei; ſo müſſen dem Kranken ſolche Mittel gegeben werden, die das Gift ſelbſt angreifen und ihm ſeine Schädlichkeit benehmen. Eines der kräftigſten Gegengifte iſt [1]) recht ſtarker Koffee, und dem verdienen auch hier wieder die Säuren, vornemlich die Pflanzenſäuren, z. B. Eſſig, Limonienſaft, der Saft von Johannisbeeren, u. d. ohne Einſchränkung, die erſte Stelle. Aber der Gebrauch dieſer Säuren, oder zur Säure geneigten Mittel muß, wenn er auch gleich in dieſer zwoten Periode weit nothwendiger iſt, nicht bis auf dieſe aufgeſchoben, ſondern mit dem Gebrauche der erſtern, der brech- und abführenden Mittel verknüpft, und auch dieſe Mittel in ſehr groſer Menge genommen werden.

Zuweilen iſt der Arzt auſer Stande, die Urſache der Krankheit ſogleich aus dem Wege zu räumen, oder zu mil-

---

1) Vornemlich gegen den Mohnſaft Hahnemann in ſeiner Ueberſezung von W. Cullen materia medica B. II. S. 351.

www.dlibra.wum.edu.pl

dern, und die Zufälle, die ich oben erzählt habe, verstärken sich inzwischen bis zu der gefährlichsten Höhe; alle Räder der Maschine stehen still, alle Nerven scheinen gefühllos, alle Muskeln ohne bewegende Kräfte; hier muß der Arzt den dringenden Zufällen zuvorkommen, ehe er den Hauptfeind selbst zu Boden schlagen kann, wenn er seinen Kranken dem offenen Rachen des Todes entreissen will. Er muß Nerven und Muskeln aus ihrem Schlafe aufweken, und den allzustarken Trieb der Säfte von dem Haupte hinweg und nach andern minder edlen Theilen abzuleiten suchen. Einen Theil dieser Absicht erfüllen zwar schon Brechmittel, und die scharfen abführenden Mittel; allein diese reichen oft nicht zu; daher legen die Aerzte Blasenpflaster auf verschiedene Theile des Leibes, vornemlich auf das Haupt, halten starkriechende Geister unter die Nase, und geben innerlich Bibergeilextrakt, Bisam und andere ähnliche Mittel, welche geschwind und mit Macht auf die Nerven wirken, und sie aufmuntern.

Dieses sind die allgemeinen Merkmahle, an welchen sich die betäubenden Gifte erkennen lassen, nebst den allgemeinen Mitteln, ihren unseeligen Folgen zu begegnen. Allein sie zeichnen sich noch in ihrem äusern Ansehen durch besondere Merkmale aus, wenn auch der Unterschied in ihrer Wirkung nicht beträchtlich ist.

Höchst wahrscheinlich beziehen sich auf solche Gifte die Verwandlungen im Homer und die von ihm angeführten magischen Kräuter, die Salben der Pamphyle bei Apulejus, die Begeisterungen der heidnischen Opferpriester, und viele andere dergleichen Ueberbleibsel von dem Gebrauche und der Wirkung der Zauberkräuter [m]). Dahin verschiedene Stellen

m) Möhsen a. a. O. II. S. 441.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ovid's n), deſſen Zeitalter alſo gewis den Gebrauch ſolcher Gifte kannte.

Dahin

n) Der zwar hier und da die Kräuter nennt, aber ſicherlich unter dieſem Namen nicht immer beſtimmt dieſelbige verſteht, welche ihn heut zu Tage führen. So metamorphoſeon cum annot. poſthum. Minellii, magna ex parte ſuppl. atque emend. a Rabus. Roterod. 1686. 12. L. IV. Fab. XIII. v. 500. &c. S. 172.

"Attulerat ſecum liquidi quoque monſtra veneni,
Oris Cerberei ſpumas et virus Echidnae,
Erroresque vagos caecaeque oblivia mentis,
Et ſcelus et lacrymas rabiemque et caedis amorem,
Omnia trita ſimul; quae ſanguine miſta recenti
Coxerat aere cavo, viridi verſata cicuta.
Dumque pavent illi; vertit furiale venenum
Pectus in amborum, praecordiaque intima movit.
— — — — — — — —
Protinus Aeolides, media furibundus in aula
Clamat — — — — — — —
— — — Tum denique concita mater,
Seu dolor fecit ſeu ſparſi cauſa veneni
Exululat — — — „

und L. VII. F. I. v. 109. &c. S. 268.

"— — — — Tamen illis Aeſone natus
Obvius it: vertere truces venientis ad ora
Terribiles vultus, praefixaque cornua ferro
Pulvereumque ſolum pede pulſavere biſulco
Fumificisque locum mugitibus implevere,
Diriguêre metu Minyae: ſubit ille, nec ullos
Senſit anhelatus (tantum medicamina poſſunt)„

und

Dahin die Gifttränke, deren ſich nach Guy Patin o) einige Prieſter bedienten, welche nachher als Hexenmeiſter eingezogen wurden; dahin das Gift, welches zu Kongo Merolla unter ſeinen Speiſen bekam p), und welches daſelbſt

---

und v. 194 — 196. S. 272.

"Tuque triceps Hecate, quae coeptis conſcia noſtris,
Adjutrixque venis, cantusque artesque magorum,
Quaeque magos tellus pollentibus inſtruis herbis.„

v. 208. S. 272.

"— — — — pallet noſtris Aurora venenis.„

v. 213. 214. S. 273.

"Cuſtodemque rudem ſomni ſopiſtis, et aurum
Vindice decepto Grajas miſiſtis in urbes.„

F. 21. v. 395. S. 284.

"Sed poſtquam Colchis arſit nova nupta venenis.„

F. 22. v. 407. 408. S. 295.

"Hujus in exitium miſcet Medea, quod olim
Attulerat ſecum Scythicis aconiton ab oris.„

o) a. a. O. B. II. 1692. L. CLXXIV. S. 37. 38. "Il y a ici un curé d'Eſcoeün, Normand de nation, priſonnier dans la conciergerie, à cauſe des crimes, dont les moindres ſont le ſacrilege, l'empoiſonnement et le meurtre. On dit, qu'il a fait bien des cocus en ſon village. Il y a encore un autre prêtre priſonnier dans Sainte Genevieve, qu'on accuſe d'être ſorcier: du moins eſt-il conſtant, qu'il a débauché pluſieurs femmes par enchantement et brûvages, que les Catſards appellent art magique, lequel Pline met entre les arts fort imperieux, à qui les ſots ſe laiſſent tromper.„

p) New Collection of voyages and travels for Aſtley. London, fol. B. VI. S. 185. b, 186. a.

www.dlibra.wum.edu.pl

sieben Kapuziner nach einander um das Leben brachte q); dahin der Prüfungstrank (Bondo- oder Imbondotrank), welcher zu Loango bei gerichtlichen Untersuchungen statt des Eides r), und in ähnlichen Absichten von den Quojas auch in Afrika s) den Beschuldigten eingegeben, in Kongo aus der Wurzel eines Baums Nkassa t), von welchem Vögel, wenn sie sich nur auf seine Zweige sezen, sogleich tod niederfallen u), von den Priestern der Quojas aus der Rinde zween diker und zu den Giften gezählter Bäume (Nelle und Quoni) bereitet wird, und, wenn er ihn nicht sogleich wieder von sich gibt, wo er denn für unschuldig gehalten wird, oder Gegengifte erhält, schrekliche Zukungen, Verlust der Sprache, und einen Schaum vor dem Maule erregt.

Sollte sich nicht der Ganga in Loango zu seinen Gaukeleien, von welchen ihn Besprengen mit einem sauren Wasser aus einem Rohre wieder zurecht bringt x), nicht die Schamans im mitternächtlichen Asien y) sich zu ihren wilden Begeisterungen, vielleicht unter der Gestalt von Rauchwerk solcher Mittel bedienen? Sollten nicht die Kräuter

---

q) Ebendersf. S. 186. b.

r) Bettel bei Purchas a. a. O. B. II. S. 983.

s) New Collection of voyages and travels &c. B. II. 1745. S. 540. a.

t) Ebendaf B. III. S. 262. b.

u) Ebendaf. B. III. S. 264. b.

x) New collections of voyages and travels &c. B. III. S. 232. b.

y) J. G. Gmelin Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733—1743, Göttingen. 8. Erster Theil 1751. S. 287. 291. 397.—400. zweiter 1752. S. 44—46. S. 82—89. u. a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

und Rinden, welche die Weiber der Quojas, und der Schwarzen überhaupt ihren Männern geben, um ihre Begierden in vollen Aufruhr zu bringen z), hieher gehören? Gewisser gehört ein groser Theil der sogenannten Liebestränke a), die so oft, ohne ihren Zwek zu erreichen, groses Unheil anrichteten b), in so ferne sie nicht blos auf blindem Aberglauben beruhen, hieher.

Auch unter diesen betäubenden Giften gibt es solche, die ihre Wirkung nur auf Thiere äusern, ohne dem Menschen zu schaden, und mehrere, welche wenigstens auf jene viel heftiger wirken, als auf diesen. So wirkt der Samen von Kornraden oder Agrostemma Githago Linn. Flor. dan. Pl. 567. von dessen gefährlicher Wirkung auf Menschen noch kein Beispiel bekannt ist, wie ein solches Gift auf Vögel und Hunde c).

---

z) New Collection of voyages and travels &c. B. II. S. 535. a.

a) 1) J. D. Gröllmann de Philtris Ultraj. 1683. 2) G. H. Röser de Philtrorum agendi modo et noxis. Altd. 1701. 3) Chr. Vater de venenis et philtris propinatis. Vitemb. 1706. 4) Fr. Hoffmann de laesionibus externis, abortivis, venenis ac Philtris. Hal. 1729. 5) J. J. Virey sur la nature des philtres et sur l'action des aphrodisiaques im Magazin encyclopédique redigé par Millin. 8. à Paris 1. Fructid. an. 7. S. 300—331. vornemlich S. 310.

b) Man lese z. B. H. ab Heers observat. oppid. rar. wo er einen Fall von Aussaz und Blutflus durch alle Absonderungswege erwähnt, den ein solcher Liebestrank erregt hat.

c) Viborg und Rafn physicalsk, oeconomisk og medicochirurgisk Bibliothek för Dannemark og Norge. Kiobenh. B. II. 1799. nr. 2.

www.dlibra.wum.edu.pl

I) Einige von ihnen gehören unter die natürliche Horde der Nachtschatten (Solanaceae). II) Andere zeichnen sich durch rauhe oder wollige Blätter aus (Asperifoliae). III) Bei andern hat die Blume einige Aehnlichkeit mit einer Larve (Personatae). IV) Kressenarten (Tetradynamae). V) Zwiebelgewächse. VI) Porstarten (Leda). VII) Hülsengewächse. VIII) Bei andern haben die Blumen sehr viele Staubfäden (Polyandrae). IX) Einige sind wahre Gräser (Gramina). X) Bei andern hat die Blume keine Krone, (Incompletae). XI) Andere tragen zusammengesezte Blumen. XII) Noch andere gehören zu den Stauden und Bäumen.

I. Betäubende Pflanzen aus der Rotte der Nachtschatten.

Ihre Dauer ist sehr verschieden. Viele unter ihnen fühlen sich fett, oder klebricht an, und lassen an den Fingern, mit welchen man sie berührt hat, einen schweren widrigen Geruch zurük. Sie haben gemeiniglich etwas trauriges entweder in ihrem ganzen äuserlichen Ansehen, oder in der Farbe ihrer Blätter, oder Blumen. Ihr Stengel theilt sich in Aeste, und an diesen so wohl, als an jenem stehen die Blätter zu beiden Seiten abwechselnd. Ihre Blumen haben fünf fruchtbare Staubfäden, welche gemeiniglich inwendig im Kreise herum an der Krone vest sizen; diese besteht so, wie der Kelch aus einem zusammenhängenden Stüke, ist aber gemeiniglich in fünf Abschnitte gespalten. Jede Blume hat einen nach allen seinen Theilen ganz einfachen Staubweg, und hinterläßt eine einzige Frucht.

www.dlibra.wum.edu.pl

1) Schlafbringende Judenkirsche. Physalis somnifera Linn. Gärtner a. a. O. Pl. 131. Abb. 3.

Dieser kleine Strauch findet sich in Spanien, Sicilien, Kandien und Mexico. Sein Stengel ist rundlicht, wird ungefähr zween Schuhe hoch und treibt ganz gerade Aeste. Seine Blätter sind in ihrem Umfange eirund und am Rande ohne allen Einschnitt. Seine Blumen stehen in den Winkeln der Blätter ganz gedrängt beisammen; die Staubfäden stosen zusammen. Die Krone ist blaßgelb und hat einige Aehnlichkeit mit einem Rade; ihr Kelch ist zotig, bläht sich, wenn die Blume verwelkt, immer mehr auf, und dient der Beere zur Bedekung. Diese ist rund, wie eine Kugel, bald gelb, bald roth, und inwendig in zwei Fächer getheilt; sie enthält sehr viele kleine Samen.

Der Nahme, den dieses Gewächs schon bei Dioskorides (στρυχνον υπνωτικον) führt, und den es nachher beständig beibehalten hat, lässet mich vermuthen, daß sein Genus Schlummer und Schlafsucht errege, ob ich gleich keine entscheidende Erfahrungen vor mir habe d).

2) Nachtschatten, Solanum.

Die Arten dieser Gattung, die hieher gehören, sind meist Sommergewächse. Ihre Blumen hängen gemeiniglich an einer Art von Traubenkämmen; der Kelch geht um den Fruchtknoten herum; die Krone gleicht in ihrer Gestalt einigermasen einem Rade; die Staubbeutel sizen auf sehr kurzen Stielen, sind gelb und durch eine Haut unter sich verwach-

d) Seine Samen sind Hünern tödlich. Forskål a. a. O. S. LVII.

www.dlibra.wum.edu.pl

sen. An ihrer Spize haben sie zwei Löcher, welche weit ofsen stehen, wenn sie ihren Samenstaub ausstreuen. Jede Blume hinterläßt eine Beere, welche inwendig in zwei Fächer getheilt ist.

α) Liebesäpfel, Goldäpfel. Solanum Lycopersicum Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 533.

Diese sind in wärmern Gegenden von Amerika zu Hause. Der Stengel wird bis zween Schuhe hoch und höher, ist haarig, blattreich, aber ohne Stacheln, und theilt sich in viele Aeste. Die gelbgrünen Blätter bestehen aus mehreren Blättchen, die an einem gemeinschaftlichen Stiele einander gegen über stehen, ganze Paare ungleich kleinerer Blättchen zwischen sich haben, an ihrem Rande eingeschnitten sind und sich mit einem ungleichen Blättchen endigen. Die Blumen zeigen sich zu Anfang des Herbstes an ganz einfachen Traubenkämmen; sie sind klein, glatt und ganz ohne Stacheln; die Krone ist mattgelb. Die Frucht ist beinahe kugelrund, oft nicht viel kleiner als Pomeranzen, weich und gestreift, bald schlecht gelb, bald goldgelb, bald schön röthlicht, bald auch, wiewohl sehr selten, weis, oder bunt, und enthält viele kreisrunde, breitgedrükte und haarichte Samen, sie wird im Herbst zeitig. Das ganze Gewächs hat einen starken, verdächtigen und stinkenden Geruch. Schon dieser und der Ruf, in welchem es bei den Alten stund, als wenn es verliebten Wahnwiz erregte, noch mehr die Erfahrung eines Textors an einem Wahnsinnigen, den schon blos seine Ausdünstungen eingeschläfert haben e), werden mich entschuldigen, wenn ich ihm hier so lange eine Stelle anweise, bis seine Unschuld durch unwidersprechliche Beweise dargethan ist.

e) Bei J. Bauhin a. a. O. III, S. 631.

www.dlibra.wum.edu.pl

Inzwischen werden auch seine Früchte in Italien mit Salz und Oel gewürzt, und gespeist. Ohne Zweifel macht hier der Zusaz die Schädlichkeit des Giftes stumpf.

β) Jungfernbrüste. Merianin Surinam Pl. 27.

Ihr Stengel ist mit Stacheln besezt. Ihre Blätter haben in die Länge, und in die Quere einerlei Durchmesser; sie sind ziemlich stumpf, übrigens aber wie ein Herz gestaltet, etwas in Lappen getheilt, nach tiefen Winkeln eingeschnitten und auf beiden Flächen mit Stacheln und feinen, dicht an einander gewebten Haaren besezt. Ihre Früchte sind goldgelb, und gleichen in ihrer Gestalt und Grösse einer kleinen umgekehrten Birne. Sie kommen aus Virginien und Barbados. Diese Früchte erregen Aufschwellen des Bauchs, Erbrechen und häufige Bauchflüsse, auch wohl den Tod f).

γ) Tollapfel. Solanum insanum Linn. Trongum hortense. Rumpf Herbar. Amboinens. V. Pl. 85.

Diese Pflanze ist in Asien, Afrika und Amerika zu Hause. Ihr Stengel ist mit Stacheln besezt. Ihre Blätter sind im Umfange rund, wie ein Ei und auf beiden Flächen mit einem weichen Filze bekleidet. Die Blumen sind ziemlich gros, und hängen an eigenen Stielen, die nach der Blume zu immer diker werden; an ihrem Kelche haben sie viele Stacheln, und ihre Krone sieht mattbläulicht oder röthlicht aus. Die Früchte sind gemeiniglich glänzend schwarz und glatt, bald mehr kugelrund, bald mehr länglicht.

Die Benennungen dieser Pflanze haben mich verleitet, sie hier anzuführen, da mich keine wahre Erfahrung weder

f) Rottböll Act. litterar. univ. Havnienſ. B. I. 1778. nr. VI. S. 286.

www.dlibra.wum.edu.pl

davon, noch von dem Gegentheil versichert. Die Früchte werden in Amboina ohne Schaden gespeist.

δ) Sodomsäpfel. Solanum sodomaeum Linn. Solanum pomiferum fruteſcens africanum ſpinoſum nigricans, boraginis flore, foliis profunde laciniatis. P. Hermann Parad. Lugd. Bat. Abb. S. 575.

Diese Staude wächst in Indien und Afrika vornemlich am Vorgebirge der guten Hofnung an Gräben und andern ungebauten Orten wild, und ist stark mit filzigen Stacheln besezt. Ihr Stamm ist stielrund; ihre Blätter durch rund zulaufende Buchten in Lappen oder Querstüke getheilt, ohne bestimmte Ordnung mit Stacheln besezt, sonst aber nakend; ihre Blumen haben stachlichte Kelche. Ihre Wurzel und vornemlich ihre Beeren erregen Schwere des Kopfs, Trägheit, Wuth, sogar den Tod g).

ε) Stinkender Nachtschatten. Solanum foetidum. Rottböll a. e. a. O. S. 287.

Diese Art wächst in Surinam wild; ihre Beeren geben, wenn sie zerschnitten werden, einen unerträglichen Geruch von sich, und erregen Ekel und Kopfschmerzen h). Sollten sie deswegen wirklich eine Stelle unter den Giften verdienen?

Noch gedenkt Forskål einer Art, die hieher zu gehören scheint, und der er den Beinamen Madd i) gibt.

Ueberhaupt aber ist es wahrscheinlich, daß noch mehrere Arten dieser Gattung, wenn sie auch nicht immer so schnell

---

g) Puihn a. e. a. O. S. 49.
h) Rottböll a. e. a. O.
i) a. a. O. S. XCVIII.

www.dlibra.wum.edu.pl

und augenscheinlich wirken, als die angeführten, doch eben so wohl, als diese, ihre Stelle unter den Giften verdienen. Allein von dem gemeinen Nachtschatten: Solanum nigrum Linn. Flor. danic. Pl. 460. und dem Bitterfus, Solanum Dulcamara Linn. Flor. dan. Pl. 607. ist es zu gewis entschieden, daß sie nicht Gifte sind, als daß ich mich überwinden könnte, ihrer hier weiter Meldung zu thun; denn wenn auch das mit der Wurzel des ersten gekochte Wasser Hunden schädlich war k), so fressen doch Truthüner Kraut und Beeren gern und ohne Schaden l), und die Beispiele von Menschen und Thieren, bei welchen ihr Genus Zukungen, Raserei und selbst den Tod veranlaßt haben soll, scheinen sich auf eine Verwechslung dieser Pflanzen mit unbezweifelt schädlichen zu gründen; und wenn auch das Wollvieh das Kraut des zweiten stehen läßt und dreisig Beeren davon nach vielen Erbrechen und heftigen Bauchflüssen einen Hund tödeten, in dessen Magen man sie noch unverdaut fand m), so scheint mir dieses noch nicht hinlänglich, ihm den Namen eines Giftes zu geben.

3) Alraun, Hundsäpfel, Erdäpfel, Atropa Mandragora Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 364. Dudaim. M. Jak. Thomasius de Mandragora von der Alraunwurzel. Leipzig 1655. 4.

Er wächst in Spanien, in der Provence, in Languedok, Italien, Kandien und auf den Cycladischen Eilanden

k) Brunwell Medical observations and inquiries by a Society of Physicians at London. B. VI. 1784. nr. 21.

l) Wittenbergisches Wochenblatt für 1783.

m) Puihn a. e. a. O. S. 47.

www.dlibra.wum.edu.pl

wild. Er hat einen bittern, ekelhaften Geschmak und einen widrigen Geruch. Seine Wurzel ist dik, lang, gemeiniglich in zwei dünnere getheilt, und mit vielen Zasern versehen; sie treibt keinen Stamm, sondern nur eine Menge dunkelgrüner Blätter, welche ziemlich breit und bis zu einer Elle lang werden, zwischen welchen Blumenschäfte in die Höhe schiesen, deren jeder nur eine Blume trägt; diese hat eine weislichte in ein mattes Purpurroth spielende, etwas haarige Krone, deren Gestalt einige Aehnlichkeit mit einer Gloke hat; in dieser stehen in einiger Entfernung von einander fünf Staubfäden, die einwärts gekrümmt sind, nebst einem Staubweg, um dessen untersten Theil der Kelch rings herum geht, sie zeigt sich schon im Hornung. Seine Beere ist von verschiedener Gröse, bald kugelrund, bald wie eine kleine Mispel gestaltet, saftvoll, von einem scharfen Geruch, wenn sie ihre Reife erhalten hat; ihre Farbe ist alsdann bald gelbgrün, bald blaßgelb; sie ist inwendig in zwei Fächer getheilt, in welchen viele platte Samen ohne bestimmte Ordnung liegen.

Schon seit den ältesten Zeiten steht dieses Gewächs, vornemlich aber seine Wurzel, in dem Rufe, daß es die Kräfte niederschlage, Trägheit in allen Bewegungen verursache, und Schlaf mache; ein Ruf, der gegründeter ist, als der übrige Wahn von den fabelhaften Eigenschaften, die man von ihm angeführt hat n).

---

n) 1) J. Bauhin a. a. O. III. S. 617. 2) Lemnius Similitud. quae in Bibliis ex herbis et arborib. sumuntur explicatis. Francof. 1608. c. 2. S. 9. 3) Select. Francofurt. Francof. ad Viadr. B. I. 1736.

www.dlibra.wum.edu.pl

Wirklich soll man dem Tiger, wenn man ihn zahm machen wollte, um ihn anders wohin zu führen, Alraun o) gegeben, und die sogenannten Hexen in der Provence sich mit einer Salbe aus Alraun, Bilsenkraut, Stechapfel und Nachtschatten, von welchen sie in Schlaf und Wahnsinn fielen, mehrere Theile des Leibes eingeschmiert haben p). Cäsar nüzte seine betäubende Kraft gegen die ciliciſchen Seeräuber q). C. Fr. Daniel sah auf den innerlichen Gebrauch der Wurzel Entzündung des Magens, Brand in den Gedärmen und innerhalb drei Tagen den Tod r); Meibom von 8—9 Granen der Wurzel in warmem Bier innerhalb zwölf Stunden den Tod s) erfolgen, und Sallin s*) in solchen Leichen auser dem Magen auch die Kehle entzündet.

Geschichte.

Maharbal, ein Feldherr von Karthago, mischte, als er gegen die aufrühreriſchen Afrikaner geschikt wurde, eine Menge Alraunwurzel unter den Wein; er stellte sich, als ob er davon flöhe, und den Wein im Stiche lies. Die Feinde kamen und tranken ihn, froh über ihre Beute, fielen aber

---

o) Victorius L. IV. Var. lect. c. 3.

p) Darluc a. a. O. II. S. 291.

q) Frontin Stratagem. L. V. S. 239. L. VIII. S. 367.

r) Sammlung mediciniſcher Gutachten und Zeugniſſe, samt einer Abhandlung über eine besondere Misgeburt an Herz und Lungen. Leipzig 1776. 8.

s) Epist. manuscr. de mandragorae radicis usu ad F. F. Wepfer bei Blumenbach mediciniſche Bibliothek. B. I. St. 2. S. 375. 376.

s*) a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

alle in einen tiefen Schlaf, daß es dem Feldherrn leicht wurde, sich ihrer zu bemeistern.

Frontin a. a. O. L. II. C. V. in veterib. de re milit. scriptorib. Vesal. 1670. S. 209.

Indessen haben schon die ältesten Aerzte verschiedene Theile dieser Pflanze in mancherlei Absichten und unter mancherlei Gestalten, so gar innerlich verordnet; mit gröserm Rechte empfielt sie ein neuerer schwedischer Arzt Hofberg t) entweder mit Honig und Milch als einen Umschlag, oder fein zerrieben und unter der Gestalt eines Pflasters äuserlich als ein ausnehmend zertheilendes Mittel in Geschwulsten und Verhärtungen der Drüsen, auch wenn sie venerischer Art sind.

4) Stechapfel, Datura Linn.

Die Arten dieser Gattung, deren ich hier gedenke, sind Sommergewächse. Sie haben zwar keinen starken, aber einen äuserst widrigen Geruch. Ihre ganze Oberfläche fühlt man mit einer klebrichten Feuchtigkeit überzogen. Ihr Stengel wird niemalen über drei Schuhe hoch, und theilt sich in starke Aeste. Ihre Blumen haben fünf Staubfäden, welche niemalen mit einander verwachsen und meistens so lang als der Kelch sind; sie stehen in einiger Entfernung von einander und haben eine kaum merkliche Stüze; die Staubbeutel aber sind länglicht, stumpf und von beiden Seiten breitgedrükt. Ihr Kelch ist länglicht und unten etwas bauchig; er stellt eine kurze Röhre vor, die fünf Eken hat, verwelkt, wie näher die Frucht ihrer Zeitigung kommt und fällt zulezt ab;

---

t) Abhandlung der schwedischen Akad. der Wissensch. zu Stokholm 25. B. S. 243. u. f

doch läßt er eine kleine Spur seines Daseins, wie den Abschnitt eines Kreises, zurük, die immer steifer wird und das Samengehäus umgiebt. Ihre Krone verliert sich aus einer sehr langen Röhre in eine weite Mündung mit starken Falten und fünf Ecken; gemeiniglich ist sie weis, in Gärten zuweilen auch bläulicht; ihr Eierstok ist, in Absicht auf seine Gestalt, gleichsam in der Mitte zwischen einem Ei und einem Würfel, und hat rings um sich herum einen drüsichten Ring; er trägt einen einfachen geraden und fadendünnen Griffel, der gerade so lang als die Staubfäden ist, und sich in ein stumpfes, gleichsam aus zwei Blättern bestehendes Köpfchen verliert. Ihr Samengehäus ist ganz troken, und von aussen dicht mit diken spizigen Stacheln besezt, die, wie näher es seiner Reife kommt, desto steifer werden; hat es diese vollkommen erreicht, so springt es von selbst in vier Stüke; inwendig ist es durch zwo Scheidewände in vier Fächer getheilt, die einander kreuzen, mit gewölbten und gedüpfelten Schuppen, auf welchen die Samen sizen, besezt sind, deren die eine der Länge nach durch das ganze Samengehäus, die andere aber nur durch drei Viertheile desselbigen geht, von diesen Fächern fliesen die zwei obern wieder in eines zusammen; ihre Samen liegen in groser Anzahl dicht auf einander; sie sind runzelicht, und haben übrigens in ihrer Gestalt einige Aehnlichkeit mit Nieren; sie haben beinahe keinen, wenigstens keinen gewürzhaften Geruch.

α) Gemeiner Stechapfel, Dornapfel, Rauchapfel, Stachelnus, Dollkraut, Igelskolbe. Datura Stramonium Linn. Stramonium. Blackwell a. a. O. Pl. 313.

Ursprünglich ist diese Pflanze in Amerika zu Hause, nun aber ist sie auch in ganz Europa einheimisch. Ihre

www.dlibra.wum.edu.pl

Wurzel ist holzig, dik, ungleich und zasericht. Ihr Stengel verbreitet sich mit zahlreichen Aesten weit umher, die sich zulezt immer wieder in zween kleinere theilen. Ihre Blätter sind gros, breit, glatt, gemeiniglich satt dunkelgrün, flach, zart und geadert; sie stehen in den Winkeln, welche die Aeste mit den Stengeln machen, auf langen Stielen einander gerade gegen über; in ihrem Umfange sind sie beinahe rund, wie ein Ei, und an ihrem Rande haben sie Winkel und Buchten, welche einem halben Monde gleichen. Ihre Blumen sind gros, in Gärten zuweilen vielfach oder gefüllt, und sizen auf ganz kurzen Stielen in den Winkeln, welche die Aeste mit den Stengeln, oder die Zweige mit den Aesten, oder die Blätter mit den Aesten machen; ihr Kelch hat fünf scharfe Eken; die Eken ihrer Krone verlieren sich in eine weiche etwas steife Spize. Ihr Samengehäus steht aufrecht und ist länglicht; die Samen selbst aber sind schwarz; sie lassen sich dadurch leicht von den Samen des Schwarzkümmels (Nigella) unterscheiden, daß sie weit gröser und breiter sind, und entweder gar keinen, oder doch gewis keinen gewürzhaften Geruch, wie jene, haben.

Kraut u), Blumen x), Früchte y), vornemlich aber die Samen dieses Gewächses z), wenn sie als Pulver, oder

---

u) Döderlin Commerc. literar. Noric. 1744. S. 15.

x) Nach Garzias J. Bauhin a. a. O. III. 2. S. 625.

y) 1) Sauvages Nosolog. method. Amstel. 1763. B. III. Th. I. S. 364. 2) Hamilton Essays and observations read before a Society at Edinburgh vol. II. 1756. art. II. S. 247.

z) 1) Transactions of the American Society for promoting useful Knowledge. vol. I. 1769. of Phys. art. 3. 2) Ephem.

www.dlibra.wum.edu.pl

in einem Trank mit Wasser, Wein oder Milch gekocht, genommen werden; ja schon ihre Ausdünstungen in der natür-

---

Acad. Caes. Nat. Curios Dec. III. A. 3. obs. 170. 3) Miscell. Lipsiens. P. III. S. 247. 4) Kramer Commerc. litterar. Noric. 1733. S. 252. 5) Hyckel ebend. 1744. nr. 2. 6) Büchner Miscell. Vratislav. 1727. S. 123. 7) Lobstein in dem Anhang zu Guerin Diss. de vegetabil. venen. Alsat. Argent. 1766. 8) Kaaum Börhaave Impetum faciens dict. Hippocrat. Lugd. 1745. S. 282. 9) Sauvages a. a. O. S. 376. 10) Tropaninger Medic. legal. S. 296. 11) Clauder Praxis medic. legal. cas. I. 12) Storch Abhandl. von Kinderkrankheiten, Eisen. 1750. II. S. 183. und Unterricht vor Hebammen. Gotha 1746. S. 149. 13) Garidell a. a. O. S. 450. 14) Trüger Ephem. Acad. Caes. Nat. Curios. Dec. III. A. 2. S. 84. 15) Deneke Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 1748. S. 640. 16) Schreber Sammlung verschiedener Schriften 6. B. S. 297. 17) Bei einem sechsjährigen Kinde Fowler medicinische Commentarien einer Gesellschaft von Aerzten zu Edinburg aus dem Engl. B. I. St. 2. Altenburg 1781. 8 S. 168. ꝛc. 18) Bei einem Frauenzimmer Johnston Medical facts and observations B. V. 1794. n. VIII. 19) Bei einem Knaben 1781. bei Spandau auf dem Gewehrplan. Willdenow Flor. berolin. prodromus. 1787. S. 86. 20) Bei einem Kinde. Bartram Transactions of the College of physicians at Philadelphia 8. B I. Th. I. 1793. 21) Bei einem dreijährigen Knaben. Wedekind bei Baldinger neues Magaz. für Aerzte, Leipzig. 8. 1779. St. I. S. 34. ꝛc. 22) Bei einem anderthalbjährigen Kinde zu Derbber. Ebenders. Hannöv. Magazin ꝛc. 1785. St. 29. S. 463. S. auch King physisch-medicinisches Journal. Leipzig. 8. Merz 1800. S. 189—191.

www.dlibra.wum.edu.pl

lichen Wärme einer eingeschlossenen Luft a), und noch mehr alsdann, wenn sie bei gelinder Hize getroknet werden b), sind von den traurigsten Wirkungen auf den menschlichen Leib, die aber wieder nach dem verschiedenen Gewichte, Gestalt und Mischung, und nach der Beschaffenheit des Leibes, in welchen sie kommen, in ihrer Art und in ihrer Heftigkeit verschieden sind.

Der verdammungswürdigste Misbrauch, den Diebe, Hurenwirthe und ihres gleichen zur Erfüllung ihrer ruchlosen Absichten von diesem Gewächse gemacht haben c), und

---

a) Des Krautes, Störk von dem sichern Gebrauch und der Nuzbarkeit des Stechapfels, des Bilsenkrautes und des Eisenhüthleins, übers. von Schinz. Zürch 1763.

b) Schinz in der Vorrede zu dieser Uebersezung S. LXX.

c) In Getränken oder Speisen. Diebe und Huren, um ihr Verbrechen desto ungehinderter zu begehen, wenn sie die Leute damit eingeschläfert haben. Kramer a. a. O. Sauvages a. a. O. II. Th. S. 429. Hurenwirthinnen, um in ihren gemietheten Mägdchen alles Gefühl der natürlichen Schaam zu erstiken. Sauvages und Garidell a. e. a. O. Und einige wissen so gut damit umzugehen, daß sie die Dauer der Wirkung ganz genau bestimmen. J. Bauhin a. a. O. III. Th. 2. S. 625. Alte Hurer, um junge Mädchen zu verführen. Kaauw Börhaave a. a. O. Missethäter, um ihre Wächter sinnlos zu machen, Garidell a. a. O. Ehebrecherinnen, um ihre Männer zu ruhigen Zuschauern ihrer Schandthaten zu machen, a Costa in Clusii opp. omnib. S. 289. In Rußland legt man die Samen in das Bier, um die Leute desto geschwinder zu besaufen. S. G. Gmelin Reise durch Rußland 1770. I. Th. S. 43. vornemlich legen die Kosaken zum Scherze die Samen-

gehäuse

die Unvorsichtigkeit anderer d) hat gezeigt, daß es berauscht und betäubt e), einen übergehenden, oder gänzlichen Verlust des Gedächtnisses f), Wahnwiz g), Sinnlosig-

---

gehäuse zerdrükt mit den Samen in's Bier, oder hängen ganze Bündel derselbigen darinn auf; so erregt das Bier, vollends bei Leuten, die von reinem Bier schon halb betrunken sind, eine drollige Narrheit, welche noch den andern Tag Kopfschmerzen zurükläßt, die sich jedoch auf ein Glas Brandwein verlieren, J. P. Falk Beyträge zur topographischen Kenntniß des russischen Reichs. S. Petersburg. 4. B. II. S. 131, 132.

d) Statt der Samen des Schwarzkümmels. Haller Hist. stirp. Helvet. indig. B. I. S. 259. Büchner, Sauvages, Storch, Wedekind a. d. a. O. Statt kleiner Rosinen, Schreber a. a. O. Kinder statt einer andern esbaren und unschädlichen Pflanze. Lobstein a. a. O. andere statt der Samen der Mariendistel. Krazenstein bei Crell neueste Entdekungen in der Chemie. B. X. S. 138.

e) Döderlin, Garidell und Crüger a. d. a. O.

f) Sauvages und Schinz a. a. O. Linné Amoenit. acad. B. V. S. 154.

g) Bald heftiger, bald gelinder und angenehmer, Kramer, Lobstein, Hamilton, Sauvages, Büchner, Fowler, Willdemann a. d. a. O. zuweilen eine Art von Entzükung. Garidell und Crüger a. d. a. O. Sauvages Epist. ad ill. Hall. script. B. III. S. 137. blos vorübergehenden Valvasor Ehre des Herzogthums Crain, Laibach 1689. fol. B. III. Th. 2. S. 172. davon, daß der Rand eines Bierglases mit einem Blatte dieses Gewächses gerieben wurde, soll derjenige, der daraus trank, in Wahnsinn, und in ein zween Tage lang dauerndes Fieber verfallen sein. Halle Gifthistorie S. 171,

www.dlibra.wum.edu.pl

keit h), Wuth und Raserei i), Begeisterungen von Hexen k), Zittern l), Zukungen m), Aufspringen der Sehnen n), Schlummer o), kalte Schweiſe p) und Schlagfluß q) erregt; sehr oft lähmt es die Glieder r), verursacht unerträgliche Trokenheit und unauslöſchlichen Durſt s), ſchwächt die Kräfte

---

h) Kaauw Börhaave, Sauvages, Kramer, Garidell, Fowler a. d. a. O.

i) Döderlin, Lobſtein, Garidell und Ephem. Acad. Caeſ. N. Cur. Dec. III. A. 3. obſ. 170. Krazenſtein ſah a. e. a. O. davon eine alle Monate wieder kommende Raserei erfolgen.

k) Sauvages a. a. O. III. S. 393.

l) An Lippen, Händen und Füſſen, Kaauw Börhaave a. a O.

m) Bald am ganzen Leibe, Lobſtein, Döderlin, Kramer a. a. O. bald an einzelnen Gliedern, Büchner, Sauvages, Kaauw Börhaave, Wedekind bei Baldinger a. d. a. O. De Witt bei Kühn phyſiſch-mediciniſches Journal bei Bradley und Willich für Deutſchland bearbeitet und mit Originalbeiträgen vermehrt. Leipzig 1800. 8. S. 70.

n) Darinn ſuchen viele Aerzte den Charakter des Giftes, vornemlich wenn es ſich während dem Schlummer zeigt. Storch und Haller a. d. a. O.

o) Der bald vor bald nach dem Wahnſinn, oder den Zukungen kommt, und zuweilen tief, auch wohl mit Schnarchen verknüpft iſt. Kaauw Börhaave, Sauvages, Döderlin, Tropaninger, Fowler, Wedekind a. d. a. O.

p) Lobſtein und Barrere bei Haller a. d. a. O.

q) Büchner a. a. O.

r) Sauvages und Hamilton a. d. a. O.

s) Sauvages, Hamilton, Miſcell. Lipſ. a. d. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

des Herzens ungemein t), macht alle Sinnen stumpf, oder gegen äusere Gegenstände gänzlich unempfindlich u); oft erfolgt auf seinen Gebrauch Schwindel x), eine widernatürliche Erweiterung des Sterns im Auge y), ein Funkeln und eine Unbeweglichkeit der Augen z), Schwürigkeit im Hinunterschlingen a), Wasserscheu, Beklemmungen und ungewöhnliche Schmerzen a*), ein Verlust der Sprache b); bald durch den ganzen Leib eine unmäsige brennende Hize c), bald in den Gliedern eine Kälte d); zuweilen erfolgt auch darauf ein Reiz zum Erbrechen und ein Juken in der Gegend des Magens e), Blasen auf der Haut, starker und unwillkührlicher Abgang des Harns e*), ein übergehendes Aufschwellen des Unterleibes f), grausame Kopfschmerzen g), eine Röthe im Gesicht h), die schamloseste Geilheit, ein Knirschen mit den

---

t) Der Aderschlag ist schnell und klein oder unterbrochen. Hamilton und Kaauw Börhaave a. d. a. O.

u) Hamilton u. a. a. d. a. O.

x) Hamilton und Crüger a. d. a. O.

y) Lobstein a. a. O.

z) Kaauw Börhaave und Wedekind bei Baldinger a. a. O.

a) Fowler a. a. O.

a*) De Witt a. a. O.

b) Kaauw Börhaave und Sauvages a. d. a. O.

c) Lobstein, Wedekind und Döderlin a. d. a. O.

d) Hamilton a. a. O.

e) Döderlin a. a. O.

e*) De Witt a. a. O.

f) Döderlin, Fowler und Lobstein a. d. a. O.

g) Döderlin a. a. O. S. 16. Störk a. a. O. S. 6.

h) Kaauw Börhaave, Döderlin und Fowler a. d. a. O. an Zunge und Augen. Wedekind a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Zähnen, ein sehr langsames Einziehen des Athems und schnelles Aushauchen i), eine völlige Erlöschung der Zeugungskraft k); nicht selten beschließt der Tod in kurzer Zeit die Reihe dieser Zufälle und zuweilen kommt er plözlich l). Schon äuserlich auf das Auge gelegt, haben die Blätter eine unheilbare Erweiterung des Augensterns m), und in die Nase gestert, Amblyopie und schwarzen Staar n) erregt.

Nach dem Tode solcher Unglüklichen findet man öfters den grauen Theil des Hirns voll Blut, und seine Höhlen mit hart geronnenen Blutklumpen angefüllt o); den Unterleib sehr aufgetrieben, und grünlicht, den übrigen Leib gelbsüchtig, Magen und dünne Gedärme stark entzündet und hier und da brandig, die Zotenhaut derselbigen wie abgelößt p).

---

i) Kaauw Börhaave und Fowler a. d. a. O.

k) Sauvages Epist. ad ill. Hall. cit.

l) Sauvages, Büchner, Haller, Schreber und Willdenow a. d. a. O. Krause erfahrungsmäßiger Unterricht von der Gärtnerei. Berlin 1773. Wedekind in Diepholz Hannöverisches Magazin 1782 St. 32 bei einem anderthalbjährigen Kinde in einem halben Tage. Ebenders. a. e. a. O. 1785. S. 29. 463. Bei einem andern Kinde in sechs Stunden. Selle neue Beyträge zur Natur- und Arzneywissenschaft. Berlin 8. Theil II. 1783.

m) Nach Rais Beobachtungen bey Guerin a. a. O. S. 31.

n) In die Nase gestekt Ephemerid. Acad. Caesar. Nat. Curios. Dec. II ann. 6 obs. 137.

o) Haller a. a. O.

p) Wedekind Hannöv. Magazin a. d. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Geschichte.

Ein Greis, der dem Laster der Unzucht so ergeben war, daß er es auch da nicht verlassen konnte, wo ihn die Natur seines Körpers auf bessere Wege hätte leiten sollen, hatte mit Geld und guten Worten ein junges, sehr schönes Mädchen zu seinen ruchlosen Absichten gewonnen. Mistrauisch in seine äuserlichen Reize und in seine Kräfte, suchte er andere Mittel, sich der Liebe seiner Buhlerin zu versichern. Er erfuhr von einem seiner Bekannten, der mit ihm in gleichem Alter und in gleicher Verdammnis war, ein Mittel, das der lezte nach seiner Versicherung in dergleichen Fällen öfters bewährt gefunden hatte; er lies es fein stosen und gab es seinem Mädchen nach einer grosen Mahlzeit heimlich in einer Schaale Kaffee. Mit heiser Ungedult erwartete er die gewünschte Wirkung seines Trankes, und um sich davon noch mehr zu versichern, gab er gerade noch einmal soviel, als ihm sein Mitschuldiger angerathen hatte. Bald darauf zeigten sich folgende Zufälle in der Ordnung, wie ich sie hier anführe. Zuerst war sie gleichsam berauscht, sie funkelte in den Augen; ihr Gesicht war ganz roth; sie sang laut, zeigte einen ausschweifenden Trieb zur Unzucht, entblößte sich auf die schändlichste Weise, und konnte überhaupt mit der Sprache nicht wohl fortkommen, hielt die Augen steif und vest, zitterte mit den Lippen, an Händen und Füsen, knirschte mit den Zähnen, verfiel in Zukungen und kam von Sinnen. Dieser fürchterliche Auftritt, der gegen drei Viertelstunden dauerte, preßte dem, seiner bösen Sache bewußten Greis den Angstschweis aus, und nöthigte ihn, mitten in der Nacht einen Arzt zu rufen. Dieser fand die Kranke in dem Bette auf dem Rüken liegend mit ganz offenen und auf einen Gegen-

www.dlibra.wum.edu.pl

stand vest gehefteten Augen, mit vest geschlossenen Zähnen und Lippen, mit geschlossenen Händen, doch so, daß sie sich leicht eröffnen liesen und die Daumen nicht eingeschlagen waren; ihre Arme zogen sich zusammen, und liesen wieder nach, sie sties auch mit den Füssen; allein, weil sie schon ermüdet war, waren diese Bewegungen schon ziemlich schwach. Ihr Athem war ungleich, sie zog ihn langsam, sties ihn sehr schnell wieder aus und zog ihn sogleich wieder an; ihr Aderschlag war zwar lebhaft, aber oft unterbrochen. Da der Arzt auf den Grund dieser Erscheinungen fiel, dachte er sogleich an ein Brechmittel, lies aber inzwischen, bis man dieses haben konnte, den Mund mit Gewalt öffnen, gab ihr etliche Lothe Baumöl, und nach diesem etwas spanischen Wein ein, der über dem Glase des Spiesglanzes gestanden hatte. Alles dieses litte sie ganz geduldig, da sie ganz von Sinnen war, und, unerachtet sie auf alle Bewegungen, die man mit ihrem Leibe vornahm, kein Zeichen einer Empfindung von sich gab, so schlukte sie doch alles, was man ihr eingab, wohl hinunter. Bald darauf brach sie, aufrecht in dem Bette sizend, mit der äuersten Bangigkeit und mit Zukungen an Händen und Füsen, alles, was sie bei der lezten Mahlzeit so wohl, als erst kürzlich in Gegenwart des Arztes zu sich genommen hatte; einige Zeit darauf war sie etwas ruhiger und die starrsüchtige Steifigkeit in ihren Gliedern lies etwas nach. Sie brach das laue Wasser, das sie zu wiederholten Malen zu sich genommen hatte, zum zweiten und dritten Male wieder heraus. Allein sie blieb von allen äuserlichen Gegenständen noch immer so ungerührt, als wenn sie der Wein eingeschläfert hätte; bald darauf aber verfiel sie in einen sehr tiefen Schlaf mit Schnarchen: nun zeigte sich zuweilen, besonders in dem linken Fuse, eine leichte Zukung. Als der Arzt mor-

www.dlibra.wum.edu.pl

gens früh wieder kam, fand er die Kranke noch in dem nemlichen Schlafe, der bisher ununterbrochen fortgedauert hatte, nur zog sich der Schenkel von Zeit zu Zeit etwas zusammen; als sie erwachte, war sie sich noch nicht recht bewußt; sie lies sich von keinem Gegenstande rühren, und es schien, als ob sie wieder einschlafen wollte. Da der Arzt damals die Art des Giftes noch nicht kannte und vermuthete, es möchte die Natur des Mohnsaftes haben; so lies er sie äuserlich und innerlich Essig gebrauchen, und da er sie noch um den Mittag schlafend antraf, gab er ihr aus Furcht, es möchte noch etwas von dem Gifte in dem Magen sein, Brechwurzel ein; von dieser erbrach sie sich ziemlich stark, und bald darauf erwachte sie von sich selbsten. Anfangs war sie ihrer nicht völlig mächtig, aber bald kam sie zu sich selbst, und gestund, als man sie darüber befragte, daß sie diese ganze Zeit über nicht das Mindeste empfunden hätte, und daß der Kaffee, den sie nach Tische zu sich genommen hatte, ihr längstes Denken wäre q).

Die Schafe lassen dieses Gewächs, wenn es ihnen auf der Weide vorkommt, stehen; und Schweine werden davon taumelicht q*); übrigens hat ein Loth des Samens einem Hunde, der schon vier und zwanzig Stunden gehungert hatte, ob er es gleich nicht zu sich nehmen wollte, eingegeben, nichts geschadet r).

---

q) Kaauw Börhaave a. a. O.

q*) Paul Boccone curiöse Anmerkungen. Leipzig 1694. 12.

r) Sprögel a. a. O. S. 21. §. XVI. Exp XIII. Doch wird ein Anderer von seinem Geiste gleichsam berauscht. Bartholin Cent. VI. hebd. 76.

www.dlibra.wum.edu.pl

Auch hier sind Brechmittel, die man sogleich bei der ersten Vermuthung, daß in diesem Gifte der Grund der Krankheit liege, in verstärkten Gewichten beibringen und durch häufiges Trinken von lauem Wasser in ihrer Wirkung unterstüzen muß s), Pflanzensäuren, Essig, Limoniensaft u. d. selbst saure Molken in groser Menge getrunken, sind nach sichern Erfahrungen die kräftigsten innerlichen Mittel Ihre Wirkungen kann man durch fleisigen Gebrauch scharfer Klistiere, die man mit Salz, Seife, oder auch mit Tabak würzt, unterstüzen.

Allein eben diesen zu heftigen und eben dadurch unglüklichen Wirkungen kann man eine glükliche und heilsame Richtung geben, wenn man nach der Vorschrift eines Störk t) durch ein langsames Abdünsten des aus dem Kraute u) ausgedrükten Saftes, etwas von den flüchtigen Theilen, in deren Menge die Heftigkeit der Wirkung liegt, davon jagt, oder aus dem Samen einen Absud u1) oder mit Weingeist u2) eine Tinktur bereitet, dann ist er ein sehr gutes, reizendes, auflösendes und krampfstillendes Mittel, und leistet

---

s) Kaauw Börhaave a. a. O. Spiesglaswein; andere empfehlen Brechmittel oder Brechweinstein, oder weissen Vitriol. Wedekind rettete bei Baldinger a. a. O. den dreijährigen Knaben mit Brechweinstein und Klistiren von Salz, Essig und Oel, auf welche er zulezt Mannatränkchen folgen lies, Fowler a. a. O. seinen Kranken mit Brechwurzel und abführenden Mitteln.

t) Libello, quo demonstratur, Stramonium &c.

u) Störk a. e. a. O.

u1) King a. a. O.

u2) Hufeland Iournal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. B. IX. St. 3. S. 91.

www.dlibra.wum.edu.pl

in einem halben oder ganzen Grane, höchstens bis zu drei Grane gegeben, in allzuheftigen Bewegungen öfters treffliche Dienste: als in der fallenden Sucht und andern Zukungen, selbst in solchen, welche ihren Grund in den Werkzeugen der Verdauung haben, oder von einer zurükgehaltenen Ausleerung kommen, vornemlich aber in solchen, welche auf einer leichten Verstopfung der Eingeweide, auf einem mechanischen Reiz, oder einer allzugrosen Empfindlichkeit der Nerven beruhen u3); auch in der Wuth wird er mit gutem Erfolge gegeben x). An der Volga nimmt man die Samen gegen Wechselfieber ein, und läßt bei Zahnschmerzen, nachdem man sie auf glühende Kohlen geworfen hat, den Rauch davon an die Zähne gehen y); auch die Blätter sind schon lange äuserlich als ein erweichendes Mittel gebraucht worden z).

---

u3) 1) Störk a. a. O. 2) Wadenberg de Stramonei usu in morbis convulsivis Upsal 1772. 3) Razoux diss. de cicuta stramonio, hyoscyamo et aconito. Nism. 1780. 4. 4) Hufeland a. e. a. O. S. 91. 92. 5) Lund K. Suenska Wetensk. Acad. Handlingar. B. XXIII. 1766. Doch hob dieses sogenannte Extrakt in einem Falle, den Störk anführt, die Krankheit nicht, und in einem andern schien sie darauf noch schlimmer zu werden, so wie sich auch Oberteuffer a. a. O. S. 91. über getäuschte Erwartung beklagt.

x) Drei glükliche Erfahrungen S. bei Störk a. a. O. andere Comment. Lipf. B. XI. S. 241. und Pajeot la Foreſt Recueil de la Societé de medecine à Paris. à Paris 8. B. IV. 1798. S. 331. zween fruchtlose Versuche. Siehe Comment. Lipf. a. e. a. O.

y) F. P. Falk a. a. O. II. S. 131.

z) Fränkische Samml. I. Th. S. 424.

www.dlibra.wum.edu.pl

β) Metel. Datura Metel Linn. Hummatu, Rheede Hort. Malabar. II. Pl. 28.

Diese Art ist ursprünglich in Asien und Afrika zu Hause. Ihr Stamm ist stark, wächst bis drei Schuhe hoch, und theilt sich in viele holzige Aeste. Ihre Blätter sind etwas haarig, und fast ohne allen Einschnitt; ihre Gestalt kommt der Gestalt eines Herzens nahe. Ihre Blumenkelche haben fast ganz unmerkliche Eken; sie sind beinahe rund und aufgeschwollen; ihre Blumenkrone ist weis, und hat eine lange Röhre. Ihre Samengehäuse hängen über, sind kugelrund, und enthalten eine Menge hellbrauner Samen.

Sie hat sich in Asien, so wie die erste Art in Europa und Amerika, durch ihre unglükliche Wirkung furchtbar gemacht. Sie berauscht a) vornemlich in ihren Samen, schläfert ein b), unterdrükt den Gebrauch des Verstan-

---

a) Zu dieser Absicht gebrauchen die Türken und Indianer eine Mischung, in welche ihre Samen kommen. Dänische Missionsberichte 29. Forts. S. 442. Kämpfer Amoenit. exotic. Fasc. III S. 650. Welsch hecatost. I. Obs. 57. Daher hielt sie Borrich Hermet. Aegypt. sapient. S. 129. u. f. für das Nepenthe der Alten.

b) Forskål a. a. O. S. 99. Rheede a. a. O. S. 49. Rumpf a. a. O. B. V. S. 824. Dazu gebrauchen sie die ostindischen Frauen, um ungehindert vor ihren Männern die eheliche Treue zu verlezen. Linschoten Navigat. et Itinerar. in Indiam oriental. Hag. 1599. c XXXI. et LXI. (sie scheint wenigstens seine Herba Dutroa zu sein). Bernier bei Schinz a. a. O. S. LXX. und die Diebe um ungescheut zu plündern. Garcias ab Orta Coloquios das simples y drogas he cousas medicinales da India. Goae 1563. L. II. 24.

www.dlibra.wum.edu.pl

des c) und der Sinnen d), erregt Zukungen e) und zuweilen den Tod f).

Sollte es wohl diese Art, oder der wilde Stechapfel, Datura ferox Linn. (Stramonium) Datura ferox, pomo crassioribus aculeis robustioribus Morison a. a. O. III. Sect. 15. Pl. II. Abb. 4.) sein, der ursprünglich in Sina zu Hause ist, und sich durch die beträchtlichere Stärke der obern

---

Sollte sie es sein, deren sich nach Marco Polo (bei Purchas a. a. O. III. S. 72.) Aloydine, ein eifrig mahomedanischer Fürst im mittägigen Theile Persiens, bediente, um seine Diener in einen Schlaf zu bringen, in welchem sie die wollüstigsten Träume hatten, und nachher erzählten, sie seien in Mahomets Paradiese gewesen?

c) Bald mit Lachen, bald mit Heulen. Bernier, Garzias, Kämpfer a. d. a. O. Rhazes Libr. ad Manf. VIII. Basil. 1544. c. 21. S. 199. Bartholetti Method. in dispnoeam, Bonon. 1033. S. 405. und es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Pflanze es war, durch deren giftige Kräfte das Heer eines Marc. Antonius von Sinnen kam. S. Triller Progr. de Planta quadam venenata, ejusque furioso effectu λιθοσροφω. Vitemb. 1765.

d) Vornemlich des Gesichts, Bernier, Garzias, Kämpfer a. d. a. O.

e) Sie sind aber nur übergehend; daher gebrauchen sie die Brachmanen, um ihren Vestalen, denen sie ein daraus, oder aus einer ähnlichen Pflanze zubereitetes Mittel heimlich beibringen, an dem Feste ihres Gottes Vishnu das Ansehen von Besessenen zu geben. Kämpfer a. a. O.

f) Rhazes a. a. O. Ihre Samen sind auch den Hünern tödlich, Forskål a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

zusammenstosenden Stacheln an seinem Samengehäuse auszeichnet, dessen Samen man noch in Sina und Tibet als ein starkes betäubendes Mittel gebraucht g), und dessen sich die Sineser vormals bedienten, ihr Bier so zu vergiften, daß diejenigen, welche es tranken, davon in Wuth geriethen; ein Betrug, der ihnen, nachher durch ein eigenes Gesez verboten wurde h). Auch Ives vermuthet i), daß es die Samen dieser Pflanze seien, deren sich die indianischen Frauenzimmer als eines geheimen Gifts bedienen.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch die übrigen Arten dieser Gattung, welche sich bisher noch durch keine unglüklichen Erfahrungen bekannt gemacht haben, hier eine Stelle verdienen, wenigstens hat auch Datura Tatula Linn. welche sich durch ihre herzförmige und gezahnte Blätter auszeichnet, einen schweren Geruch, und ihre Blumen und Samen sollen Beängstigungen verursachen k). Auch erwähnt l'Ecluse zweier Pflanzen von den luzonischen Eilanden, welche er zu dieser Gattung zählt l); von der einen soll das aus den Samen gedrukte Oel, wenn es in die flache Hand gerieben wird, Schlaf machen, und der aus der Wurzel gedrükte Saft mit Wein genommen zuerst tiefen Schlaf, dann einen einige Tage lang anhaltenden Wahnsinn; von der andern der Samen selbst auch in geringer Menge Schlaf verursachen; drüke man

---

g) Saunders Philosophical. Transactions B. XXIX. for the Year 1789. Th. I. S. 89.

h) Sprat history of the royal Society of London for the improvement of natural Knowledge.

i) a. a. O. II. S. 416.

k) Puihn a. e. a O S. 40.

l) Bei Rai a. a O. app. 3. 15.

www.dlibra.wum.edu.pl

die Hälfte eines Samengehäuses in Wein aus, so falle er in einen tiefen Schlaf mit starkem Schweiße und öfterm Trieb auf den Harn, und noch am dritten Tage, wenn er davon aufwache, behalte er noch eine Art Sinnlosigkeit.

5) Bilsenkraut, Hyoscyamus.

Die Arten dieser Gattung dauern niemals länger als zwei Jahre; sie haben gemeiniglich einen schweren äuserst unangenehmen und betäubenden Geruch, der lange an den Fingern hängen bleibt, mit denen man sie berührt hat. Stengel, Blätter und Blumenkelche sind über und über mit einem schmierigen, klebrichten Wesen und Haaren bekleidet. Ihr Stengel geht in Herbst darauf, ist dik, blattreich und nicht sehr hoch, und theilt sich in mehrere Aeste. Ihre Blumen stehen auf keinen oder nur ganz kurzen Stielen; der Kelch derselbigen hat ungefahr die Gestalt einer Gloke, und wird, wenn sich die Frucht ihrer Zeitigung nähert, unten etwas weiter; er theilt sich in spizige und ungleiche Abschnitte, verwelkt nach und nach, wird dabei immer steifer, und dient der reifen Frucht zur Bekleidung; ihre Krone hat eine traurige Farbe; der Gestalt nach kommt sie einem Trichter nahe, dessen Röhre kurz und ungleich ist, weit offen steht, und sich in eine weite Mündung verliert, die in stumpfe und ungleiche Abschnitte gespalten ist; ihre Staubfäden sind ungleich, unter sich geneigt, und purpurroth, und ihre Staubbeutel voll eines schwefelgelben Mehls; ihr Eierstok, der auf einem sehr kurzen Stiel sizt, ist rundlicht, und mit einem markigen Ringe umschlossen; er trägt einen dünnen und purpurrothen Griffel, der sich in ein dikes, rundes, vertieftes und unter sich geneigtes Köpfchen verliert. Ihr Samengehäus gleicht seiner Gestalt nach einem Ei; es ist ganz troken, und seiner

www.dlibra.wum.edu.pl

ganzen Länge nach mit starken Furchen bezeichnet; es hat einen Dekel, wie eine halbe Kugel, der, wenn die Frucht zeitig wird, von sich selbst abfällt; inwendig ist es durch eine dünne und durchsichtige Scheidewand in drei Fächer getheilt, und trägt auf eigenen sehr grosen Behältern, die an die Scheidewand gleichsam angeheftet sind, und ungefähr die Gestalt eines in der Mitte entzwei geschnittenen Eies haben, eine grose Menge kleiner gedüpfelter und rauher Samen, deren Gestalt einige Aehnlichkeit mit Nieren hat.

α) Gemeines Bilsenkraut, schwarzes Bilsenkraut, Bilsensamen, Dollkraut, Schlafkraut, Zigeunerkraut, Rindswurzel, Säubohnen, Teufelsaugen. Hyoscyamus niger Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 550.

Man findet es häufig in ganz Europa, an den unfruchtbarsten Stellen, wo es vornehmlich im Mai- und Brachmonat blüht. Seine Wurzel dauert zwei Jahre; sie ist lang und dik, runzlicht, von ausen braun, inwendig aber weis; ihr Geschmak ist fett und fad, und ihre Gestalt kommt der Gestalt einer Spindel in etwas gleich. Die übrige Pflanze ist über und über mit weichen ziemlich langen Haaren bekleidet. Der Stengel wird oft gegen eine Elle hoch, und theilt sich in Aeste, welche aus den Winkeln der Blätter entspringen; diese haben eine sehr ungleiche Gröse, und werden überhaupt immer kleiner, wie weiter sie nach oben stehen; sie umfassen den Stengel mit ihrem untern Theile genau, und haben zu beiden Seiten des Randes spizige, dreiekige Zähne, welche grose Buchten zwischen sich lassen. Seine Blumen sizen meistens einzeln und wechselsweise nur auf einer Seite des Stengels und der Aeste nach ihrer Spize zu, und bilden daselbst eine Art von lokern Aehren; sie haben eine gelblichte

www.dlibra.wum.edu.pl

Krone mit vielen sehr feinen purpurrothen Adern, die gleich einem Neze in einander laufen. Seine Samen sind schwarz.

Ob gleich diese Pflanze weder Pferden m), noch Hämmeln n), noch Kühen o), noch Schweinen p) schadet, und der Saft der Blätter zu zwei Lothen gegeben einem Hund durchaus nichts geschadet hat q), so lassen sie doch die Schafe stesten, dem Hornvieh schadet sie oft r), und Mäusen s), Gänsen t), Fliegen und andern Arten von Ungeziefer u) ist ihr Genus tödlich. In dem menschlichen Leibe erregen schon ihre

---

m) Vielmehr mischen Roßhändler den Samen unter Hafer, um die Pferde fett zu machen. Renard Iournal de medicine, chirurgie, pharma. B. 28. S. 243.

n) Ebendersf. a. a. O.

o) Kalm a. a. O.

p) L'Isle observat. on Husbandry. London 1757. B. II. S. 232.

q) Sprögel a. a. O. S. 19. §. XIV. Exp. XII. auch ein Scrupel des Extrakts hat einem andern nicht geschadet; doch hat ein halbes Loth ihn eingeschläfert, seinen Augenstern erweitert und ihm Erbrechen und Bauchfluß erregt. Störk Lib. quo demonstr. Stramonium &c. S. 281.

r) Hacquet a. e. a. O. I. S. 54.

s) Schreber in vermischten Schriften 6 Th. S. 285.

t) Bradley Country Gentlemans and Farmers monthly Director. Lond. 1736. S. 30. auch Hünern und Fischen.

u) Schreber a. e. a. O. nur dem cimici hyoscyami nicht, der sich so gar davon nähret.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ausdünstungen x) oder der äuserliche Gebrauch ihrer verschiedenen Theile unter der Gestalt eines Bades y), einer Bähung z), einer Salbe, die man in den After schmiert a), eines Klistirs b) oder eines Rauchs, den man in den Mund läßt c), gefährliche Zufälle. Sie sind aber noch weit

---

x) 1) Ephemer. Acad. Caes. Nat. Curios. Dec. III. a. 7. 8. Obs. 66. a. 9. 10. app. 179. 2) J. G. Gmelin Flor. Sibir. T. IV. S. 93. und 3) Haller an dem Beispiel des grosen Börhaave, da er aus dem Safte Pflaster machte. Hist. stirp. Helvet. B. I. S. 254.

y) Clauder Ephem. Acad. Caesar. Nat. Cur. Dec. II. A. 6. S. 362.

z) 1) Seliger ebendas. Dec. II. A. I. S. 340. 2) Grunwald ebendas. Dec. III. A. 9. 10. app. S. 178.

a) Einer solchen Salbe bediente sich ein Schäfer, und beredete sich und andere, er könnte ihnen dadurch nach Belieben das Vergnügen verschaffen, der feierlichen Zusammenkunft der Hexen beizuwohnen, Gassendi bei Garidell a. a. O.; auch zu Lacunas Zeiten bedienten sich die sogenannten Hexen einer solchen Salbe. S. dessen Annotat. in Dioscor. Lugd. 1554.

b) 1) Grunwald a. a. O. 2) La Serre Ephem. Acad. Caes. Nat. Curios. Dec. II. A. 6. S. 162. 3) Marquet venimecum de botanique. Par. 1773. B. II.

c) 1) Lobel Nova stirp. advers. Antw. 1576. S. 107. 2) J. Bauhin a. a. O. III. Th. 2. S. 627. 3) Jacobäus Act. Hafn. 1671. I. S. 209. cas. CXIV. 4) J. M. Faber Strychnomania Aug. Vind. 1677. S. 79. 5) Von Ruoff Nov. Act. Acad. Caes. Nat. Cur. vol. IV. obs. 59. S. 293. 6) Grunwald a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

weit gefährlicher, wenn Wurzel d) Kraut e) oder Sa-

d) 1) Phil. Transact. n. 429. 2) Iournal de Medecine, de Chirurg. et de Pharmacie. 1756. Fevr. 1763. Iuill. 3) Miller Figures of the moſt beautiful, uſeful, and uncommon Plants, Lond. 1760. Vol. I. und allgemeines Gärtnerlexikon aus dem Engl. überſ. 2. Th. Nürnberg 1772. S. 300. 4) Wepfer Hiſt. Cicut. aqueat. Baſil. 1716. S. 230. 5) S. Pauli Quadrip. bot. S. 247. 6) Alberti Iurisprud. medic. I. S. 271. 7) J. G. Gmelin Reiſe durch Sibirien III. S. 511. 8) Storch Abhandl. von Kinderkrankh. Eiſen. 1750. IV. S. 470. 9) Threlfeld Synopſ. ſtirp. Hibernic. Dubl. 1727. S. 12. 13. 10) Sauvages Noſolog. method. Th. III. I. S. 366. 11) P. Borellus Hiſtor. et obſerv. medic. phyſicar. Cent. IV. obſ. 45. 12) Raulin Vapeurs S. 269. 270. und Examen de la houille conſiderée comme engrais des terres. Paris 1775. 13) Willis de Anim. brutor. Amſtel. 1674. S. 309. 14) Schreber Samml. verſchiedener Schriften VI. B. S. 284. 15) Walther Schaz ſonderbarer Anmerkung. Leipz. 1715. 49ſte Anmerk. S. 259. 16) Blom Act. Acad. Suec. 1774. S. 52. 17) El. Camerer Diſquiſ. extempor. de venenorum indole et diiudic. Tub. 1725. und Act. Acad. Caeſ. N. Cur. vol. I. S. 250. 18) G. W. Wedel Diſp. de opio. Iena 1749. und Ephem. Acad. Caeſ. N. Cur. Dec. I. A. 3. S. 37. obſ. 21. 19) Hünerwolf ebendaſ. Dec. III. A. 2. obſ. 92. 20) Schulz ebendaſ. A. 4. 5. S. 120. obſ. 124. 21) Büchner Miſcellan. phyſic. med. mathem. 1729. S. 60. 22) Patouillart Hiſtoire de l'Acad. de Par. 1737. S. 78. 23) Navier Recueil periodique d' obſervations de medecine &c. B. IV. S. 113.

e) La Serre, Clauder, Grunwald, Seliger, Sauvages u. d. a. O. Chevalier und Bertrand Hiſt. de l'Acad. de Par. 1709. S. 50. Auch in der Theurung von 1771. bemerkte einer meiner Freunde, der nun ver-

www.dlibra.wum.edu.pl

men f) aus unüberlegter Kühnheit des Arztes g) oder aus Ungeduld des Kranken h), oder aus sträflicher Unwissenheit

---

storbene Reutlingische Stadtarzt Weinmann, unter dem gemeinen Volke auf den Genus dieses Krauts Todesfälle.

f) 1) Act. Helvet. T. V. S. 333. 2) Matthiol Comment. in lib. VI. Dioscor. S. 1046. 3) Salmuth observat. medic. Brunsuig 1648. Cent. II. obs. 88 S. 103. 4) Helmont Ort. med. S. 306. 5) Alexandrinus bei Schenk in Observ., med. rar. nov. admirab. et monstr. L. VII. S. 879. 6) Barrere Observ. d' anatom. 1753. 7) Bierling Advert. curios. Ien. 1679. Cent. I. n. 2. S. 14. 8) Börhaave praelect. academ. Edit. Halleri T. VI. Goett. 1744. S. 250 9) Blair Miscellan. observat. in Physik, Anatomy, Surgery and Botanik. London. 1718. S. 82. 10) P. Spindler observ. cent. 1691. Frankf. 11. obs. 13. S. 25. 11) Walther a. a. O. 41. Anm. S. 137. 12) Garmann Ephem. Acad. Caes. Nat. Curios. Dec. III. a. 78. 13) Hoyer Act. Acad. Caesar. Nat. Curios. vol. V. S. 261. 14) J. Conr. Gmelin bei Ehrhard in Commerc. litt. Noric. 1736. S. 101. 102. 15) Planchon Journal de medec. chirurg. et pharmac. &c. B. XIX. S. 42. u. f. 16) Costa ebendas. B. XXX. Fevr. S. 134. 17) Sloane Philos. Transact. nr. 457. 18) Miller Gärtnerlexikon S. 541. 19) Göz dritte kleine Harzreise. S 186. 187. 20) Journal für Deutschland 1785. St. 9. S. 263. 21) J. M. Faber 22) Lobel. 23) J. Bauhin. 24) G. W. Wedel 25) Grunwald. 26) Jacobäus. 27) v. Ruoff. 28) v. Haller a. d. a. O.

g) Seliger, Grunwald, und J. K. Gmelin a. d. a. O.

h) Act. Helv. a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

der Kräuterhändler, Apotheker und Köche i), oder aus verabscheuungswürdiger Bosheit vorsezlicher Bösewichter, bald als Arzenei, bald als Speise hinunter geschlungen werden.

Die Wirkungen dieses Gifts sind aber nach der Art und Gestalt, unter welcher es beigebracht wird k) nach seinem Gewichte l), nach dem Alter m), der Lebensart n),

---

i) So wurde die Wurzel in den Apotheken statt des rothen Enzians verkauft Miller, Figures &c. statt der französischen Rapunzel (Oenoth. biennn) Ehendess. Gärtnerlexicon a. d. a. O. statt der Wegwarten als Salat. Wepfer und Navier a. d. a. O. statt der Pastinakwurzeln, Willis und Schreber a. d. e. a. O. statt Rüben Walther a. a. O. gespeist; so wurde der Samen für Dilsamen, Alexandrinus und Salmuth a. d. a. O. für Mohnsamen, Walther a. a. O. die ganze Frucht für Haselnüsse, Sloane a. a. O. genossen. Vielleicht war es eben die Wurzel dieser Pflanze, die zu Brokesby's Zeiten statt des Enzians in Apotheken verkauft wurde. Philos. Transct. nr. 486. ihre Gestalt und äuserliches Ansehen, selbst ihr Geschmak ist aber doch zu sehr verschieden.

k) Gelinder wirkt sie in Salat, als unter einer andern Gestalt; gelinder kalt, als warm; gelinder alt, als frisch; gelinder zum Extrakt eingekocht, als roh; gelinder äuserlich angebracht, als innerlich eingenommen.

l) Ein halber Skrupel des Samens stürzt in die größte Lebensgefahr, Ehrhard; auf einen Skrupel sah J. K. Gmelin die fallende Sucht, auf ein halbes Loth, Helmont a. d. a. O. Raserei erfolgen.

m) Stärker scheint sie auf Kinder, als auf Greise, und auf diese stärker, als auf Leute von mittlerm Alter zu wirken. G. W. Wedel a. a. O.

n) So verfielen die Studenten in Wuth, der Koch in tiefen Schlaf. Schulze a. a. O. Bauern starben dahin.

www.dlibra.wum.edu.pl

und der übrigen Beschaffenheit des Menschen, der das Unglük gehabt hat, in diese Gefahren zu gerathen stufenweise, und selbst auch in ihrer Art verschieden, bald übergehend, bald bleibend, bald anhaltend, bald nachlassend, bald abwechselnd, bald gelinder, bald grausamer, bald mehrere bald wenigere beisammen. Auf den Genus dieser Pflanze zeigt sich bald ein leichter Wahnwiz o), bei welchem die Kranken bald frölich p), bald lächerlich q), bald ruhig r), bald traurig s) sind, oder von Hexen träumen t); bald ist dieser Wahnsinn

---

S. Paulli a. a. O. Sachwalter, Studenten, Mönche u. a. wurden gerettet. Schulze, Helmont, Wepfer, Sauvages, Wedel, Chevalier, Grunwald a. a. O.

o) Act. Helv. Haller, Sauvages, Wedel, J. G. Gmelin a. d. a. O. Bierling Adversar. curios. Cent. I. Ien. 1679. 4. schon Xenophon scheint in Sokrates Gespräch mit Kritobul Οικονομικος κεφ. α. Opp. omn. Ed. s. Oxford B. IV. S. 5. "ἐι μη γε και τον ὑοσκυαμον καλουμενον χρηματα ἐιναι, φησομεν ὑφ' οὑ οἱ φαγοντες ἀυτον παραπληγες γινονται„ auf eine solche Wirkung hinzudeuten.

p) Lobel a. a. O.

q) 1) Wepfer a. a. O. 2) Borellus Hist. et observat. medic. physic. 1670. IV. obs. 45. S. 312.

r) Sauvages, Wedel, Haller, J. G. Gmelin, Lobel, Borellus, Wepfer a. d. a. O.

s) Patrouillart a. a. O.

t) Lacune und Garidell a. d. a. O. Sie fielen davon in einen tiefen 24 Stunden lang anhaltenden Schlaf, und erzählten nach dem Erwachen Wunderdinge, welche sie auf dem Bloksberge gesehen hätten. i) J. G. Göbelmann de magis veneficis et lamiis Francof. 1601. 4. L. II.

www.dlibra.wum.edu.pl

mit Fieber begleitet u), und so wohl deswegen, als auch an sich selbst gefährlich; er hält länger an x) oder kommt zu gewissen bestimmten Zeiten wieder y); der Kranke wird zänkisch z), öfters nach und nach rasend a), daß man ihn für einen Besessenen halten sollte b), oder daß er sich und andern Gewalt anzuthun sucht c), oft aber wird er ganz sinnlos d), unempfindlich, und gegen alle äuserliche Gegen-

---

c. 4. n. 24. 2) A. Lerchheiner Bedenken von der Zauberei. Heidelberg 1585. 4. K. 13. S. 117. Sollte diese Pflanze nicht auch bei den Götterſprüchen Apolls zur Begeisterung der Pythias und zu den Träumen der Fragenden gebraucht worden sein, und davon den Namen: Herba Apollinaris erhalten haben? Möhsen a. a. O. S. 441.

u) Hieher scheinen die meisten Beobachtungen unter x, y, z, a. zu gehören.

x) Barrere und Grunwald a. d. a. O.

y) Grunwald a. a. O.

z) Aus Bartholet, Ettmüller Colleg. pract. doctr. Th. I. S. 880. Schulze, Grunwald, Garmann a. d. a. O. Daher scheint das Bilsenkraut den Namen: Altercum erhalten zu haben. Scribonius Largus de Compoſit. medicam. nr. 187.

a) Patouillart, Planchon, Costa, Miller, Büchner, Schulze, Grunwald, Faber, Walther, Schreber, Raulin a. d. a. O. Plinius Hist. mund. cur. Dalech. Lugd. 1606. L. XXVI. S. 562.

b) Matthiol a. e. a. O.

c) Faber a. a. O.

d) Act. Helv. S. Paulli, Helmont, Hünerwolf, Alexandrinus, Faber a. d. a. O. bei zween Knaben so sehr, daß man sie als todt hinweg trug, Göze a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

stände gleichgültig e). Sehr gewöhnliche Folgen sind eine Art von Berauschung oder von schwerem Kopfe f), Schwindel g), unterbrochener Gebrauch aller äuserlichen Sinne h), ein verdunkeltes i), geschwächtes k), falsches l) oder gedoppeltes m) Gesicht, oder ein gänzlicher Verlust desselbigen, Entzündung der Augen n), Steifigkeit und ungewöhnlicher Glanz derselbigen o), Stammeln p) und gänzlicher Verfall der Sprache q), Unempfindlichkeit in den obern Gliedern r),

---

e) Iournal de Medecine &c. 1756. Fevr. Hünerwolf, J. Bauhin, Wepfer, J. G. Gmelin, Wedel, Ehrhart und Costa a. d. a. O.

f) Alberti, Wedel, Kobel und von Börhaave, Haller a. d. a. O.

g) Philos. Transact. n. 429. Sloane, Miller, Jacobäus, Hünerwolf, Alberti, J. G. Gmelin, Wepfer, Grunwald a. d. a. O.

h) La Serre, S. Paulli, Ehrhart und J. G. Gmelin a. d. a. O.

i) Sauvages, Hünerwolf, Sloane, nach einem Versuch, den von Swieten an sich gemacht hatte, Cranz a. d. a. O.

k) Wepfer a. e. a. O.

l) Daß die Kranken glaubten, die Buchstaben, die sie vor sich hätten, lebten alle und bewegten sich, Wepfer, daß sie alles scharlachroth sahen, Patouillart a. e. a. O.

m) Patouillart a. a. O.

n) Hünerwolf a. a. O.

o) Navier a. a. O.

p) Costa a. a. O.

q) Act. Helv. a. a. O.

r) Patouillart, Sauvages a. d. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Lähmung auf einer Seite s), unüberwindliche Neigung zum Schlafe t), tiefer u), oft lange anhaltender Schlaf x), in welchem der Kranke die Augen öfters offen y), und mit den fürchterlichsten Träumen zu kämpfen hat z); nicht selten endigt sich dieser in Schlagfluß a); bei einigen hat man nach dem Tode die Blutgefäße der Hirnhäute ganz strozend von Blut b) und in dem Magen schwarzblaue Fleken gefunden c). Einige klagen über Schwachheit des Kopfs d) und Gedächtnisses e), über Krämpfe f) und Zukungen, die sich bald über den ganzen Leib verbreiten g), bald nur in den Handen,

---

s) Clauder a. a. O.

t) Haller a. a. O.

u) Act. Helv. J. G. Gmelin, Hagedorn, Wedel, J. Bauhin, Bierling a. d. a. O.

x) Schulze, Hünerwolf, Alberti, Sloane a. a. O.

y) Miller, Hünerwolf a. d. a. O. Auch sollen sich die Zigeuner zum Theil so, daß sie etwas davon an ein Trinkglas reiben, dieser Pflanze bedienen, um die Leute, welche sie dazu ausersehen haben, besser bestehlen zu können. Göze a. e. a. O. 1787. 188.

z) Planchon a. a. O.

a) Ebenders. a. a. O.

b) Ebenders. a. a. O.

c) Barrere a. a. O.

d) Jacobäus a. a. O.

e) Das erfuhr van Swieten, Cranz a. d. a. O.

f) J. K. Gmelin, Hünerwolf, Alberti a. d a. O.

g) Weinmann, El. Camerer, Hünerwolf, Costa, Patouillart, Planchon, Schreber, Raulin a. d. a. O. bei zween Knaben Journal für Deutschland a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

dem Geſichte h), den Augen i) dem untern Kiefer k), oder dem Schlunde l) ausbrechen. Einige zittern nur in den Gliedern m); bei andern kommt es zu Anfällen einer wahren fallenden Sucht n); öfters klagen die Kranken über Schwachheit o) und Schmerzen des ganzen Leibes p), zuweilen empfinden ſie nur die leztern, oder doch weit grauſamer im Kopfe q) oder Unterleibe, oder in den Gedärmen r); bei einigen zeigen ſich merkliche Fehler in den Werkzeugen der Verdauung, Ekel vor allem Eſſen s), Waſſerſcheue t), leere Reize zum Erbrechen u) oder auch wirkliches Erbrechen, das oft lange anhält x), Aufſtoſſen und Blähungen y), ein Beifen z) oder

---

h) Ein ganz verwirrtes Geſicht und das ſardoniſche Gelächter bemerkten Act. Helv. und Patouillart a. d. a. O.

i) Act. Helv. J. K. Gmelin und Alberti a. d. a. O.

k) Zahnknirſchen bemerkte J. K. Gmelin a. a. O. Mundſperre. Göze a. e. a. O.

l) Hünerwolf und Sauvages a. d. a. O.

m) Alberti J. K. Gmelin, von dem Schneider, Wepfer a. d. a. O.

n) Seliger, El. Camerer, J. K. Gmelin, Faber und Planchon a. d. a. O.

o) Act. Helv. Navier, Sauvages a. d. a. O.

p) Wepfer a. a. O.

q) Chevalier, Sauvages, Planchon, Coſta a. d. a. O.

r) Wepfer und Coſta a. d. a. O.

s) Hünerwolf und Coſta a. d. a. O.

t) Barrere und Coſta a. d. a. O.

u) J. G. Gmelin a. a. O.

x) Das zuweilen heilſam iſt. Hünerwolf a. a. O.

y) Alberti a. a. O.

z) Ebenderſ. a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

ein anderer heftiger Schmerz in dem Magen a), Entzündungen in demselbigen, die leicht in Brand übergehen b). Nicht selten finden sich auch grausame Bauchflüsse c), ein Aufschwellen des Unterleibes d) Geschwulst in den Gelenken e), unauslöschlicher Durst f), Trokenheit in dem Munde, auf der Zunge und in dem Schlunde g) ein; so haben auch die Aerzte auf den unfürsichtigen Gebrauch dieser Pflanze kalte Schweisse h), hartnäkige Wassersucht i), unerträgliches Juken auf der Haut k), eine verhinderte Ausleerung des Harns l), verschiedene Fehler in dem Umlaufe des Geblüts, Fieber m), Herzklopfen n), Ohnmachten o), plözliches Erblassen p), oder eine schwarzblaue Farbe über den ganzen Leib, oder doch über das Gesicht q), einen schwachen, wankenden, schnellen, un-

---

a) Alberti und Miller a. d. a. O.
b) Barrere a. a. O.
c) Die allerdings von einer Schwäche der Gedärme kommen. Hünerwolf a. a. O. Schlevogt de virtute Hyoscyami cathartica. Ien. 1715.
d) Alberti, Walther und Blair a. d. a. O.
e) Clauder a. a. O.
f) Sloane und Wepfer a. d. a. O.
g) Miller und Wepfer a. d. a. O.
h) Alberti a. a. O.
i) Barrere a. a. O.
k) Costa a. a. O.
l) Chevalier und Sauvages a. d. a. O.
m) Blanchon, Costa, J. K. Gmelin a. d. a. O.
n) Alberti a. a. O.
o) Hünerwolf, Alberti a. d. a. O.
p) Alberti a. a. O.
q) El. Camerer und Costa a. d. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

terbrochenen und unordentlichen Aderschlag r), unerträgliche Hize in dem ganzen Leibe s), Aufschwellen der Adern an dem Halse und dem Gesichte t), einen schweren Athem u), unausstehliche Bangigkeiten x), weibliche Unfruchtbarkeit y), und nicht selten den Tod z) folgen gesehen.

Geschichte.

In dem Benediktinerkloster zu Rheinau, bereitete man statt des Abendessens einen Salat zu, zu welchem Wegwartwurzeln kommen sollten. Diese waren in dem Klostergarten in einem Beete mit dem Bilsenkraute gewachsen; man grub beide aus, und der Gärtner band beide, jede in ein abgesondertes Bündel, damit sie der Knabe, der dieses Geschäft auf sich hatte, nachher in die Küche tragen sollte. Dieser überbrachte, da er von der Sache nichts wußte, in Abwesenheit der Vorgesezten von dem Garten, beide Wurzeln unter einander dem Küchenmeister, und dieser brachte sie gekocht auf die Tafel. Beinahe alle, welche in dieser Gesellschaft

---

r) Act. Helv. a. a. O.

s) Costa a. a. O.

t) Ebendersf. a. a. O.

u) Hünerwolf a. a. O.

x) Hünerwolf, Wedel, Alberti, El. Camerer a. d. a. O.

y) Ruoff a. a. O.

z) Walther Thesaur. medic. chirurg. obsevat. Lipf. 1715. nr. 49. Weinmann, Marquet bei Bauron. S. Paulli bei einem Knaben, Wedel a. d. a. O. und Journal für eutschland 1785. St 9. S. 203. Bei einem Kinde, Walther a. a. O. Bei einem Mann. Schreber a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

speisten, bekamen besonders durch die diken und fetten Wurzeln, die sie zuvor eben nicht häufig gesehen hatten, noch mehr Begierde zum Essen, und genossen, troz der Fastenzeit, desto mehr davon. Weil aber eine grose Schüssel davon aufgetragen wurde, und doch die Fastenordnung nicht übertreten werden durfte, so blieb auch dem Schuster und Schneider in dem Kloster etwas übrig. Bald darauf gieng ein jeder zu seiner Zeit schlafen; aber auch schon damals zeigten sich einige Zufälle, und das Gift der gespeisten Wurzeln fieng nach und nach an sich zu verbreiten. Einige klagten über Schwindel im Kopfe, andere über eine ungewöhnliche Trokenheit auf der Zunge und den Lippen, über rauhen Hals, über Grimmen und Schmerzen in allen Gliedern; einer unter ihnen wollte dem Brennen in seinem Gaumen durch ein Gurgelwasser wehren, aber die Zunge war wie gebraten und blieb bei allen Mitteln unverändert. Allein Nachts um zwölf Uhr, als die Mönche zum Gebet gewekt wurden, zeigte sich erst die traurige Veränderung, welche mit einigen vorgegangen war, in ihrer wahren Stärke: einer unter ihnen war so von Sinnen und Kräften, daß man gänzlich an seinem Aufkommen verzweifelte, und ihn auf die Ewigkeit vorbereitete; ein anderer bildete sich ein, er bisse Nüsse auf, und würfe die Kerne seinem Finken vor, trieb mit einer Hand die Pfauen hinweg und murmelte vor sich hin: fort ihr Schelme, komm Finkli ꝛc. ein anderer umarmte in seiner Zelle den Ofen und bildete sich ein, er klettere einen Baum hinauf; ein anderer stemmte die Hände in beide Seiten, krümmte sich mit dem ganzen Leibe, und schrie: die Eingeweide wollten ihm bersten; von denen, die noch in den Chor gekommen waren, um ihre frühe Andacht zu verrichten, konnten einige kaum die Augen öfnen oder lesen, oder, wenn sie

www.dlibra.wum.edu.pl

es auch konnten, brachten sie Worte und ganze Perioden hinein, welche nicht hinein gehörten, und mußten also wieder hinweggehen; einer unter ihnen, der für sich besonders beten wollte, hielt, als er das Buch öfnete, die Buchstaben für belebt, und glaubte einen ganzen Haufen von Ameisen zu sehen, welche ohne Ordnung unter einander liefen, daß er davon keine Sylbe, geschweige denn ein Wort, oder mehrere Worte im Zusammenhang heraus bringen konnte. Lächerlich war es auch den Schneidermeister zu sehen, der den andern Morgen wieder arbeiten wollte, und doch blinder als sein Stuhl zu sein schien, da er die Nadel weder selbst einfädeln, noch die von seinen Jungen eingefädelte Nadel gebrauchen konnte, ohne sich bei jedem Stich in den Finger, oder das Knie zu stechen. Selbst derjenige, der die Nachricht dem Arzte überschrieb, wäre nicht besser davon gekommen, wenn ihn nicht der verschiedene Geschmak der grösern Wurzeln abgeschrekt, und ihm die kleineren vorzüglicher gemacht hätte. Mit den erzählten Uebeln hatten einige bis in den Morgen zu kämpfen, und niemand wußte noch die Quelle derselbigen: da sie aber fast alle getroffen hatten, so schlos man mit vieler Wahrscheinlichkeit, daß sie aus der Küche geflossen war. Deswegen fragte man erstlich bei dem Koch nach, was er gestern Abends zu dem Salat genommen hätte, und da dieser betheuerte, daß er, auser einigen Wurzeln, die ihm der Gärtner geschikt, und die er auf die gewöhnliche Art gekocht hätte, nichts auf den Tisch gebracht habe; so kam die Untersuchung an den Gärtner. Dieser gestund nun die Sache: er hätte nemlich zweierlei Wurzeln, von dem Bilsenkraut und von den Wegwarten, mit einander ausgegraben, und von einander abgesondert, er wüßte aber nicht, ob sie nicht vielleicht des Gärtners Junge aus Versehen untereinander ge-

www.dlibra.wum.edu.pl

bracht und dem Koch gegeben habe. Als man nun auch den Knaben fragte, so gestund dieser, er hätte alles, was er ausgegraben gefunden hätte, in die Küche getragen. Da nun der Vorsteher des Klosters den Grund dieser Ereignisse einsahe, so lies er einen benachbarten Arzt rufen, der bei Zeiten erschien, und durch angemessene Mittel alle Kranke nach und nach wieder herstellte. Ein einiger unter ihnen, der mehr von den Wurzeln gespeist hatte, als die übrigen, behielt noch ein Andenken davon; sein Gesicht, das zuvor recht scharf gewesen war, wurde ihm so stumpf, daß er genöthigt war, eine Brille zu gebrauchen a).

Die Rettungsmittel, und die Art und Ordnung, in welcher sie gebraucht werden, sind hier gänzlich die nemlichen, die ich bereits bei dem Stechapfel und in der allgemeinen Anleitung angegeben habe; schon Wedel b) empfiehlt dagegen vorzüglich Säuren.

Dieser Erfahrungen ungeachtet haben schon die ältesten Aerzte verschiedene Theile dieses Gewächses gebraucht: vornemlich die Samen, und das daraus gedrükte, oder damit gekochte Oel, die frischen Blätter, und der daraus, so wie auch der aus dem Stengel gedrükte Saft, waren unter ihren vorzüglichsten Mitteln, Schmerzen und krampfhafte Zufälle zu stillen, und anfangende Entzündungen zu zertheilen. Sie bedienten sich ihrer bald roh und unvermischt, bald unter der Gestalt einer Bähung, eines Breiumschlags c), einer

---

a) Wepfer a. e. a. O.

b) Ephemer. Acad. Caes. Nat. Curios. Ann. III. ad 1672. obs. 14.

c) So verordnete sie noch neuerlich ein französischer Arzt la Brousse in herumziehenden Schmerzen der Glieder,

Salbe oder eines Pflasters, oder eines Klistirs, oder sie liessen den Rauch davon an den schmerzhaften, oder sonst angegriffenen Theil gehen.

Allein damit noch nicht zufrieden, wagten sie es sogar, eben dieses Gewächs innerlich zu gebrauchen; schon Celsus d) verordnete das damit gekochte Wasser in der Hirnwuth. Die Aerzte nach ihm gaben die Samen von acht bis zu zwanzig Granen in schmerzhaften und krampfigten Zufällen, in Blutflüssen und Bauchflüssen, Turquet de Mayerer e) in der Fallsucht, und neuerlich fand Störk f) und die Aerzte, die in seine Fußstapfen traten g), in dem aus dem Kraute gedrükten und zur Dike eines Extrakts eingekochten Safte von zwei bis zu zwanzig Granen gegeben, ein herrliches Mittel in der Milzsucht, Schwermuth, Raserei, und verwandten Krankheiten, in krampfigen Zufällen, wenn sie ihren Grund

---

die mit Lähmung der Schenkel, und Zittern an dem ganzen Leibe verbunden waren Iournal de Medec. &c. B. XXIX. Par. 1768. Dec. 3. S. 503.

d) a. a. O. B. III. c. 18. L. V. c. 25.

e) Syntagm. prax. medic. B. I.

f) Libell. quo demonstratur, Stramonium &c. Libell. quo continuantur experimenta et observat. circa nova sua medicamenta. Vindob. 1765. C. VI. Libell. de Flammula Iovis, et libell. de Pulsatill. nigr. usu medic. &c.

g) 1) Whytt on nervous disorders S. 363. 364. 2) Schinz a. a. O. 3) Collin observat. T. II. Art. 3. 4) Gesner Sammlung von Beobachtungen aus der Arzeneigelahrheit und Naturkunde I. Th. 17. St. 5) Lentin a. a. O. 6) Baldinger Pharmacop. Edinburg. additam. auct. Brem. 1776. S. 168. 7) Oberteuffer a. a. O. S. 87. 88. 8) Hufeland ebend. S. 88. 91.

www.dlibra.wum.edu.pl

nicht in organischen Fehlern haben, in Blutflüssen aus der Brust, und in grausamen Schmerzen, vornemlich in dem Bauchgrimmen, das von einem Darmbruche kommt.

β) Weisses Bilsenkraut. Hyoscyamus albus Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 111.

Man trift es in den mittägigen Gegenden Europens, in Afrika, und den Morgenländern wild an. Es ist nur ein Sommergewächs, treibt aber früher im Jahre, als das schwarze. Stengel und Blatter sind, wie bei dem schwarzen, nur sind die lezten kleiner und dichter, mit weissen Haaren bekleidet; sie sizen auf eigenen Stielen; seine Blumen sind bald gröser, bald kleiner; ihr Kelch ist weisser, als bei dem schwarzen, und gestreift; ihre Krone ist wie bei diesem, und in der Tiefe bald grün, bald schwarzroth. Die Samen sind weislicht.

Auch diese Art erregt die gleichen Zufälle, die auf den Gebrauch des schwarzen Bilsenkrauts erfolgen, nur daß sie etwas schwächer sind h); der Same vornemlich hat in mehreren Fällen zu einem Gewicht von fünfzehn bis fünf und zwanzig Granen i), Schlummer, Zuckungen, Aufspringen der Sehnen, Gefühllosigkeit k) mit übergehender Unmöglichkeit zu schlingen, Sprachlosigkeit und Wahnwiz l) oder auch

---

h) J. Bauhin a. a. O. III. Th II. S. 628.

i) Hamilton New Essays of a Society at Edinburgh. 1756. II. nr. 10.

k) Ebendersf. a. e. a. O.

l) Targioni Toppetti relazioni d' alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservar le produzioni naturali e gli antichi monumenti d' esse Firenze. B. VI. S. 279.

www.dlibra.wum.edu.pl

einen etwas länger dauernden, aber gelinden Wahnsinn m) erregt. Sein Same wurde von den alten Aerzten häufig als schmerzstillendes Mittel gebraucht.

γ) Goldgelbes Bilsenkraut. Hyoscyamus aureus Linn. Bulliard a. e. a. O. Pl. 20.

Es wächst in den Morgenländern, auch in Kandien und Malta, und ist ein zweijähriges Gewächs, weicht auch von dem weissen durch seine gezahnte und spizige Blätter, durch seine goldgelben in der Tiefe schwarzrothen Blumen, und durch seine unter sich hängenden Früchte ab. Es soll Zittern und Schwachheit verursacht haben n). Verdient es demnach hier eine Stelle?

δ) Abgestuztes Bilsenkraut. Hyoscyamus muticus Linn. Pr. Alpin exot. Abb. S. 192.

Es ist in Egypten und Arabien zu Hause, und wie das Goldgelbe, ein zweijähriges Gewächs, weicht aber von diesem durch seine eirunde Blätter mit spizigen Winkeln, durch seine Blumen mit abgestuztem Kelche, und durch seine unzertheilte Deckblätter unter denselbigen ab. Es soll einige Tage lang anhaltenden Wahnwiz erregen o).

ε) Sibirisches Bilsenkraut. Hyoscyamus physalodes Linn. Amoenit. academ. B. VII. Pl. VI. Abb. 1.

Es wächst in Sibirien an den Wasserfällen der Angara, und hält mehrere Jahre aus. Sein Stengel ist rundlicht,

---

m) Spindler a. a. O. obs. 14.

n) Buihn a. e. a. O. S. 40.

o) Ebenderf. a. e. a. O. S. 42.

www.dlibra.wum.edu.pl

licht, saftig, blaßgrün und mit einer weissen etwas krausen Wolle bekleidet. Seine zahlreichen Blätter fühlen sich fett an, sind mattgrün, nach der Spize zu aber etwas braun, in ihrem Umfange eirund, und an ihrem Rande ganz ohne Einschnitt; sie sizen auf kurzen borstigen Stielen, und haben in ihren Winkeln noch zwei kleine Nebenblätter. Seine Blumen sizen ohne eigene Stiele an dem Gipfel des Stengels in Köpfchen beisammen; ihr Kelch ist mit einer kurzen Wolle bekleidet und so aufgebiasen, daß er beinahe eine Kugel vorstellt; er spielt aus der grünen Farbe in eine matte purpurrothe; ihre Krone aber aus der blauen in die Purpurfarbe, die, in der Tiefe dunkler ist; ihre Staubfäden sind ganz violblau, haben aber einen weislichten Staub; ihr Eierstok ist länger als die Staubfäden und röthlicht; ihr Griffel ist dünn, und so lang als der Kelch, und ihre Narbe weislicht.

Wurzel und Blätter erregen in einem Brei oder unter einer Kräutersuppe genossen, Berauschung und einen solchen Wahnsinn, daß man, z. B. einen Strohhalm für einen Balken, einen Tropfen Wasser für ein unerschöpfliches Meer u. d. ansieht, und sich die fürchterlichsten Vorstellungen von einer nahen Gegenwart des Todes macht p); selbst das Bier, das eine Zeit lang darüber gestanden, oder damit gegohren hat, äusert solche Wirkungen q), und dient den Leuten, die an dem Angarastrom wohnen, um sich unter einander solche Possen zu spielen. Die russischen Kaufleute sollen die Wur-

p) J. G. Gmelin Reise durch Sibirien 3. Th. Gött. 1752. S. 84. 85.

q) 1) J. G. Gmelin a. e. a. O. 2) J. P. Falk a. a. O. II. S. 132.

www.dlibra.wum.edu.pl

zel gegen die fliesende Goldader und das Blutharnen gebrauchen r); auch bei Zahnschmerzen von hohlen Zähnen, in welche sie gestekt wird s).

ζ) Schlafmachendes Bilsenkraut, Walkenbaum. Hyoscyamus Scopolia Linn. Scopolia. Jacquin observat. bot. B. I. Vienn. 1764. Pl. 20.

Es wächst in verschiedenen Gegenden Teutschlands, vornemlich bei Idria in Wäldern, auch nach einigen Nachrichten in Schottland wild, und hält mehrere Jahre aus.

Es hat in seinem äuserlichen Ansehen sehr vieles mit der gemeinen Wolfskirsche gemein; aber seine Wurzel ist gros, knollig und weis; sein Stengel wird selten über einen Schuh hoch, ist viereckig, und theilt sich immer in zween; seine Blätter sind schmal, stark geadert, ganz unzertheilt, und in ihrem Umfange beinahe eirund; sie sind ganz ohne Haare, sizen gemeiniglich wechselsweise, zuweilen einander gerade gegen über, auf eigenen Stielen. In ihren Winkeln stehen die fadendünnen, langen Stiele, an deren jedem nur eine Blume hängt, einzeln. Diese haben einen ganz glatten aufgeblasenen Kelch, der einigermasen die Gestalt einer Gloke hat; ihre Krone hat beinahe die gleiche Gestalt, und eine traurige purpurblaue Farbe; ihre Staubfäden sind gerade, hin und wieder mit Borsten besezt, und kürzer als der Staubweg. Sein Samengehäus ist rund, wie eine Kugel, und schwarz, oder schwarzbraun.

---

r) J. G. Gmelin a. e. a. O.

s) J. P. Falk a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Es erregt bei Hornvieh t) und Menschen u) allerlei gefährliche Zufälle. Es ist sehr wahrscheinlich, daß es dasjenige Kraut ist, welches vormals die Schotten zu einer Kriegslist gebrauchten, um die Dänen, welche sie überfallen hatten, im Schlafe zu überraschen und zu überwinden. Sie mischten seinen Saft unter Bier, Wein und Brod, und überliefen diese Lebensmittel den eingebildeten Siegern; diese brachten sie in ihr Lager, und genosen sie ungescheut; sie verfielen davon in einen tiefen Schlaf, und die Schotten hatten ihre Absicht erreicht x).

Der genannte Arzt Wier gebrauchte es inzwischen als ein durchdringendes Mittel in verschiedenen der hartnäkigsten Krankheiten.

η) Egyptisches Bilsenkraut, Hyoscyamus Datura Forsk.

Sein Stengel ist mit feinen, dicht in einander gewebten Haaren bekleidet. Seine Blätter sizen auf eigenen Stielen, und haben hin und wieder an ihrem Rande Einschnitte; sie haben beinahe die Rundung eines Eis, nur laufen sie an beiden Enden spizig zu. Seine Blumen stehen in einer Aehre beisammen.

Forskål fand es in Egypten, und sahe auf seinen Gebrauch Wahnsinn y) erfolgen, der erst nach einigen Tagen vorüber gieng.

---

t) Hacquet a. e. a. O. S. 53.

u) Wier Arzneybuch von dem Scheurbauch, von den Waren ꝛc. Frankfurt 1588.

x) Buchanan Rerum Scoticat. Histor. Traject. ad Rhen. L. VII. S. 190.

y) a. a. O. S. 45.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ohne Zweifel kommen auch die übrigen Arten dieser Gattung in ihren schädlichen Kräften mit den angeführten überein; da ich aber keine Erfahrung vor mir habe, welche dieses bestätigen könnte, so wollte ich ihrer hier wenigstens nicht namentlich gedenken.

6) Gelber Rosenlorbeer, Azalea pontica Linn. Pallas Flor. rossic. I. Pl. 69.

Dieser Baum wird oft Manns hoch, oder noch höher, und sein Stamm zuweilen so dik, als ein Schenkel; rund um sich herum hat dieser mehrere kleine Stengel, und theilt sich in viele ungleiche, schwache, brüchige und inwendig weisse Zweige, die mit einer grauen und nur an der Spize rauhen Rinde bekleidet sind; nach dem Gipfel der Aeste zu sizen die Blätter in ganzen Büscheln beisammen; sie sind in der Mitte breiter, und laufen nach beiden Enden spizig zu; ihre Oberfläche ist hellgrün und glänzend glatt, den Rand ausgenommen, welcher rings herum mit steifen Haaren eingefaßt ist. Seine Blumen sizen an der Spize der Zweige zu achtzehn bis zwanzig in Sträusen beisammen, jede auf einem eigenen Stiele, der aus dem Winkel eines weislichten Nebenblättchens entspringt; ihr Kelch ist klein, rauh und gelblicht; er hat fünf spizige Zähne, die, wie die Strahlen eines Sterns, ausgebreitet sind, und bleibt an der künftigen Frucht. Die Krone ist blaßgelb, an einigen Stellen goldgelb; sie hat einigermasen die Gestalt einer Gloke, und ragt weit über den Kelch hervor; sie ist in fünf Stüke getheilt, von welchen das Mittelste das Gröste ist, und welche, alle zusammen umgebogen sind, und nach unten stehen. In dieser Krone sind fünf ungleiche, krumme und gelblichte Staubfäden, welche, so wie der Staubweg, zu innerst aus der Blume hervorkommen;

www.dlibra.wum.edu.pl

sie sind nach unten zu gebogen, und tragen gelbe Staubbeutel, die voll gelblichten Staubs sind. Ihr Eierstok ist, wie eine Pyramide, gestaltet, weisgrün; dünn und rauh; auf ihm sizt der krumme Griffel, der länger, als die Staubfäden ist, und sich mit einer blaßgrünen Narbe endigt. Sein Samengehäus ist ganz troken, hart, braun, geribbt und spizig; es springt, wenn es zeitig ist, in fünf Stüke auseinander, und ist inwendig in fünf Fächer getheilt.

Die Pflanze wächst in groser Menge um Heraklea in Pontus, oder, wie sie jezt heißt, um Penderachi oder Elagri, und an den Küsten und den Wäldern bis jenseits Trapezunt, auch in Georgien, vornemlich bei Oni, wo der Honig auch davon betäubend wird z).

Ziegen fressen das Laub, aber mit Schaden z1), anderes Vieh läßt sie gemeiniglich unberührt stehen. Die Blumen riechen, wie die Blumen des Geisblatts, aber weit stärker; sie nehmen sehr bald den Kopf ein, und stehen in dem allgemeinen Rufe, als wenn sie Schwindel und Betäubung erregten, und sogar behaupten die Einwohner der Gegenden, wo sie zu Hause ist, aus ihrer Erfahrung selbst, der Honig, den die Bienen aus ihren Blumen saugen, mache dumm, Ekel und Uebelkeiten z2).

---

z) J. A. Güldenstädt Reisen durch Rußland und am caucasischen Gebirge, herausgegeben von P. S. Pallas S. Petersburg 1797. 4. S. 281.

z1) Ebendersf. a. e. a. O.

z2) Tournefort Mémoires de l'Academ. des scienc. à Paris pour l'ann. 1704. S. 348.

www.dlibra.wum.edu.pl

Vergleicht man diese Wirkungen und das Vaterland dieser Pflanze mit den Erzählungen einiger Schriftsteller, welche den unglüklichen Erfolg auf den Genus des Honigs um Heraklea a), Trapezunt b) und in Mingrelien, oder Colchis c) beschrieben haben; sollte es nicht sehr wahrscheinlich sein, daß durch diese Pflanze der scharfe Honig aus Heraklea vergiftet gewesen seie, der nach Dioscorides d) und Plinius e) Bericht sich schon durch seine grose Flüssigkeit, sein gröseres Gewicht, seine feurigere Farbe und durch seinen fremden Geruch verdächtig machte, starkes Niesen erregte, und die Leute, die ihn genosen, unsinnig machte, und nach Xenophons f) und Diodorus g) Bericht, unter einem Heere von zehentausend Griechen, Erbrechen, Durchlauf, Berauschung und Raserei verbreitete, die doch bei den mei-

---

a) Dioscorides de Mater. med. L. II. interpr. Ruell. Lugd. 1547. c. LXXIV. S. 150.

b) 1) Xenophon περι κυρου ἀναβασεως Δ. κεφ. η ις. Ed. Hutchinson. Oxon. 1735. S. 347. 2) Aristoteles περι θαυμασιων ἀκουσματων. Opp. id. du Val. B. II. S. 716. „Ἐν Τραπεζουντι τη ἐν τῳ ποντῳ γινεται το ἐκ της πυξου μελι βαρυοσμον· και φασι τους μεν ὑγιαινοντοις ἐξιεναι, τους δ' ἐπιπληκτους και τελεως ἀπαλλαττειν.„

c) Lamberti Relazioni della Colchide. Napol. 1652.

d) a. e. a. O.

e) Histor. mund. L. 21. c. 13. S. 492. in Opp. omn. edit. cura du Vallii Paris 1654. B. II. S. 716.

f) a. e. a. O.

g) Της βιβλιοθηκης ἱσαρικης βιβλ. 14. interpr. Rhodoman. Amstelod. 1745. B. I. S. 665.

www.dlibra.wum.edu.pl

sten am zweiten, bei allen am vierten Tage ganz vorüber waren und bei keinem tödlich abliefen; da er noch überdies nur zu gewissen Zeiten des Jahrs diese schädliche Eigenschaft äuserte; daß sie der vermeintliche Buxbaum des Aristoteles, das Aegolethron eines Plinius, und Oleandro giallo eines Lamberti ist.

II. Betäubende Pflanzen mit rauhen Blättern, Asperifoliae.

Es sind theils zweijährige, theils Sommergewächse, welche in Europa wild wachsen. Ihre Blätter sind mit weissem Filze bekleidet, und fühlen sich weich an; sie sind einfach, unzertheilt, und ohne Einschnitte am Rande, und sizen meist ohne eigene Stiele am Stengel; ihre Blumen haben eine aus einem zusammenhängenden Stüke bestehende Krone, fünf fruchtbare Staubfäden und einen Staubweg, und hinterlassen trokne Samengehäuse.

1) Wollkraut, Verbascum.

Die Arten dieser Gattung, welche hieher gehören, sind zweijährig, ihre Stengel sind dicht mit Wolle bekleidet; ihre Blätter stumpf, ihre Blumen stehen in Aehren beisammen, und haben eine gelbe, radförmige Krone, welche den Fruchtknoten umschließt und in mehr oder weniger ungleiche Abschnitte getheilt ist, unter sich geneigte meist rauhe Staubfäden von ungleicher Länge und eine stumpfe Narbe, und hinterlassen ein trokenes Samengehäus, welches in zwei Schalenstüke zerspringt, und inwendig in zwei Fächer getheilt ist; ihre Samen äusern auf Fische, wenn man sie in das Wasser

www.dlibra.wum.edu.pl

wirft, eine betäubende Kraft h). Sollten sie deswegen hier eine Stelle verdienen?

α) Gemeines Wollkraut, Königskerze, Verbascum Thapsus Linn. Flor. Danic. Pl. 361.

Es hat einen einfachen Stengel, der an seiner Spize die Blumenähre trägt; seine Blätter sind breit, und laufen an Stengel herunter; sie werden, wie die nach Honig riechenden Blumen, von den Aerzten äuserlich und innerlich als erweichende Mittel gebraucht.

β) Aestiges Wollkraut, Verbascum thapsoides Linn.

Es weicht nur darin vom gemeinen ab, daß sich sein Stengel in Aeste theilt, und scheint nur eine Spielart desselbigen zu sein.

γ) Phlomisartiges Wollkraut, Verbascum phlomoides Linn. Mönch Flor. hass. Pl. 4.

Es wächst aufrecht. Seine Blätter sind rund, wie ein Ei; die untern sizen auf Stielen, welche oben flach sind, die obern sizen vest, und umfassen den Stengel zur Hälfte: seine Blumen haben lanzenförmige Dekblätter zwischen sich, welche ohne bestimmte Ordnung am Stengel stehen; zwischen jedem sizen vier Blumen mit purpurrothen Staubfäden, von welchen die mittelste zuerst, dann die unterste, und nun erst die beiden übrigen aufgehen; seine Samengehäuse sind länglicht.

---

h) Puihn a. c. a. O. S. 131.

www.dlibra.wum.edu.pl

2) Gemeine Hundszunge, Cynoglossum officinale Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 249.

Sie gehört zu den Sommergewächsen; ihre Blätter sizen vest auf, und sind breit, doch, daß sie, wie eine Lanzette nach beiden Enden spizig zulaufen, ihre Blumen haben eine dunkele, blaurothe, trichterförmige Krone, die nicht länger als die Staubfäden ist, und am Schlunde mit Schuppen geschlossen ist; sie hinterlassen vier undurchbohrte plattgedrükte Nüsse, welche nur an der innern Seite am Griffel hängen, auf einem pfriemenförmigen Boden sizen, und in den Kelch eingeschlossen sind.

Nach Morison i) hat ihr Kraut bei mehreren Leuten, welche es als Zugemüs genossen, einen tiefen, vierzig Stunden lang anhaltenden, bei einem derselbigen einen ewigen Schlaf verursacht, wirklich hat sie auch frisch einen sehr widrigen Geruch, und wird vermuthlich deswegen vom Vieh k), etwa Ziegen ausgenommen, nicht gefressen; inzwischen sind doch von diesem in Europa doch sehr gemeinen Kraute keine andern Beispiele gefährlicher Wirkungen bekannt geworden.

III. Betäubende Pflanzen mit larvenförmigen Blumen.

Da ich die vorzüglichsten botanischen Merkmale dieser Abtheilung schon in der Geschichte der scharfen Pflanzengifte beschrieben habe; so will ich hier nur diejenigen bemerken,

---

i) a. a. O. III. S. 450.

k) Linné Flor. spec. nr. 162.

www.dlibra.wum.edu.pl

welche die Arten auszeichnen, die, wenn sie anders unter den giftigen Pflanzen eine Stelle verdienen, hieher gehören.

1) Orant, Durant, Löwenmaul, Kalbsnaſe, Kalbsmaul, Teufelsband, Stärkkraut. Antirrhinum Orontium Linn. Flor. danic. Pl. 941.

Er ist ein Sommergewächs, wächst in ganz Europa auf Aekern, vornemlich auf Brachfeldern, wild, und blüht oft vom Mai- bis in den Weinmonat.

Seine Wurzel ist dünn und weislicht, und treibt mehrere Stengel, welche aufrecht, aber nicht leicht einen Schuh, selten zween Schuhe hoch wachsen, rundlicht und zotig sind, und sich in Aeste theilen. Seine Blätter sind im Umrisse oval, übrigens schmal, weich und fett anzufühlen; sie stehen wechselsweise auf eigenen Stielen, und haben einen etwas scharfen und bittern Geschmak. Seine Blumen sizen ohne eigene Stiele und ohne bestimmte Ordnung an dem Gipfel der Aeste, und bilden eine Art einer kurzen Aehre; ihr Kelch ist weit länger, als die Krone, zotig und in fünf bis sieben Abschnitte von ungleicher Gröse gespalten, welche wie die Finger an einer Hand ausgebreitet sind; die Krone ist weit kleiner, als bei dem grosen Löwenmaul, und purpurroth mit einem gelblichten Filze; ihre Röhre ist breit; ihr Schlund schwillt oben und unten in einen Gaumen auf, der ganz oval ist und die Röhre schließt; die obere Lippe ist umgeschlagen und entzwei gespalten, die untere ist in drei Abschnitte getheilt; von welchen der mittlere kleiner, als die übrigen ist; hinten verliert sie sich in einen ganz kurzen Sporn; von ihren vier Staubfäden, welche den einzelnen Staubweg umgeben, sind zween länger als die zween andern. Sein Samen-

www.dlibra.wum.edu.pl

gehäus gleicht dem Hirnschedel eines Affen; es ist ganz troken, und inwendig in zwei Fächer getheilt; es öfnet sich, wenn es zeitig wird, an drei Orten.

Linné l) zählt diese Pflanze unter die Gifte, ohne jedoch Erfahrungen für seine Behauptung anzuführen. Ehemals hatte sie eine Stelle unter den sieben sogenannten Berufkräutern, und wurde zu allerlei abergläubischen Absichten gemisbraucht. Auch einige Arten der

2) Salbei, Salvia.

haben einen starken Geruch, welcher den Kopf einnimmt, und leichte Betäubung hervorbringt m); sollten sie sich wohl dadurch einer Stelle unter den betäubenden Giften werth machen?

Diese Kräuter haben durchaus am Rande eingeschnittene Blätter, und zwischen ihren Blumen, oft gefärbte Dekblätter; diese Blumen haben eine aus einem Stüke bestehende und in ihrer Gestalt dem aufgesperrten Rachen eines reissenden Thiers etwas ähnliche Krone, einen Staubweg, und zween Staubfäden, von welchem jeder auf einem in die Quere laufenden Stiele ruht; sie hinterlassen vier Samen, welche ohne weitere Bedekung im Kelche liegen, und oft schleimig sind.

α) Muskatellerkraut, Salvia Horminum Linn. Plenck plant. medic. Pl. 20.

Dieses Sommergewächs ist in Griechenland und Apulien zu Hause, und zeichnet sich durch seinen Muskatellerge-

---

l) Spec. plantar. Edit. III. T. II. Vindob. 1764. S. 860.

m) Puihn a. e. a. O. S. 20. 21.

www.dlibra.wum.edu.pl

ruch aus; seine Blätter sind stumpf und gekerbt; seine obersten Deckblätter ohne Blumen, und die grösere unter ihnen nicht grün.

β) Wiesensalbei, Salvia pratensis Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 258.

Sie wächst in ganz Europa auf Wiesen wild, und hat eine ausdaurende Wurzel. Ihre Blätter sind länglicht, und haben die Gestalt eines Herzens; die obersten umfassen den Stengel; ihre Blumenquirle sind von Deckblättern beinahe entblößt; die Blumen haben gewöhnlich eine dunkelblaue, seltener eine hochrothe oder weisse Farbe, an welcher die obere Lippe klebricht ist.

γ) Klebrichter Salbei, Salvia glutinosa Linn. Sabbat. Hort. rom. III. Pl. 21.

Sie wächst in ganz Europa auf Lettenboden, und hat ebenfalls eine ausdaurende Wurzel. Sie zeichnet sich durch ihre klebrichte Oberfläche aus; ihre Blätter sind spizig und am Rande wie eine Säge gezakt, und haben in ihrer Gestalt einige Aehnlichkeit mit derjenigen eines Herzens oder eines Pfeils; ihre Blumen haben eine gelbe Krone.

δ) Scharlachkraut, Salvia Sclarea Linn. Regnault Botanique mise à la portée de tout le monde. Pl. 8.

Es wächst in Syrien und Italien wild, und hält zwei Jahre aus. Seine Blätter sind runzelicht, länglicht, stumpf, und rauh, und haben in ihrer Gestalt einige Aehnlichkeit mit einem Herzen; die Deckblätter, welche unmittelbar unter den Blumen stehen, haben eine andere, als grüne Farbe, welchen

www.dlibra.wum.edu.pl

über die Blumenkelche heraus, und sind vertieft, und scharf zugespizt.

IV. Betäubende Kressenarten. Tetradynamae.

Da zu dieser Abtheilung nur eine Pflanze gehört, so scheint es wohl überflüssig eine allgemeine Beschreibung derselbigen zu entwerfen.

1) Fischkörner aus dem Südmeer, Lepidium Piscidium. Forster Flor. austr. S. 46.

Die Blätter dieser Pflanze haben einen glatten Rand, und sind elliptisch-länglicht, und am vordern Ende spizig; ihre Blumen haben einen Staubweg, und sechs Staubfäden, von welchen vier länger sind als die übrigen; sie hinterlassen eine rundlichte, breitgedrükte, ausgeschnittene Schote, deren Schalenstüke eine scharfe Kante haben, und deren Fächer jedes einen Samen enthält. Dieser Samen bedienen sich die Bewohner der Inseln des Südmeers, um die Fische zu betäuben, welche sie fangen wollen n).

V. Betäubende Pflanzen unter den Zwibelgewächsen.

Da die Nachrichten von den Zwibelgewächsen, welche hieher gehören noch unsicher, und die Pflanzen selbst, welche Wirkungen dieser Art äusern, noch nicht mit systematischer Strenge beschrieben sind, so würde es um so eher unnöthig

n) Forster a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

sein, eine allgemeine Beschreibung der Zwibelgewächse voraus zu schicken, da dieses schon in dem Abschnitte von scharfen Pflanzengiften geschehen ist.

So gedenkt Rheede o) einer solchen indischen Schmarozerpflanze, Katou-Theka-Marvara, die sich in den dichtesten Wäldern an den ältesten Bäumen hinauf schlingt, und die Hirten, wenn sie davon genießen, rasend macht; unter der Asche gebraten bringen ihre Zwibel Eitergeschwüre zur Zeitigung, getroknet sollen sie, wenn man sie in Bälgen aufbewahrt, Schlangen vertreiben, und in Pulver eingenommen dem Gifte toller Thiere widerstehen.

Einer andern dergleichen Zwibel (wenn sie anderst hieher gehört) vom Vorgebirge der guten Hofnung, welche Erbrechen erregt, gedenkt Breyn p).

VI. Betäubende Gewächse aus der Horde der Porstarten.

Sie haben frisch meist einen schweren Geruch, und holzige Stengel, und wachsen theils in Morästen, theils auf Gebirgen; ihre Blätter sind einfach; ihre Blumen haben zehen Staubfäden und einen Staubweg, einen in sechs Abschnitte getheilten oder gespaltenen Kelch, und eine aus einem zusammenhängenden Stüke bestehende Krone, und hinterlassen ein trokenes Samengehäus, das sich inwendig in fünf Fächer theilen läßt, und viele Samen enthält.

---

o) a. a. O. XII. 25.

p) Bei Rai a. a. O. II. 1111.

www.dlibra.wum.edu.pl

8) Gemeiner Porst, Post, wilder Roßmarin. Ledum palustre Linn. J. D. Reitter und G. F. Abel Abbildung der hundert deutschen wilden Holzarten nach dem Numernverzeichnis im Forsthandbuch von F. A. L. von Burgsdorf, als eine Beylage zu diesem Werke für die Liebhaber. Stuttg. 4. Pl. 83.

Er wächst in dem mitternächtlichen Theile Europens bis nach Schlesien, Böhmen und dem grösten Theile Teutschlands in Sümpfen und Morästen. Seine Blätter sind lang und schmal, doch in der Mitte etwas breiter, und auf ihrer untern Fläche filzig und gleichsam mit Rostflecken besezt; seine Blumen haben einen in fünf Abschnitte gespaltenen Kelch, und eine flache Krone, welche kürzer ist als die Staubfäden; sein Samengehäus springt zuerst unten auf.

Er hat einen bitterlichten und etwas zusammenziehenden Geschmak, und zwar Frühlings einen nicht unangenehmen, aber nachher einen sich weit verbreitenden schweren Geruch, welcher den Kopf einnimmt, und diese Eigenschaft, so wie eine stärker berauschende Kraft auch dem Bier mittheilt, zu welchem er vormals statt des Hopfens kam q).

Doch ist er schon längst in Ungarn in der Bräune und ihren verschiedenen Arten, selbst in solchen, die von Fieber begleitet war r) und Wasser, Milch oder Molken, wo-

---

q) Linné Flor. lappon., S. 121. 2) Rupp Flor. jenens. ed. Haller. S. 127.

r) Jacquin bei Westring diss. praes. Linnaeo de Ledo palustri. Upsal 1775. S. 15.

www.dlibra.wum.edu.pl

mit man das Kraut angebrüht hat, in Schweden im Krampfhuſten s), und ſo wie das damit gekochte Waſſer, in der Ruhr und andern Bauchflüſſen t), auch äuſerlich angewandt, in mancherlei Ausſchlägen u), in Kräze und Grind x), auch in herpetiſchen y) und ſogar in einigen Arten des Ausſazes z), in Schleſien auch in Flus und Gicht z*) gebraucht werden. Sein Aufgus erregte bei einigen Soldaten gefährliche Zufälle a).

2) Alpenroſe, Rhododendron.

Ihre Blätter ſind breiter, als bei dem Porſt; ihre Blumen haben einen in fünf Abſchnitte getheilten Kelch, und unter ſich geneigte Staubfäden.

α) Ro-

---

s) 1) Linné Flor. ſuec. S. 136. 2) Haartman bei Bergius Förſök til ganbane Sjukdorners utrönande för ar 1754. S. 25. 3) Wahlbom und Wahlin Provincial med. berättelſer ſaſom en Forſättning &c. 4) Blom und Colliander Medicinal-verkets tilſtand. S. 17. 436. 5) Bjbrelund und Wadſtröm Veckoſprift för Läkare och Naturforskare. B. V. 1784. und 1785.

t) Odhelius Kongl. Svensk. Vetenſk. Acad. Handl. för ar 1779. 4. 5. 6.

u) Ebenderſ. a. a. O. för ar 1783. S. 224.

x) Weſtring a. a. O.

y) Wallenius Veckoſkrift för Läkare och Naturforſkare, B. IX. 1783. S. 210. 267.

z) 1) Odhelius a. a. O. för ar 1774. S. 266. 2) Veckoſkrift för Läkare och Naturforſk. B. VIII. S. 3.

z*) G. Longmare bei Duncan Annales of medicine B. III. for 1798. S. 2. n. 7.

a) Jacquin Collectan. botan. B. II. S. 45.

www.dlibra.wum.edu.pl

α) Rostige Alpenrose. Rhododendron ferrugineum Linn. Jacquin Flor. austr. III. Pl. 255.

Sie wächst auf den pyrenäischen, savoiischen, schweizerischen, oberteutschen und sibirischen Alpengebirgen wild. Ihre Blätter sind glatt, und auf der untern Fläche mit Rostflecken besezt; ihre Blumen stehen in flachen Sträusen beisammen, und haben eine unter sich geneigte trichterförmige und tief in ungleiche Abschnitte getheilte Krone, von welchen die zween untern schmäler sind.

Sie hat eine betäubende Kraft, so sehr, daß ein Hase, der ihre Blätter gefressen hatte, geschlachtet und zugerichtet wurde, allen, welche davon genossen, den Tod brachte b); doch besizt sie nach Kölpin c) und anderen d) mit der sibirischen Schneerose gleiche Arzneikräfte.

β) Dauurische Alpenrose, Rhododendron dauuricum Linn. Pallas Flor. ross. Pl. 32.

Sie wächst in Dauurien wild. Ihr Stengel ist nakend, treibt Sprossen, und hat nur an seiner Spize Blätter; diese sizen auf eigenen Stielen, sind länglicht, glatt, auf beiden Flächen stark gedüpfelt, auf der obern nakend, auf der untern sehr dicht mit Rostdüpfelchen besezt; ihre Blumen sind gröser als die Blätter, und haben eine radförmige veilblaue oder rosenrothe Krone, welche so lang ist, als die Staubfäden, und einen blutrothen Griffel.

---

b) Buhn a. e. a. O. S. 92. 93.

c) Praktische Bemerkung über den Gebrauch der sibirischen Schneerose in Giftkrankheiten. Berlin und Stettin 1779. 8.

d) Bei Pallas neue nordische Beyträge B. IV. S. 404.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sollte sie unter den betäubenden Giften auch eine Stelle verdienen e)?

γ) Sibirische Schneerose, Rhododendron chrysanthum Linn. Pallas Flor. rossic. Pl. 30.

Sie wächst in Dauurien und im übrigen Sibirien auf den kältesten Gebirgen wild, und zeichnet sich durch ihre länglichte beinahe eiförmige, ungedüpfelte, am Rande umgerollte, auf der obern Fläche rauhe und sehr stark geaderte, auf der untern Fläche aber glatte Blätter, durch ihre mit Filz bekleidete und gleichsam mit Rost angelaufene Blumenknospen, durch ihre an der Spize des Stengels und der Aeste stehende Blumendolden, und durch ihre gelbe radförmige und ungleich getheilte Blumenkrone von den übrigen Arten aus.

Obgleich diese Pflanze von Hirschen und Bisamthieren ohne auffallenden Nachtheil gefressen wird f), so fieng doch ein zahmes Reh, welchem man zehen Blätter davon zu fressen gegeben hatte, nach einigen Minuten an, auf den Beinen zu wanken und den Kopf anzustossen, fiel auf die Knie, und in Schlaf, und wollte als es nach vier Stunden von diesem wieder erwachte, nichts mehr von diesen Blättern fressen, da man sie ihm vorhielt g); auch bei Menschen erregt das Wasser, womit man die Pflanze heis angegossen oder gekocht hat, Trokenheit und Durst h), Uebelkeit, Erbrechen, Bauchfluß, Brennen und Zusammenschnüren des Halses, Be-

---

e) Puihn a. e. a. O. S. 93.

f) Pallas Reisen ꝛc. B. I. S. 370.

g) Steller bei Pallas Flor. rossic. S. 45.

h) Pallas Reisen ꝛc. I. S. 369.

www.dlibra.wum.edu.pl

ängstigungen, Juken und Schmerzen von allerlei Art i), Schwindel k); es macht sinnlos l), berauscht und schläfert ein m); doch sind diese Wirkungen meist nur vorübergehend, und sowohl Pallas n) und Demidof o) in Rußland, als Kölpin p), Gruner q), Stark r) und Weismantel s) in Teutschland haben meist den Aufgus oder Absud, andere eine mit Franzbrandwein und spanischen Wein daraus bereitete Tinktur in mancherlei Arten von Gicht und Flus mit gutem Erfolge gebraucht.

d) Pontische Alpenrose, Rhododendron ponticum Linn. Jacquin ic. plant. rar. Cent. I. Pl. 79.

Sie wächst in den Morgenländern, auch bei Gibraltar an schattigen etwas feuchten Orten wild, und bleibt immer grün. Ihre Blätter gleichen denen des Kirschlorbeers; sie sizen auf kurzen glatten Stielen, und sind, wie eine Lanzette gestaltet, und auf beiden Flächen glänzend glatt, und von gleicher Farbe und Schattirung derselbigen; ihre Blumen sizen

---

i) Home clinical experiments. S. 145.

k) Home a. e. a. O.

l) Pallas a. e. a. O.

m) Steller a. e. a. O.

n) a. d. a. O.

o) Bei Pallas neue nordische Beyträge B. III. 399.

p) 1) a a. O. 2) Bei Pallas neue nordische Beyträge, B. III. S. 398. 399. IV. S. 404.

q) Almanach für Aerzte und Nichtärzte 1783, S. 172.

r) Bei J. H. Zahn praes. C. G. Gruner diss. de rhododendro chrysantho quaedam sist. Ien. 1783. 4. S. 18. ꝛc.

s) Ueber die heilende Kraft des Guajacharzes in Podagra und Gicht. Erfurt 1786.

www.dlibra.wum.edu.pl

alle in verschiedener Höhe auf nakenden Stielen am Ende der Stengel und Aeste, in flachen Sträusen beisammen, und haben einen sehr kleinen Kelch, und eine glokenförmige purpurrothe Krone, welche eben so lang als die Staubfäden, und deren Abschnitte lanzetförmig sind. Die Bienen sollen von seinen Blumen einen giftigen Honig sammlen t).

Sollte auch die zotige Alpenrose Rhododendrum hirsutum Linn. Jacquin Flor. austr. I. Pl. 98. hier eine Stelle verdienen, da Hacquet 11) beobachtet hat, daß sie Schafen und Ziegen ein wahres Gift sei, wenn sie sie nicht wieder ausbrechen? und die Andromeda polifolia Linn. Flor. dan. Pl. 45. und Gualteria procumbens Linn. du Hamel arbr. I. Pl. 113. von deren Aufgusse Longmare 12) vierzehen Soldaten dem Tode nahe gebracht sahe?

VII. Betäubende Hülsengewächse.

Sie wachsen alle in Westindien und Südamerika wild, haben vielfache, meist gefiederte Blätter, und schmetterlingsförmige Blumen, deren Krone aus einem Fähnchen, einem Schiffgen, und zwei Flügelblättchen besteht, und in jeder derselbigen zehen mit einander verwachsene Staubfäden und einen Staubweg, und hinterlassen eine Hülse, welche bei den meisten viele Samen in sich hat, und inwendig nicht in Fächer getheilt ist; die Samen äusern auf Fische eine betäubende Kraft, und werden im Vaterlande dieser Gewächse in das

t) Puihn a. e. a. O. S. 93.

11) Reisen durch die dinarischen Alpen ꝛc. I. S. 60.

12) a. f. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Wasser geworfen, um diese leichter zu fangen u). Sollten sie deswegen hier eine Stelle verdienen?

1) Fischbohnen, Piscidia Erythrina Linn. Jacquin stirp. amer. ic. pict. S. 103.

Diese Staude ist im wärmern Theile von Amerika zu Hause. Ihre Blätter bestehen aus lauter eiförmigen Blättchen; ihre Blumen sizen an der Spize der Zweige an Kämmen und haben, unten ganz zusammengewachsene Staubfäden, und eine spizige Narbe: ihre Hülse ist der Länge nach mit vier Häuten eingefaßt.

2) Halbaufrechte Faseln. Phaseolus semierectus Linn. Jacquin ic. plant. rar. Cent. II. Pl. 15.

Dieses Gewächs hat mit dem vorhergehenden das gleiche Vaterland, und hält mehrere Jahre aus. Sein Stengel wächst anfangs gerade in die Höhe, drei Schuhe hoch, dann erst schlingt er sich, übrigens ist er stielrund, etwas gestreift und etwas haarig; seine Blätter bestehen aus drei eiförmigen, nakenden Blättchen, die so lang als der Blattstiel sind, und ziemlich schwerdförmige Nabenblättchen unter sich haben; seine Blumen sizen auf Schuhe langen, ganz aufrechten Stielen in einer lokern Aehre, immer zwo ohne besondere Stielchen beisammen; sie haben zehen Staubfäden, von welchen nur einer getrennt, die übrigen aber zusammen gewachsen sind, einen Staubweg mit schnekenförmig gewundenem Griffel und haariger Narbe, einen walzenförmigen Kelch ohne Dekblatt, und eine purpurrothe Krone, an welcher Fähn-

u) Puihn a. e. a. O. S. 132.

www.dlibra.wum.edu.pl

chen und Schiffchen blasser, und das lezte schnekenförmig zusammengedreht, die Flügelblättchen aber ausgebreitet, gewölbt und dreimal gröser sind.

3) Geisklee aus Jamaika, Brown civil and natural history of Iamaica. S. 296.

Diese Staude wächst aufrecht, und hat eine rauhe Oberfläche: ihre Blätter sind gefiedert; ihre Blumen sizen an der Spize der Aeste in Aehren beisammen. Sollte sie wirklich zur Gattung des Geisklees gehören?

4) Niku, Robinia Nicou. Aublet plant. de la Gujane françoise. S. 771. Pl. 308.

Diese Staude wächst im französischen Antheil von Gujana wild. Ihre Aeste steigen in die Höhe; ihre Blätter sind gefiedert mit einem einzelnen Blättchen an der Spize, ihre Blumen sizen in den Winkeln der Blätter in Aehren beisammen, und haben einen in vier Abschnitte gespaltenen Kelch, an ihrer Krone ein rundlichtes, umgeschlagenes und abstehendes Fähnchen, und zehen Staubfäden, von welchen einer von den übrigen getrennt ist, ihre Hülse ist walzenförmig und lang.

5) Geisraute, Galega.

Ihre Blumen zeichnen sich durch die pfriemenförmige, ziemlich gleiche Zähne an ihrem Kelche aus, und stehen an Traubenkämmen; ihre Hülsen sind strichförmig, und mit schiefen Streifen gezeichnet, zwischen welchen die Samen liegen.

α) Graue Geisraute, Galega cinerea Linn. Jacquin Ic. pl. rarior. Cent. II. P. 72.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sie wächst in Jamaika wild. Ihre Blätter sind auf der untern Fläche rauh, und die Blättchen, woraus sie bestehen, haben eine steife Spize; ihre Blumentrauben stehen den Blättern gerade gegen über, ihre Hülsen senkrecht auf eigenen Stielen und von den Aesten ab.

β) Strandgeisraute, Galega littoralis Linn. Jacquin Stirp. amer. pict. Pl. 192.

Sie wächst bei Karthagena am Strande in Sand wild, und ist durchaus rauh und filzig. Ihre Blätter bestehen aus änglichten Blättern, und haben ungetheilte Nebenblättchen unter sich; ihre Blumen haben eine fleischrothe Krone.

VIII. Betäubende Pflanzen, mit vielen Staubfäden.

Da die allgemeinen botanischen Merkmale dieser Abtheilung schon unter den scharfen Pflanzengiften, theils bei den Arten des Hahnenfuses, theils bei denen mit ihnen verwandten Gewächsen beschrieben worden sind; so will ich hier nur derjenigen gedenken, die einige wenige Pflanzen, welche hier mit einigem Rechte eine Stelle zu verdienen scheinen, kenntlich machen.

1) Christophskraut, gemeines Christophskraut, Christophswurz, ährenförmiges Schwarzkraut. Actaea spicata Linn. Christophoriana. Blackwell a. a. O. Pl. 565.

Es wächst in ganz Europa in kleinen Wäldern und in schattigen Klüften der Berge, wo es im Maimonate blüht, und hat einen schweren Geruch. Seine Wurzel hält ver-

www.dlibra.wum.edu.pl

schiedene Jahre aus, und ist holzig, rauh und schwarz. Seine Blätter haben in ihrem äuserlichen Ansehen vieles mit den Blättern der Doldengewächse gemein; sie sind glänzend glatt, und theilen sich zweimal in kleinere dreiekige Blättchen, die an ihrem Rande, wie eine Säge, gezakt sind. Seine Blumen stehen an einer Art von Traubenkämmen, die in ihrem Umrisse rund, wie ein Ei, sind; sie sizen alle auf der Spize eines eigenen Stiels, der zur Seite aus dem Stengel entspringt, und haben zwanzig, bis ein und zwanzig Staubfäden, welche verdikt, nebst den Staubbeuteln weis, und den Blättchen der Krone ähnlich sind, und einen einzigen Staubweg; Kelch und Krone sind kürzer, als die Staubfäden, bestehen aus vier gleichen Blättchen, und fallen ab; an der Krone sind sie weis, und von ausen röthlicht, an beiden Enden spizig und länger als an dem Kelche; zuweilen arten zween, oder drei Staubfäden aus, so daß sie eher entzweigespaltene Blättchen der Blumenkrone vorstellen. Seine Beere ist, wenn sie vollkommen reif ist, ziemlich troken und schwärzlicht; sie hat beinahe die Gestalt eines Eies, nur daß sie von beiden Seiten etwas breitgedrükt ist und von den Trümmern des Griffels in die Quere eine Erhöhung hat; sie erhält, ob sie gleich nicht in mehrere Fächer getheilt ist, mehrere Samen, die in ihrem Umrisse einer in der Mitte entzwei getheilten Eilinie gleichen.

Das Kraut zieht auf der Haut Blasen, und ist in dieser Absicht in der Viehseuche empfohlen worden x). Eine einige Beere ist im Stande, ein Huhn, oder auch andere

x) Le Monnier bei Caſſini de Thury de la meridienne de l'obſervatoire royal de Paris. Par. 1744.

www.dlibra.wum.edu.pl

Vögel zu tödten y), und von eben diesem Genusse der Beeren will Linné z) einige traurige Fälle bei Menschen bemerkt haben; vielleicht hat ihn die verdächtige schwarze Farbe der Beeren und ein gewisses Vorurtheil für das Ansehen der Alten, welche die Pflanze zu ihren Aconitis, und mit diesen zu den Giften zählten, verleitet, die Zufälle, die er auf den Genus dieser Beeren beobachtete, sogleich auf ihre Rechnung zu schreiben; denn in neuern Zeiten hat man keine entscheidende Erfahrung für ihre schädlichen Kräfte. Ihre Wurzel wird häufig für schwarze Nieswurz a) verkauft, und kann ohne Schaden dafür gebraucht werden b). Selbst ein aus den Beeren zubereitetes Extrakt kann, ohne die mindesten gefährlichen Zufälle zu erregen, bis zu zwölf Granen eingegeben werden c).

Ihre Wurzel kann statt eines Haarseils gebraucht werden; die Alten empfehlen auch den innerlichen Gebrauch derselben in Kopfgeschwulsten, nnd einigen Arten der Engbrüstigkeit. Der Saft der Beeren gibt, wenn er mit Alaun gekocht wird, eine schwarze Tinte d).

---

y) Sauvages Memoir. de l'Acad. de Paris 1739. S. 470.

z) Flor. Lapponic. 1737. S. 175.

a) Lorry de Melancholia, et morb. melanchol. Par. 1765. B. II. S. 293.

b) Lieutaud Synopf. univerf. prax. medic. P. II. Amftel. 1765. S. 639.

c) Sauvages a. e. a. O.

d) Linné de Plant. tinct. S. 19.

www.dlibra.wum.edu.pl

2) Amerikanisches Christophskraut, Actaea racemosa Linn. Skuhr a. a. O. Pl. 139.

Es wächst in Florida, Virginien und Kanada wild, und unterscheidet sich durch seine sehr lange Blumentrauben, an welchen die Staubfäden von gleicher Dike, und die Blättchen der Krone sehr klein, dik und von ungleicher Wölbung sind, gleichsam auf eigenen Stielchen stehen, und in eine Borste auslaufen, und durch ihre eirunde ganz trokene Beeren.

Auch diese Art hat einen schweren Geruch, und ihre Beeren werden für giftig gehalten e).

3) Barringtonie, Barringtonia speciosa Linn. J. Fr. Miller ic. Pl. 7.

Dieser Baum wächst zwischen den Wendezirkeln an der Küste, auch auf den Eilanden des indischen und des Südmeers, und hat Schuh-lange glatte länglichte Blätter. Seine Blumen haben sehr viele Staubfäden, welche weit über die vierblätterichte Krone hinausgehen, aber nur einen Staubweg, auf dessen Fruchtknoten der einfache nur aus zwei Blättchen bestehende Kelch aufsizt, und hinterlassen eine Steinfrucht, deren Stein inwendig gar nicht oder in vier Fächer getheilt ist.

Seine Samenkerne haben eine berauschende Kraft, und werden von den Fischern ins Meer geworfen, in der Absicht die Fische zu betäuben, und so leichter zu fangen f).

---

e) Dillenius Hort. Elth. S. 79.

f) Rumpf a. a. O. III. B. 179.

www.dlibra.wum.edu.pl

4) Asiatische Sida, Sida asiatica Linn. Cavanilles Diss. botan. 5. Pl. 128. Abb. 1.

Dieses Sommergewächs ist in Indien auf nassem Boden zu Hause. Seine Blätter fühlen sich weich an, sind unzertheilt, und haben die Gestalt eines Herzens, eine grösere Länge als Breite, starke Adern, und umgebogene Nebenblättchen; seine Blumen sizen, jede einzeln, auf einem Stiele, der länger ist, als der Blattstiel, und haben einen einfachen, ekigen Kelch, eine gelbe Krone, sehr viele zusammengewachsene Staubfäden, und einen Staubweg; sie hinterlassen mehrere zusammengehäufte abgestuzte, sehr zotige trokene Samengehäuse, deren jedes einen Samen in sich hat.

Der Samen ist in der Türkei sehr stark im Gebrauche, um Schlaf zu erregen, aus welchem die Leute nicht eher wieder erwachen, als bis sie an der Nase mit Essig gerieben werden; zu dieser Wirkung sind inzwischen doch zwei Loth nöthig g).

IX. Betäubende Gräser.

Selbst unter dieser natürlichen Horde, deren beinahe allgemeiner, und seit dem Anfange der Welt eingeführter unschädlicher Gebrauch zur Nahrung des thierischen Körpers uns sicher machen könnte, sind Gifte verborgen; aber ihre Anzahl ist so gering, und die Merkmale, an welchen wir sie erkennen können, so auszeichnend, daß es der sträflichste Undank gegen die Vorsehung wäre, wenn man darüber klagen, und der geflissentlichste Irrthum, wenn man sich die leichten Kenntnisse nicht verschaffen wollte, die hier allein sicher stellen.

g) Ebendersf. a. a. O. IV. S. 29.

www.dlibra.wum.edu.pl

1) Sommerlolch, Lülch, Töberich, Durt, Tollkorn, Kühweizen, Mäuseweizen (wenn er unter der Gerste wächst), Twalch (wenn er unter dem Roggen wächst), Tresp, Trapsendort, Trespdorp, Trefzen, und (wenn er sich unter dem Haber zeigt) Schwindelhaber, Tollhaber, Dippelhaber. Lolium temulentum Linn. Lolium Flor. Danic. Pl. 160.

Er wächst in ganz Europa unter dem Getreide, unter Weizen, Spelz, Einkorn, Roggen, Gerste und Haser, selten unter dem Lein, vornemlich auf Feldern, die entweder an sich zu feucht sind, oder von Ueberschwemmungen und allzuhäufigen Regen im vorhergehenden Winter und Frühling zu nas sind. Unter diesen Umständen, die sein Wachsthum ungemein befördern, so wie sie dem frölichen Gedeihen der guten Getreideart äuserst hinderlich sind, sieht man ihn öfters in so groser Menge hervor kommen, daß man daraus vermuthlich das Mährchen von der Verwandlung des Weizens in Lolch herzuleiten hat: eine Behauptung, die dem Verfahren der sich immer gleichbleibenden Natur allzudeutlich widerspricht.

Er geht im Herbst zu Grunde, vermehrt sich aber desto stärker durch den Samen. Seine Halme erreichen gemeiniglich die Höhe von zween Schuhen, zuweilen werden sie über fünf Schuhe hoch; zuweilen findet man sie gestreift, und meistens haben sie einige Knoten, und sind mit mehreren glatten Grasblättern bekleidet. An dem Gipfel eines jeden sizt eine grüne, manchmalen röthlichte Aehre, die gleichsam von beiden Seiten breitgedrükt, fast immer mit häufigen und langen Grannen bewaffnet uud meistens gegen einen Schuh lang

www.dlibra.wum.edu.pl

ist. Sie besteht aus mehrern kleinen Aehrchen, die in ihrer Anzahl und Gröse verschieden sind; bald sind es nur vier, bald acht, bald zwölf, und manchmal steigt ihre Anzahl bis auf achtzehn. Alle diese Aehrchen stehen wechselsweise an dem Gipfel des Halmes, der sich daselbst bald auf diese, bald auf die andere Seite beugt, und sind vest an seine Seite angedrükt; unter jedem sizt ein einzelnes steifes und gerades Blättchen, das sich meistens in eine steife Spize endigt, und gerade so lang ist, als das Aehrchen, unter welchem es sizt; dieses versieht hier die Stelle des Blumenkelchs. Jedes Aehrchen besteht aus acht kleinen Blümchen; diese haben statt der Krone zwei gleiche grüne Blättchen, von welchen das eine bisweilen sich in einen Stachel endigt, das andere aber flach und im Umrisse wie ein Ei ist; zwischen denselbigen sizt ein Eierstok mit zween Griffeln, und um diese herum drei Staubfäden; jedes dieser Blümchen hinterläßt einen einigen braunschwarzen Samen, welcher eirund, von beiden Seiten aber breitgedrükt und kleiner als die Samen der gemeinen Getraidarten ist; er ist von einem süslichten nicht unangenehmen Geschmak, aber, so wie die ganze Pflanze, ganz ohne Geruch.

Von dem englischen Raigrase (Lolium perenne), mit welchem der Sommerlolch sehr nahe verwandt ist, unterscheidet er sich auf dem Felde schon dadurch leicht, daß er ein Sommergewächs ist, meistens sehr lange Grannen hat und seine kleinen Aehren weiter auseinander stehen, da hingegen das Raigras viele Jahre dauert, meistens gar keine Grannen hat, und seine kleine Aehren weit gedrängter beisammen stehen. Von den übrigen Gras- und Getreidarten unterscheidet er sich dadurch: daß der Blumenkelch der kleinern Aehrchen nur aus einem einigen Blättchen besteht, da er bei

www.dlibra.wum.edu.pl

den meisten übrigen wenigstens aus zwei zusammengesezt ist, von den meisten Getreidarten aber dadurch, daß seine Samen weit kleiner sind. Aber auch nachher, und alsdann, wenn der Same schon unter anderem Mehle ist, verräth sich der Sommerlolch durch einige Merkmale; wenn man solches Mehl, in dessen Mischung der Same desselbigen ist, mit Wasser vermengt, so verdikt es sich nicht so, wie das Roggenmehl, wenn es rein und unvermischt ist. Kocht man ein solches Mehl, oder das davon gebakene Brod in Wasser, so wirft es einen starken Schaum; wird es mit Wasser vermischt hingestellt, so gährt es lange nicht so stark, und wenn dieses gährende Wasser über den Helm getrieben wird, so gibt es nicht, wie die übrigen Getreidarten, zuerst einen blauen, sondern einen röthlichten Geist h).

So viel bisher aus sichern Erfahrungen bekannt ist, so sind nur die Samen dieses Grases schädlich i). Sie sind es dann vornemlich, wenn ihre flüchtige Theilchen noch vorhanden sind, oder durch die Wärme und Gährung entwikelt und wirksam gemacht werden. Daher erregen schon ihre Ausdünstungen eine Art von Betäubung und Kopfschmerzen, wenn

---

h) Seeger in Dissert. de Lolio temulento, Praes. R. I. Camerario, Tubing. 1710.

i) 1) R. Lentilius Eteodromus medico-practic. a. 1709. Stuttgard 1711. 4. 2) Taube Geschichte der Kriebelkrankheit besonders derjenigen, welche in den Jahren 1770 und 1771 in den zellischen Gegenden gewütet hat. Göttingen 1782. 8. nur Burghard behauptet Medicor. silesiac. Satur. I. S. 47. daß selbst das Stroh Kälbern tödlich sei.

www.dlibra.wum.edu.pl

man sie in einem verschlossenen Zimmer röstet k), oder auf glühende Kohlen wirft l), oder wenn bei der Gährung derselbigen Dünste entwischen, und in Stand gesezt werden, auf den Körper zu wirken m), noch schädlicher aber werden sie, wenn sie unter Getreidesamen, vornemlich unter dem Haber, von welchem sie, besonders in theuren Zeiten, nicht sorgfältig genug ausgelesen werden, oder wenn sie mit anderem Mehle vermischt in Gestalt eines Breies oder Kuchens, oder unter dem Brode, besonders wenn es noch warm ist n), genossen werden. Auch dem Biere und Kornbrandewein o) theilen sie ihre schädlichen Kräfte mit p), wenn sie vor der Gährung mit den Körpern vermischt werden, die man zu ihrer Zubereitung gebraucht.

Die Wirkungen sind selbst nach der Art, wie die Samen beigebracht werden, und nach dem Alter desjenigen, der die Samen genießt, verschieden. Sie sind heftiger bei Er-

---

k) Seeger a. a. O. S. 8.

l) Plinius a. a. O. L. 18. c. 17. Edit. cit. p. 416.

m) 1) Burghard a. a. O. n. 8. 2) Linné de plant. esculent. S. 8. 3) Seeger a. a. O.

n) 1) Burghard a. a. O. 2) Riviere Histoire de la Societé Royale des sciences de Montpellier. Lyon 1766. 3) Mariotti dei cattivi effetti del pane logliaceo e dei loro incommodi. Perugia 1768. 4) Da es zu $\frac{1}{5}$ daraus bestand de la Maziere Histoire de la Societé de medec. à Paris pour les ann. 1777 et 1778.

o) Linné und Burghard a. d. a. O.

p) Wozu man an einigen Orten mit Vorsaz auf zwanzig Theile Roggenkorn acht Theile von diesen Samen nimmt. Seeger a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

wachsenen q) und Alten, als bei jungen Leuten und Kindern. Die gewöhnlichen sind eine Art von Trunkenheit r), die zuweilen anhaltend ist, Schmerzen und Schwere in dem Kopf, Schwindel s), Schlummer und unaufhaltbarer Schlaf t) mit schweren Träumen u), Schwächung und Verwirrung der äuser-

---

q) 1) Burghard a. a. O. 8. 2) Linné de plantis esculentis S. 8. 3) Seeger a. a. O.

r) Nach der allgemeinen Bemerkung. S. auch Seeger und Burghard a. d. a. O. unter dem Brod genossen, Parmentier Recreations physiques, économiques, et chymiques B. II. Par. 1774. S 391. und J. Fr. Wagner Ephem. Acad. Caes. Natur. Curios. Dec. III. Ann. 9. obs. 186.

s) Nach dem Zeugnisse eines Aristoteles, Theophrast und Galens, das durch mehrere Erfahrungen bestätiget wird. S. auch 1) J. Rudolph Camerer sylloge memorab. med. et mirabil. natur. arcanor. Cent. III. Aug. 1624. Cas. 91. S. 202. 2) Seeger a. a. O. S. 10. 3) Parmentier a. a. O. 4) Sarcone Geschichte der Krankheiten, welche im Jahre 1764 in Neapel beobachtet wurden. Ueberset durch Füslin. Zürich 1772. II. S. 24. 5) Güldenstedt, der die Samen in Weizenbrod bekam, mit seiner Gesellschaft a. a. O. S. 281. 294.

t) 1) Linder de Venenis, Lips. 1739. S. 538. 2) Wier de Praestig. daemon. Basil. 1564. III. S. 18. 3) Seeger a. e. a. O. 4) J. F. Wagner a. a. O. 5) Schober act. Eruditor. Lips. 1723. S. 447. (Doch sind diese Zufälle in der lezten Geschichte vielleicht nicht auf die Rechnung des Lolchs, sondern zum Theil auf die Rechnung des Brandes im Getreide zu schreiben).

u) Güldenstedt und Parmentier a. d. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

äuserlichen Sinne, eine Dunkelheit vor den Augen, eine Unbeweglichkeit derselbigen, ein Klingen in den Ohren und überhaupt ein falsches Gehör x). Manchmalen zeigen sich leichte und übergehende Anfälle von Sinnlosigkeit y), Zittern in den Gliedern und allen Theilen des Leibes z), eine allgemeine Ermattung a), eine Kälte in den äusern Gliedern b), ein Verfall der Sprache, die gröste Beschwerlichkeit und Unmöglichkeit etwas hinunter zu schlingen, Bangigkeiten c), Magenschmerzen, heftige Zusammenschnürungen des Magens, besonders an seinen beiden Mündungen, leere Reize zum Erbrechen d), wirkliches Erbrechen e), leichte Blutflüsse f), starke auch kalte Schweise g), häufiger Abgang des Harns h), Geschwulsten, Krämpfe i), die sich manchmalen in Lähmung

---

x) 1) Seeger a. e. a O. 2) Burghard a. a. O. I. S. 47.

y) Wier, Schober, Parmentier und Burghard a. d. a.

z) 1) Seeger a. a. O. 2) Rudolph Jac. Camerer und Valentini Ephem. Acad. Caes. Nat. Curios. Dec. III. A. 2. S. 187.

a) Seeger, Schober, Sarcone und Burghard a. d. a. O.

b) Bürghard a. a. O.

c) Burghard, Schober und Seeger a. d. a. O.

d) Burghard, Seeger und Schober a. d. a. O. leichte Blutflüsse, Sarcone a. a. O.

e) De la Mazière und Wagner a. d. a. O.

f) Sarcone a. a. O.

g) Seeger und Burghard a. d. a. O.

h) Seeger a. a. O.

i) Schober und Parmentier a. d. a. O. Wepfer Ephemer. Acad. Caes. Nat. Cur. Dec. II. A. 3. S. 365.

www.dlibra.wum.edu.pl

endigen k), etwas selten Wahnwiz l), bleibende Fehler in den Augen, Schlagflüsse, oder der Tod m), doch sehr selten ein plözlicher n).

Geschichte.

Zween Bauern genossen mit ihren Frauen und einer andern ältern Frau fünf Pfunde Haberbrod, unter welche auch die Samen dieses Sommerlolchs gekommen waren; zwo Stunden darauf beklagten sie sich insgesammt über einen schweren Schmerzen in dem Kopfe, der ihnen, besonders in dem Stirnknochen seinen Siz zu haben schien; es überfiel sie ein Schwindel, bei dem es ihnen dunkel vor den Augen wurde; sie hatten ein Klingen in den Ohren, und es war ihnen bald darauf nicht anders, als ob sie Pauken und Trompeten hörten; ihre Zunge zitterte ihnen sehr, daß sie kein ganzes Wort herausbringen konnten; eben so unmöglich war es ihnen, etwas hinunter zu schlingen; es war ihnen nach dem Ausdruk ihrer Empfindung, als wenn ihnen ein Ball auf dem Herzgrübchen läge; sie holten schwer Athem; sie hatten Bangigkeiten und Magenschmerzen, und nach langen vergeblichen Reizen brachen sie eine dünne, wässerichte Flüssigkeit heraus. Die Esluft war ihnen vergangen; es trieb sie stark und schnell hintereinander auf den Harn, ohne daß sie gerade Schmerzen, oder eine andere Ungelegenheit dabei gehabt hätten; sie zitterten am ganzen Leibe, und hatten

---

k) Sulzer Breslauer Sammlung ꝛc. 1723. M. Jenner Schober, Wagner, Güldenstedt a. d. a. O.

l) Schober a. a. O.

m) Burghard und Schober a. d. a. O.

n) Schober a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

kalte Schweiſe und eine auſerordentliche Mattigkeit in allen Gliedern; einige Stunden nach dem Anfall verfielen ſie in einen Schlaf, dem ſie durchaus nicht widerſtehen konnten o).

Auch bei Pferden p), Hornvieh q), Gänſen und andern Thieren r) erregt dieſer Same tödliche, und bei Hunden s), Schweinen t) und Hühnern u) gefährliche Zufälle.

Die Art, ſich gegen dieſe Uebel zu ſchüzen, beruht erſtlich auf der Vertilgung dieſes Gewächſes von den Feldern überhaupt; zweitens auf der Abſonderung ſeines Samens von dem guten Getreideſamen; und drittens auf der Entkräftung ſeines Gifts, wenn man genöthiget iſt, ihn in das gute Getreide zu mengen.

Bei der ungemeinen Fruchtbarkeit dieſes Unkrauts und der Dauerhaftigkeit ſeines Samens, der auch nach dem dritten Jahre noch aufgeht, hat die Ausrottung ihre ſehr groſen Schwierigkeiten, und erfordert einen unermüdeten Fleiß in der Beſtellung der Felder; man muß dieſe, ſobald als das reife Getreide zu Hauſe iſt, noch im Ernde- oder doch im Herbſtmonat anfangen, den Samen, den man ausſäet, auf das ſorgfältigſte zuvor reinigen, ſich hüten, auch mit dem

---

o) Seeger a. a. O.

p) Burghard und Mariotti a. d. a. O.

q) Burghard a. a. O.

r) Ebenderſ. a. a. O.

s) Seeger a. a. O.

t) Buffon Hiſtoire naturelle generale et particuliere &c. B. V. S. 113.

u) Burghard a. a. O. Dieſen ſchadet es nicht immer, Mariotti a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Dünger keinen Samen von Unkraut auf die Felder zu bringen, oder, wenn er sich t .r befinden sollte, durch beigemischte Holzasche, oder Seifensiederlauge seine Keime zu tödten; die Felder fleisig pflügen und mit gutem reinem Miste reichlich düngen; wenn sie zu thonig, zu feucht und zu kalt sind, durch Vermengung mit Mergel, oder Kalkerde ihren Boden verbessern, oder, wenn sich viele Gruben darinnen befinden, in welchen das Wasser stehen bleibt, sie durch aufgeführte Erde erhöhen. Vereitelt aber die Nachläsigkeit der Nachbarn die Früchte dieses Fleises, und führen Winde und Vögel von ihren Feldern immer wieder neuen Samen zu, so bleiben bei und nach der Erndte noch Mittel übrig, reines Getreide nach Hause zu bringen. Man kann entweder die Halme des Unkrautes, die man an den angeführten Merkmalen erkennt, noch ehe das gute Getreide reif wird, ausraufen, oder die Aehren, die noch weit leichter zu erkennen sind, mit den Händen aus den aufgestellten Garben herausziehen. Ist aber das Getreide schon gedroschen, so ist die Absonderung schon mühsamer und schwerer. Einige werfen den unreinen Samen zu etlichen Händen voll in ein groses Gefäs mit Wasser, und nehmen alsdann den Samen, der oben am Rande des Gefässes schwimmt, als rein heraus; andere werfen die Körner in einer gewissen Entfernung, und glauben dadurch, weil die Samen der guten Getreidearten in ihrem Gewichte von den Samen des Unkrauts verschieden sind, diesen Entzwek eben so zu erreichen; andere lassen dieses erst in der Mühle durch den sogenannten Gerbgang besorgen; am sichersten aber ist es, entweder den Samen des Unkrauts mit den Fingern aus den Samen der guten Getreidearten auszulesen, und noch besser, sich in dieser Absicht, wie es in einigen Gegenden Schwabens gewöhnlich ist, eines eigenen, deswegen so genannten,

www.dlibra.wum.edu.pl

Trespensiebs zu bedienen, dessen Löcher nach der Gestalt der Samen dieses Unkrauts gebildet, und mehr länglicht, als bei den Radensieben, sind.

Zwingt aber die Noth, vornemlich bei einem allgemeinen Miswachs, den armen Landmann, diese Samen unter dem Brode, oder andern Nahrungsmitteln zu geniesen; so kann allerdings ein gelindes, langsames Troknen an einem Orte, wo der Wind von allen Seiten frei durchstreichen kann, das Vermengen mit einer ungleich grösern Menge guten Mehls, Kochen mit Wasser und häufiges Abschäumen während desselbigen, und vornemlich gelindes Rösten, ihre schädlichen Kräfte ziemlich schwächen: vielleicht erreicht man diese Absicht auch einigermassen durch einen Zusaz von Gewürzen, vornemlich von Kümmel und Küchensalz, vielleicht auch durch Vermischung mit Fettigkeiten, Butter, Spek, Milch u. dgl. In einigen Gegenden speist der dürftige Landmann den aus diesen Samen zubereiteten Brei mit einem Sauerkohl, den er für das beste Gegengift dieses Gifts hält. Unter den angeführten Umständen kann also dieser Same selbst zur Nahrung benuzt werden; auch das Brod, das daraus gebaken wird, kann man ohne Schaden speisen, wenn man es nur kalt werden läßt, auch bei mäsigem Gebrauche, nach C. Bauhins Erfahrung, Tauben, Wachteln, Hüner und Gänse, und nach anderer Versicherung, sogar Schweine damit mästen.

Hat man aber die oben angegebenen Fürsichtsregeln bei dem Gebrauche dieses Samens aus den Augen gesezt, und sich der Wuth der Zufälle blosgestellt, die ich beschrieben habe; so kommen auch hier die in der allgemeinen Heilart gegen die betäubenden Gifte angeführten Mittel, Brechmittel, viele laue, öligte Getränke und Pflanzensäuren am besten

www.dlibra.wum.edu.pl

zu ſtatten. Vormals gebrauchten die Aerzte dieſe Samen äuſerlich, um Schmerzen zu ſtillen. Nicht nur die Wenden, ſondern auch hin und wieder Gaſtwirthe, welche einen Vortheil darunter haben, wenn ihre Gäſte bald berauſcht werden, kochen ſie ſtatt des Hopfens mit dem Malze, um ein deſto ſtärkeres Bier zu erhalten; andere vermengen ſie mit andern Getreideſamen und mit Bierhefen, und brennen einen Kornbrandewein daraus; noch andere leſen dieſe Samen mit Vorſaz und Sorgfalt aus, brennen daraus einen Brandewein, der in ſeinen äuſerlichen Eigenſchaften und in den chemiſchen Proben durchaus nicht von dem gemeinen Fruchtbrandewein aus Roggen zu unterſcheiden iſt, und vermiſchen ſodann zween Theile jenes Brandeweins mit fünf Theilen des gemeinen guten Brandeweins, um den lezten deſto ſtärker und berauſchender zu machen.

2) Stachlichtes Kammgras, Cynoſurus echinatus Linn. Gärtner a. a. O. Cent. I. Pl. 1. Abb. 8.

Es wächſt in dem mittägigern Theile von Europa und in den Morgenländern wild. Seine Blumenährchen ſizen alle an einer Seite des Halms, in einer knaulförmigen Traube beiſammen, und haben (jedes Blümchen) nur nach der äuſeren Seite zu ein Deckblatt, welches die Stelle einer Blumenhülle vertritt, abwechſelnd gefiedert und ſpreuartig iſt, und in Grannen ausläuft; den Kelch ſtellen zwei ſtrichförmige häutige ſcharf zugeſpizte Blättchen von gleicher Gröſe vor, welche zwei Blümchen in ſich ſchlieſen, jedes von dieſen hat drei Staubfäden und einen Staubweg mit entzweigeſpaltenem Griffel und einem zweiblätterichten Saftbehälter; ihre Krone beſteht auch aus zwei Blättchen, die an ihrer äuſern Spize

www.dlibra.wum.edu.pl

eine gerade Granne haben, und wovon das eine vertieft und länger als das andere ist.

Seine Samen haben, vornemlich in den Kleien meist im Heu- und Erndemonat, einen unangenehmen Geschmak, und werden von Enten und Hünern nicht gefressen; sie theilen dem Roggen (denn das Gras wächst z. B. in der Lombardie, häufig unter Roggen), wenn sie damit gemahlen und gebaken werden, dem Brode nicht nur eine widerliche Bitterkeit mit, sondern das Brod wird davon schwer und klebricht, troknet nicht leicht, schlukt sehr viele Feuchtigkeiten ein, und verdirbt leicht und erregt, wenn es noch warm genossen wird, Bauchflus, Kopfschmerzen und Schwindel; der Milchsaft der Samen Entzündung des Schlundes; schon das rohe Mehl macht Schweine schläfericht x).

X. Pflanzen, deren Blumen keine Krone haben.

Sie sind theils Sommergewächse, theils Bäume. Ihre Blätter haben keine eigene Stiele, aber immer eine ganz glatte Oberfläche; ihre Blumen haben nie eine Krone, einige nur einen, andere zween, wieder andere fünf, noch andere mehrere Staubfäden, die entweder in der nemlichen Blume mit dem einzelnen Staubwege beisammen, oder auf einem ganz verschiedenen Stamme stehen. Diese Blumen, und in dem lezten Falle nur diejenigen, in welchen der Staubweg ist, hinterlassen einen einzelnen Samen, der keine andere Bedekung, als den verwelkten Blumenkelch hat.

---

x) Puihn a. a. O. S. 26. 27.

www.dlibra.wum.edu.pl

1) Muskatnüsse, Myristica Linn.

Sie wachsen auf Bäumen, welche ungefähr so gros als unsre Birnbäume sind, eine glatte und braungraue Rinde, abstehende zulezt haarzarte Aeste, und unzertheilte, glatte, einen Finger lange, unten blassere Blätter haben, welche alle in ungleicher Höhe an den Zweigen stehen; ihre Blumen sizen einzeln und auf eigenen Stielen hin und her zerstreut an den äussersten Zweigen; sie haben einen glatten in drei kurze, aufrechte und eirunde Abschnitte gespaltenen Kelch; einige einen fadendünnen Staubfaden, der kürzer ist als der Kelch, und unter seiner Spize einen gestreiften durchbohrten Staubbeutel trägt, andere auf dem gleichen Stamme einen Fruchtknoten, der vom Kelche umschlossen wird, und einen kurzen diken Griffel mit zwo kurzen und spizigen Narben trägt; diese hinterlassen eine Steinfrucht, welche zur Seite aufspringt, an umgebogenen Stielen hängt, ein blaßgrünlichtes, nachher blaßgelblichtes zusammenziehendes Fleisch, und um den runzelichten Kern noch eine nezförmige, pomeranzengelbe Hülle (Muskatblüte) hat; diese Bäume sind in den Molukken und in Neuguinea zu Hause.

Schon die Ausdünstungen des Baums sollen bei zween Soldaten, welche die Nacht über darunter geschlafen hatten, nach dem Erwachen Schwindel und Neigung zum Schlafe zurükgelassen, und fünf bis sechs Nüsse, welche andere asen, Wahnsinn verursacht haben; auch fand man einen Mann im Bette tod, der sie vor sich stehen, und vermuthlich zu viel davon genossen hatte y). Sie erregen nemlich Beklemmung

---

y) Rumpf a. a. O. II. S. 21. 22.

www.dlibra.wum.edu.pl

auf der Bruſt, Engbrüſtigkeit, heftigen Durſt, Kopfſchmerzen, Schwindel und Schlagfluß z).

α) Wahrer Muſkatnusbaum, Myriſtica moſchata Linn. Botaniſches Magazin, H. 6. Pl. 1. 2.

Er hat lanzenförmige, ſcharf zugeſpizte, und glatte Blätter, und eine eiförmige, ganz glatte Frucht.

β) Filziger Muſkatnusbaum, Myriſtica tomentoſa, Rumpf a. a. O. B. 2. Pl. 5.

Er iſt nicht ſo gros, und verbreitet ſich nicht ſo ſehr in Zweige; dieſe ſind aber diker, ſeine Blätter ſind mehr eiförmig, dik und etwas filzig; ſeine Blumen ſizen unten an den Zweigen auf kurzen, diken und filzigen Stielen; ſeine Früchte ſind ſehr ſtumpf, filzig und nicht a) ſo gewürzhaft, als diejenigen des wahren Muſkatnusbaums.

γ) Faber Muſkatnusbaum, Myriſtica fatua Swarts nov. plant. gen. et ſpec. S. 96. Gärtner a. a. O. Cent. III. Pl. 41. Abb. 3. 4.?

Seine Blätter ſind länglicht-lanzetförmig und auf der untern Fläche weichhaarig; ſeine Blumenkelche und Früchte rauh, und geſchmaklos.

Drei ſeiner Fruchtkerne, die man geröſtet, einer Frau zum Abführen gab, ſollen Blödſinn und Wahnwiz erregt haben, auch ſollen in Java die Frauen daraus einen Liebestrank für ihre Männer bereiten b).

---

z) K. P. Thunberg diſſ. reſp. Fr. W. Radloff de myriſtica moſchata. Upſ. 1788. 8. §. 4. Diſſertat. acad. Goetting. 8. B. II. S. 323.

a) Ebenderſ. §. 5. S. 324.

b) Rumpf a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

2) Breitblätterichter Pfeffer, Piper latifolium Linn. Banks fig. of plants Pl. 3.

Er wächst in Tahiti wild, und wird auch auf andern Inseln des Südmeers gebaut. Seine Blätter sizen auf eigenen Stielen, haben die Gestalt eines Herzens und viele Ribben, und tragen in ihren Winkeln sehr viele Blumenähren, welche auch auf eigenen Stielen stehen; die Blumen haben weder Kelch noch Krone, aber zween Staubfäden, und einen Staubweg mit drei Narben, und hinterlassen eine Beere, in welchen nur ein Same ist.

Ein daraus bereiteter Trank erregt Schlummer, Betäubung und Berauschung, und ein oft widerholter Genus desselbigen Trokenheit, schwarze Farbe und Abschilfern der Haut, Entzündung und Triefen der Augen, Auszehrung, Schwächung der Seelenkräfte, Geschwulst der Haut, weisse, auch wohl röthlichte und gelblicht-grüne Fleken, und zulezt fressende und fliesende Geschwüre auf derselbigen c).

3) Unächter Gänsefus. Chenopodium hybridum Linn. Curtis Flor. Londin. Pl. 248.

Er wächst in ganz Europa, vornemlich an gebauten Stellen, als Unkraut, und gehört unter die Sommergewächse.

Er riecht unangenehm, beinahe, wie der gemeine Stechapfel. Sein Stengel wächst aufrecht, theilt sich in mehrere Aeste und ist ganz glatt; seine Blätter sind sattgrün, vollkommen glatt und nicht mit dem Mehle bestreut, das man an den meisten übrigen Arten bemerkt; sie haben einigermas-

c) Puihn a. e. a. O. S. 21.

www.dlibra.wum.edu.pl

sen die Gestalt eines Herzens, oder eines Pfeils, und an ihrem Rande sieben bis neun Zähne, und eben so viele Buchten. Seine Blumen bilden zuerst runde Klumpen, welche an der Spize der Aeste und in den Winkeln der Blätter in Büscheln beisammen stehen, die sich wieder in viele Aeste theilen; jede Blume hat einen Eierstok mit zween Griffeln und fünf Staubfäden, deren Staubbeutel von der geringsten Berührung, oder, wenn sie zeitig sind, von selbst aufspringen, und ihren Staub ausstreuen; ihr Kelch ist fünfekig, besteht aus fünf Blättchen, und dient, nachdem die Blüthe vorüber ist, unter der Gestalt eines Sterns dem Samen zur Bedekung, der die Gestalt einer Linse hat.

Schon der heßliche Geruch machte Hallern diese Pflanze verdächtig. Tragus d) sah auf ihren Genus Schweine sterben, und ein neuerer Schriftsteller e), den ich nun selbst werde reden lassen, auch bei einem Menschen gefährliche Zufälle darauf erfolgen.

"Ein französischer Sprachmeister, ein ziemlich starker und gesunder Mann, hatte sich verschiedene Kräuter in seine Küche gesammelt, unter welchen auch dieser Gänsefus war. Gleich nach Tische bekam er einen Schwindel, es wurde ihm dunkel vor den Augen; sein Aderschlag war häufig und schwach, sein Augenstern erweitert, seine Glieder zitterten; er klagte über Mattigkeit des ganzes Leibes; seine Haut, vornemlich seine Lippen, Zunge und Nägel waren schwarzblau, die Zun-

d) a. a. O. S. 239.

e) Rust de limitanda laude virtutis stypticae Balsami vulnerarii rubri Dippelii, et Olei Martis per deliquium. Goett. 1773. S. 22.

www.dlibra.wum.edu.pl

ge war voll von zähem dikem und gelblichtem Schleim; die flache Hand und das Weisse im Auge ganz gelb, und nach einigen Stunden verbreitete sich diese Farbe über die ganze Oberfläche des Leibes, und hielt einige Tage lang an. Doch wurde er durch ein Brechmittel, ob es gleich kein Erbrechen erregte, sondern nur zweimal auf den Stuhlgang trieb, durch Baumöl und Essig bald wieder hergestellt: aber die Mattigkeit, die gelbe Farbe und das schwache Gesicht behielt er noch einige Tage.

Sollte wohl der rothe Gänsefus, Chenopodium rubrum Linn. Gärtner a. a. O. Cent. V. Pl. 75. Abb. 6. der sich durch seine ziemlich stumpfe, dreieckige, gezahnte, und mit tiefen Buchten am Rande versehenen Blätter, durch seine röhrlichte, aufrechte, zusammengesezte und ziemlich blattreiche Blumentrauben unterscheidet, übrigens aber mit dem unächten übereinkommt, hier eine Erwähnung verdienen, da er auch den Schweinen tödlich sein soll f).

4) Eibenbaum, Taxbaum, Taxus, Ibenbaum, Ifenbaum, Eifenbaum, Eienbaum. Taxus baccata Linn. Taxus, Blackwell a. a. O. Pl. 572.

Er findet sich hin und wieder in Europa und in dem mitternächtlichen Amerika, in steinigen und gebürgichten Gegenden. Sein Stamm wird in gutem fruchtbarem Boden ziemlich hoch und dik, hat ein rothbraunes ziemlich vestes Holz, und treibt viele Aeste, die, so lange sie noch jung sind, eine grüne, nachher aber eine rothbraune Rinde haben.

---

f) Tragus a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Seine Blätter sind oben dunkelgrün, glänzend, unten hellgrün, und werden im Herbst etwas gelb; sie bleiben aber den Winter über am Baum; sie gleichen überhaupt den Blättern der Tanne sehr, nur sizen sie nicht so ordentlich kammartig an den Zweigen, und laufen ohne Einschnitte ganz spizig zu. Seine Blumen zeigen sich im Merz und April in den Winkeln der Blätter, gemeiniglich auf ihrer untern Fläche; auf dem einen Baume sizen solche Blumen, welche nur Staubfäden und keinen Staubweg, auf dem andern aber nur solche, welche einen Staubweg und keine Staubfäden haben; die ersten zeigen sich schon im Erndemonat zuvor als kleine runde Knospen, im Frühling aber in rundlichten Käzchen neben einander; sie haben keinen andern Kelch, als die Knospe, von vier bis sieben Blättchen, unter welchen die äusern dik und hart, die innern zart und silbergrau sind. Ihre zahlreichen Staubfäden sind länger als die Knospen, und in eine Säule mit einander verwachsen; sie haben breitgedrükte und am Rande zugestumpfte Staubbeutel, welche in sechs bis acht Theile zerschnitten sind, und wenn sie ihren Staub abgeworfen haben, erscheinen sie flach wie ein Schild mit einem achtmal eingeschnittenen Rande. Die lezten haben einen oval zugespizten grünen Eierstok, der sich ohne dazwischen kommenden Griffel in eine spizige Narbe verliert; sie hinterlassen einen schwarzen oval länglichten Samen, der zu Ende des Erndemonats und zu Anfang des Herbstmonats reif wird, und mit der Spize aus dem Kelche hervorragt. Dieser dient vornemlich dem Samen zur Bedekung, wird saftig und länglich rund, und stellt eine schöne rothe, aber vertiefte, klebrichte Beere von fadem Geschmake vor.

Die Nachrichten von seiner Wirkung auf Thiere und Menschen scheinen sich zu widersprechen, wenn nicht dieser

www.dlibra.wum.edu.pl

Anſchein von Widerſpruch auf dem wärmeren oder kälteren Himmelsſtriche, unter welchem der Baum wächſt, auf der wärmern oder kältern Jahrszeit, zu welcher die Erfahrungen gemacht ſind, vielleicht auch zum Theil auf der Tageszeit und Witterung, auf dem verſchiedenen Alter des Baums und ſeiner Theile, auf dem Gewichte und der Art wie ſie genommen wurden, beruht. Schon Plinius g) und Dioſkorides h) ſchildern den Schatten des Taxbaums, jener des arkadiſchen, dieſer des narboniſchen als giftig, und noch Harmand erzählt ſowohl das Beiſpiel eines Hundes i), welcher darinn in Schlaf verfiel, als die Geſchichte einer ſtarken Magd k), welche, da ſie eine Nacht unter dieſem Baum geſchlafen hatte, mit einem ſehr ſtarken Frieſelausſchlag erwachte, und innerhalb vierzehen Tagen an einem hizigen Fieber ſtarb; und Bellucci l) von Gärtnern, welche das Schneiden dieſes Baums über eine halbe Stunde nicht aushalten konnten, ohne die heftigſten Kopfſchmerzen zu bekommen; Taglini m) und andere hingegen erklären dieſen Schatten für unſchädlich; die Wurzeln eines alten Taxbaums tödeten nicht nur, da man ſie in einen fiſchreichen Waſſergraben geworfen hatte, eine groſe Menge Fiſche, ſondern dieſe Fiſche lieſen auch Kazen unangetaſtet liegen, und Menſchen, welche

---

g) a. a. O. L. XVI. c. 10.

h) a. a. O. L. IV. c. 80.

i) Iournal de medecine, chirurgie, pharmacie &c. B. LXXXIII. S. 212.

k) Ebenderſ. a. a. O. S. 213.

l) Bei Ray a. a. O. II. S. 1417.

m) Lettere ſcientifiche ſopra varii dilettevoli argumenti. Firenze 1747. S. 90.

www.dlibra.wum.edu.pl

davon genoſſen hatten, hatten einige Tage lang an Durchfall und Leibſchmerzen zu leiden n). Die Rinde mit den Blättern in Pulver gegeben, wirkte auf eine Henne, auf eine Kaze, und auf ein Schaf, auf beide lezten doch erſt nach einigen Wochen, auf ein an der Fallſucht liegendes Kind, welches anfangs zwei, nachher ſechs Grane eines ſolchen Pulvers mit Zuker und Wein bekam, in wenigen Tagen tödlich o).

Aber nach allen Nachrichten haben Blätter und Zweige am häufigſten Schaden angerichtet, der Galen ſchon p) und ſpäterhin Allen p*) veranlaßt haben mag, dieſen Baum giftig zu nennen, und andere q), ihn mit dem Namen: Baum des Todes zu bezeichnen. Wirft man ſie in einen Fiſchteich, ſo werden die Fiſche davon ſo betäubt, daß ſie ſich mit der Hand fangen laſſen r). Schon Theophraſtus Ereſius erzählt, daß Hausthiere, die widerkäuende ausgenommen, ſterben s); Matthiol will den gleichen tödlichen Erfolg auch bei widerkäuenden, und namentlich bei Hornvieh t), J. Bauhin u) ſo wohl bei dieſem als bei Eſeln bemerkt haben; nach Birch x) tödeten ſie die Pferde des

---

n) Harmand a. a. O. S. 216.

o) Ebenderſ. a. a O.

p) De ſimplic. medicam. L. VIII.

p*) Synopſ. univerſ. medic. practic. Francof. 1749. S. 560.

q) Suite de la matiere medicale de Mr. Geoffroy B. III. S. 2. S. 161.

r) Floyer pharmacobaſan. S. 189.

s) Hiſt. plant. L. III. c. 10. Ed. Bod. a Stapel. S. 160.

t) Comment. in Dioſcoridem. L. VI. c. 72. S. 989.

u) a. a. O. B. I. Th. 2. S. 244.

x) Hiſtory of the royal Society of London. I. S. 454.

www.dlibra.wum.edu.pl

Marschalls von Sachsen, auch Schwente y), Havemann z), Stedman a), Viborg b) und einige Ungenannte c) sahen Pferde, die beiden ersten auch d) Ziegen, Floyer e) Pechey f), Coles g), und ein Ungenannter h) Kühe, der lezte i) auch viele Schafe davon hinfallen, Toppetti k) noch von den welken Blättern Esel darauf gehen; auch in der Provence glaubt man, sie blähen das Vieh auf und tödten es in die Länge l). Nach andern hingegen werden sie von

---

y) Verhandling over de Cicuta aquatica Gesneri. Hag. 1756. S. 53.

z) Hannöverisches Magazin 1789. S. 79. S. 1249. ꝛc.

a) Philosophical Transactions. B. XLVII. art. 27.

b) Schriften der leipzig. ökonomischen-Gesellschaft. B. VIII. S. 157. 159.

c) Ebendersf. S. 156.

d) a. d. a. O.

e) a. e. a. O.

f) Compleat herbal of physical plants London 1694. S. 196.

g) The art of simpling or an introduction to the knowledge and gathering of plants. London 1656. S. 59.

h) Hannöverisches Magazin 1781. St. 53. S. 847. ꝛc. und S. 55. S. 879. ꝛc.

i) Ebendaselbst St. 8 S. 126. ꝛc.

k) Reisen in einem Auszuge von Jagemann B. I S. 251.

l) Darluc a. a. O. II. S. 26 noch andere Beispiele ihres nachtheiligen Erfolgs auf verschiedene Thiere haben, 1) v. Haller Hist. stirp. Helvet. indig. n. 1663. 2) Schreber Sammlung von ökonom. und in die Cameralwissenschaft einschlagenden Abhandlungen ꝛc. B. VI. S. 253. 3) Riem Sammlung vermischter ökonomischer Schriften B. II. S. 4. 4) Paulet recherches sur les maladies epizootiques B. II. 396. &c. gesammelt.

www.dlibra.wum.edu.pl

von wildem und zahmem Vieh m), Ziegen n), Kühen o), Schafen, Rehen und Pferden p) ohne Schaden gefressen; auch Viborg q) sah sie zwei Pferde, denen man sie mit Hafer zu fressen gab, ohne allen Schaden nehmen; das daraus bereitete Extrakt schadete einer Elster und einem Hunde nichts r), selbst das davon mehrmalen abgezogene Wasser Hunden nichts r*). Schon Dioskorides s) schreibt ihnen die gleiche Wirkung auf Menschen zu, als dem Schierling, und Julius Cäsar t) so wohl als Florus u) erzählen, Kativulk habe sich mit ihrem Safte das Leben genommen; Percival sah drei Kinder von 4 — 5 Jahren, denen sie ihre Mutter frisch mit Zuker in Pulver zu einem Löffel voll gegen Würmer gab, in Beängstigung, und Betäubung fallen, und ohne Schmerzen und Zukungen den andern Tag starben x);

---

m) 1) Göze zweite Harzreise S. 137. 2) Ray a. a. O. II. S. 1417. 3) Suite de la matière medicale de Mr. Geoffroy B. III. S. 2. S. 165. ꝛc. 4) Gleditsch Einleitung in die Forstwissenschaft B II. S. 1051. 5) Meyer medizinische Versuche S 36.

n) Ahlers Hannöverisches Magazin 1782. St. 19. S. 299.

o) Ebendersf. a. a. O. S. 298.

p) Ebendersf. a. a. O. S. 301. 302.

q) a. a. O.

r) Gaterau Iournal de medecine, chirurgie, pharmacie 1789. Octob.

r*) Brandis in einem Briefe.

s) De venenis c. 12. Ed. Sarrac. S. 407.

t) Comment. de bello Gallico. L. VI. c. XXXI. s. cum not. Voss. Amstelaed. 1697. S. 171.

u) Hist. rer. rom. IV. S. 66.

x) Essays medical, philosophical and experimental. B. II. S. 180. ꝛc.

www.dlibra.wum.edu.pl

H. Hofr. Brandis ein Mädchen, dem sie ein Hirte gerathen hatte, um sich die Leibesfrucht abzutreiben, an einem Quintchen derselbigen y), Rai z) von dem mit den Zweigen abgekochten Wasser einen andern Menschen sterben; auch ein Mädchen, welches sich damit rothe Wangen verschaffen wollte, büßte seine Eitelkeit mit dem Leben, auch Buchholz bekam von etwa zehen Granen des Extrakts Schwindel, drükenden Schmerzen über den Augen, und Neigung zum Schlafe a). Dessen unerachtet zweifeln doch noch viele b) an der schädlichen Kraft dieser Blätter und Zweige, und Gaterau c) empfand wenigstens von zwei Granen des Extrakts, welche er morgens nüchtern zu sich nahm, keine Ungelegenheit; er bediente sich dessen vielmehr mit Nuzen gegen Flüsse d), so wie Harmand e), nur daß dieser es mit Wein bereitete, Buchholz f) und Hufeland g), gegen Fallsucht, und, so wie Althof h), im Ausbleiben des Monatflusses; schon der Kaiser Klaudius rühmte den Saft gegen giftigen Schlangenbis i), und schon längst ist das mit den Blättern gekoch-

---

y) In einem Briefe.

z) Catalog. plantar. circa Cantabrig. nascentium. S. 162.

a) Bei Althof a. a. O. II. S. 606.

b) Z. B. J. Camerarius Hort. medic. et philosoph. S. 166.

c) a. a. O.

d) Ebenders.

e) a. a. O. S. 217.

f) Bei Althof a. a. O. S. 612.

g) Ebenders. und Annalen der französischen Arzneykunde. B. I. S. 149. Anm.

h) a. a. O. S. 613. 614.

i) Suetonius Vit. imperat. Claud. c. 16. zu Ende.

www.dlibra.wum.edu.pl

te Wasser in Schlesien im Rufe gegen den tollen Hunds- bis k); noch mehr gilt das von dem geraspelten Holze, welches zu einem halben Quintchen l) bis zu einem Loth m) mit Mehl und Wasser angemacht und gebaken, bei Hunden und Menschen gute Dienste geleistet haben soll. Harmand hat von dem mit der frischen Rinde angebrühten Wasser in Wechselfiebern und in der englischen Krankheit, glükliche Wirkungen erfahren n).

Auch die Beeren standen früh in einem übeln Rufe; schon Dioskorides o) versichert, sie erregen bei Hühnern schwarze Farbe, und bei Menschen Bauchflüsse, Matthiol p) will so wohl diese, als hizige Fieber, J. Kamerarius q) bei Vögeln Betäubung auf ihren Genus wahrgenommen haben, und Selle r) erzählt das Beispiel eines fünfjährigen Knaben, bei welchem auf den unmäsigen Genus dieser Beeren Fleken ohne Fieber ausbrachen, und nach 14 Tagen der Tod erfolgte, da sie hingegen Theophrastus s), Lobel t),

---

k) a. e. a. O.

l) Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. B. VII. S. 254.

m) Von Burgsdorf Forsthandbuch. S. 257.

n) a. a. O. S. 214. 221. 222.

o) Περι ὑλης ἰατρικης. L. 4. c. 8.

p) Kräuterbuch. S. 1416.

q) a. a. O.

r) Neue Beiträge zur Natur- und Arzneywissenschaft. Berlin. B. I. 1782. S. 1—5.

s) a. a. O.

t) Stirp. adversar. S. 450.

www.dlibra.wum.edu.pl

Gerard u), Brookes x), Brandis y), Meyer z), Percy a) und andere b) für ganz unschädlich erklären, und Percy c) so wohl als ein Ungenannter d) in Katarrhen, in mancherlei Arten des Hustens, in Gries- und Leibschmerzen sehr wohlthätig gefunden haben.

Auch die Samen sollen auf den Stuhlgang treiben e).

Das Holz ist eines der besten europäischen Hölzer, das sehr gut zu feinen Arbeiten taugt, und sich schön schwarz beizen läßt. Der Gebrauch des Baums zur Zierde der Gärten ist bekannt.

5) Sevenbaum, Iuniperus Sabina Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 214.

Er wächst in Portugall, Italien, Sibirien und den Morgenländern wild.

Er hat einen schweren Geruch, und aufrecht stehende Blätter, welche an den Zweigen herunterlaufen, und immer zwei einander gerade gegen über stehen, und bei dieser ihrer Stellung in ihrer Gestalt einige Aehnlichkeit mit einer Büchse annehmen; seine männlichen Blumen haben drei mit einan-

---

u) Bei Garidell a. a. O. S. 455.

x) Natural history of vegetables. B. VI. S. 396.

y) a. a. O.

z) a. a. O.

a) Iournal de medecine, chirurgie, pharmacie &c. B. LXXXXIII. S. 226. ꝛc.

b) Hannöverisches Magazin 1783. St. 37. S. 583.

c) a. a. O.

d) Hannöverisches Magazin a. e. a. O.

e) Floyer a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

der verwachsene Staubfäden und stehen in Käzchen beisammen. Die weiblichen, welche auf einem andern Stamme stehen, einen in drei Abschnitte getheilten Kelch, von welchem noch Stüke in Gestalt von Erhöhungen an der Frucht hängen bleiben, eine aus drei Blättchen bestehende Krone, und einen Staubweg mit drei Griffeln, und hinterlassen eine Beere, welche, ohne in Fächer getheilt zu sein, drei Samen enthält, und ausen an ihrer Grundfläche mit Balsamdrüschen besezt ist.

Seine Blätter haben, in der oft verfehlten f) Absicht gebraucht, den Monatflus wieder in Gang zu bringen, bei einem Mädchen Blutspeien g), und in der frevelhaftern, eben so oft mislingenden g*) Absicht, ihre Leibesfrucht abzutreiben, bei Müttern tödliche Blutflüsse h) verursacht, und stehen daher mit Recht unter den verdächtigen Gewächstheilen i); doch werden sie nicht nur äuserlich als Pulver aufgestreut, in Warzen k) und Geschwüren l), vornemlich in venerischen m),

---

f) 1) Scopoli Flor. carniol. S. 104. 2) Herz Briefe an Aerzte B. II. S. 151. 156.

g) Haller a. e. a. O. n. 1662.

g*) Storch Hebammenb. S. 220.

h) Mohrenheim Versuche ꝛc. B. II. S. 245.

i) 1) Ammann med. crit. S. 414. 2) Ludwig Medic. forens. S. 88.

k) Alph. Ferrus de caruncula s. callo, quae cervici vesicae innascitur. Lugd. 1553. 4.

l) 1) Rai hist. plant. S. 1416. 2) Lieutaud mater. med. S. 231.

m) 1) Buhle Bemerkungen über Gegenstände der Mundarzneykunst. Th. I. S. 47. 2) Bell system of surgery B. II. S. 266. 3) Dease Medical commentar. B. IV.

www.dlibra.wum.edu.pl

auch in Knochenfäule n) und Brand o), sondern auch innerlich als Pulver im Ausbleiben des Monatfluses p) und in dem daraus gedrükten Safte, oder dem damit gekochten Wasser gegen Würmer q) gebraucht.

6) Einähriger Roßschwanz, Ephedra monostachya Linn. Flor. rossic. Pl. 83.

Er wächst in Sibirien, an der Wolga, auf der jaikischen Steppe und auf den unfruchtbarsten sonnigen Bergen und Hügeln.

Seine Blumen stehen in einzelnen Käzchen auf mehreren Stielen, auf dem einen Stamm nur männliche, auf dem andern nur weibliche, jene haben einen halbentzweigespaltenen Kelch und sieben Staubbeutel, welche einen gemeinschaftlichen Träger haben, und von welchen vier niedriger stehen, als die andern; die weiblichen haben einen fünfachen entzweigetheilten Kelch, der mit der Zeitigung der Samen zu dem Ansehen einer Beere anwächst, und zween Staubwege, und hinterlassen zween Samen, die von Kelch eingehüllt werden.

Er erregt mit Bier, Quaas, Meth gegohren, bei den an der Wolga wohnenden Russen eine Berauschung, bei wel-

---

S. 334. 4) Hagström Tal om Danriks Hospital inrättn. S. 18. 5) Faber a) Traité des maladies veneriennes ed. 1765. B. I. S. 361. 365. b) Nouvelles observations sur les maladies veneriennes. S. 78.

n) 1) Werlhof Opp. ed. Wichmann S. 716. 2) C. L. Hofmann vom Scharbok S. 264.

o) Rai a. a. O.

p) Home cli ical experiments S. 419. ꝛc.

q) Rai a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

cher die Leute so lange singen und springen, bis sie vor Ermattung niederfallen; auch mäsig getrunken, aber stark bereitet, nach dem Rausche Mattigkeit in allen Gliedern r); seine Beere fressen die Vögel, vornemlich die Sumpfvögel, sehr gerne s).

XI. Betäubende Pflanzen mit zusammengesezten Blumen.

Es ist eine einige Pflanze, welche ich hier anzuführen habe, weil sie in ihrem Vaterlande zur Betäubung der Fische gebraucht wird, Aublet hat sie in Gujana gefunden und beschrieben t).

1) Baillieria aspera.

Ihre Blumen haben einen eirunden Kelch, welcher aus vier bis fünf Blättchen besteht, und einen Boden, der mit Spreublättchen besezt ist; die Blümchen in der Mitte haben eine röthlichte Krone, fünf Staubfäden, welche sich in einen Staubbeutel vereinigen und einen jedoch unfruchtbaren Staubweg; die sieben Blümchen im Umkreise haben eine zungenförmige Krone, und zwar keine Staubfäden, aber einen fruchtbaren Staubweg; sie hinterlassen Samen, welche keine Haarkrone aber an der Spize zwei Hörner haben.

r) Jährig bei Pallas neue nordische Beiträge. B. I. S. 164.

s) S. G. Gmelin Reise durch verschiedene Provinzen Rußlands II. S. 13.

t) Plantes de la Gujane françoise. S. 804. Pl. 317.

www.dlibra.wum.edu.pl

XII. Betäubende Bäume und Stauden.

Ich vereinige unter diesem Abschnitte alle Bäume und Stauden dieser Abtheilung, welche nicht schon unter einem der vorhergehenden ihre Stelle fanden.

1) Jacquinie mit stumpfen Blättern, Iacquinia armillaris Linn. Jacquin Stirp. amer. pict. Pl. 56.

Sie wächst auf den karibäischen Eilanden und im mittägigen Theile von Amerika in Wäldern und Gebüschen, welche nicht weit vom Strande liegen, wild.

Ihre Blätter sind stumpf, verlieren sich aber doch zulezt in eine scharfe Spize, ihre Blumen sizen auf eigenen Stielen, welche durch ihre Stellung unter sich Traubenkämme bilden; sie haben fünf Staubfäden, welche tief unten in der Blumenkrone entspringen, einen Staubweg und eine in zehen Abschnitte gespaltene Krone, und hinterlassen eine Beere, welche einen bis vier Samen enthält. Blätter und Zweige werden in ihrem Vaterlande in das Wasser geworfen, um die Fische zu betäuben und leichter zu fangen u).

2) Hearreetree, Hirribaum x).

Man findet ihn in Gujana an dem Ufer der Flüsse in einiger Entfernung von dem Meere und immer einzeln, denn man sagt hier, er zerstöre durch seine giftigen Eigenschaften alle Pflanzen, die ihm nahe kommen. Gemeiniglich wächst er zwischen zwanzig und fünf und zwanzig Schuhe hoch; er

---

u) Jacquin Stirp. Americ. S. 53.

x) Bancroft a. d. a. O. S. 96.

www.dlibra.wum.edu.pl

hat eine graue, rauhe Rinde, die mit weislichtem Mose bekleidet ist. Er treibt nur wenige Aeste, die zunächst an dem Gipfel mit groben runzlichten und dunkelgrünen Blättern besezt sind. Man hält ihn in Gujana für ein äuserst schädliches Gift, und den Rauch des brennenden Holzes, wenn er in die Lunge gezogen wird, allen Thieren für tödlich: deswegen sind einige von den Pflanzungen an den Ufern dieser Flüsse, wo einige von diesen Bäumen gefunden wurden, verlassen, und das Land, das zunächst daran liegt, nicht mehr gebaut worden.

3) Heiarriwurzel, Roots of Hiarree [y]).

Sie wächst theils wild, theils wird sie in Gärten gezogen; die lezte hält man für besser, und sie macht einen betrachtlichen Handlungszweig eines indianischen Stammes aus. Sie ist nemlich die Wurzel eines Strauchs, der ungefähr sechs Schuhe hoch wird, und breite, aber an beiden Enden spizig zulaufende Blätter mit starken Buchten hat. Die Wurzeln selbst werden acht bis zehen Schuhe lang, und behalten ihrer ganzen Länge nach beinahe den gleichen Durchmesser, bis sie sich an der Spize in mehrere Aeste theilen; sie sind rund, ungefähr drei Zolle im Umfange dik, und von einem zähen, faserichten Gewebe; sie gleichen den frischgegrabenen Süsholzwurzeln, sind aber, wie die Pastinaken, mit einem gelbbraunen Häutchen bedekt. Wenn sie die Accawaus zum Verkaufe bringen, so sind sie gemeiniglich in Stüken zerschnitten, die ungefähr zween Schuhe lang und in Bündel gebunden sind. Eines dieser Stüke gequetscht und

---

y) Ebendersf. a. a. O. S. 106.

www.dlibra.wum.edu.pl

in einen Meerbusen, oder in einen Flus geworfen, wenn das Wasser eben fallen, oder steigen will, und stokt, ist im Stande, alle Fische in einer beträchtlichen Entfernung zu betäuben, so daß sie in wenigen Minuten ohne Bewegung auf dem Wasser schwimmen und dann leicht gefangen werden können; läßt man sie aber gehen, so erholen sie sich bald wieder, wenn anders das Wasser nicht mit einer grosen Menge der berauschenden Theilchen der Wurzel geschwängert worden ist. Fast alle Fische, die man in diesem Lande speist, werden auf diese Art gefangen, und doch hat man niemalen gefunden, daß sie durch diese Wurzel ungesund gemacht worden wären. Wahrscheinlicher Weise werden ihre schädlichen Theilchen, so wie die Theilchen der Manihotwurzel, durch das Küchenfeuer verbessert.

Antonio Ulloa gedenkt einer Art von Kräutern, die die Indianer an dem Flusse Guiaquil in Südamerika zum Fischen gebrauchen, von welcher er sagt, daß sie die Indianer zuvor kauen, und dann ins Wasser werfen; würden die Indianer von Guiana diese Wurzel kauen, so würden sie Gefahr laufen, eben so alle Bewegung zu verlieren, als die Fische, die damit gefangen werden; und ich kann nicht begreifen, wie es sich anders mit den Indianern von Guyaquil verhalten kann, da die menschliche Natur noch niemalen eine Freistätte gegen die schädlichen Wirkungen natürlicher oder künstlicher Körper gewesen ist, und es kein Thier von gleicher Gröse giebt, welches von Arzneien oder Giften so leicht angegriffen wird, als der Mensch; ich will deswegen, so unerweislich sie auch ist, die Glaubwürdigkeit der Erzählung nicht läugnen, ob ich gleich aus verschiedenenen Umständen in der Art, wie sie Ulloa vorträgt, muthmase, daß er eher vom Hören sagen, als aus eigener Beobachtung, erzählt hat.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sollten wohl hier auch die Buchekern, oder die Früchte der gemeinen Büche, Fagus sylvatica Linn. Cramer Anl. zur Forstw. Pl. III.

welche sich so leicht durch ihre eirunde am Rande stumpf nach Art einer Säge gezakten Blätter, durch ihre Blumen, von welchen einige 12 — 19 Staubfäden, und einen glokenförmigen in fünf Abschnitte gespaltenen Kelch, die andern auf dem gleichen Stamme drei Staubwege, und einen vierzakigen Kelch haben, und statt der Frucht zween dreiekige ölreiche Samen, in diesen aus vier Schalenstüken bestehenden, bei ihrer Reife stachlichten Kelch eingehüllt, hinterlassen, so leicht unterscheidet, da sie in zu groser Menge genossen, so wie das Oel, wenn es aus unreifen Samen gedrükt wird, Betäubung erregen z);

Sollte der guineische Baum, der bei Ray a) unter den Samen: Lobus magnus ex Guinea foetidus cum granis arboris Iudae vorkommt, da seine Samen innerlich genommen, sehr gefährlich wirken, und das Mark in den Hülsen einen schweren Geruch hat, und damit den Kopf einnimmt;

Sollte die Adamboe von Rheede b), deren Samen auch den Kopf einnimmt, Schwindel, Berauschung und ähnliche Zufälle verursacht;

Sollte die Gamira littorea von Rumpf c), die in Indien auf steinigem Boden wächst, deren Blätter einen

---

z) Göze zweite kleine Harzreise S. 141.

a) a. e. a. O. II. 1773.

b) a. a. O. IV. 20. 21. 45.

c) a. a. O. III. S. 209.

www.dlibra.wum.edu.pl

durchdringenden Geruch haben, und noch als Zugemüs gekocht, Schwindel erregen;

Sollte dessen Aytuy d), der einen Milchsaft in sich hat, und dessen Früchte die Indianer grob gestosen und mit Asche vermengt, in Körben ins Wasser sezen, und nachdem sie das Wasser stark gerührt und die Fische betäubt haben, diese halb todt auf der Oberfläche hinwegfangen;

Sollte dessen Walan e), der auf den hohen Gebirgen von Hiro und den dichten Wäldern von Toya wächst, und dessen rothe Wurzelrinde die Einwohner zu gleicher Absicht gebrauchen;

Sollte Ray's f) Jerichoapfel, dessen Samen die Krokodile töden und Fische betäuben soll;

Sollte endlich der gemeine Koriander, Coriandrum sativum Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 176. dessen frischer Samen durch seine Ausdünstung Schwindel und Betäubung erregt g), wohl hier noch eine Stelle verdienen?

---

d) a. a. O. III. S. 213.

e) a. a. O. III. S. 214.

f) a. e. a. O. III. app. S. 25.

g) Buihn a. e. a. O. S. 68.

www.dlibra.wum.edu.pl

III.

Pflanzen, welche zugleich durch Schärfe und betäubende Kraft wirken.

Nicht geruchlos, wie die meisten scharfen, nicht fad oder geschmaklos, wie die meisten betäubenden Pflanzengifte vereinigen diese Pflanzen in sich die Kennzeichen von beiden mit einander. Obgleich wenige unter ihnen eine solche Schärfe besizen, wie ich sie als ein Merkmal der scharfen Pflanzengifte angegeben habe; obgleich wenige unter ihnen äzende Kräfte auf die Haut äusern; so verräth doch schon die Empfindung, die sie auf der Zunge erregen, bei allen eine gewisse Schärfe, welche ein aufmerksamer Arzt in den übrigen Zufällen noch mehr entdekt.

Alle Arten von Pflanzen, die zu dieser Klasse gehören, haben einen Geruch, der bei einigen scharf, bei andern stärker, bei den meisten aber unangenehm ist. Ihre Ausdünstungen verursachen, vornemlich in einer eingeschlossenen Luft Betäubung, Schwindel, einen unterbrochenen Gebrauch der äuserlichen und innerlichen Sinne, eine übergehende Schwäche der Seelenkräfte und eine unüberwindliche Neigung zum Schlafe; zuweilen wohl noch gefährlichere Zufälle und umgehende Seuchen.

Diese Zufälle werden noch heftiger, wenn etwas von diesem Gifte verschlukt wird. Sie sind immer aus den Zufällen, welche die scharfen, und denen, welche die betäuben-

www.dlibra.wum.edu.pl

den Pflanzengifte erregen, vermischt, und wenn sie in dem einen oder dem andern Falle die Kräfte des Lebens mit der äußersten Gewalt niederschlagen, so spornen sie sie auch auf der andern zu den ausschweifendsten Bewegungen an, welche die Maschine in kurzer Zeit zu Grunde richten müssen.

Die gewöhnlichsten dieser Zufälle, bei deren Erzählung eben das zu bemerken ist, was ich schon einige Male erinnert habe, sind folgende: schmerzhafte und mit krampfhaften Zufällen begleitete Entzündungen des Magens, zuweilen auch der übrigen Eingeweide des Unterleibes, brennende Hize in dem ganzen Leibe, vornemlich in den Gedärmen, Lähmung und gänzliche Unthätigkeit derselbigen, so wie auch des Magens; Schluchzen, Ekel, leere Reize zum Erbrechen, oft willkührliches Erbrechen, welches zuweilen noch heilsam wird; unauslöschlicher Durst, Berauschung, Schwindel, unüberwindliche Neigung zum Schlafe, tiefer Schlummer, grose und anhaltende Mattigkeit, Schlafsucht, Schlagfluß, Fehler und Schwachheit der Augen, oder auch gänzlicher Verlust des Gesichts, Verfall der Sprache, falsches Gehör, Unempfindlichkeit gegen alle äußerliche Gegenstände, gedankenlose Schwermuth, allerlei Arten des Wahnsinns, die manchmal in Raserei ausarten, Zittern und Krämpfe an einzelnen Theilen, oder am ganzen Leibe.

Vorzüglich zeichnen sich diese Gifte durch die ungemein starke und schnelle Auflösung der Säfte aus, die sie hervorbringen, und die nicht nur an einigen der erzählten Zufälle den gröſten Antheil hat, sondern sich auch noch bei Lebzeiten, durch Aufschwellen des Bauchs und ganzen Leibes, durch Unordnungen in dem Umlauf des Bluts, und in der Absonderung der feinern Säfte von demselbigen; durch Ohnmachten, schweren Athem, Angst und Bangigkeit, schwarz-

www.dlibra.wum.edu.pl

blaue Farbe, oder eine Menge von Brandflekken auf der Oberfläche des ganzen Leibes, und nach dem Tode durch einen unbegreiflich schnellen Uebergang in Fäulung, mit einem unausstehlichen Gestank, durch das Ablösen der obern Haut, und die Ströme von dünnem schäumendem Blute, die zu allen Oefnungen des Leibes hervorschiesen, unwidersprechlich verräth. Die Art, diesen unseeligen Folgen zu begegnen, ist übrigens vollkommen die nemliche, wie bei den betäubenden Giften.

So, wie ein unfürsichtiger Genus dieser Pflanzengifte die unglüklichsten Folgen in dem menschlichen Leib hervorbringen kann; so können hingegen diese nemlichen Gifte durch eine fürsichtige Behandlung zu den kräftigsten Arzneimitteln umgeschaffen werden. Nur werden sie selten mit eben der gegründeten Hoffnung eines sichern und glüklichen Erfolgs, als die betäubenden in krampfichten Zufällen und andern allzulebhaften Bewegungen gebraucht werden können; aber desto stärker muß ihre Wirkung sein, wo zu zertheilen und aufzulösen, und hartnäkige Verstopfungen in den kleinsten Gefässen zu heben sind.

Die Pflanzen, welche nach Beobachtungen an Menschen hier eine Stelle zu verdienen scheinen, gehören unter sechs natürliche Ordnungen von Pflanzen. Von den fünf ersten derselbigen habe ich bereits unter den beiden vorhergehenden Klassen der Pflanzengifte die allgemeinen botanischen Merkmale angegeben. I) Bäume und Stauden. II) Pflanzen, die an die Gattung der Nachtschatten gränzen (Solanaceae). III) Doldengewächse (Umbelliferae). IV) Pflanzen mit vielen Staubfäden an den Blumen (Polyandrae). V) Pflanzen ohne Krone an der Blume (Incompletae). VI) Schwämme (Fungi).

www.dlibra.wum.edu.pl

I. Bäume und Stauden.

1) Streubüchsenbaum, Hura crepitans Linn. Trew Plant. Select. Dec. IV. Pl. 34. 35.

Er wächst in dem wärmern Theile von Amerika und den benachbarten Eilanden wild, und in seinem Vaterlande 24 Schuhe hoch, und noch höher, und bleibt immer grün. Sein Stamm ist weich und theilt sich in viele Aeste und Zweige, welche, wenn man Einschnitte darein macht, einen sehr scharfen Milchsaft von sich geben, der, wenn er in die Augen sprüzt, blind macht; seine Blätter sind schön grün, gros, geadert, gekerbt und von der Gestalt eines Herzens, und lassen da, wo sie abfallen, Narben zurük; seine Blumen haben keine Krone; die männlichen sizen in den Theilungswinkeln der Aeste in länglichten überhängenden Käzchen beisammen; diese bestehen aus Schüpchen, welche, wie Dachziegel aufeinander liegen, und jedes eine sehr kurze, abgestuzte walzenförmige Blumendeke mit einem blutrothen, walzenförmigen langen, abgestuzten, steifen Staubfaden bedeken; dieser Staubfaden hat unter seiner Spize zween bis drei Wirtel von Knötchen; in jedes dieser Knötchen sind zween ovale entzweigespaltene Staubbeutel eingesenkt; die weiblichen Blumen, welche auf dem gleichen Stamme sizen, haben keinen Kelch, aber einen Staubweg mit einem trichterförmigen Griffel, und einer in zwölf Lappen gespaltenen Narbe; diese hinterlassen ein trokenes hartes Samengehäus, das inwendig in zwölf Fächer getheilt ist, und in jedem derselbigen einen Samen enthält, und bei starker Sonnenhize mit Gewalt plazt.

Diese Samen wirken, vollends wenn sie noch unreif sind, sehr heftig auf den Stuhlgang, und brachten, auch nur

zu

www.dlibra.wum.edu.pl

zu zwei Stüken gegeben, bei Schwarzen beinahe tödliche Wirkung hervor h).

2) Fischkörner, Kokoskörner, Menispernum Cocculus Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 389.

Der Baum, der diese Körner trägt, ist in Ostindien zu Hause. Sein Stamm ist zerschlissen; seine Blätter sind zugestumpft, haben aber übrigens die Gestalt eines Herzens und verlieren sich in eine steife Spize. Seine Blumen haben an ihrem Kelche zwei, an der Krone aber zwölf Blättchen, von welchen vier die äusere, acht aber die innere Reihe ausmachen. Auf dem einen Baume haben sie sechzehen fruchtbare Staubfäden und keine Spur von Staubwegen; auf dem andern aber acht unfruchtbare Staubfäden und zween Staubwege; die lezten hinterlassen jede zwo Beeren; diese sind, so wie sie zu uns kommen, ungefähr so gros, als unsere grose Erbsen, grau, runzlicht, bauchig und wie eine Niere gestaltet; sie enthalten unter einer zähen Schale einen einigen Kern von äuserst bitterm und brennend scharfem Geschmak.

Dieser äusert auf die Fische, wenn er in Wasser geworfen wird, eine betäubende Kraft, so daß sie durch diesen Kunstgriff, der aber an den meisten Orten höchst verboten ist, leicht gefangen werden können; und in der nemlichen Absicht bedient man sich ihrer in Ostindien, um Paradiesvögel, Papagaien, und andere Vögel, Krokodillen und andere wilde Thiere, Kühe und Böke zu fangen i); bei Kazen und Hunden erregt sein innerlicher Gebrauch Zukungen, Krämpfe, die sich zuweilen bald schneller, bald langsamer mit dem Tode

h) Aublet bei Puihn a. e. a. O. S. 153.

i) Rumpf a. a. O. S. 35.

www.dlibra.wum.edu.pl

endigen k). Bei Menschen erregt er Blutflüsse l), und Hill will Ekel und Ohnmachten m) davon bemerkt haben. Ein Beispiel eines tödlichen Erfolgs findet sich bei keinem bewährten Schriftsteller, und wahrscheinlicher Weise hat blos die Anwendung der Versuche an Thieren auf den Menschen diesen Körnern eine Stelle unter den Giften angewiesen.

3) Gerberstrauch mit Myrtenblättern. Coriaria myrtifolia Linn. Engl. Garden. diction. Pl. XX. Abb. 1.

Er wächst bei Montpellier, auch in Spanien und Italien wild. Seine Wurzel kriecht tief unter der Erde; seine Stengel werden ungefähr vier Schuhe hoch und wachsen buschig; seine Blätter sind länglicht und in ihrem Umfange beinahe rund, wie ein Ei. Seine Blumen haben einen Kelch und eine Krone, die sich einander ganz gleichen, und aus fünf Blättchen bestehen, nur daß diese bei der Krone einigermasen mit einander verwachsen sind. Auf dem einen Baume haben sie zehen Staubfäden mit vollkommen fruchtbaren und entzwei getheilten Staubbeuteln, aber keinen Staubweg; auf dem andern hingegen haben sie zwar auch Staubfäden und Staubbeutel, diese sind aber leer und unfruchtbar; hingegen haben sie einen Eierstok mit fünf Griffeln; diese hinterlassen jeder fünf Samen, welchen die Blättchen der Blumenkrone zur Bekleidung dienen; diese werden endlich, je mehr sich die Samen ihrer Zeitigung nähern, immer desto

---

k) 1) Wepfer a. a. O. S. 184—194. 2) Hillefeld a. a. O. S. 34. 37.

l) Rumpf a. e. a. O.

m) History of the Mat. med. S. 504.

www.dlibra.wum.edu.pl

saftiger, und bilden zulezt mit den Samen eine Art von Beeren.

Ziegen und Lämmer fallen von dem Genus der jungen frischen Blätter in Zukungen, und wenn diese aufhören, in eine Art von vorübergehender Berauschung; alte Ziegen und Esel lassen daher diesen Strauch in Frankreich unangetastet stehen n); auf den pyrenäischen Gebirgen hingegen fressen die lezten seine Blätter mit Geschmak und ohne Schaden. Bei Menschen erregen die Beeren fallende Sucht, die zwar niemalen lange anhält, aber in kurzer Zeit oft wieder kommt, und sich öfters in den ersten Tagen mit dem Tode endigt o).

Erste Geschichte.

Zu Alais speiste 1732 ein Kind von zehen Jahren einige Beeren dieses Strauchs; da es nach Hause kam, fiel es plözlich in mehrere Anfälle einer so heftigen fallenden Sucht, daß es, aller Hülfe ungeachtet, den folgenden Tag starb.

Zweite Geschichte.

Im Jahr 1733 speiste eben daselbst ein gesunder Akermann von vierzig Jahren funfzehen dieser Früchte. Eine halbe Stunde darauf hatte er einen oder zween Anfälle von der fallenden Sucht; man lies ihm zur Ader; der Arzt fand ihn in Zukungen auser sich selbst, schwarzblau und auf dem Punkte, aus dem Bette zu fallen. Er gab ihm auser dem Anfall ein Brechmittel, und der Kranke brach acht bis neun

n) Sauvages Histoire de l'Academie royale des sciences à Paris pour l'ann. 1739. S. 473.

o) Ebenders. a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Beeren heraus; allein er blieb, deſſen ungeachtet, noch dieſen Abend in dem funfzehenden Anfalle. In ſeinem Leichname fand ſich nichts widernatürliches, als fünf bis ſechs Beeren in dem Magen p).

4) Strychnos.

Die Arten dieſer Gattung ſind Bäume und erreichen eine beträchtliche Höhe. Ihre Blätter ſind im Umfange eirund. Ihre Blumen haben fünf Staubfäden und einen Staubweg beiſammen; ihr Kelch iſt in fünf Stüke getheilt, und auch ihre Krone in fünf Abſchnitte geſpalten. Jede Blume hinterläßt eine Beere, welche eine hölzerne Schale und inwendig nur eine Zelle hat, und oben noch mit der zurükgebliebenen Narbe gezeichnet iſt. Beide Arten ſind in Oſtindien zu Hauſe.

α) Krähenaugen, Gränaugen. Strychnos Nux vomica Linn. Nux vomica, Blackwell a. a. O. Pl. 395.

Der Baum hat in allen ſeinen Theilen eine ungemeine Bitterkeit. Seine Wurzel iſt dik und holzig; ſein Stamm iſt aufrecht und beträgt einige Lachter im Umfange; ſeine Aeſte ſtehen ohne beſtimmte Ordnung, und die äuſerſten haben viele ungleiche Erhöhungen; ſeine Blätter ſtehen wechſelsweiſe auf eigenen Stielen, und haben einen ganz glatten Rand, und auf ihrer untern Fläche noch fünf Ribben. Seine Blumen ſind klein, haben eine grünlichte Krone, und zeigen ſich im Erndemonat in länglichten Büſcheln beiſammen. Seine Beeren ſind kugelrund und gelb, aber leicht zerbrechlich; in ihrem weiſſen und weichen Marke liegen viele glatte,

p) Ebenderſ. a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

graue, kreisrunde Samen von äuſerſt bitterem und ekelhaftem Geſchmak, die gleichſam einen Nabel in der Mitte haben, von welchem viele Haare, wie Strahlen, aber nach einer krummen Richtung auslaufen.

Dieſe ſind die ſogenannten Krähenaugen, welche zwar Schweinen q) nicht zu ſchaden ſcheinen, deren tödliche Kräfte aber auf andere Thiere, auf Hunde r), Kazen s), Kaninchen t), Krähen u), und Enten x) ſchon längſtens bekannt, durch neuere Verſuche beſtätigt, und ſelbſt benuzt y) worden ſind. Auch in dem menſchlichen Leibe erregt ihr unvorſichtiger Gebrauch gefährliche Zufälle y*): man hat darauf

---

q) Loſſius diſſ. de nuce vomica, Vitemb. 1683. §. 24.

r) 1) Wepfer a. a. O. S. 194—208. 2) Brunner bei Wepfer a. a. a. O. 3) De Heyde Obſerv. 50. S. 116. 4) Courten Philoſoph. Transact. 4. 335. 4) Seutter diſſ. de nuce vomica. Lugd. 1691. 6) Konr. Geſner Epiſt. fol. 33. a. 7) Alm praeſ. Sidren diſſ. de nuce vomica. Upſal. 1780. 8) P. L. Sachs monocerologia ſ. de genuinis unicornibus diſſ. Ratzeburg 1676. 8. 9) Hillefeld a. a. O. VII. VIII. Erſ. St. 4. u. f.

s) 1) Brunner bei Wepfer a. a. O. S. 209. 2) Loſſius a. a. O. 3) Hillefeld a. a. O. IV. Erſ. S. 3.

t) Hillefeld a. a. O. I und V. Erſ. S. 1. 2.

u) Loſſius a. a. O. §. 15.

x) 1) Ebenderſ. a. a. O. 2) Hillefeld a. a. O.

y) Schon längſt bedient man ſich ihrer, Mäuſe und Razen zu tödten, und Kalm räth an, die Samen, die man ausſäen will, damit in Waſſer zu kochen, um ſie gegen die Saatkrähe zu verwahren. Reſa til Novra America &c. I. S. 173.

y*) Bei mehreren Tiſchgenoſſen in dem Hauſe eines hildburghäuſiſchen Pächters. Gemeinnüziges Volksblatt, her-

www.dlibra.wum.edu.pl

Ekel z), starkes Erbrechen, heftigen Durst, grausame Bauchflüsse a), entsezliche Bangigkeiten b), plözliche Ermattung c), Berauschung d), Magenkrampf e), Zukungen f), Steifigkeiten und Unempfindlichkeit beinahe in dem ganzen Leibe g), Schweise h) und Tod i) selbst erfolgen sehen.

Geschichte.

Einem Mädchen von zehen Jahren gab man in einem hartnäkigen viertägigen Wechselfieber zweimal hintereinander

---

ausgegeben von der märkischen ökonomischen Gesellschaft zu Potsdam. 8. Jahrg. IV. Aug. 1801. S. 361. 362.

z) Matthiol Comment. in Dioscorid. L. IV. C. 23.

a) Ebendersf. a. e. a. O.

b) 1) Hofmann Medic rat. systemat. B. II. p. 175. 2) Matthiol a. e. a. O.

c) Matthiol a. e. a. O.

d) Veckoskrift för Läkare och Naturforskare. B. II. S. 169.

e) Ebendersf. a. e. a. O.

f) 1) Matthiol a. e. a. O. 2) a. a. O. §. XI. 3) Wiel observ. de usu interno nucis vomicae et vitriol. alb. Vitemb. 1771. S. 12. 14.

g) Seutter a. e. a. O.

h) Matthiol a. e. a. O.

i) 1) Ebendersf. a. e. a. O. Ein Gewicht von fünfzehen Granen zweimal in dem viertägigen Fieber von einem zehnjährigen Mädchen genommen. 2) Fr. Hofmann a. e. a. O. 3) Tillaus de Febrium intermittentium curatione S. 40. Bei einem 16jährigen Knaben. Nationalzeitung der Teutschen. 4. 1801. St. 17. S. 360. 4) Strandberg bei Kiernander Medic. Lag. S. 269. 5) Consbruch bei Hufeland Iournal &c. B. IV. S. 442. 6) Bei einem 15jährigen Knaben zu Werden. Gemeinnüziges Volksblatt ꝛc. a. e. a. O. S. 360. 361.

www.dlibra.wum.edu.pl

fünfzehn Grane Krähenaugen. Bald darauf verfiel es in die unerträglichsten Bangigkeiten, hatte starke Reize zum Erbrechen, und starb k).

Allein eben diese Krähenaugen haben in andern Fällen, in geringem Gewichte l), bei stärkerer Leibesbeschaffenheit m), oder bei solchen, die sich nach und nach daran gewöhnten n), nichts geschadet, ja sie werden sogar nach einigen Erfahrungen o), mit ausnehmendem Nuzen in verschiedenen Krankheiten

---

k) Fr. Hofmann a. e. a. O.

l) Loſſius genos einen oder den andern Gran der rohen Krähenaugen, oder ihres Extrakts ohne Schaden a. a. O. §. 23.

m) Eine starke Frau, Melichius Dispensat. medic. ad elect. de aromat. Galen. Ein anderer nahm ein ganzes Stük ohne Schaden zu sich, bei Loſſius a. a. O. Ganze Völker, die Türken, Melichius a. e. a. O. die Lappen nehmen ein halbes Stük mit Wasser oder Brandewein gegen die Kolik ein, Montin de Medic. Lappon. Lulenſ. Lond. 1751. einige Kranke in dem Spital zu Moskau anderthalb Loth mit Süsholzsaft in einem Tage. Wiel a. a. O. S. 10. das gemeine Volk in Teutschland. Wedel de Venenis et Bezoarticis und zu seinen Zeiten die Schüler von einem Scrupel bis zu einem Quintchen, Fallopius de Tumor. S. 11.

n) Ein junger Mensch von achtzehen Jahren stieg von einem Grane bis zu fünfzehn auf. Schulze Mat. med. S. 404.

o) 1) Wiel a. a. O. 2) Junghans de nucis vomicae et corticis hippocaſtani vi medica. Hal. 1770. 4. 3) Hartmann Diſſ. ſpicilegia ad nucis vomicae uſum medicum. Traj. ad viadr. 1785. 4) J. Fr. Cappel praeſ. C. A. Nicolai diſſ. de nucis vomicae viribus et uſu. Ienae 1784. 8. 5) Hufeland Iournal &c. B. II. H. 2. S. 311.

www.dlibra.wum.edu.pl

gebraucht, wenn ihre schädlichen Kräfte durch gewisse Kunstgriffe vorher stumpf gemacht worden; oder wenn sie entweder roh p), oder noch besser, nachdem man die Haare von ihnen hinweggenommen, und sie braun geröstet, und sie zerrieben hat q), mit Weingeist ausgezogen werden, da sie alsdann wider Würmer r), in Wechselfiebern s), in der Milzsucht t), in dem Mutterweh u), in Raserei x), in Fallsucht y), in der Ruhr z), in Flus und Gicht z*), in Krebs-

---

p) So bereitete Wiel a. a. O. S. 8. seine Tinktur; so gieng Junghans nach dem Vorgang eines Büchners zu Werke a. a. O. S. 11.

q) Nach den Erfahrungen eines Junghans a. a. O. S 11—18. §. III—V.

r) 1) Schulze a. e. a. O. 2) Junghans a. a. O. S. 13. 3) Hartmann a. a. O. S. 23.

s) 1) Ludovici pharmac. modern. fecul. applic. oper. S. 113. 2) G W. Wedel Amoenit. mat. med. S. 337. 3) Büchner Dispens. Brandenburg. S. 61. 4) Hartmann Diss. sist. observ. ad cicutae, mercurii sublimati et phosphori usum. S. 17. 5) Junghans a. e. a. O.

t) 1) Junghans a. a. O. S. 9. 2) Thebesius Nov. act. Ac. Caes. Nat. Curios. I. S. 175.

u) 1) Wiel a. a. O. S. 5—13. 2) Sidren a. a. O. S. 6. 3) Hartmann Spicileg. &c. S. 28.

x) Albinus bei Alston Mater. med. II. S. 41.

y) Sidren a. a. O. S. 6. ꝛc.

z) 1) Hagström Svensk. Vetensk. Academ. Handl. för ar 1773. S. 301. 2) Odhelius a) ebendersf. för ar 1774. S. 270. b) Tal om Lazarettet. Stockholm. S. 27. 3) Dalberg bei J. A. Murrey Apparat. medic. I. S. 715. 4) Andere schwedische Aerzte Veckoskrift för Läkare och Naturforskare II. S. 171. 5) Ch. E. Fischer Versuch einer medicinischen Armenpraxis. Goetting. 1799. 8. n. 3.

www.dlibra.wum.edu.pl

artigen Geschwüren und einem allgemeinen Verderben der Säfte a) mit grosem Vortheil innerlich gegeben werden können.

Die Indianer benuzen den Baum selbst zu Zäunen, und bereiten aus den Samen, nachdem sie sie gut in Wasser eingeweicht und gekocht haben, ein Lampenöl b).

β) Unächtes Schlangenholz, Strychnos Colubrina Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 403.

Seine Wurzel ist stark, dik und holzig, und ihre Schale schwärzlicht und grau gefleckt; ihr Holz hat, so lange es frisch ist, eine erstaunende flüchtige Schärfe und eine betäubende Kraft, und erregt Unempfindlichkeit, Zittern und Sinnlosigkeit c), aber durch Troknen und Alter verliert es einen grosen Theil seiner schädlichen Schärfe; es behält aber doch noch einen durchdringenden bittern Geschmak, und mit diesem eine eröfnende, gelind abführende und brechenmachende Kraft d), welche den ältern Aerzten seinen Gebrauch in Wechselfiebern und Würmern empfohlen hat e).

Doch gebrauchte sie H. Leibarzt Wepfer ohne Erfolg. Nordisches Archiv für Natur- und Arzneiwissenschaft, herausgegeben von Pfaff und Scheel. Kiel 2. B. 1. St 1. 1799.

z*) Oberteuffer a. a. O. S. 111. 112.

a) Wiel a. a. O.

b) Hamburg. Magaz. B. IV. S. 201.

c) Heide Observat. Cent. obs. 7.

d) P. Hermann Cynos. mater. medic. I. S. 235.

e) Linné Amoenit. academ. B. II. S. 124.

www.dlibra.wum.edu.pl

5) Ignatiusbohne, Ignatia amara Linn. Camelli philoſoph. Transact. B.XXI. n.250. Pl. I. Abb. 4. 5. 6.

Dieſer Baum wächſt auf den philippiniſchen Eilanden wild. Seine Blume riechen, wie Jaſmin, haben fünf Staubfäden und einen Staubweg, einen aus einem Stüke beſtehenden Kelch mit fünf Zähnen am Rande, und eine ſehr lange trichterförmige Krone; die Steinfrucht, welche jede derſelbigen hinterläßt, hat die Geſtalt einer Birne, iſt inwendig nicht in Fächer getheilt, und enthält unter einer harten hölzernen Schale gegen zwanzig Samen (Ignatiusbohnen), welche ſehr fein geſtreift, auf der einen Seite rund gewölbt, auf der andern aber vielekig von auſen blaßbraun und gleichſam mit Mehl beſtreut, inwendig aber braungrün und hornartig, überhaupt aber von einem ausnehmend bittern Geſchmak ſind. Eben dieſe Samen ſind den meiſten wilden Thieren ein Gift; Hunde ſtarben davon in Zukungen f); auch bei Menſchen erregen ſie Erbrechen und Bauchflus g), auch wohl Krämpfe und Zukungen h); unwillkührliches Lachen, Beängſtigungen, Schwindel und kalte Schweiſe h1), ſelbſt den Tod h2). Doch ſind auch ſie in kleineren

---

f) Sidren und Alm a. a. O. S. 13. 14.

g) Cullen treat. of mater. medic. B. II. S. 91.

h) 1) Camelli a. a. O. S. 88. 2) Zeviani a. e. a. O.

h1) Camelli a. e. a. O.

h2) Bei einem jungen Jeſuiten zu Parma. Zeviani a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Gewichten zu wenigen Granen in hartnäkigen Wechselfiebern i) und Fallsucht k) mit Nuzen gebraucht werden.

Sollte wohl die Possira, Possira triphylla, Aublet plant. de la Gujane françoise &c. Pl. 355.
aus Gujana, welche sich durch ihre dreifache auf gerandeten Stielen sizende Blätter unterscheidet, Blumen mit vielen nicht vereinigten auf dem Fruchtboden stehenden Staubfäden und einem Staubwege, mit einem in vier Abschnitte getheilten Kelche und einer zur Seite stehenden aus einem Stüke bestehenden Krone, und Hülsen, die aus zwei Schalenstüken bestehen, und inwendig nicht in Fächer getheilt sind, trägt, hier eine Stelle verdienen?

Die Samen dieses Baums sind von ekelhaftem sehr scharfem Geschmak, und erregen Entzündung und Geschwulst l).

II. Nachtschattenarten, Solanaceae.

1) Wolfskirsche, gemeine Wolfskirsche, Tollkirsche, Dollkraut, Dollwurz, Dollbeere, Teufelsbeere, Wuthbeere, Felsbeere, Schlafbeere, Schlafkraut, Waldnachtschatten, tödlicher Nachtschatten, Walkenbaum, Bollwurz, Atro-

---

i) 1) Neumann Chym. med. B. II. Th. 2. S. 291. 2) Lewis mater. medic. S. 412. 3) Lind Diseas. of hot climat. S. 306. 4) Four de Bourieu Histoir. de la Societé de medec. à Paris B. I. S. 340.

k) 1) Act. Berolin. Dec. II. B. 10. S. 12. 2) Valentini Histor. simpl. reform. S. 198.

l) Aublet a. a. O. S. 934.

www.dlibra.wum.edu.pl

pa Belladonna Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 564.

Sie wächst in der Schweiz, in Teutschland, in den Niederlanden, und in England, auf waldichten Gebirgen, und blüht im Brach- und Heumonate.

Ihre Wurzel ist lang und dik, hält mehrere Jahre aus, theilt sich in viele Aeste, und treibt einen eigenen Stengel; dieser wächst aufrecht bis sechs Schuhe hoch, oder noch höher; er ist weich, weitschweifig, und meistens über einen Zoll dik; er theilt sich in viele Aeste, welche wie ein Arm, ausgestrekt sind. Ihre Blätter sind weich, haarig, ungleich, und gros, doch zeigen sich hin und wieder mitten unter den grosen auch kleinere; sie sizen am Stengel und Aesten meistens paarweise auf eigenen kurzen Stielen einander gerade gegen über, und haben an ihrem Rande Zähne: nach ihrem Umfange gleichen sie sehr einem Ei, nur daß sie an beiden Enden, spizig zulaufen. Ihre Blumen stehen einzeln, jede auf einem eigenen Stiele, in dem Winkel eines Blatts; ihr Kelch ist weit kürzer, als die Krone; die Gestalt desselbigen hat etwas von der Gestalt einer Gloke, und seine Abschnitte sind dreiekig; ihre Krone hat eine sehr traurige Farbe, welche aus der grünlichten in die purpurrothe spielt, und theilt sich wenigstens in fünf kurze, dreiekige und ungleiche Abschnitte; ihre Staubfäden sind gekrümmt, und stehen in einer ziemlichen Entfernung auseinander; ihr einzelner Eierstok trägt einen Griffel, der sich an seiner Spize krümmt, und in ein nierenförmiges Köpfchen verliert. Ihre Beeren werden im Herbst- und Weinmonathe reif; sie sind kugelrund, kohlschwarz, glänzend und überhaupt beinahe, wie eine Kirsche, gestaltet; sie haben einen faden, süssen, Geschmak, und sind inwendig durch eine

www.dlibra.wum.edu.pl

Scheidewand in zwei Fächer getheilt, die beide mit einer ungeheuren Menge rundlichter und gedüpfelter Samen angefüllt sind.

Ob gleich die Beeren einem Kaninchen m), ihr Saft einem Hunde, bis zu zwei Lothen eingegeben, nichts geschadet haben n), auch die Schafe das Kraut gerne und ohne Schaden fressen o), so ist es doch dem Hornvieh tödlich p) und nach zuverlässigen Erfahrungen hat die Wurzel q), die Blätter r),

---

m) Manetti viridarium Florent. 1751. S. 21.

n) Rossi a. a. O. S. 11. 14.

o) Hannöver. Magaz. St. 68. den 25 August 1775.

p) Hacquet a. e. a. O. S. 52.

q) 1) Dioskorides a. e. a. O. L. VI. C. VI. §. 501. 2) Matthiol a. e. a. O. S. 1413. 3) Lobel und Pena Nova stirp. adverf. S. 103. 4) Cicelius Diatribe de Belladonna. Ien. 1724. 5) M. B. Valentini Act. Acad. Caes. Nat. Curios. Vol. II. obs. 119. S. 274. 6) Carl ebendas. Vol. IV. Obs. 86. S. 324.

r) 1) Thalius Sylva Hercynica Francof. 1588. S. 105. 2) Roncalli Parolini Europae medicina Brix. 1747. 3) J. B. Porta Mag. natural. I. 8. c. 1. 4) Haen Ration. medend. T. II. S. 45. 5) Lambergen Ephem. personat. carcinomatis. Groning. 1754. 6) Bromfield Account of the English Nightshades, and their effects, and the Use of Salsaparilla. Lond. 1757. 7) Timmermann und Degner in des Ersten pericul. medic. Belladonnae. Rintel. 1765. 8) Rai in Miller's Gärtnerlexicon S. 319. 9) Histoire de l'Acad. des sciences de Paris pour l'ann. 1706. S. 72. 10) Ephem. Acad. Caes. Nat. Cur. Vol. II. obs. 119. 11) Iournal de Medec. &c. Vol. XI. S. 509—511. Ebend. 1757. m. Aout. und 1759. m. Aout. 12) Neues Magazin für Aerzte, herausgegeben von Baldinger. Leipzig. 8. H. 1. St. 1. 1779.

www.dlibra.wum.edu.pl

und vornemlich die Beeren s), deren äuſerliches Anſehen und unſchuldiger Geſchmak ſo ſehr verführeriſch iſt, bald aus Unvor-

---

s) 1) Gentlem. Magaz. 1747. M. Aug. 1748. M. Sept. 2) Matthiol Kräuterbuch IV. B. 72. Kap. S. 276. b. 3) Ollinger bei Tragus in ſeinem Kräuterbuch I. B. S. 101. 4) Tragus ſelbſt a. e. a. O. 5) Lobel und Pena a. a. O. S. 103. 6) G. Horſt opp. omn. II. S. 488. 7) Gerard Herbal. London 1597. S. 341. 8) Bodäus a. Stapel in den Anmerkungen zu Theophraſti Hiſt plantar. L. IX. C. 12. S. 536. 9) Paulli a. a. O. C. III. Solan. 10) El. Cammerer bei Wepfer a. a. O. S. 227. 11) Alberti juriſprud. med. T. III. S. 580. 12) Mappus Hiſt. plantar. Alſat. S. 36. 13) Mardorf Diſp. de Maniacis nuper Gieſſenſibus a ſolano furioſo. Gieſſ. 1691. 14) Erndl Diſp. Ex veneno ſalus. Lipſ. 1691. 15) Scopoli Flor. Carniol. S. 288. 16) Manetti a. a. O. S. 21. 17) Sauvages Noſol. method. B. II. Th. 2. S. 29. und 338. B. III. Th. 2. S. 497. 18) Wier Obſervat. rarior. B. II. S. 10. 108. 19) Blair a. a. O. S. 81. 20) Heucher novi proventus horti medici Wittembergenſ. 1713. 21) Dreizehen Fälle J. M. Faber a. a. O. 4—18. 22) Brodbek ebendaſ. S. Burlet Memoir. de l' Acad. des ſcienc. à Paris, pour l'ann. 1703. 23) Van Swieten bei Cranz Mat. med. et chirurg. III. S. 42. 24) S. G. Gmelin Reiſe durch Rußland B. III. Petersb. 1774. S. 360. 361. 25) Gökel Fränk. Sammlungen von Anmerkungen ꝛc. B. III. Nürnb. 1758. S. 44. 26) Albrecht Commerc. litt. Noric. 1731. S. 232. 27) Scheffler ebendaſ. 1733. Woche 26. 28) Schrek ebendaſ. 1743. S. 61. 29) Wagner Ephem. Acad. Caeſ. Nat. Curioſ. Dec. II. A. 10. Obſ. 108. 30) Valentini ebendaſ. Obſ. 118. 31) Dillenius ebendaſ. Dec. III.

www.dlibra.wum.edu.pl

sichtigkeit, oder Unwissenheit t), bald aus Vorsaz und Bosheit u),

---

A. 7. S. 79. 32) Hasenest Act. Acad. Caes. Nat. Curios. Vol. III. Obs. 35. S. 282. 33) Schuster ebendas. Vol. VI. Obs. 61. S. 165. 34) Rau ebendas. Vol. X. Obs. 24. S. 90. 35) Grimm Nov. Act. Acad. Caes. Nat. Curios. Vol. II. Obs. 60. S. 216. 36) De Launay d' Hermont Hist. de l'Acad. des scienc. à Paris pour l' ann. 1756. S. 72. 57) Du Moulin Iournal de Medecine &c. T XI. m. Aout art 5. S. 38) De St. Martin ebendas. Vol. XVIII. m. Aout S. 144. 39) Boucher ebendas. B. 24. S. 310. u. f. 40) Eb. Gmelin in Gesners Sammlung von Beobachtungen ꝛc. 5. B. St. 6. Ein Ungenannter, Hannövr. Magaz. 1772. n. 61. 41) May ebendas. 1773. n. 97. 42) Im neuen Magaz. für Aerzte (ein alter Mann nebst zwo Frauen. B. I. St. I. S. 30. 43) Chaix bei Villars Histoire des plant. du Dauphiné II. S. 498. 44) Noch ein Ungenannter Medic. Observ. and inquiries B. VI. 222. sqq. 45) Darluc (Kinder) a. a. O. II. S. 81. 46) Sage (2 Studenten, und 28—30 Kinder) analyse chymique &c. I. S. 649. 252. 47) Sauter (2 Kinder) bei Hufeland Iournal der prakt. Heilkunde B. XI, St 3. S. 126—130.

t) Dieses ist der gewöhnliche Fall bei den Beeren.

u) So gebrauchte man zu Matthiols Zeiten die Wurzel, um die Schmarozer, denen man in der ersten Speise etwas davon beibrachte, bei dem Anblik der besten Speisen hungern zu lassen, weil sie dann nicht mehr schlingen konnten. Comment. S. 1413. So mischten sie andere vor der Gährung unter den Weinmost, um durch einen solchen Wein andere sinnlos zu machen. Porta Mag. nat. L. II. S. 165. So gebrauchte eine alte Frau im pfälzischen Dorfe Kirkel das mit dem zarten Würzelchen gekochte Wasser, um andere auf einige Zeit von Sinnen zu bringen, und inzwischen zu bestehlen, Pol-

www.dlibra.wum.edu.pl

bald als Arznei x), bald als Speise oder Getränk y) genossen, bei Menschen die erschrecklichsten Zufälle erregt, die nach der Gestalt, unter welcher z), nach dem Gewichte a), in

---

lich Nov. act. Acad. Caes. nat. Curios. B. VII. So gab ein Bartscherer einen Trank von den Blättern, als ein schmerzstillendes Mittel. Thalius a. a. O. So rieth ein Freund dem andern die Beeren als ein Mittel an, auf den Beischlaf zu treiben. Moiban Comment. in Ευπορισα Dioscorid. L. I. c. II. So mischten einige den Saft der Beeren unter den Wein, von welchem ein Quartier tödlich war, Mappus a. a. O.

x) So weiß ich, daß ein Apotheker die Wurzeln unter den Klettenwurzeln hatte; ein anderer sammelte die Beeren statt der Kreuzbeeren (Rhamn. cathart.) Ehrhart ökonomische Pflanzenhistorie VII. S. 10. 11. ein anderer, statt der Hollunderbeeren, und machte Roob daraus, Horst a. a. O. Andere speisten sie für Heidelbeeren, Erndl. a. a. O. oder für Kirschen.

y) Die meisten andern Fälle, die nicht unter u und x angezeigt sind.

z) So sind die Beeren roh am gefährlichsten; ihr Saft mit Zuker zu Syrup eingekocht, ist in der Hand eines fürsichtigen Arztes ein fürtreffliches Heilungsmittel. Konr. Gesner Epistol. medicin. Tig. 1577. L. I. C. 34. Auch äuserlich in das Aug gesprizt, hat der Saft der Pflanze Blindheit verursacht, welche, der gebrauchten Mittel ungeachtet, drei Wochen lang anhielt. Daries de Atropa Belladonna. Lipf. 1776. S. 34.

a) Zehen Grane der Wurzel haben gefährliche Zufälle erregt. M. B. Valentini a. a. O. zwanzig, Matthiol a. a. O. zwei oder drei Grane der Blätter mit Wasser angegossen, verursachten nur leichte gemeiniglich

www.dlibra.wum.edu.pl

in welchem, und nach dem Körper, von welchem sie genommen wurden b), in ihrer Heftigkeit verschieden waren.

Der Genus dieser Pflanze erregt in dem Schlunde und in dem Magen Entzündungen c), Aufblähen d), Krämpfe e) und grausame Schmerzen f); sie frißt die Häute des Magens an g), und zerstöhrt seine Reizbarkeit h), die Gedärme

---

übergehende Zufälle; drei, vier, auch wohl mehrere Beeren schlang Tragus a. a. O. und Simonis ohne Schaden hinunter. Haller Hist. stirp. &c. I. S. 251. Zehen erregten die grausamsten Uebel. Haseneſt und Grimm a. d. a. O.

b) Die meisten Todesfälle ereigneten sich bei Kindern, Matthiol Kräuterbuch, Ollinger, Tragus, Pena und Lobel, Gerard, Bodaus a Stapel, Pauli, Wagner, Bouldue, Alberti, Schreck, Göckel a. d. a. O. J. M. Faber im 2ten und 6ten Falle a. a. O. Zwo oder drei Beeren tödeten einen Knaben, Bodäus a Stapel a. a. O. von vier Kindern zu Conbalizerdiece bei einem Courtivron Hiſtoire de l'Academ. des ſciences à Paris pour l'ann. 1778. S. 10. 11. einen Erwachsenen, neues Magazin für Aerzte ꝛc. a. e. a. O. S. 30. 32. vier Beeren einen Wundarzt, der sich rühmte er könnte sie ohne Nachtheil verschlingen; van Swieten a. a. O. Tragus und Simonis, der sich schon an mehrere Gifte gewöhnt hatte, verschlangen eben so viel ohne Schaden a. d. a. O.

c) Göckel und Rau a. d. a. O.

d) Ebenderſ. a. d. a. O.

e) Manetti a. a. O.

f) Wagner, El. Camerer, de Launay d'Hermont a. d. a. O.

g) Bouldue a. a. O.

h) Daß die Beeren fast ganz unverändert bleiben, Schred, El. Camerer; daß vierzehen Gran Brechweinstein

www.dlibra.wum.edu.pl

werden aufgebläht i), verlieren ihre Bewegung und werden entzündet k), die Entzündung erstrekt sich auch oft auf das Gekröse l), die Leber, die Lungen m) und auf die ganze Oberfläche des Leibes n): und geht leicht in Brand über; Trokenheit in dem Munde o), Zittern der Zunge p), unauslöschlicher Durst q), Ekel vor allen Speisen r), die größte Schwierigkeit, oder auch Unmöglichkeit, etwas hinunter zu

---

kaum ein Erbrechen erregten, de St. Martin; daß der Leib hartnäkig verstopft blieb. Grimm a. d. a. O.

i) Göckel a. a. O.

k) Daß der Stuhlgang ohne Wissen der Kranken abgeht, Moulin a. a. O.

l) Schreck a. a. O. der Anfang des Zwölffingerdarms, Göckel a. a. O.

m) Schreck a. a. O.

n) Ueber den ganzen Leib, Sauvages a. a. O. B. II. Th. 2. S. 79. B III. Th. 2. S. 497. oder nur im Gesicht Albrecht a. a. O.

o) Courtivron a. a. O. bald vorübergehend, du Moulin a. a. O.

p) Das bemerkte vornemlich der Reutlingische Stadtarzt Weinmann auf den Genus dieser Pflanzen.

q) El. Camerer a. d. a. O.

r) Kommt vielleicht daher, die zu Matthiols Zeiten durch die Wurzel dieser Pflanze erzwungene Enthaltsamkeit der Schmarozer, oder kommt sie vielmehr von der Unmöglichkeit, die Speisen hinunter zu schlingen, oder von einem Kinnbakenzwange her, den auch Sage a. a. O. und ein Anderer neues Magaz. für Aerzte a. e. a. O. S. 32. als Wirkung dieser Pflanze wahrnahmen?

www.dlibra.wum.edu.pl

schlingen s), Erbrechen t), Aufschwellen u), Spannung u*) und Schmerzen x) des Unterleibes, ein Verderben des Speichels y), eine unterdrükte z) oder allzuhäufige a) oder ohne Wissen des Kranken vorgehende Ausleerung des Harns b), Fieber c) und andere Unordnungen in dem Umlauf der Säfte d),

---

s) Sicelius, Manetti, de Launay d'Hermont, Sage, ein Ungenannter, neues Magaz. für Aerzte a. e. a. und in neun seiner Fälle J. M. Faber a. d. a. O.

t) Viele Schriftsteller läugnen es zwar, daß auf den Genus dieser Pflanze von selbst Erbrechen erfolge, Ehrhard a. a. O. VII. S. 16. Allein in den Fällen, welche El. Camerer, Valentini, Alberti, de Launay, d'Hermont, Göckel, Schuster, Sage und Grimm a. d. a. O. anführen, war es doch gewis keine Wirkung der Gegengifte.

u) Göckel und Schreck a. d. a. O.

u*) Courtivron a. a. O.

x) In vier Fällen J. M. Faber, bei einem dreijährigen Knaben. Schreck bei vier Kindern, Courtivron a. d. a. O.

y) Sicelius a. a. O.

z) De Launay d'Hermont a. a. O.

a) Horst, und in fünf seiner Fälle J. M. Faber a. d. a. O. den Abgang eines trüben wässerichten und blassen Harns sah Gmelin a. a. O.

b) Du Moulin a. a. O.

c) Brodbek, Hasenest, Boulduc a. d. a. O. Sauvages a. a. O. B. II. Th. II. S. 79. bei einem sechsjährigen Kinde zu Paris, Bohadsch Schriften einer böhmischen Privatgesellschaft B. V. S. 116. Entzündungsfieber de Launay d'Hermont, brennendes Fieber St. Martin a. d. a. O.

d) Einen schnellen und schwachen Aderschlag El. Camerer, einen schnellen und ungleichen, mit gewaltiger Hize,

www.dlibra.wum.edu.pl

Schmerzen e) und Aufschwellen f) des Kopfes, Schwachheit der Augen g), Narrheit h) äuserste Unempfindlichkeit der Regenbogenhaut i), erweiterter zum Theil unbeweglicher Augenstern k), andere Fehler l) oder auch gänzlicher Verlust des Gesichts m), Verfall der Sprache n) und Stimme o), die gröste Beschwerlichkeit im Athemholen p), Brennen im

---

Rau; einen sehr schnellen, und sehr schwachen, mit erstaunender Hize, Grimm, einen vollen und sehr schnellen bei einem Alten N. Mag. für Aerzte, einen kleinen, unterbrochenen und krampfhaften bei vier Kindern Courtivron a. d. a. O.

e) In sechs Fällen, J. M. Faber a. d. a. O.

f) Horst, Aldrecht, und in einem Falle J. M. Faber a. d. a. O. Neues Magazin für Aerzte a. a. O.

g) Lambergen a. a. O.

h) Neues Magazin für Aerzte a. a. O. S. 32.

i) Von vier Beeren bei einem zehenjährigen Knaben. Gothaische gel. Zeitungen 1784. St. 52. S. 434.

k) Sage a. e. a. O.

l) Von Haen und Grimm a. d. a. O. Einige Kinder sahen alles roth. Sage a. e. a. O.

m) Wier, Horst, Roncalli, El. Camerer, Hasenest, de Launay d'Hermont, Sage, in sechs Fällen J. M. Faber a. d. a. O. übergehend Lambergen a. a. O.

n) Der aber bald vorüber ging. Sauvages a. a. O. B. II. Th. II. S. 338.

o) Sage a. e. a. O.

p) El. Camerer, de Launay d'Hermont, Grimm a. d. a. O. die unerträglichste Bangigkeit, Rau, Degner und Timmermann a. d. a. O. Dehne bei Schuster a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Leibe q) und eine schwüle Hize der innern Theile r) sind keine seltene Folgen dieses Giftes. Noch häufiger sind: Wahnwiz, der bald in einem fort dauert s), bald aufhört, und wiederkommt t), und gemeiniglich lächerlich u) oder lustig x) ist, Wuth y), Berauschung z), Schwin-

---

q) Carl, Hasenest und Albrecht a. d. a. O.

r) El. Camerer a. a. O.

s) Horst, Boulduc, Hasenest, und in vier Fällen J. M. Faber a. d. a. O. S. auch neues Mag. für Aerzte a. a. O.

t) Brodbek, Valentin, Albrecht, de Launay d' Hermont, Bohadsch, Courtivron.

u) Hasenest a. a. O. und Rai bei Millern a. a. O.

x) Sauvages a. a. O. B. II. Th. 2. S. 332. Grimm, Carl, S. G. Gmelin a. d. a. O. Diese Art Wahnwiz bemerkte auch der erfahrne Nürtingische Stadtarzt Dr. Jäger an einem Ehepaar, das, sich den Durst zu löschen, von diesen Beeren gespeist hatte. Sage a. e. a. O. bei einigen Kindern.

y) Tragus, Dillenius, Valentini, Schreck, du Moulin, Dehne, Timmermann, Rai, Grimm, Scopoli, S. G. Gmelin, Sage, Chaix a. d. a. O. Rutty Essay towards a natural History of the Country of Dublin. Dubl. 1772. bei zween Soldaten Brunwell Medical. observat. and inquir. B. VI. eine Frau mußte an Ketten gelegt werden, und spie auch da noch nach den Umstehenden. Neues Mag. für Aerzte a. e. a. O. S. 32. bei zwei Kindern Sauter a. a. O. Daher hies vermuthlich das Gewächs μανικκον, und daher hat es auch einen grosen Theil seiner teutschen Benennungen.

z) Sicelius, Lambergen, Albrecht, de Launay d'Hermont, und in einem Falle auch J. M. Faber, bei Kindern Sage, bei einem Alten Neues Mag. für Aerzte a. d. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

del [a]), Neigung zum Schlafe [b]), Schlummer [c]), Schlafſucht [d]), Schlagflus [e]), Schwachheit des ganzen Leibes [f]), Lähmung der Füſe [g]), Zittern [h]), Krämpfe und Zukungen in den Gliedern [i]), dem Geſichte [k]), den Augen [l]), dem

---

a) Von Haen. Courtivron und Lambergen a. d. a. O. bei vier Menſchen, welche im Walde Holze auflaſen, ſo daß ſie damit aufhören mußten. Neues Magaz. für Aerzte a. e. a. O. S. 30.

b) Sicelius und Carl a. d. a. O.

c) M. B. Valentin, El. Cammerer, Haſeneſt, Rau, Thalius, Sauvages, Rutty a. a. O. in zween Fällen J. M. Faber a. a. O.

d) Wagner a. a. O.

e) Ebenderſ. a. a. O.

f) Carl und du Moulin, auch neues Magaz. für Aerzte a. d. a. O.

g) Du Moulin a. a. O.

h) Horſt und de Launay d'Hermont a. d. a. O. bei vier Menſchen, neues Mag. für Aerzte a. e. a. O.

i) Wagner, Dehne, Göckel, Carl, Fl. Camerer, Rai, Rau, Grimm, du Moulin, de St. Martin, Boulduc a. d. a. O. De Brisude Iournal de Medecine &c. 1736. dies bemerkte auch Dr. Jäger, und ein anderer bei zween Menſchen, neues Mag. für Aerzte a. e. a. O. S. 31—33.

k) Daher kommt das ſardoniſche und zum Theil auch das laute Gelächter. Carl du Moulin, de St. Martin das bemerkte auch Weinmann, und bei einem Greiſen ein Anderer, neues Magaz. für Aerzte ꝛc. a. a. O. S. 31.

l) Schreck a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

untern Kiefer m) oder in dem ganzen Leibe n) eine Auflösung der Säfte, die zunächst an Fäulung gränzt o), und Abgang von Blut und Eiter durch Nase, Mund und After p). Häufiger als jedes andere unserer einheimischen Pflanzengifte hat dieses Gift den Tod gebracht q), der oft ziemlich schnell r) auf seinen Genus erfolgte.

Geschichte s).

Nachmittags den 28sten Heumonat 1765 schlichen sich fünf Kinder in den Apothekergarten des Generalhospitals zu

m) Entweder Zukungen in demselbigen, aus welchen Guerin a. a. O. die Entbaltsamkeit jener Schmarozer herleitet, oder einen Kinnbakenzwang Hasenest a. a O.

n) Sauvages a. e. a. O. Eine Erstarrung des ganzen Leibes, Ehrhard a. a. O. X. S. 126.

o) Das zeigte vornemlich der allgemeine kalte Brand, Mappus a. a. O. und die Erscheinungen gleich nach dem Tode.

p) Bei Kindern Sage a. e. a. O. S. 251.

q) Valentini a. beid. a. O. Matthiol Kräuterbuch, Thalius, Ollinger, Pena und Lobel, Heucher, Gerard, Bodäus a Stapel, S. Paulli, Dillenius, Wagner, Bouldue, Alberti, Dehne, Böckel, Rutty, Eb. Gmelin, bei zwei Studenten, Sage a. d. a. O. Von 3—4 Beeren bei einem Kutscher Gentleman's Magazin. 1748. M. Sept. von zehen Beeren einige Knaben, Wagner a. a. O.

r) Mappus a. a. O. innerhalb zwölf Stunden Eb. Gmelin und Gentleman's Magazin 1747. M. Aug. Die Nacht darauf, Alberti; den Morgen darauf, Schreck und Courtivron a. d. a. O. Den Tag darauf zwei Kinder zu Edinburg, Gentleman's Magazin a. e. a. O.

s) Boucher Iournal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie &c. den ich hier selbst reden lasse, B. XXII. S. 310. u. f.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ryssel durch eine Lüke in dem Plankenzaune; sie trafen daselbst saftige und süse Früchte an; diese hielten sie für kleine Kirschen und asen viel davon. Das Aelteste war ein Mädchen von eilf Jahren, die andere ein Mädchen von fünf Jahren, Margouhin, ein Knabe von sechs Jahren, le Fevre, ein Knabe von vier Jahren, Truffenne und noch ein jüngerer Courat. Nicht zufrieden, daß sie sich den Magen damit angefüllt hatten, sammleten sie sich eine Menge fruchttragender Zweige in Bündeln zusammen, um sie zu Hause unter sich auszutheilen. Schon diesen Abend bemerkten die Eltern der jüngsten Kinder, daß sie krank wären; zwei oder drei erbrachen sich; dessen unerachtet aber waren sie die ganze Nacht über sehr unruhig: diejenigen, die sich nicht erbrachen, waren es noch mehr. Ein Wundarzt, den man rief, lies sie laues Wasser in Menge trinken; allein dieses Mittel war lange nicht hinreichend. Man rief also in aller Frühe Herrn Corroyez, der sogleich erkannte, daß diese Zweige von der Wolfskirsche waren, und also der Sache auf den Grund sahe. Die Kranken, nur das älteste Mädchen ausgenommen, redeten irre, bewegten den ganzen Leib hin und her, und hatten in Augen und Händen beständige Zukungen. Herr Corroyez lies sie insgesammt vieles Oel trinken, und ich rieth ihm, ihnen ein Brechmittel in Gestalt eines Syrups zu verordnen. Gegen Mittag fand ich die Kranken noch eben so; ich untersuchte ihren Aderschlag, ich befühlte die Gegend des Magens und den ganzen Unterleib, und fand nirgends nichts, das mir einen lebhaften Reiz, oder eine Anlage zur Entzündung anzeigte. Le Fevre hatte sehr feurige Augen, einen sehr erweiterten Stern und eine unruhige Miene, sein ganzer Leib, und vornemlich seine Arme waren in Bewegung; sein Bauch aufgeblasen, aber ohne Spannung und Schmer-

www.dlibra.wum.edu.pl

gen; Aderschlag und Zunge waren in ihrem natürlichen Zustande. Truffenne war sehr niedergeschlagen; sein Blik verwirrt; sein Aderschlag klein und schwach; er bewegte sich in seinem Bette stark hin und wieder, und hatte sich noch sehr wenig erbrochen. Eben das fand ich auch bei der Margouhin, die ich bei meinem ersten Besuche schon übel antraf; ihr Augenstern war sehr erweitert, und die Augen wälzten sich krampfhaft in ihren Höhlen herum; Arme und Hände drehten sich beständig zusammen, und bewegten sich zuweilen nach vornen, als wenn sie etwas damit haschen wollte. Courat hatte sich ziemlich stark erbrochen, fiel aber doch gegen Abend in einen Schlummer, der desto mehr befürchten lies, da sein Aderschlag schwach, klein und ungleich wurde. Alle drei liesen ihren Harn ohne Empfindung in das Bette laufen. Wir gaben ihnen noch ein Brechmittel, worauf sie viele halb verdaute Früchte ausbrachen, und da wir muthmasen konnten, es möchte auch etwas davon in die Gedärme übergegangen sein; so suchten wir dieses durch erweichende und gelind abführende Klistiere hinwegzuschaffen. Da wir glaubten, daß nun sattsam ausgeleert wäre, liesen wir die Kranken sauren Honig und Molken in groser Menge trinken. Noch den 30sten Heumonat gaben sie durch den Stuhl Stüke von der Wolfskirsche von sich. Margouhin war noch sehr schwach; ihr Aderschlag klein und in ihren Augen zeigten sich noch beständige Zukungen; da sie sich aber bisher nur wenig erbrochen hatte, gab ich ihr noch einen Gran Brechweinstein, und dieser that auch seine Wirkung. Den 2ten Erndemonat waren alle wieder hergestellt.

Die Leichen solcher Unglücklichen gehen gemeiniglich sehr schnell in Fäulung s); sie laufen ganz gewaltig auf und wer-

s) Eb. Gmelin a. a. O. zwölf Stunden nach dem Tode.

www.dlibra.wum.edu.pl

den gemeiniglich hart u); an den Spizen der Finger x), oder in dem Geſichte, oder auf der innern ganzen Seite, oder über den ganzen Leib werden ſie ſchwarzblau y), oder ſind mit Brandflekken gleichſam beſäet z); aus allen Oeffnungen des Leibes, vornemlich aus Mund a), Naſe und Ohren b) fließt Blut c), oder Schaum, oder rothgelbes ſcharfes Waſſer d) hervor; die Oberhaut löſt ſich ab e) und es ſteigt ein unerträglicher Geſtank in die Luft f).

Geſchichte.

Ein Hirt auf dem Schwarzwalde in Schwaben, fällt, durch die ſchwüle Hize der Sommertage gedrungen, auf den unglüklichen Gedanken, ſeinen Durſt mit glänzenden ſchwarzen Beeren zu ſtillen, die er für Kirſchen hielt, und an einer übrigens unanſehnlichen Pflanze im Walde wachſen ſahe. Nicht zufrieden damit, daß er ſeinen Magen ſchon im Walde damit überladen hatte, brachte er einen ganzen fruchttragenden Zweig davon mit ſich nach Hauſe. Kaum war er zu Bette, ſo wurde er unruhig und fieng an irre zu reden; ſeine Frau gab ihm ſogleich Brandewein, aber bald darauf bekam

---

u) J. M. Faber im zweiten und ſechſten Falle a. a. O. S. 15. Eb. Gmelin a. a. O.

x) J. M. Faber im ſechſten Falle a. a. O. S. 15.

y) J. M. Faber im zweiten Falle S. 10. 11.

z) Eb. Gmelin a. a. O.

a) J. M. Faber a. e. a. O. in beiden Fällen.

b) Eb. Gmelin a. a. O.

c) Ebenderſ. a. a. O.

d) J. M. Faber a. a. O. im ſechſten Falle S. 15.

e) Ebenderſ. im zweiten Falle S. 11.

f) Eb. Gmelin a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

er einen Schauer, entsprung aus dem Bette, verfiel in Raserei, und aus dieser in Zukungen, bis er durch die lezte ermüdet und aller seiner Sinnen beraubt, in Zeit von zwölf Stunden ein Raub des Todes wurde. Gleich zwölf Stunden darauf geschahe die gerichtliche Besichtigung der Leiche. Aber auch schon da hatte die Fäulnis sehr überhand genommen, daß vor dem unerträglichen Gestanke weder Wundarzt, noch andere Zeugen zugegen bleiben wollten. Aus Mund, Nase und Augen, strömten unaufhörlich schaumiges Blut; der ganze Leib war erstaunlich aufgetrieben; der Unterleib, der Hodensak und die Ruthe waren so hart, als ein Stein anzugreifen, und da man sie eröfnete, sprang ein schaumiges stinkendes Wasser heraus, das alle Messer angriff. Das Gesicht, die Brust, der Unterleib, der Rüken, die Gliedmasen waren dicht mit breiten, schwarzblauen Blattern besezt. In dem Zwölffingerdarm wurde man hin und wieder bläulichte Fleken gewahr, Milz und Leber waren ganz bröklicht und verfault; das Gehirn war auch schon von der Fäulnis ergriffen und roth; alle seine Gefässe strozten von Blut, welches überhaupt in dem ganzen Leibe ganz aufgelöst und flüssiger war g).

Vornemlich findet man bei solchen Leichen den Grund des Magens entzündet, und die linke Niere mehr oder weniger verändert g*).

Die Art denen Zufällen zu begegnen, welche auf den Genus dieser Pflanze erfolgen, weicht im Grunde von der allgemeinen Heilart gegen diese Klasse von Gisten nicht ab;

---

g) Eb. Gmelin a. a. O.

g*) Sallin a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

sie ist aber besonders bei dieser Pflanze durch mehrere glükliche Erfahrungen bestätiget.

Mit einem Brechmittel rettete Bohadsch h) ein sechsjähriges Kind; mit Brechmitteln, Klistieren, gelinde abführenden Mitteln, und fleisigem Gebrauche der Mandelmilch Courtivron i) drei Kinder; mit einem Brechmittel und hintennach wiederholtem Gebrauche von Säuren Chaix k) einen andern Kranken; mit Essig Sage l) einige Kinder.

Einige Tropfen des Extrakts in Wasser aufgelöst, erregen, wenn man sie an den Augapfel bringt, eine vorübergehende Lähmung des Sterns, welche das Staarstechen ungemein erleichtert l*).

Die Schäfer gebrauchen sie mit Nuzen bei Segelern, bei dem Bisse von tollen Hunden, in dem sogenannten Spreu, in Augenkrankheiten, vornemlich in Entzündungen der Augen m). Die Wallachen in Siebenbirgen reiben sich im Hüftweh mit dem aus der Wurzel gedrükten Safte die Glieder; bei hartnäkiger Gicht nehmen sie ihn im Temeswarer Bannat ein n); schon die alten Aerzte bedienten sich ihrer Wurzel und der Blätter äuserlich als eines zurüktreibenden,

---

h) a. a. O.

i) a. a. O.

k) a. a. O.

l) a. a. O. S. 252.

l*) Reimarus und Graßmeyer Bulletin des Sciences de la Soc. phil. à Paris III. S. 22.

m) Hannöv. Magaz. 68. St. den 25. Aug. 1775.

n) Von Born Abhandlung einer Privatgesellschaft in Böhmen B. V. S. 117.

www.dlibra.wum.edu.pl

schmerzstillenden, und zertheilenden Mittels o) und nach Willughby p) rühmt sie noch neuerlich äuserlich und innerlich in lezter Absicht bei scirrhösen Geschwulsten Darluc q), andere sowohl in diesen r), als in Milchgeschwulsten s), und selbst im Krebse t) an der Brust u): überhaupt verordnete man in neuern Zeiten u) häufiger den innerlichen Gebrauch der

---

o) 1) Welsch Miktomimemat. Cent. III. S. 9. 2) Quer Flor. Espann. III. Madr. 1762. S. 209. auch neuerlich Graham Medic. and Philosoph. Comment. of Edimb. B I. S. 419.

p) Bei Rai a. e. a. O. B. I. S. 680.

q) a. e. a. O.

r) 1) Darluc Iournal de medecine, pharmacie, chirurgie &c. B. XI. S. 449. 2) Ziegler Beobachtungen aus der Arzneiwissenschaft S. 22. 24. 30. 3) J. H. Münch, der Vater; Hannövr. Magaz. 1767. n. 64. 1768. n. 14. 1769. n. 62. 90. 94. 95. S. 1427. und Beobachtungen von angewendeter Belladonna bei den Menschen, Stendal. 8 St. I. 1789. Vorber. S. 10, ꝛc.

s) Evers Bemerkungen und Erfahrungen in der Wundarzneykunst S. 52. ꝛc.

t) 1) Comment. de rebus in sc. nat. et med. gestis B. 8. S. 654. 2) Ziegler a. a. O. S. 20. 28. 3) J. H. Münch der Vater a. d. a. O.

u) 1) F. Chph. Oetinger Diss. Praes. M. Alberti de Belladonna tanquam specifico in cancro Hal. 1739. 2) Junker ebend. 3) Lambergen Lect. inaugural. hist. Ephemerid. carcinomat. Groening. 1704. 4) In einigen Fällen Timmermann a. a. O. 5) Degner ebendas. 6) Van den Blok Iournal de Medecine &c. 1761. Febr. 7) Andere ebendas. 1762. May und B. XI S. 449. 8) Marteau Gazette-salutaire 1762. n. 25. 9) Watson Philos. Transact. B. XLIX. P. II. art. 112. S. 810. u. f.

www.dlibra.wum.edu.pl

Blätter und der Wurzel, und des aus einem oder dem andern ausgedrükten und eingedikten Saftes unter mancherlei Gestalten, zu wenigen Granen gegeben, in Verhärtungen und krebsartigen Geschwüren der Brust; in verhärteten Drüschen der Zunge und der Gedärme x); in Geschwüren der Schenkel, die von dem Bisse wilder Thiere kommen; in Tollheit, Schwermuth und ähnlichen Krankheiten y); in andern Unordnungen der Nerven z); in anhaltendem Erbrechen;

Medical observat. and Inquiries by a Society of physicians in London 1767. T. III. 10) Ludwig Comment. Lipſ. Vol. VIII. S. 654. 11) Lentin a. e. a. O. 12) Bellot utium in cancro Belladonnae uſus cum internus, tum externus &c. Paris 1760. 13) Zagoni de inventis hujus ſeculi in arte ſalutari novis Viteb. 1764. 14) Schmuker vermiſchte chirurgiſche Schriften. I. B. 1776. 15) Greding Adverſ. medic. pract. B. I. Th. 4. S. 695. ꝛc. oft in den hartnäkigſten Wechſelfiebern, Fallſucht und Veitstanz, Hufeland Iournal der practiſchen Arzneikunde und Wundarzneykunſt B. IX. St. 3. S. 100. 102.

x) Degner und Ziegler a. d. a. O. Darlue a. e. a. O.

y) 1) J. H. Münch Beobachtungen bei angewendeter Belladonna ꝛc. S. 105. 2) deſſen Sohn gleiches Namens Diſſ. obſervationes practicae circa uſum Belladonnae in melancholia, mania et epilepſia. Goetting. 1783. S. 17. ꝛc. 3) J. Fr. Ludwig Diſſ. de Belladonna ejusque uſu in veſania Ien. 4) Schmalz chirurgiſche und medicinische Vorfälle. S. 79. 5) Schmucker vermiſchte Schriften Th. I. S. 173. ꝛc. 6) Evers berliniſche Sammlungen zur Beförderung der Arzneiwiſſenſchaft B. V. S 563. 7) Ein ſchwediſcher Arzt Veckoſkrift för Läkare och Naturforſkare B. IX. S. 326.

z) Vornemlich in Fallſucht 1) J. H. Münch der Vater a. e. a. O. S. 66. 2) Deſſen gleichnahmiger Sohn a. e.

www.dlibra.wum.edu.pl

in trokenem und vornemlich Krampfhuſten a); in langwieriger Gelbſucht b) und langwierigem Katharr, in Flüſſen c), Gicht d), Waſſerſucht e), einſeitigem Schlagfluſſe f), Lähmung der Zunge g), vornemlich aber gegen die Folgen von dem Biſſe toller Thiere h), auch bei allerlei Hausthieren, ſowohl wenn ſie von tollen Thieren gebiſſen waren, als in

---

a. O. S. 27. 31. 3) Theden neue Bemerkungen und Erfahrungen B. II. S. 212. 4) Evers Hannövr. Magazin 1783. St. 99. 5) Greding bei Ludwig Adverſ. medic. pract. B. I. Th. 4. S. 637. 6) Stoll Rat. medend. B. III. S. 408—412.

a) 1) Buchhave Anviiſning for Almuen til Belladonna rodens nyttige Brug i Kighoſte. Kiobenh. 1785. 8. 2) Widemann bei Hufeland Iournal der prakt. Heilkunde. B. XI. St. 2. S. 169.

b) Greding a. c. a. O. S. 314. ꝛc.

c) Ziegler a. c. a. O. S. 33.

d) Ebenderſ. a. a. O. S. 36.

e) Theden a. a. O. II. S. 210—214.

f) Evers bei Schmucker a. a. O. B. I. S. 185. ꝛc.

g) Selle a. a. O. III. S. 109. ꝛc.

h) 1) J. H. Münch der Vater a) a. d. a. O. b) Kurze Anleitung, wie die Belladonna ſowohl bei Menſchen als bei Thieren im tollen Hundsbiß anzuwenden ſey. Göttingen 1783. 8. c) Hannöver. Magaz. 1768. St. 33. 38. 103. 1769. St. 14. 2) Neimeke bei ebendemſ. Beobachtungen bei angewendeter Belladonna I. S. 74. 3) Bucholz heilſame Wirkung der Belladonnawurzel bei ſchon ausgebrochener Wuth. Erfurt 1785. 8. 4) Burk. Fr. Münch a) diſſ. de Belladonna efficaci in rabie canina remedio. Goett. 1781. 4. b) Praktiſche Abhandlung von der Belladonna und ihrer Anwendung. Göttingen 1785.

www.dlibra.wum.edu.pl

mancherlei Seuchen i) und glaubten, bei einer nie genug zu empfehlenden Behutsamkeit, die herrlichsten Wirkungen darauf zu bemerken.

Allein der unglükliche oder fruchtlose Erfolg in andern Fällen k) machte andere schüchtern, und lies sie an diesen hochgepriesenen Heilkräften zweifeln l).

Auch den Saft der Beeren, mit einer hinreichenden Menge Zuker zu Syrup gemacht, pries schon K. Gesner als

---

i) Joh. H. Münch der Vater, kurze Anleitung, wie und in welchen Fällen die Belladonna bei den Thieren in der Landwirthschaft anzuwenden ist. Stendal 1787. 8.

k) 1) Heister instit. chirurg. I. B. I. Theil I. B. IV. C. XVI. P. 337. Amstel. 1750. 2) Andry Iournal de Medecine &c. B. XI. S. 499. u. f. 3) Darlüc und Amourup ebendas. B. XIII. S. 47. u. f. 4) Van den Blok ebend. B. XIV. S. 100. 5) De Brioude ebend. 1767. 6) Van der Haar over de Knierknoest en Kanker Gezwelle S. 85. 7) Von Döveren bei Timmermann a. a. O. S. 28. 8) De Haen Rat. medend. II. S. 45. et Ind. oper. S. 58. 9) W. Bayle Practical essays. S. 37. 10) Schmalz a. a. O. S. 83. 11) Lentin Beobachtungen einiger Krankheiten ꝛc. S. 81. ꝛc. 12) Schmucker chirurgische Wahrnehmungen II. S. 150. 13) Ziegler a. a. O. S. 37. 14) Bromfield. 15) Gataker. 16) Timmermann a. d. a. O. 17) Evers berlin. Samml. 5. B. 5. St. 18) Acrell Chirurgiske Händelser Stokh. 1759. S. 27. 19) Raulin Fleurs blanches, B. II. S. 594. 20) De Man Verhandeling van de Maatschappy te Haerlem B. XV. 1774. nr. 4. 21) Oberteuffer a. a. O. S. 100.

l) 1) Frey A ıs. de Apostematibus Lipsi. 1776. 2) Hill vegetable System. Lond. 1765. B. IX.

www.dlibra.wum.edu.pl

als schmerzstillendes Mittel in Bauch- und Blutflüssen an m); dreister ist die Gewohnheit der Dithmarsen, die den Wein, in welchen sie die Beeren gequetscht und eingeweicht haben, gegen die Gicht gebrauchen n). Mayern führt das mit den Beeren gekochte Wasser als vorzüglich wirksam gegen die Würkungen des tollen Hundsbisses auf o). Eben diese Beeren geben den Mahlern eine schöne grüne Farbe.

Nach Wiern kommt das Kraut auch in die Salben, womit sich die Hexen einschmieren, um in ihre Entzükungen zu gerathen p).

2) Kermesbeeren, Phytolacca.

Die Arten dieser Gattung gehören zu den ausdaurenden Gewächsen, und sind ursprünglich auser Europa in wärmern Ländern zu Hause; ihre Blumen haben nur eine weisse Deke, welche aus fünf Blättchen besteht, und an der Frucht sizen bleibt, acht bis zehen Staubfäden und auf einem von der Deke umgebenen Fruchtknoten acht bis zehen Griffel, und hinterlassen eine Beere, welche in acht bis zehen Facher getheilt ist, und acht bis zehen glänzende Linsen ähnlichte Samen in sich hat.

a) Virginische Kermesbeeren, amerikanischer Nachtschatten, Phytolacca decandra Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 515.

---

m) 1) Epistol. medicinal. S. 34. 2) Ephemer. Acad. Caes. Nat. Curios. Dec. III. 3) S. 154.

n) Wier observat. rarior. L. II. obs. 961.

o) a. a. O. S. 136.

p) De lamiis übers. durch Rebenstok. Frf. 1586. S. 23.

www.dlibra.wum.edu.pl

Er ist in Virginien zu Hause, und hat in jeder Blume zehen Staubfäden und zehen Griffel, saftige Stengel und Blätter und in den Beeren einen purpurrothen Saft, der auch zu Mahlerfarbe zugerichtet werden kann, und häufig zum Färben des Weins gebraucht wird.

Ob gleich die Beeren von einigen Vögeln gefressen werden, und der Saft derselbigen einem Hunde zu einem halben Quintchen gegeben, ihm nichts schadete q), so erregten doch die Beeren bei Knaben, die sie gespeißt hatten, Wuth, Fallsucht und Tod r); doch wird auch diese Pflanze als Arznei gebraucht s), und der Saft aus ihren Blättern tropfenweise auf den leidenden Theil gelassen, für ein vorzügliches Mittel im Krebse gehalten t).

β) Japanische Kermesbeeren, Phytolacca octandra Linn. Phytolacca mexicana, baccis sessilibus. Dillen Hort. Elth. S. 218. Pl. 239. Abb. 308.

Sie wachsen in Mexiko und Japan wild, und die Pflanze hat ganz die Stellung der virginischen; ihre Blätter sind aber weisser; ihre Blumen sizen an äuserst kurzen Stielen und Stielgen, haben eine ganz flache Deke, und acht Staubfäden und acht Griffel.

Zween japonische Sklaven, welche von ihren Beeren aßen, hatten viel davon zu leiden; einer wurde doch nach fünf

---

q) M. Schulze Ephemer. Ac. Caes. Natur. Curios. Dec. II. ann. 8. obs. 154.

r) M. B. Valentini ebendas. ann. 10. obs. 118.

s) Benj. Schulz Dissertation on the phytolacca decandra of Linneus. Philadelphia. 1795. 8.

t) Linné Amoenit. academ. B. IV. S. 523.

www.dlibra.wum.edu.pl

Tagen wieder gesund, aber der andere war noch lange mit einem Ausschlage geplagt u).

3) Einbeeren, Paris quadrifolia Linn. Flor. dan. Pl. 139.

Sie treibt aus einem diken Knollen nur einen einigen ganz aufrechten Stengel, an welchem oben rings herum vier, zuweilen auch mehrere grose glänzende, etwas weniges gerunzelte Blätter stehen; mitten aus diesen Blättern steigt ein Blumenstiel auf, der nur eine einige grüne und kleine Blume mit acht gelblichten Staubbeuteln und vier Griffeln trägt; diese hinterläßt eine weiche dunkel purpurrothe Beere, welche gemeiniglich vier stumpfe Eken hat, inwendig in vier Fächer getheilt ist, und in diesen eine Menge kleiner ovaler weislichter Samen enthält.

Sie hat in ihrem Geruche allerdings etwas verdächtiges; allein weder dieser, noch die Behauptung anderer, welche ihren Saft dem Mohnsafte an die Seite sezen, noch selbst die Wahrnehmung, daß ihre Samen Hühner töden, und ihre Beeren bei Menschen Magenkrampf und Erbrechen erregt haben, geben ihr eine gesicherte Stelle unter den Giften; denn da diese Pflanze in einigen Gegenden in Wäldern sehr gemein, und das äuserliche Ansehen ihrer Beeren verführerisch ist, so müste sie sich gewis durch Todesfälle bekannt gemacht haben, wenn sie den Namen eines Giftes verdienen sollte.

4) Tabak, Nicotiana.

Alle Arten dieser Gattung, deren ich hier Meldung zu thun habe, sind in dem mittägigen Theile von Amerika zu

u) Thunberg flor. japon. S. 189.

www.dlibra.wum.edu.pl

Hause, und gehören unter die Sommergewächse. Sie sind alle auf ihrer ganzen Oberfläche mit einem klebrichten Wesen bekleidet, und verbreiten, oft in eine ziemlich weite Entfernung, einen unangenehmen Geruch, der den Luftkreis, in welchem er aufsteigt, betäubend und einschläfernd macht. Ihr Stengel erreicht eine beträchtliche Höhe, und theilt sich in viele Aeste; ihre Blätter sind saftig, und stehen abwechselnd zu beiden Seiten des Stengels und der Aeste; sie haben meistens eine beträchtliche Breite und an ihrem Rande weder Zähne noch Einschnitte. Ihre Blumen sizen an den Gipfeln der Aeste, gemeiniglich in einer Art von Rispe beisammen; sie haben alle fünf Staubfäden, welche etwas einwärts gebogen sind, nebst einem Staubwege; ihr Kelch ist kürzer, als die Krone, deren Saum in Falten gelegt ist, übrigens aber ungefähr die Gestalt eines Trichters hat. Das Samengehäus, welches jede Blume nach sich läßt, ist ganz troken, länglicht und spizig; es besteht aus zwei Schalenstüken, und enthält in zwei Fächern, in welche es inwendig getheilt ist, eine ungeheure Menge kleiner brauner Samen.

Man wird mir vielleicht die tägliche Erfahrung entgegen halten, wenn ich Tabak und seine verschiedene Arten unter die Gifte zähle; man wird mir sagen: wenn der Tabak ein wahres Gift ist, warum äusert er bei so vielen Menschen, die ihn oft in so groser Menge rauchen, kauen, oder schnupfen, so gar keine schädliche Wirkungen, daß sie sich vielmehr besser darauf zu befinden glauben?

Erstlich gilt das, was ich hier sage, vornemlich von der noch frischen und unveränderten Pflanze; von dieser belehrt uns schon der häsliche Geruch, die betäubende und einschläfernde Kraft, welche ein, blos mit ihren Dünsten ange-

www.dlibra.wum.edu.pl

füllter Luftkreis äuſert, die nahe Verwandſchaft mit Gewächſen, deren giftige Eigenſchaften entſchieden ſind, daß wir Urſache genug haben; ſie unter die verdächtigen Pflanzen zu zählen. Schon die Dämpfe, die bei dem Kochen der Blätter mit Waſſer aufſteigen, erregten Berauſchung x), und, als man ſie an Theile, welche mit der Kräze behaftet waren, gehen lies, Blutbrechen und Zukungen y); ſchon, wenn man die friſchen Blätter blos kaute, nahmen ſie den Kopf ein z). Das bloſe Waſchen mit Kräze behafteter Theile mit dem Waſſer, welches mit den Blättern gekocht war, zog Berauſchung, Kopfſchmerzen, Trokenheit der Haut, heftiges Erbrechen, Bauchflüſſe, Krämpfe und ſchweren Athem nach ſich a); drei Mädchen b), denen ihre Mutter, um den Grind zu vertreiben, Schnupftabak mit Butter auf den Kopf geſchmiert hatte, bekamen Schwindel, heftiges Erbrechen, Hize, Schweis und Unmachten, und waren 24 Stunden lang gleichſam betrunken. Die Prieſter c) der Mexikaner gebrauchen eine Salbe, worinn Tabak der wirkſamſte Beſtandtheil zu ſein ſcheint, um ſich kühn und insbeſondere bei ihren Menſchen-

x) Stoll a. a. O. IV. S. 467.

y) Marigues bei Vandermonde Recueil periodique d'obſervations &c. B. VII. S. 67.

z) K. Geſner Epiſt. ad Ad. Occonem a. 1565. L. II. c. 79. S. 2.

a) Grant bei Duncan Medic. Comment. Dec. II. B. I. S. 327. ꝛc.

b) Fehr Ephem. Ac. Caeſ. Nat. Curioſ. Dec. II. A. 4. S. 46. ähnliche Beiſpiele finden ſich ebendaſ. A. 2. obſ. 108. S. 262. ꝛc. und bei Alſton mat. med. II. S. 190.

c) Joſ. Acoſta bei Purchas a. a. O. III. B. V. K. 5. S. 1042. 1043.

www.dlibra.wum.edu.pl

opfern, recht herzhaft zu machen, auch andere, um Hexereien zu spielen, den Teufel zu sehen, mit ihm zu spielen u. dgl. auch der Tabakrauch berauscht nicht nur Thiere d), z. B. Frösche, Sperlinge und andere Vögel, schläfert sie ein, und tödet sie; er bringt auch bei Menschen, welche noch nicht daran gewöhnt sind, eine Art von Trunkenheit und gemeiniglich zulezt Erbrechen hervor. Lanzoni sahe Wahnsinn e), Marigues f) von 25 Pfeifen Betäubung und Verlust aller Sinne, Helwig g) bei zwei Brüdern, deren einer 17, der andere 18 Pfeifen geraucht hatten, einen tödlichen Schlagfluß erfolgen; ein Hund, welchem man Tabak eingegeben hatte, mußte sich sehr davon erbrechen h); Menschen, welche damit gekochtes Bier genommen hatten, bekamen davon heftiges Erbrechen, Bauchfluß, Bangigkeit, äuserste Schwäche, und fielen in Schlummer und sehr starken Schweis i); auch zu starkes Schnupfen des Tabaks zog Schlummer und zulezt tödlichen Schlagfluß nach sich k).

Ich läugne nicht, daß durch die verschiedenen Beizen und andere Körper, welche dem Tabak bei seinen mancherlei

---

d) B. Carminati de animalium ex mephitibus interitu. S. 167.

e) Miscellan. Acad. Caes. Natur. Curios. Dec. XI. ann. II. obs. 131.

f) a. a. O. S. 68.

g) Observat. physico-medic. posthum. Angust. Vindel. 4. S. 45.

h) K. Gesner a. e. a. O.

i) Diemerbrök Tract. de peste S. 294.

k) Ephemer. Acad. Caesar. Nat. Curios. Dec. II. ann. 10. obs. 131. S. 222.

www.dlibra.wum.edu.pl

Zubereitungen zugesezt werden, seine natürlichen Kräfte in etwas geändert, und daß sowohl dadurch, als noch mehr durch das Troknen, seine schädlichen Eigenschaften gemildert werden. Allein ich würde wider alle gesunde Grundsäze und noch mehr wider die Erfahrung reden, wenn ich deswegen behauptete, daß der Tabak dadurch ganz unschädlich würde; der Rauch eines noch sowohl zubereiteten Tabaks berauscht einen Menschen, der sich noch nicht daran gewöhnt hat, und erregt bei ihm gemeiniglich zulezt Erbrechen; und wenn auch durch eine lange Gewohnheit die Nerven, die der Tabak angreift und erschüttert, oder betäubt, in etwas stumpfer, und die Wirkungen weniger sinnlich werden; so würden wir sehr irren, wenn wir daraus den Schlus ziehen wollten, daß er gar keinen Schaden thue. Ich will hier das nicht wiederholen, was alte und neue Aerzte über die schädlichen Folgen, welche der Misbrauch dieses peruanischen Gewächses nach sich zieht, geschrieben haben; vielleicht haben einige den Schaden zu hoch angesezt; allein, wenn andere noch grosen Nuzen für die Erhaltung der Gesundheit davon hoffen, so ist doch so viel gewiß, daß wir diese Vortheile mit andern, auch einheimischen, Körpern auf eine eben so angenehme Art erhalten könnten.

1) (Aegidii) Euerardi de Herba panacea, quam alii Petum, alii Nicotianam vocant, Commentariolus. Antw. 1587.

2) (Iuan de) Castro de las virtutes y proprietades del Tabaco. Cordub. 1620.

3) (Iohann) Neandri Tabacologia. Leid. 1626.

4) (Nicol.) Braun de fumo Tabaci diss. Giess. 1628.

5) (I. Nicol.) Baumann de Tabaci virtutibus, usu et abusu. Basil. 1629.

www.dlibra.wum.edu.pl

6) Wine, Beer, Ale and Tobacco, ſtriving for ſuperiority. Lond. 1630.

7) (Franc.) de Leiva y Aquilar defenganno contra del Tabaco, tratanſe muchas dudas con reſolution las nuevas, con veritad las antiquas. Cordova. 1634.

8) (I. Chriph.) Magneni de Tabaco Exercitationes 14. Ticini 1648.

9) (Iacobi) Baldi fatyra contra abuſum Tabaci. Monach. 1657.

10) (Simon) Pauli lib. de uſu et abuſu Tabaci et herbae Theae. Argent. 1665.

11) (Car. v.) Mander Poema de pulvere Tabaco. 1666.

12) (I. Arn.) Friderici Diſſ. de Tabaco. 1667.

13) (Edw.) Baillart Diſcours du Tabac, où il eſt traité particulierement du Tabac en poudre. Paris 1668.

14) (Edw.) Maynwaring Diſcourſe, that Tabaco is the cauſe of Scurvy. Lond. 1672.

15) (Heinr.) Barſtein von Tabak. Regenſpurg 1673.

16) (Paul) Matlot an ex Tabaco caluities. Paris 1676.

17) De Prade Hiſtoire du Tabac, et particulierement du Tabac en poudre. Par. 1677.

18) Remarques curieuſes ſur le Tabac, tirées de l'hiſtoire de Mr. de Prade. Paris 1680.

19) (I. Dan.) Dorſten Diſſ. de Tabaco. Marburg 1682.

20) The natural Hiſtory of Coffea, Tea, Chocolate and Tabaco, with a Tract. of the Elder- and Iuniperberries. Lond. 1683.

www.dlibra.wum.edu.pl

21) (Car.) Contugi Nocetne crebro Tabaci uſus. Paris 1690.

22) (Bernh.) Albini Diſſ. de Tabaco. Francof. ad Viadr. 1695.

23) (Guid. Creſc.) Fagon Quaeſt. An ex Tabaci uſu frequenti vita brevior? Paris 1699.

24) (Henr. Ern.) Keſtner de jure Tabaci. Rintel. 1700.

25) (Joſ.) Lanzoni de uſu Tabaci. Ferrar. 1702.

26) (Ant.) Nicolicchia uſo ed abuſo del Tobacco o ſia ſulla utilitate e nocumenti del medeſimo. Lyon 1708.

27) (Nicol.) Mainardes delle virtu del Tabaco. Venez. 1708.

28) (Geo. Dan.) Thebeſius vom Tobak. Halle 1713.

29) Ergözlichkeiten vom Tabak, worinn deſſen Urſprung, Wirkung und Annehmlichkeit vorgeſtellt wird. Leipzig 1715.

30) Diſſertation on the uſe and abuſe of Tabaceo. Lond. 1720.

31) Philon de Conſervationibus, allerhand neue zum Ruhm des Tabaks gereichende Einfälle. Cölln 1722.

32) (Hieron.) Ludolf Diſſ. de Noxa Tabaci poſt paſtum. Erford 1725.

33) (Ant. Wilh.) Plaz Diſſ. de Tabaco ſternutatorio. Lipſ. 1727.

34) (Iv. Ioh.) Stahl de Tabaci effectibus ſalutaribus et nocivis. Erford 1732.

35) (Ge. Leonh.) Beck Diſſ. de ſuctione fumi Tabaci. Altd. 1745.

www.dlibra.wum.edu.pl

36) (Andr. El.) Büchner Diſſ. de genuinis Tabaci viribus, ex ejus principiis conſtitutivis demonſtratis. Hal. 1746.

37) (Magn.) Mentzer utförlig beskrifing om hollandska Tabak örtens, ans och skötſel lämpade af ter Wort climate Stockh. 1747.

38) (Geo. Aug.) Langguth Diſſ. de immoderatiore Tabaci abuſu. Lipſ. 1750.

39) (Chrph. Carl) Reichel de Tabaco. Lipſ. 1750.

40) (Ioh. Mar. Fr.) de la Sone quaeſt. E. Tabacum lentum eſt homini venenum. Paris 1751.

41) (Fr. Io.) Cantira diſſ. de viribus medicis nicotianae, ejusque uſu et abuſu. Vindob. 1777. 8.

42) (Rob.) Hamilton diſſ. de nicotianae viribus in medicina et de ejus malis effectibus in uſu communi et domeſtico. Edinb. 1780. 8.

43) (Th.) Fowler medical reports of the effects of tobacco, principally with regard to its diuretic quality in the cure of dropſies and dyſuries, together with ſome obſervations on the uſe of clyſters of tobacco in the treatment of the colic. London 1785. 8.

Indeſſen hat der Tabak, als Arznei gebraucht, allerdings ſeinen groſen Nuzen. Vorzüglich verdient das Extrakt als ein Mittel, das den Schleim mächtig zertheilt, wenn es nur zu fünf bis ſechs Granen gegeben wird, vornemlich in Krankheiten der Bruſt innerlich, und der Rauch des Krauts als Kliſtir gebraucht, in hartnäkigen Verſtopfungen des Leibes, in Verwikelung der Gedärme, in eingeſchloſſenen Darmbrüchen und bei Scheintodten angerühmt zu werden. Das

www.dlibra.wum.edu.pl

Extrakt hat Hunden, Kazen und Kaninchen nichts geschadet, denen es durch eine Wunde beigebracht wurde l). Ich übergehe hier den Anbau dieses Gewächses m).

α) Gemeiner Tabak, groser breitblätterichter Tabak, virginischer Tabak. Nicotiana Tabacum Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 146.

Seine Blätter sizen ohne eigene Stiele an dem Stengel, und laufen an demselbigen herab; sie haben eine glänzende Oberfläche und eine ziemliche Breite und Länge; ihre Gestalt nähert sich der Gestalt eines Eies, nur daß sie an beiden Enden spizig zulaufen. Ihre Blumen sind lang, spizig und mattroth; sie zeigen sich vom Mai bis in den Erndemonat. Dieser ist die gemeinste Art, welche am häufigsten gebaut wird.

---

l) Herissant Philosoph. Transact. B. XLVII. S. 82.

m) S. davon 1) Select. oeconomico-physica. Stuttgart. 8. B. II. S. 264. ꝛc. 2) Verhandeling von den Tabak door een kundig Tobacks-Handelaer. Amsterdam 1770. 8. 3) J. E. Korge Unterricht zum Anbau des Tabaks. Breslau. 8. 1775. zwote Ausg. 1779. 4) J. G. Bakhaus neue und vollständige Abhandlung vom Tabaksbau. Darmstadt 1779. 8. Traité complet de la culture, fabrication, et vente du tabac. à Paris 1791. 8. 5) Christ patriotische Nachricht und Anweisung zu dem einträglichen Tabaksbau. 1780. 8. 6) Abhandlung vom Tabak, worinn dessen Anbau, Mengen, Anfeuchten, Packen und Zubereitungen gelehrt werden, aus dem holländischen. Leipzig 1781. 8. 7) Halle Tabaksmanufaktur oder die vollständige Oekonomie des Tabaksbaues nach allen seinen Zweigen 1788. 8.

www.dlibra.wum.edu.pl

β) Türkischer Tabak, kleiner Tabak, gemeiner englischer Tabak, Bauerntabak. Nicotiana rustica Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 437.

Er unterscheidet sich von dem gemeinen dadurch, daß er nicht so hoch wächst, daß seine Blätter kleiner und in ihrem Umfange ganz rund wie ein Ei sind, und auf eigenen Stielen stehen, und daß seine Blumen eine mindre beträchtliche Gröse und eine grüne Krone haben, und stumpf sind. In seinen Wirkungen ist er schwächer, als der gemeine Tabak. Er blühet in Brach- und Heumonate.

γ) Jungferntabak. Nicotiana paniculata Linn. Kongl. Svensk. Vetensk. Academ. Handling. B. 15. Pl. 1.

Er ist sehr nahe mit dem türkischen verwandt, nur wächst er höher, drei Schuhe hoch oder noch höher. Sein Stengel ist zärter und oben in eine Rispe ausgebreitet. Seine Blätter haben mehr die Gestalt eines Herzens, als eines Eies. Seine Blumenkelche und Samengehäuse sind spizig; seine Blumenkrone enger; sie haben eine lange, keulenförmige Röhre, und einen sehr kurzen und stumpfen Saum. In seinen Wirkungen ist er weit gelinder, als die übrigen Arten.

δ) Soldatentabak, Nicotiana glutinosa Linn. Kongl. Svensk. Vetensk. Acad. Handling. a. a. O. Pl. 2.

In Absicht auf seine Blätter kommt er ziemlich mit dem Jungferntabak überein, nur sind diese so, wie der Stengel, auf ihrer ganzen Oberfläche dicht mit zarten Haaren besezt, welche eine schleimichte, klebrichte Feuchtigkeit absondern. Die Blumen stehen nur auf einer Seite des Stengels oder der Aeste in wenigen, aber langen Traubenkämmen beisammen; sie kommen mit den Blumen des gemeinen Tabaks sehr

www.dlibra.wum.edu.pl

überein; nur ist der obere Abschnitt ihres Kelchs noch einmal so gros, als die übrigen, und die Krone gleicht einigermassen dem aufgesperrten Rachen eines reissenden Thieres. Er ist in seinem Geruche, und in seiner ganzen Wirksamkeit stärker, als die übrigen Arten des Tabaks.

Es sei mir erlaubt, hier noch einige verwandte und verdächtige Gewächse beizufügen.

5) Spigelie, Spigelia.

Diese Gattung Kräuter ist in dem wärmern Amerika zu Hause. Ihre Blumen sizen in Aehren beisammen, die nur nach einer Seite gerichtet sind, haben fünf Staubfäden, einen Staubweg mit einer einfachen Narbe und einem vom Kelche umschlossenen Fruchtknoten, und eine trichterförmige aus einem zusammenhängenden Stücke bestehende Krone; sie hinterlassen ein trokenes, zweiknotiges Samengehäus, das inwendig in zwei Fächer getheilt ist, und viele Samen enthält.

Sie erregt in Wurzel und Kraut leicht Erbrechen und Bauchfluß n), Schlaf, und Funkeln der Augen o) Verdrehen und Verdunkeln derselbigen, Zukungen und selbst den Tod p); wirkt aber, in geringern Gewichten gegeben, sehr kräftig gegen die Würmer q), und vornemlich gegen den Bandwurm.

n) Van Swieten Comment. in aphorism. Boerh. IV. S. 737.

o) Browne civil and natur. hist. of Iamaic. S. 156.

p) Chalmers Account of the weather and diseases of South-Carolina I. S. 67. ꝛc.

q) 1) Browne a) a. e. a. O. b) Gentleman's Magazine 1751. S. 544. 2) Wright London medic. journ. 1787. S. 286. 3) Brocklesby oeconomic. and medic. observat. S. 282. 4) Chalmers a. a. O. 5) Linning Essays and ob-

www.dlibra.wum.edu.pl

α) Spigelia anthelmia Linn. Plenck Plant. offic. Pl. 88.

Sie ist in dem mittägigen Amerika zu Hause und ein Sommergewächs; ihre obersten Blätter stehen immer zu vier beisammen.

β) Spigelia marilandica Linn. Curtis Botan. Magaz. Pl. 80.

Sie wächst in Südkarolina, hält mehrere Jahre aus, und wirkt vornemlich in ihrem Aufgusse weit heftiger, als die erste Art; ihr Stengel ist viereckig; ihre Blätter sizen ohne eigene Stiele paarweise einander gerade gegen über; sie sind eirund-länglicht und scharf zugespizt; ihre Blumen sizen am Gipfel der Aeste in einzelnen Aehren beisammen.

6) Zaunrübe, weisse Zaunrübe, Gichtrübe, Gichtrebe, Gichtwurz, Stikwurz, weisse Stikwurz, Scheiswurz, Raswurzel, Zaunrebe, römische Rebe, Weisweinrebe, Hundsrebe, Hundskürbis, Teufelskirschen, wilder Zittwer, weisser Enzian. Bryonia alba Linn. Bryonia alba. Blackwell a. a. O. Pl. 37.

Man findet sie in ganz Europa als ein häufiges, beschwerliches und stark wucherndes Unkraut in lebendigen Heken. Ihre Wurzel hält mehrere Jahre aus; sie ist sehr gros,

---

servat. physic. and litterar. B. I. S. 386. ꝛc. 6) Garden ebendas. B. III. S. 145. 6) Whytt observat. on nervous disorders. S. 407. 8) Home a. a. O. S. 457. 9) Bergius und Dahlberg bei Rosenstein om Barnsjukd. S. 361.

www.dlibra.wum.edu.pl

aufen gelblicht, der Länge nach und in die Rundung gestreift, inwendig markig, in viele Aeste getheilt, und voll von einem bittern, scharfen, ekelhaften Safte, der wie Mohnsaft riecht. Ihr Stengel ist weich, ekig, und mit vielen stechenden Haaren besezt; er theilt sich in mehrere Aeste, und schlingt sich nach Schlangenzügen oft bis sechs Schuhe hoch an den benachbarten Gewächsen hinauf. Ihre Blätter sind auf ihrer Oberfläche mit weissen Haaren bekleidet; sie haben fünf Eken, und sind in fünf dreiekige Lappen getheilt, welche an ihrem Rande wie eine Säge gezakt sind; aus den Winkeln, welche sie mit den Aesten machen, entspringen Gabeln, die, wie eine Schnekenlinie, gedreht sind. Ihre Blumen zeigen sich im Brach- und Heumonat; sie sizen in den Winkeln der Blätter auf eigenen Stielen, welche sich in Aeste theilen und mehrere Blumen zugleich tragen; ihr Kelch ist in fünf schmale und kurze Abschnitte gespalten und ist einigermasen wie eine Gloke gestaltet; ihre Krone hat eine schmuzig weisse, oder gelbe Farbe, mit grünlichten, oder röthlichten Strichen; sie ist tief in fünf Lappen getheilt, welche in der Mitte etwas breiter, an beiden Enden aber sehr spizig sind.

Einige dieser Blumen sind unfruchtbar, zuweilen sind es alle auf einer Pflanze, und hingegen auf einer andern Pflanze alle fruchtbar; gemeiniglich aber sind auf der nemlichen Pflanze nur einige fruchtbar, die mehresten aber unfruchtbar. Die unfruchtbaren haben drei Staubfäden, die sich alle nur in einen Staubbeutel verlieren; die fruchtbaren hingegen einen Staubweg; der Griffel sizt auf dem Eierstoke, welcher oben in drei Stüke gespalten, und sich in eine dreifache Narbe verliert, welche wie ein halber Mond gestaltet ist.

www.dlibra.wum.edu.pl

Nur diese lezte Art Blumen hinterlassen eine kleine Beere, die beinahe ganz kugelrund, gemeiniglich schwarz, bisweilen auch roth ist, und inwendig drei Samen enthält.

Die Wurzel dieser Pflanze hat, so lange sie frisch und jung, und weder durch Troknen, noch durch andere Kunstgriffe der Apotheker verändert ist, eine ganz ungemeine Schärfe; ihr Gebrauch verursacht die grausamsten Bauchflüsse r), Wahnwiz s), Sinnlosigkeit t), Bangigkeit u) und Schwindel x), auch wohl zuweilen den Tod y). Schon Abano zählte sie daher unter die Gifte. Die Schafe lassen die Pflanze unangetastet stehen.

Die alten Aerzte gebrauchten nicht nur die jungen Sprossen, welche stark auf den Stuhlgang treiben, sondern auch die Wurzel, nachdem sie sie durch Troknen, Kochen, durch Zusaz von Wein, Milch, Pflanzensäuren, oder Gewürze unschädlicher gemacht hatten, als auflösendes und harntreibendes Mittel in hartnäkigen Verstopfungen der Eingeweide und Drüsen, in Krankheiten der Haut, der Wassersucht, und der fallenden Sucht: sicherer bedienen sich ihrer zuweilen unsere neuern Aerzte äuserlich, als eines zertheilenden Mittels.

Aus

---

r) Cranz Mat. med. et chirurg. II. §. 149.

s) Dioscorides Mat. med. L. IV. C. CLXIII.

t) P. de Abano a. a. O. C. XXXV. S. 36. auch Nicolai behauptet a. a. O. II. sie wirkt wie Mohnsaft.

u) Ebenders. a. a. O.

x) Ebenders. a. a. O.

y) 1) Gazette salutaire 1784. n. 43. Rahn Gazette de sant. Jahrg. IV. S. 569.

www.dlibra.wum.edu.pl

Aus eben dieser Wurzel kann man nicht nur Stärke a) sondern sogar, nachdem man sie durch verschiedene Kunstgriffe aller ihrer Schärfe beraubt hat, Mehl b) und aus diesem Brod c) machen.

Mit dieser Pflanze kann man auch alte Wände grün bekleiden; aber aus lebendigen Hecken muß sie verbannt werden, weil sie andere nüzlichere Gewächse erstikt, oder doch ihr glükliches Gedeihen hindert.

Sollte hier nicht die Hippomanica, ein nicht auszurottendes Sommergewächs auf den fetten Angern in Chili, dessen Blumen zehen Staubfäden und einen Staubweg, einen in fünf Abschnitte getheilten Kelch, und eine aus fünf eirunden Blättchen bestehende Krone haben, und ein trokenes inwendig in vier Fächer getheiltes Samengehäus hinterlassen, von welchem die Pferde wütend werden, wenn sie nicht so gleich, nachdem sie es gefressen haben, durch starkes Rennen in Hize und Schweis gejagt werden d); sollte nicht die malabarische Wurzel Velli-Nawi, welche Hühnchen zu fünf Granen beigebracht, Zittern und Zukungen, zuerst an Hals und Kopf, nachher in allen Theilen des Leibes erregt, meist vor Verlauf einer Stunde tödet und nach dem Tode auser Aufschwellen des Leibes, keine sichtbaren Spuren seiner Wirkung zurükläßt e); sollte vielleicht auch das Dorycnium der Alten,

---

a) Avantcoureur 1773.

b) Anzeigen von der Leipz. ökonom. Gesellschaft 1771.

c) Rozier observation &c. 1772. Decembr.

d) Molina a. a. O. S. 126. 127.

e) P. Russel Account of indian serpents collected on the coast of Coromandel, London 1796. fol. S. 75.

www.dlibra.wum.edu.pl

welches sie dem Alraun an die Seite sezten, hier eine Stelle verdienen?

III. Doldengewächse. Umbelliferae.

1) Kälberkropf. Chaerophyllum Linn.

Die Arten, deren ich hier gedenken muß, haben einen etwas unangenehmen Geruch. Ihre Wurzel ist fleischig, und hält mehrere Jahre aus. Ihr Stengel erreicht eine beträchtliche Höhe, und ist inwendig hohl, und immer da, wo die Gelenke abgesezt sind, äufgeschwollen. Ihre Blätter sind zu dreienmahlen in kleinere feine Blättchen getheilt. Ihre grose Blumendolde hat gemeiniglich gar keine Hülle, zuweilen statt derselbigen nur ein einiges Blättchen; die kleineren hingegen, in welche sie sich theilt, haben eine Hülle, welche aus fünf bis sieben, selten nur aus drei Blättchen besteht, und umgebogen und vertieft ist. Unter ihren Blumen sind einige unfruchtbar, und diejenigen, welche aufen an der Dolde stehen, sind kleiner, als die innern; alle haben eine weisse, sehr selten eine röthlichte Krone, deren Blättchen unzertheilt, und beinahe wie ein Herz gestaltet sind. Bei den innern Blümchen sind diese Blättchen in ihrer Gröse nicht sehr verschieden: aber bei den äufern sind sie ungleich, so daß das nach aufen stehende Blättchen ungemein gros, die übrigen aber äuserst klein sind. Ihre Samen sind länglicht und glatt.

Sie unterscheiden sich von dem gefleckten Schierling dadurch, daß ihre Wurzel mehrere Jahre ausdauert, daß der übrige Theil der Pflanze keinen so sehr unangenehmen Geruch hat, als der Schierling, daß ihre Blätter eine hellere

www.dlibra.wum.edu.pl

Farbe, und ihre grosen Blumendolden keine Hülle haben; daß die Hüllen der kleinern Dolden vertieft, und wenn die Blumen verwelken, zurükgelegt, und ihre Blättchen von ungleicher Gröse sind; ferner daß ihre Blümchen von sehr ungleicher Gröse, und nicht alle fruchtbar, und ihre Samen mehr länglicht, und niemahlen geribt sind.

Durch eben diese Merkmahle, die von der Hülle der kleinern Dolden, von den Blumen und Samen entlehnt sind, unterscheiden sie sich auch von dem giftigen Wüterich.

Von dem Gartenkörbel, dem Myrrhenkorbel und der Petersilie zeichnen sie sich durch ihre längere Dauer aus, da diese entweder nur zweijährig, oder gar Sommergewächse sind, und durch ihren Geruch, der bei den genannten Pflanzen angenehm und ganz eigen ist.

α) Wilder Kälberkropf, wilder Körbel, Kerbelkern, Buschmöhre, Scheere. Chaerophyllum sylvestre Linn. Jacquin Flor. austr. B. II. Pl. 149.

Diese Pflanze ist in Obst- und andern Gärten, auch auf Wiesen in ganz Europa ein sehr gemeines Unkraut, wo es im Maimonat blüht.

Seine Wurzel ist dik, lang, weis und von einem scharfen, etwas gewürzhaften Geschmak. Sein Stengel ist dik, gestreift und nur etwas weniges haarig. Seine Blätter sind gros und zuweilen bis zween Schuhe lang, und, die Blattribben ausgenommen, meistens ganz glatt; die kleinen Blättchen, in welche sie sich theilen, stehen an dem gemeinschaftlichen Blattstiele einander gerade gegenüber, und haben an ihrem Rande spizige Zähne; die äuserſten von ihnen fliesen zusammen. Die allgemeine Blumendolde ist flach, und nicht

www.dlibra.wum.edu.pl

sehr blumenreich. Die Hülle der kleinen Dolden ist etwas weniges haarig; unter den Blümchen sind nur wenige unfruchtbar. Die Samen sind glatt, glänzend und dunkel gefärbt.

Obgleich diese Pflanze in Kamtschatka eine sehr gewöhnliche Speise f) und in Teutschland ein unschädliches Futter für das Hornvieh ist, so soll doch die Wurzel nicht nur den Ochsen in Sibirien tödlich g) sein; sondern auch, wenn sie im Winter ausgegraben wird, bei Menschen Wahnsinn h), tiefen Schlummer i), Bangigkeit, Trägheit, Wuth und Berauschung k) erregt haben: aber kein einiger Fall in den Geschichtbüchern der Aerzte erweist, daß sie tödlich gewesen sei. Ob die Cicutaria, von deren giftigen Wirkung S. Pauli l) erzählt, diese Pflanze sei, will ich nicht entscheiden.

---

f) Krafcheminikow Beschreibung des Landes Kamtschatka, übers. durch Köhler. Lemgo 1766.

g) J. G. Gmelin Flor. Sibir. I. S. 211.

h) Held v. Hagelsheim Miscellan. Vratislau. II. 1722. S. 577.

i) So tief, daß man den Kranken einen ganzen Tag hindurch nicht aufwecken konnte. J. Bauhin a. a. O. B. III. Th. 2. S. 182.

k) Diese Zufälle sahe J. Bauhin a. a. O. bei zwo Familien zu Mömpelgard auf den Genus dieser Wurzel erfolgen.

l) Παρεκβασις. s. Digressio de vera unica et proxima causa febrium malignarum, petechialium, tum morbillorum, scorbuti, luis venereae et similium morborum macularium, nec non accurata febres has curandi methodus. Francof. 1660. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

Das Kraut kommt in Holland zu einem sehr gebräuchlichen Breiumschlag wider den Brand m); die Blumen werden fleisig von den Bienen besucht n). Auch kann man Garn damit grün färben o).

β) Bolliger Kälberkropf, Peperlein, Stapenkörfel. Chaerophyllum bulbosum Linn. Jacquin a. e. a. O. B. I. Pl. 63.

Er wächst in Norwegen, Ungarn, Teutschland, und in der Schweiz, vornemlich an Heken, und blüht im Brachmonat.

Seine Wurzel ist zu Anfang des Frühlings fleischig, und beinahe wie eine Birne gestaltet; nachher wird sie immer länger, und endlich holzig. Sein Stengel wird bis sechs Schuhe hoch; er ist beinahe seiner ganzen Länge nach mit sehr feinen braunen Flekken bemahlt, und unten mit sehr feinen, weit auseinander stehenden Haaren bekleidet, sonst aber glatt. Seine Blätter sind etwas weniges haarig. Die Hülle, der kleinen Dolden besteht aus drei bis sieben Blättchen welche zu unterst mit einander verwachsen sind. Die Samen sind glatt, und haben viele braune Furchen.

Die Wurzel dieses Gewächses, welche in Oestreich im Frühling ausgegraben, und mit Oehl, Essig, und Salz als Salat gespeist wird, erregt, wie l'Ecluse bemerkt hat, Schwindel, Schmerzen, und Schwere im Kopfe p).

---

m) Buchwald a. a. O. S. 84.

n) Hagström Pan apum Stockholm 1768. S. 5.

o) Abh. der Königl. Schwed. Akademie der Wissenschaften 1742. I. Viertelj. 6. St

p) Dies bemerkte auch Schreber neue Cameralschr. 8. Th. S. 269.

www.dlibra.wum.edu.pl

Pallas will auch q) den berauschenden Kälberkropf Chaerophyllum temulum Linn. Jacquin a. e. a. O. Pl. 65. als schädlich für die Menschen befunden haben; in Teutschland ist er es nicht.

2) Gleisse, kleiner Schierling, Hundspeterlein, stinkender Peterlein, tolle Petersilie, faule Grete. Aethusa Cynapium Linn. Cicuta minor. - Blackwell a. a. O. Pl. 517.

Dieses Sommergewächs zeigt sich in ganz Europa in Heken und Gärten sehr häufig; dadurch vermehrt sich die Gefahr, die es droht, und zwar um desto mehr, weil es mitten unter den esbaren Küchengewächsen von sich selbst hervorkommt, und einigen von ihnen so ähnlich sieht, daß es, vornemlich ehe es blüht, nur sehr schwer von ihnen zu unterscheiden ist.

Es ist auf seiner ganzen Oberfläche glatt, und hat, wenn es zwischen den Fingern gerieben wird, einen schweren Geruch, der sehr nahe an den Knoblauchgeruch gränzt. Sein Stengel ist gefurcht, und treibt viele Aeste, welche wie ein Arm ausgestrect sind. Seine Blätter theilen sich dreimal in kleine Blättchen, welche an dem gemeinschaftlichen Blattstiele einander gerade gegen über stehen; sie sind glatt, und auf ihrer obern Fläche schwarzgrün und glänzend. Die allgemeine Dolde ist gros und ohne Hülle, die kleinern, in welche sie sich theilt, haben statt der Hüllen, nur auf einer Seite drei lange spizige, umgeschlagene, und gleichsam unter sich

---

q) Reisen durch verschiedene Provinzen des Rußischen Reichs III. Th. Petersb. 1776.

www.dlibra.wum.edu.pl

hängende Blättchen. Alle Blumen sind fruchtbar, und alle haben eine weisse Krone, deren Blättchen von ungleicher Gröse, und in ungleiche Abschnitte getheilt sind. Seine Samen sind ganz nakend und rund, beinahe wie eine Kugel; sie haben auf ihrer Oberfläche vier Furchen, und drei erhöhete Striche. Es blüht im Brach- und Heumonat.

Bei einer Pflanze, die so leicht mit Küchengewächsen, oder andern verwechselt werden kann, und bereits verwechselt worden ist, scheint es keine überflüssige Sache zu sein, die Merkmale besonders anzugeben, wodurch sie sich von diesen auszeichnet.

Am häufigsten ist sie wohl mit der Petersilie verwechselt worden, und es ist sehr wahrscheinlich, daß diejenigen Fälle, in welchen das Schierlingskraut statt der Petersilie genossen worden, vielmehr auf die Gleisse passen. Die Gleisse unterscheidet sich aber so wohl, ehe sie blüht, dadurch, daß sie ein Sommergewächs ist, und eine kleinere Wurzel hat; daß sie, wenn sie nicht zerrieben wird, keinen, oder doch keinen angenehmen Geruch hat; daß die Blätter auf ihrer obern Fläche glänzen und schwarzgrün sind, noch deutlicher aber, wenn sie einmal blüht, dadurch, daß sie unmittelbar unter den kleinern Dolden nur auf einer Seite drei ziemlich lange, spizige, und umgebogene Blättchen hat, die in ihrer Gestalt von den übrigen Blättern gar sehr abweichen.

Von dem Seleri unterscheidet sie sich durch die nemlichen Kennzeichen.

Von dem Kümmel unterscheidet sie sich durch ihren höhern Wuchs, dadurch, daß sie gar keinen oder doch keinen gewürzhaften Geruch hat; durch ihre minder fein zertheilten

www.dlibra.wum.edu.pl

Blätter; durch die halben Hüllen unter den kleinern Dolden, und durch ihre kugelrunde Samen, endlich noch dadurch, daß sie ein Sommergewächs ist.

Von der Pastinakwurzel unterscheidet sie sich dadurch, daß ihre Wurzel ganz dünn, und ohne merklichen Geruch ist, und im Herbst darauf geht; daß ihre Blätter glatt, glänzend, feiner, und zum drittenmahle in kleinere getheilt sind, daß ihre kleinern Dolden eine Hülle, alle Blumen eine weisse Krone, und an dieser getheilte Blättchen haben, und daß ihre Samen kugelrund sind.

Von dem Dill und Fenchel zeichnet sie sich dadurch aus, daß sie keinen gewürzhaften Geruch und Geschmak hat, daß ihre Blätter nicht so fein zertheilt sind, daß ihre kleineren Blumendolden eine Hülle, daß alle Blumen eine weisse Krone, und an dieser getheilte Blättchen haben, und daß ihre Samen kugelrund sind.

Von dem Gartenkörbel und Myrrhenkörbel zeichnet sie sich dadurch aus, daß sie keinen angenehmen Geruch hat; daß ihr ganzer Bau nicht so fein, ihre Blätter dunkelgrün, und ihre Blumen insgesamt fruchtbar sind; daß sie unter den kleinern Blumendolden nur auf einer Seite eine Hülle hat, und daß ihre Samen beinahe kugelrund sind.

Von der gemeinen Gartenmöhre unterscheidet sie sich durch ihre weit dünnere Wurzel, welche im Herbst darauf geht; durch die glatte Oberfläche aller ihrer übrigen Theile, und die dunkelgrüne Farbe ihrer Blätter; ferner dadurch, daß sie unter der allgemeinen Blumendolde gar keine, und unter den kleinen nur auf einer Seite eine Hülle hat, und endlich durch die runde Gestalt ihrer Samen.

www.dlibra.wum.edu.pl

Von dem Koriander unterscheidet sie sich durch den ihm eigenen Wanzengeruch; daß ihre allgemeine Blumendolde gar keine Hülle hat; daß die Blättchen ihrer Blumenkronen in mehrere Stüke getheilt sind, und daß ihre Samen Furchen und Erhöhungen haben.

Von dem gefleckten Schierling läßt sie sich dadurch unterscheiden, daß ihr Geruch nicht so stark ist; daß sie nicht so buschig wächst, sondern mehr gerade in die Höhe schießt; daß ihr Stengel, seiner ganzen Länge nach ohne Fleken ist; daß ihre grosen Blumendolden keine Hülle haben; daß die Blättchen unter den kleinern Dolden weit länger und spiziger, die Blättchen ihrer Blumenkrone getheilt, und ihre Samen nicht gekerbt sind, sondern nur vier Furchen haben.

Von dem breitblätterichten, knotigen, und schmalblätterichten Wassermerk zeichnet sie sich dadurch aus, daß sie fast niemalen in Wasser wächst; daß ihre Wurzel viel dünner ist, und nicht weit um sich greift; daß ihr Stengel höher wächst; daß ihre Blätter zu dreimahlen getheilt sind, und eine weit dunklere Farbe haben; daß ihre allgemeine Blumendolde keine Hülle hat, und ihre Samen kugelrund sind.

Von den Arten der Rebendolde unterscheidet sie sich dadurch, daß sie nicht gerade an feuchten Orten wächst; daß ihre Wurzel weit kleiner ist, und im Herbste darauf geht; daß ihre Blätter gleichförmiger, ihre grose Blumendolde ohne Hülle, und ihre Blumen insgesamt fruchtbar sind, und jede auf einem eigenen Stiele steht; und daß ihre Samen ohne Kelch sind.

Von dem Wasserpferdesamen (Phellandrium aquaticum Linn.) zeichnet sie sich dadurch aus, daß sie von Natur nicht

www.dlibra.wum.edu.pl

leicht im Wasser wächst; daß ihre Stengel viel diker; daß ihre Blätter nicht fein zertheilt sind; daß ihre Samen mit Furchen durchzogen, und kugelrund und ohne Kelch sind.

Von dem giftigen Wüterich unterscheidet sie sich dadurch, daß sie nicht leicht von selbst im Wasser wächst; daß ihre Wurzel sehr viel kleiner ist, und alle Jahre im Herbst zu Grunde geht; daß ihre kleinen Blumendolden nur auf einer Seite eine Hülle haben; daß ihre äusern Blümchen gröser als die innern sind, und ihre Samen mehr die Gestalt einer Kugel, als eines Eies haben.

Die Wurzel r), noch mehr aber das Kraut r*) dieses Gewächses, erregt nach vielen Erfahrungen Bangigkeiten s), Wahnsinn t), Sinnlosigkeit u), Wuth x), Bauchflüsse y),

---

r) Bei zween Knaben, Commerc. litter. Nor. 1721. S. 178.

r*) Buchhave Act. Societ. med. Havn. I. S. 51. fünf Knaben geriethen davon in Lebensgefahr. Journal für Deutschland 1785. St. 9. S. 203.

s) Com. lit. Nor. und Schreber Sammlung verschiedener Schriften ꝛc. VI. Th. S. 273.

t) Bei einem vierjährigen Knaben. Commerc litt. Nor. a. e. a. O. Bei einem andern, Martius Ephem. Ac. Caes. Nat. Curios. Vol. I. Obs. 52, und bei einem ganzen Hause Miller ebendas. Cent X. Obs. 62.

u) 1) Dalechamp in notis ad C. Plinii Sec. Natur. L. XXXVII. Lugd 1587. 2) J. Jonston Thaumatograph. Amstel. 1632. S. 202. 3) Matthiol Comment. in Dioscorid. S. 1416.

x) Bei einem Mönche Matthiol a. e. a. O.

y) 1) Jungius Ephem. Acad. Caes. Nat. Cur. D. I. a. 4. 5. S. 101. 2) Riviere Histoire de l'Acad. Royale des Sciences à Montpellier. Lyon 1766. B. I. S. 170. u. f.

www.dlibra.wum.edu.pl

entsezliches Erbrechen z), die grausamsten Kopf- a) Magen- b) und Bauchschmerzen c), Schlummer d), Aufschwellen des ganzen Leibes e), zuweilen mit schwarzblauer Farbe f), und nicht sehr selten den Tod g).

Geschichte.

Zu Eitelbrunn bei Regenspurg waren im Monate April einige Bauerjungen auf einem Aker, wo sich ihre Eltern damit beschäftigten, das Unkraut auszureissen, und vor den Aker hinaus zu werfen; unter diesem waren auch die Wurzeln der Gleisse. Einer von den Jungen, ein Knabe von sechs Jahren, hielt sie für Petersilie, und speisete Abends um vier Uhr davon. Bald darauf fieng er an, ängstlich zu schreien, und sich über Magenkrampf zu beklagen; als man ihn nach Hause brachte, schwoll er entsezlich auf, und wurde über den ganzen Leib schwarzblau; sein Athem wurde von

---

z) 1) 2) Jungius und Riviere a. e. a. O. 3) P. Blair Pharmaco-botanologia. Lond. 1728. Dec. V. S. 212. u. f.

a) Riviere a. a. O.

b) Commerc. litter. Nor. Jungius und Blair a. d. a. O.

c) Blair und Schreber a. d. a. O. Miscell. Vratisl. 1722 Maymon.

d) Riviere a. a. O. oder Betäubung Schreber a. a. O.

e) Blair a. a. O.

f) Commerc. litt. Nor. a. a. O.

g) Ein Beispiel von einem sechsjährigen Knaben. S. Commerc. litterar. Noric. a. a. O. ein anderes bei Jonston a. a. O. zween Fälle bei Blair; drei bei Riviere a. d. a. O. ein Knabe von sechs Jahren Vicat a. a. O. S. 255.

www.dlibra.wum.edu.pl

Augenblik zu Augenblik schwerer und kürzer, und ungefähr um Mitternacht war er des Todes.

Ein anderer Knabe von vier Jahren hatte auch von diesen Wurzeln gekostet; er war schon darinnen glüklicher, daß er sie durch den Mund wieder von sich gab; doch war er seiner gar nicht mächtig: er redete irre, und glaubte eine Menge Hunde und Kazen vor sich zu sehen. Sein Vater gieng den andern Tag nach Regensburg, und fragte daselbst einen Arzt um Rath, durch dessen Hülfe er glüklich gerettet wurde h).

Die meisten Thiere fressen inzwischen diese Pflanze ohne Widerwillen und Schaden i), wenn aber einige beobachtet haben wollen, daß sie auch von Menschen ohne Schaden gespeist worden seien k), so müssen diese entweder nur sehr wenig davon genossen haben l), oder die Pflanze muß mit einer andern, minder schädlichen, verwechselt worden sein m).

Sehr oft wird sie statt des gefleckten Schierlings gebraucht; sie wirkt aber viel schwächer.

---

h) Commerc. litt. Noric. a. a. O.

i) 1) Ehrhart ökonom. Pflanzenh. 7. B. S. 315. 2) Riviere a. a. O.

k) Von einer ganzen Haushaltung Hannemann Ephem. Acad. Caes. Nat. Curios. Dec. II. a. 4. Obs. 50.

l) Dies vermuthet Herr von Haller Histor. plant. Helvet. indig. I. S. 336.

m) Dies glaubt Guerin a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

3) Breitblätterichter Wassermerk, breitblätterichter Merk, Froscheppich, Wassereppich, Wasserpeterlein, Weyherpeterlein, grosser Wasserpastinat. Sium latifolium Linn. Flor. Dan. Pl. 246.

Er findet sich in ganz Europa in kleinen Bächen und Wassergräben, und blüht vornemlich im Erndtemonat. Das ganze Gewächs hat einen schweren Geruch, der dem Harzgeruch nahe kommt.

Seine Wurzel hält mehrere Jahre aus, besteht aus mehrern deutlich abgesezten Gelenken, und giebt viele lange Zasern von sich. Sein Stengel wächst aufrecht, und bis drei Schuhe hoch. Seine Blätter sind hellgrün, weich und glänzend, und bestehen aus mehreren kleinern Blättchen, welche an einem gemeinschaftlichen Stiele einander gegenüber stehen, in ihrem Umfange eirund, und an ihrem Rande wie eine Säge gezakt sind. Seine allgemeine Blumendolde sizt an dem Gipfel des Stengels und der Aeste, und hat gar keine Hülle; unter den kleinen Dolden hingegen steht eine Hülle von sechs oder sieben ziemlich breiten Blättchen, welche an beiden Enden spizig sind, und sich, sobald die Blume verwelkt, umlegen, und nicht selten an ihrem Rande einen oder den andern Einschnitt haben. Seine Blumen sind alle fruchtbar, und alle von gleicher Gröse; ihre Krone ist weis, und die Blättchen, aus welchen sie besteht, von gleicher Gestalt und Gröse; ihre Gestalt kommt ungefähr der Gestalt eines Herzens nahe. Seine Frucht ist rund, wie ein Ei, und besteht aus zween gestreisten und von beiden Seiten gleichsam breitgedrukten Samen, welche mit der flachern Seite auf

www.dlibra.wum.edu.pl

einander liegen, und mit einem sehr kleinen Kelche umkränzt sind.

Er zeichnet sich von den übrigen Arten der gleichen Gattung, welche in Wasser wachsen, dadurch aus, daß er seine Blumendolden an der Spize des Stengels und der Aeste trägt. Von den Arten der Nebendolde und dem Wasserpferdesamen, daß seine Blätter nicht so fein zertheilt, und daß seine Blümchen alle fruchtbar, und alle von gleicher Gröse sind; von dem giftigen Wüterich, durch seine weit kleinern Wurzel; durch seinen niedrigern Wuchs; durch die minder feine Zertheilung seiner Blätter, und durch den Stand seiner Blumendolde an dem Gipfel des Stengels und der Aeste. Von den Arten des Eppichs, durch seinen Harzgeruch, und durch die Gestalt der Blättchen, aus welchen die Blätter bestehen. Von der Brunnenkresse, schon vor der Blüthe, dadurch, daß die Blättchen, aus welchen die Blätter bestehen, spiziger, länger, nicht so rund und saftig, und an ihrem Rande scharf gezakt sind. Von den Bachbungen und dem Wassergauchheil dadurch, daß die Blätter nicht einfach, sondern aus kleinern zusammengesezt sind.

Beyersten sahe auf den Genus von der Wurzel dieser Pflanze, die zu Anfang des Erndemonats ausgegraben war, so wohl bei Vieh, als bei einigen Knaben, Raserei, und bei einigen selbst den Tod erfolgen n).

Vor der Mitte des Sommers ausgegraben, ist diese Wurzel unschädlich; auch das Kraut wird, so lange es grün

n) Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar. 1750. B. XI. Vierteli. IV. Abh. 9.

www.dlibra.wum.edu.pl

ist, zwar nicht gerne, aber doch ohne Schaden, von dem Viehe gefressen o).

4) Giftiger Wüterich, Wasserschierling, giftiger Wasserschierling, Parzenkraut. Cicuta virosa Linn. Cicuta aquatica, Wepfer Historia cicutae aquaticae Basil. 1716. Blackwell a. a. O. Pl. 574. a. 574. b. 574. c.

Er wächst in ganz Europa an Wasser, vornemlich in stehendem Wasser und in Sümpfen, besonders wenn sie zwischen Bergen eingeschlossen sind.

Seine Wurzel hält mehrere Jahre aus; sie ist oft sehr gros, inwendig voll hohler Zellen und durch Scheidewände in Kammern getheilt; sie giebt viele Fasern von verschiedenem Durchmesser und verschiedener Länge von sich, die öfters durch ihre verschiedene Richtung und Verbindung gleichsam ein Nez bilden; sie riecht beinahe wie Pastinak, nur etwas ekelhafter; sie hat von aussen viele erhöhte Ringe, inwendig aber ein weisses Fleisch, welches im Sommer dichter und vester ist; ihr Saft ist im Winter, und zu Anfang des Frühlings gelb, wird aber, wenn er über Nacht steht, etwas röthlicht; anfangs schmekt er zwar süslicht, aber bald darauf äusert er auch auf der Zunge seine schädliche Schärfe: im Sommer ist dieser Saft schwach und wässericht.

Aus einer Wurzel, und zwar aus der Spize derselbigen, entspringen mehrere Stengel; diese sind voll von einem wässerichten und klebrichten Safte; unten sind sie weis und

o) Schreber Sammlung vermischter Schriften. 3. Th. S. 10.

roth gestreift, oben aber grünlicht. Sie werden bis vier Schuhe hoch, und sind deutlich in Gelenke abgesezt, welche bis einen Schuh lang werden; aus dem Knoten dieser Gelenke entstehen die Aeste, welche wie ein Arm ausgestrekt sind, und sich wieder in kleine Zweige theilen.

Seine Blätter sind glatt und glänzend hellgrün; sie sizen auf stumpfen und geraden Stielen, den Blumendolden gegen über; sie bestehen aus mehreren kleineren Blättchen, welche an dem gemeinschaftlichen Blattstiele einander gegenüber sizen und mit einem ungleichen schliesen. Diese sind wieder auf die gleiche Art in mehrere, zuweilen in fünfzehen kleinere getheilt, welche im Umfange rund wie ein Ei, an ihrem Rande, wie eine Säge gezakt, und bald einfach, bald in zween, bald in drei, bald in fünf Abschnitte gespalten sind.

Seine grose Blumendolde steht den Blättern gerade gegen über; gemeiniglich hat sie gar keine Hülle; sie theilt sich in zwölf, sechzehn, bis achtzehn kleinere, aber blumenreiche Dolden; jede hat eine Hülle von drei bis fünf schmalen Blättchen, die, sobald die Blumen verwelken, sich zurüklegen. Die Blumen selbst sind fruchtbar, und alle von gleicher Gröse; sie haben alle eine weisse Krone, deren Blättchen vornemlich bei den innern Blumen beinahe gleiche Gröse und Gestalt, und in der lezteren viele Aehnlichkeit mit einem Herzen haben.

Seine Frucht ist mit einem ganz kleinen Kelche bekränzt, und besteht aus zween Samen; diese sind rund und wie ein Ei gestreift, etwas weniges haarig gefurcht, und mit einem weissen Saume eingefaßt: sie haben viele Aehnlichkeit mit der Petersilie.

Auch

www.dlibra.wum.edu.pl

Auch diese Pflanze ist in ältern und neuern Zeiten so häufig mit andern, theils nüzlichen theils schädlichen Gewächsen verwechselt worden, daß es mir nothwendig scheint, die unterscheidenden Kennzeichen derselbigen anzugeben.

Die Peterſilie und die übrigen Arten des Eppichs zeichnen ſich durch ihren eigenen nicht unangenehmen Geruch, durch ihre minder fein zertheilten Blätter, durch die Blättchen, welche unter den groſen Blumendolden ſtehen und den übrigen Blättern gleich ſehen, durch die feineren Streifen an ihren Samen, welche mehr wie ein Ei gerundet ſind, und ſelbſt dadurch aus, daß die kleinern Dolden gemeiniglich keine Hülle haben.

Der Myrrhenkörbel zeichnet ſich durch ſeinen ſtarken und angenehmen Anisgeruch; der Gartenkörbel durch ſeinen eigenen angenehmen Geruch, durch den weit feineren Bau aller ſeiner Theile, durch ſeine geringere Dauer, da er nur ein Sommergewächs iſt, durch ſeine ganz kleine Wurzel, durch ſeinen niedrigen Wuchs und durch ſeinen langen, glänzenden und ſpizigen Samen ſehr deutlich aus.

Der Paſtinak unterſcheidet ſich durch ſeine Wurzel, welche gemeiniglich kleiner und beinahe wie eine Spindel geſtaltet iſt, durch den eigenen gewürzhaften und ſüſen Geruch aller ſeiner Theile, vornemlich der Samen, durch ſeine langen nicht ſo fein zertheilten Blätter, durch ſeine Blumendolden, welche gar keine Hülle haben, und durch die gelbe Farbe ſeiner Blumenkrone.

Die gemeine Möhre hat immer eine kleinere, und, wenn ſie auch gros iſt, mehr eine ſpindelförmige Wurzel ohne Ringe auſen, oder Zellen inwendig; die Oberfläche der gan-

www.dlibra.wum.edu.pl

zen übrigen Pflanze ist rauh, die Blätter viel feiner zertheilt, und nicht so glänzend; die grose Blumendolde beständig mit einer grosen Hülle bekleidet, und die Samen dicht mit steifen Borsten besezt.

Die wilde Engelwurz (Angelica sylvestris Linn.) unterscheidet sich durch den gewürzhaften Geschmak ihrer Wurzel und der übrigen Theile; durch die etwas rauhe Oberfläche ihres Stengels und ihrer Blätter, durch die grosen und bauchigen Scheiden, welche die lezten um den Stengel bilden, durch die grosen und diken Dolden, durch die Rundung der kleinen Dolden, wenn die Samen zu reifen anfangen, und durch die vesten und ekigen Samen, welche noch mit den umgebogenen Griffeln bekleidet sind, und eine deutliche Einfassung haben.

Der Geisfuß (Aegopodium Podagraria Linn.) zeichnet sich durch seinen etwas gewürzhaften Geruch und Geschmak aus, ferner durch die Höhe seines Stengels, welche niemalen über drei Schuhe geht, durch seine Blätter, von welchen die untern aus fünf, die obern aber nur aus drei kleinern Blättchen bestehen, durch die grosen Scheiden, welche sie bilden, durch seine kleinen Blumendolden, welche ganz ohne alle Hülle sind, durch die langen Griffel auf den Eierstöken, durch seine mehr länglichten Früchte, und endlich dadurch, daß er nicht leicht im Wasser wächst.

Der Liebstökel vom Peloponnes (Ligusticum Peloponnesiacum Linn.) unterscheidet sich durch sein schönes Ansehen, durch seinen gefurchten Stengel, durch die beträchtliche Länge seiner Blätter, welche oft über einen Schuh geht, durch den weiten Umfang seiner grosen Blumendolde und die Hülle, womit diese bekleidet ist, durch die violblaue Farbe seiner

www.dlibra.wum.edu.pl

Staubfäden, durch seine krummen Griffel, welche noch auf der zeitigen Frucht bleiben, und durch die fünf Furchen auf dieser, welche mit einem schwammigen Wesen ausgefüllt sind.

Der Wasserpferdesamen (Phellandrium aquaticum Linn.) zeichnet sich durch die Büschel von Fasern aus, welche öfters aus den Gelenken des Stengels entspringen, durch die, beinahe unendliche Zertheilung der Blätter in Aeste und Zweige, durch die ungleiche Grösse der Blumen, in welcher die äusern die innern übertreffen, und vornemlich durch die ganz glatte Oberfläche der Frucht, durch die bleibenden Griffel, womit sie bekleidet, und durch den bleibenden, weit grösern Kelch, mit welchem sie bekränzt ist.

Der geflekte Schierling ist dadurch verschieden, daß er, vornemlich, wenn er zwischen den Fingern gerieben wird, einen weit stärkern und heslichen Geruch, eine viel kleinere Wurzel, einen rothgeflekten Stengel, dunkelgrüne Blätter, und an der grosen Blumendolde beständig eine Hülle hat, endlich, daß seine Samen fünf Streifen haben, und mehr kugelrund und auf beiden Seiten gekerbt sind.

Die röhrichte Rebendolde unterscheidet sich dadurch, daß ihre untern Blätter anders gebildet sind, als die obern, daß ihre Blumen nicht alle fruchtbar, und die äusern viel gröser, als die innern sind, daß einige von den Blumen gar keine eigene Stiele haben, daß selbst die Blättchen, aus welchen die Krone der äusern zusammengesezt ist, eine ungleiche Grösse und die Früchte eine fünfekige Gestalt haben.

Eben diese Merkmale an Blumen und Früchten zeichnen auch die safrangelbe Rebendolde aus; dazu kommen noch ihr rothgelber Stengel und ihre ekige und gestreifte Blattstiele.

www.dlibra.wum.edu.pl

Wie die Gleisse, der breitblätterichte Wassermerk und die Arten des Kälberkropfs davon zu unterscheiden sein, habe ich bereits in der Geschichte dieser Pflanzen gezeigt.

Sie ist es also, deren Wurzel p) vornemlich Berauschung q), Schwindel r) unüberwindliche Neigung zum Schlafe s), Todenschlummer t), vorübergehende Sinnlosigkeit u), ungemeine Ermattung x), die auch zuweilen eine

---

p) Von dem schädlichen Erfolg des Krautes sind Beispiele sehr selten; doch gedenkt J. C. Scaliger Exoter. exercitat. L. XV. Lutet. 1557. S. 209. eines Franc. Trapolini, der die Blätter dieses Gewächses, wenn es anderst gewis dieses ist, statt der Petersilie genossen, davon von Sinnen kam und starb. Auch Sadd sucht die giftige Kraft vornemlich in der mit gelbem Safte angefüllten Wurzel. Kongl. Svenska Vetensk. Akad. Handling. 1774. III. n. 1—6.

q) 1) Etlinger Commerc. litter. Noric. 1740. S. 353. 354. 2) Wepfer a. a. O. S. 8.

r) Wepfer a. a. O. S. 8.

s) Ein Apothekerjunge fühlte diese Wirkung schon von der bloßen Ausdünstung der frischen Pflanze, die er mitten an einem schwülen Sommertage, gerade da er schwizte, ausris und nach Hause brachte. Trew Commerc. litt. Nor. 1740. S. 395. Ein Mann und eine alte Frau von dem wirklichen Genusse der Wurzel, Etlinger a. a. O. Ein Bauernknecht, Blom Kongl. Svenska Vetensk. Academ. Handling. XXV. 1774. I. nr. 6.

t) Bei einem Mädchen Wepfer a. a. O. S. 7.

u) Trew, Blom und beinahe in allen seinen Fällen Wepfer a. d. a. O.

x) Schon von den Ausdünstungen der frischen Pflanze, Trew, von dem wirklichen Genusse der Wurzel in sechs Fällen, Etlinger a. d. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Zeitlang anhält y), Wahnsinn z), eine ganz stille Tollheit a), Raserei b), Zukungen in den Gliedern c), die fallende Sucht d), leere Reize zum Erbrechen e), das doch manchmalen erfolgt f) und zuweilen blutig ist g), Schluch-

---

y) Bei einem Mädchen, Trew und Wepfer a. d. a. O.

z) In sechs Fällen, Etlinger a. a. O.

a) Scaliger a. a. O.

b) Göritz bei seiner Tochter, nach dem Berichte eines Büchners, Miscell. physico-mathemat. 1729. S. 724.

c) Bei einem Jünglinge von 20, bei einem Mädchen von 15 Jahren und bei fünf Kindern, Wepfer Ephemer. Acad. Caes. Nat. Curios. Dec. II. a. 6. S. 321. u. f. Bei drei Jünglingen, Miscell. Vratislau. 1722. I. S. 287. und bei einem Mädchen bei Büchnern a. e. a. O. Bei fünf Kindern, Held von Hagelsheim. Miscell. Vratisl. I. S. 511. Bei zwei Mädchen, Trew a. a. O. An vier Kindern, Box bei Schwenke in Verhandling over de ware Gedaante, Aart en Uytwerking der Cicuta aquat. Haag. 1756. Bei vier Kindern Schulze dresdnisches Magazin oder Ausarbeitungen und Nachrichten zum Behuf der Naturlehre, der Arzneikunst, der Sitten und der schönen Wissenschaften. Dresden, 8. B. II. 1765. Th. VII. n. 6. S. 436. ꝛc.

d) Bei acht Kindern, Wepfer Hist. Cic. aquat. a. a. O. bei einem Kinde Schulze a. e. a. O.

e) Bei einem sechsjährigen Knaben, Wepfer a. e. a. O.

f) Dieses ist gemeiniglich heilsam; so war es bei einem Manne von funfzig, bei einem Jüngling von zwanzig, und bei einer Frau von vierzig Jahren, Etlinger a. e. a. O. in einem Falle, bei Box a. a. O. und bei Wepfer a. a. O. Es ist aber doch nicht immer so, s. Wepfer ebendas. und Reimann Miscellan. Vratislau. 1727. S. 312.

g) Bei zwei Mädchen, Trew a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

zen h), Schmerzen i), Brennen k), Aufschwellen l), Entzündung m), Anfressen n), Löcher in dem Magen o), Kopfschmerzen p), schwarze Fleken auf der Haut q), Blindheit r), Blutfluß aus Nase, Mund, Augen und Ohren r*), Trokenheit in dem Rachen s), Stekfluß t) und

---

h) Bei einem sechsjährigen Knaben und bei einem noch nicht dreijährigen Mädchen, Wepfer Hist. Cic. aquat.

i) Bei drei Kindern, Ebenderf. ebendaf. bei einem starken Menschen von 26 Jahren. Ebenderf. Ephem. Acad. Caef. Nat. Curiof. Dec. II. a. 6. S. 321. bei vier Kindern, Schulze a. a. O.

k) Bei einem neunjährigen Mädchen, Wepfer Hist. cic. aquat. S. 9.

l) Bei drei Kindern, Wepfer Hist. cic. aquat. S. 7. u. f.

m) Bor a. a. O. Mappus Hist. plant. Alsatic. Argent. 1742. S. 291. zuweilen endigt sie sich in Brand Wepfer Eph. Acad Caef. Nat. Curiof. a. a. O. Oft ist sie nicht beständig, Göriz a. a. O.

n) Bor, Mappus a. d. a. O. und wenn etwa der Fall nicht vielmehr auf eine Art der Rebendolde paßt. Jaugeon Hist. de l'Acad. des sciences à Paris 1715. S. 23.

o) Jaugeon a. a. O.

p) Bei einem starken Manne von 26 Jahren Ephem. Acad. Caef. Nat. Curiof. a. a. O.

q) Blom a. a. O.

r) Der Saft Liſett, Benanci declaratio fraudium et errorum apud pharmacopoeos commiſſorum. Turon. 1553.

r*) Schulze a. e. a. O.

s) Wepfer Ephem. Acad. Caef. Nat. Curiof. a. a. O.

t) Bei einem Jünglinge von 20, und bei einem Mädchen von 15 Jahren. Wepfer Ephem. Acad. Caef. Nat. Cur. a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

sehr oft den Tod verursacht hat u), der zuweilen plözlich erfolgte.

Nach dem Tode schwillt sogleich der Leichnam, vornemlich Unterleib x) und Gesicht y) zu einer ungeheueren Gröse auf; das Gesicht z) und zuweilen die ganze äusere Oberfläche des Leibes a) wird schwarzblau. Die Lungen sind zuweilen entzündet, oder vom Brande angegriffen b); die Säfte sind ungemein aufgelöst, und es fließt ein grauer Schaum aus dem Munde c).

Geschichte d).

Gegen das Ende des Merzens trieb man das Vieh aus dem Fleken über den Brunnen. Dieses trat stark auf

---

u) Von einem Jünglinge. Wepfer Ephem. Acad. Caes. Nat. Curios. a. a. O. von zween Knaben Ebenderf. Hist. cic. aquat. a. a. O. von zween Jünglingen, und einem Mädchen, Göriz a. a. O. von drei Kindern Held von Hagelsheim, Reimann und Vox a. d. a. O. von einem Fuhrknechte, der zu Gröbing im Leobschüzer Kreise nebst drei andern kaum noch geretteten von der Wurzel gespeißt hatte. Breslau. Hamburg. unpartheiischer Korresponb. 1783. St. 58. von vier Kindern, die innerhalb vier Stunden starben, a. e. a. O. von einigen Soldaten, Mappus a. a. O.

x) Bei zween Knaben, Wepfer Hist. cic. aquat. a. a. O.

y) Bei einem sechsjährigen Knaben. Ebenderf. ebendas.

z) Bei einem achtjährigen Knaben. Ebenderf. ebendas.

a) Bei drei Kindern, Reimann a. a. O.

b) Bei einem Jünglinge von ungefähr zwanzig Jahren. Wepfer Ephem. Acad. Caes. Nat. Curios. a. a. O.

c) Bei zween Knaben, Wepfer Hist. cic. aquat. a. a. O.

d) Die sich bei dem Fleken Almanshofen in dem schwädischen Fürstenthume Fürstenberg ereignete. Wepfer Hist. cic. aquat. S. 5. u. f.

www.dlibra.wum.edu.pl

das Ufer des Flusses, und ris die Wurzeln des Wüterichs heraus, welche schon kleine Stengel und Keime von Blättern getrieben hatten. Fast zu gleicher Zeit giengen zween Knaben, und sechs Mädchen kurz vor dem Mittagessen, an dem Brunnen und auf der Wiese spazieren, durch welche der Flus lief; sie sahen die Wurzeln, und hielten sie für gelbe Pastinakwurzeln; nicht aus Hunger, sondern aus Wolluſt speisten sie mit groser Begierde davon, und einige von den Mädchen empfahlen sie den übrigen wegen ihres süsen und angenehmen Geschmaks so sehr, daß sie, vornemlich die Knaben, in groser Menge davon asen, und voll Vergnügen nach Hause eilten; so gar beklagte sich eines von den Mädchen mit Thränen bei seiner Mutter, daß ihm seine Kameraden so wenig davon hätten zukommen lassen.

Jak. Mäder, ein sechsjähriger, blonder, zarter, aber lebhafter Knabe, kam frölich, und lächelnd nach Hause, als wenn ihm nichts begegnet hätte; aber bald darauf beklagte er sich über Magenschmerzen, fiel ohne ein Wort zu reden, zu Boden, und lies seinen Harn mit groser Gewalt mannshoch springen; er hatte ein schretendes Ansehen, verlor den Gebrauch aller Sinnen, bekam Zukungen am ganzen Leibe, hatte einen hartnäkigen Kinnbakenzwang, knirschte mit den Zähnen, und verdrehte die Augen auf die wunderlichste Weise. Aus seinen Ohren strömte Blut, und in der Gegend des Herzgrübchens fühlte man einen Körper so gros als eine Mannsfaust, der stark klopfte, besonders wenn man die Hand daran hielt; er schluchzete öfters, that, als wenn er sich brechen wollte, konnte aber, weil der Mund vest geschlossen war, nichts herausbringen; er warf die Glieder hin und wieder, und verdrehte sie auf die entsezlichste Art; oft zog er das

www.dlibra.wum.edu.pl

Haupt nach hinten zu, und krümmte den Rükgrad, wie einen Bogen so daß zwischen seinem Rüken und dem Boden bequem ein anderer Knabe durchkriechen konnte; als die Zukungen einen Augenblik nachliesen, so konnte er durch kein Kneipen; durch kein Zurufen, und überhaupt durch nichts mehr aufgewekt werden, bis ihn seine Kräfte verliesen, und er erblassend, mit der Hand an der Brust, seinen Geist aufgab; diese Zufälle dauerten kaum eine halbe Stunde. Nach dem Tode schwellen der Unterleib und das Gesicht stark auf, und nirgends als um die Augen zeigte sich ein schwarzblauer Ring. Aus dem Munde flos bis auf die Stunde des Begräbnisses häufiger grüner Schaum, der immer wieder von Neuem kam, so oft ihn auch der betrübte Vater abwischte.

Kath. Mäderin, eine ältere Schwester dieses Knabens, eilte, so bald ihr Bruder diese traurige Rolle zu spielen anfing, ihrem Vater, der nicht weit von dem Fleken akerte, die schrekliche Nachricht zu hinterbringen. Nach ihres Bruders Tode sas sie hinter dem Ofen, und beklagte sich nun selbst; kaum war eine halbe Stunde vorüber, so brach sie eine ganze Hand voll von den gespeisten Wurzeln heraus; bald darauf wurde sie von einer wahren fallenden Sucht überfallen, verlor den Gebrauch aller Sinnen, und erschütterte, und verdrehte ihren Kopf, ihre Glieder und den ganzen Rumpf auf die fürchterlichste Weise, ihr Vater brach ihr den Mund mit einem Schlüssel auf, gos ihr venedischen Theriak in Essig ein; bald darauf gab sie wieder eine Handvoll von diesen Wurzeln von sich; nachher lag sie 24 Stunden lang, wie todt, in dem Bette; ihre Arme und Beine waren ganz ruhig, doch knirschte sie zuweilen mit den Zähnen, und rief manchmal ihrer Mutter; gab ihr aber diese eine

www.dlibra.wum.edu.pl

Antwort, oder redete sie sonst an, so schwieg sie stille, als ob sie nichts hörte. Neun Stunden lang hielten die Eltern ihre Tochter für todt, denn sie war ganz bleich, ihr Athem, nach ihrer Beobachtung unmerklich, und ihre Gliedmasen ganz kalt. Nach vier und zwanzig Stunden kam sie wieder zu sich selbsten, aber lange konnte sie, weil sie sich in die Zunge gebissen hatte, nicht bequem essen, und lange klagte sie noch über einen Schmerzen in der Gegend des Herzgrübchens; sie gieng zwar herum, aber vier Tage lang noch mit starker Müdigkeit; dann aber war sie wieder vollkommen gesund.

Maria Mäderin von drittehalb Jahren hatte auch, aber nicht so viel von diesen Wurzeln gespeist; sie wurde zwar auch aber lange nicht so grausam als ihre Geschwister von der fallenden Sucht angegriffen. Ihr Vater trug sie auf den Armen, und fühlte, daß in der Gegend des Herzgrübchens gleichsam eine Geschwulst, ungefähr einer Faust gros, an das Zwerchfell klopfte; sie schluchzte, heulte und wurde im Gesichte ganz roth; bald hielt sie den Mund vest zusammen, warf die Glieder hin und wieder, und verlor den Gebrauch ihrer Sinnen. Als man ihr den Mund mit Gewalt öfnete, und Theriak in Essig eingegeben hatte, gab sie eine halbe Handvoll dieser Wurzeln durch den Mund von sich: innerhalb acht Stunden war sie wieder gesund.

Matthias Graf, ein achtjähriger Knabe, blieb bis auf den lezten Athem bei Jak. Mädern, und rühmte sich, er hätte auch von diesen Wurzeln gespeist, ohne doch die mindeste Ungelegenheit zu empfinden. Nachdem er seinen Kameraden sterben gesehen hatte, gieng er nach Hause; allein, er hatte seines Vaters Wohnung noch lange nicht erreicht, so nöthigte ihn ein Schwindel, sich auf einen Stein niederzulassen. Kaum hatte er sich gesezt, so fiel er gestreckt auf das

www.dlibra.wum.edu.pl

Gesicht zu Boden; er stund doch ohne Hülfe wieder auf, eilte taumelnd nach Hause, und legte sich auf eine Bank hinter den Ofen; aber bald darauf wurde er durch krampfichte Bewegungen, ungefähr einen Schritt weit, auf die Erde geworfen, er richtete sich wieder auf, gieng einige Schritte, aber ganz wankend, vor sich, und legte sich auf die Bank hinter dem Tische nieder; aber auch von da fiel er bald wieder unter den Tisch; als man ihn hervorzog, fiel er in die abscheulichsten Zukungen und biß seine Zähne ganz vest auf einander. Der ganze Leib wurde immer auf die schrekklichste Art mit Gewalt nach hinten gezogen. Da ihm einer der Anwesenden mit einem Messerhefte die Zähne aus einander bringen wollte, zerbrach er ihm einige Zähne; und den Theriak in Essig, den man ihm eingeben wollte, konnte er nicht hinunter bringen, weil der Schlund durch einen Krampf auf das hartnäkigste verschlossen war. Zwischen der Gegend des Herzgrübchens, und dem Zwerchfell klopfte es mit der äussersten Gewalt, so daß es auch der stärkste Mann nicht zurükdrüken oder verhindern konnte. Er schluchzte laut, und der ganze Anfall hielt mit der grösten Heftigkeit über eine halbe Stunde an. Weder durch den Mund noch durch den Stuhlgang, noch den Harn ging das Mindeste ab, bis der Kranke ganz erschöpft starb. Nach seinem Tode schwoll der Unterleib und der ganze Leichnam so auf, daß man ihm kaum die Kleider ausziehen konnte; es flos eine grose Menge eines grünen Schaums unaufhörlich aus dem Munde, bis er begraben wurde. Um die Augen herum war er schwarzblau; an dem übrigen Leibe aber bemerkte man nichts ungewöhnliches.

Christiana Gräfin, eine neunjährige Schwester, dieses Knabens, hatte auch, doch sparsamer, von diesen Wurzeln

www.dlibra.wum.edu.pl

gegessen. Bis auf den Abend hatte sie nichts zu leiden; allein da es anfieng Nacht zu werden, sezte sie sich hinter den Ofen, und klagte, es würde ihr übel, und sie müßte fallen; sie klagte über einen stehenden Schmerzen in der Gegend des Herzgrübchens, und verfiel nachher in Zukungen. Ihr Vater, der nichts von diesem Elende wußte, kam gerade Abends noch zu rechter Zeit nach Hause, und da er eben klein geschnittenen Tabak bei sich hatte, so vermischte er davon so viel, als in zween Tabakspfeifenköpfe geht, mit Brunnenwasser, zog dem Mädchen die Zähne mit Gewalt aus einander, und gos ihr diesen Trank ein, der so gleich mit der äuserssten Heftigkeit wieder heraus kam, aber auch die gespeisten Wurzeln mit sich brachte. Das Mädchen gieng darauf zu Bette, schlief ruhig, wachte aber bald wieder auf, verlangte zu essen, und bezeugte, daß es ihr nun wohl sey; der Vater aber gab ihr statt dessen noch einen warmen Aufzus von Tabak ein; dadurch erbrach es mit Heftigkeit Schleim und Galle, ohne eine Spur von Wurzeln, blieb ohne Speise, schlief die ganze Nacht durch ruhig, und war den andern Morgen munter und gesund.

Mart. Müller's Tochter, und Georg Maurer's zwo Töchter von fünf Jahren hatten auch, aber sparsam, von diesen Würzeln gegessen. Sie verfielen alle in eine fallende Sucht, die aber weit gelinder, als bei den übrigen war. Sie erbrachen sich auf den Theriak, den man ihnen in Essig gegeben hatte, und wurden bald darauf alle vollkommen gesund.

Wenn aber der Wüterich zuweilen ohne Schaden genossen worden ist, so kam es entweder von der geringen

www.dlibra.wum.edu.pl

Menge, die man zu sich genommen hatte e), oder davon her, daß man die Wurzel im Sommer gegraben hatte, oder ihr sogleich die wirksamsten Gegengifte f) beisezte; oder ist vielleicht auch in einigen Fällen ein anderes, minder heftig wirkendes Gewächs damit verwechselt worden g).

Auch vielen unvernünftigen Thieren ist der Wüterich, wenigstens in einigen Gegenden der Welt, ein tödendes Gift. In Schwaben lassen ihn Pferde und Hornvieh unberührt stehen, auch in Schweden, Sibirien und Egypten rührt ihn das Hornvieh, so lange es gesund ist, nicht an; aber in Sachsen, und in dem Elsase soll es ihm nach den Berichten eines Rivius und Mappus, nachgehen. Wenn das Hornvieh durch Hunger oder andere Umstände verleitet wird, davon zu fressen, so ist er ihm, wo nicht tödlich, wie Linne' und Gadd h) einige Beispiele gesehen haben, doch gewis sehr schädlich i), und erregt unter diesen, so wie unter den Pferden, eine sehr verderbliche Seuche; auch Miller fand ihn, in Absicht auf die lezten tödlich. In Schweden und

---

e) So war es bei den drei Mädchen in Wepfer's Falle, Histor. cicut. aquat.

f) So behauptet Scaliger a. a. O. daß die Wurzel an einigen Orten ohne Schaden unter dem Salate gespeiset werde, wo sie an dem Essig und Oele mächtige Gegengifte findet.

g) So muß ich es erklären, wenn Sextus Empirikus bei Mercurialis a. e. a. O. l. C. VI. beobachtet haben will, daß eine alte Frau dreißig Drachmen von dem Safte ohne Nachtheil verschlungen habe.

h) Von dem Safte der Wurzel, der in einen kleinen Bach flos, aus welchem das Vieh trank a. e. a. O.

i) Hacquet a. a. O. I. S. 29.

www.dlibra.wum.edu.pl

Norwegen fürchten ihn Schafe und Ziegen; den ersten ist er äuserst schädlich k), auch den lezten ist er wenigstens nicht immer, noch allenthalben unschädlich l). Esel fallen davon in Schwindel. In Norwegen fressen ihn die Schweine ohne Schaden; aber in Schwaben hat er, nach einer äuserst wahrscheinlichen Vermuthung, sehr viele getödet, ehe man noch auf die wahre Ursache dieser Begebenheit gefallen war. Kaninchen erregt der Saft der Wurzel, und die Wurzel selbst, wenn sie fein zerschnitten ist, zwar grausame, aber nicht tödliche Zufälle; einer Kaze machte ein ganzes Loth aus den Blättern gedrükter Saft, auch die Samen in Milch eingeweicht, nicht die mindeste Ungelegenheit; ein Wolf fiel von vier Lothen in die grausamsten Zukungen, Hunde leiden, selbst von einem ziemlich starken Gewichte des Saftes, der aus den Blättern gedrükt wird, nichts; und auch die Wurzel ist ihnen, unter verschiedenen Gestalten eingegeben, nicht immer tödlich. Das Extrakt, durch eine Wunde beigebracht, bringt weder Kaninchen, noch Hunden, noch Kazen den Tod m); Gänse bekommen davon einen Schwindel, und gehen bald darauf zu Grunde. Adler leiden davon zwar heftige, aber keine tödlichen Zufälle. Viele Vögel fressen den Samen ohne Gefahr.

In Kamtschatka wird die Pflanze in Lendenschmerzen in den Rüken eingerieben. Ueber dieses wird sie häufig mit

---

k) So starb z. B. im Pilsner Kreise in Böhmen noch an dem gleichen Abende ein Schaf davon. Jirasek Abhandlungen der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften B. III. 1787. S. 336.

l) Gadd sahe sie davon fallen a. e. a. O.

m) Herissant philos. Transact. Vol. XLVII. S. 82.

www.dlibra.wum.edu.pl

dem geflekten Schierling verwechselt, und ſtatt deſſelbigen fälſchlich in Apotheken gebraucht. Von einem ſchwediſchen Arzte wird ſie neuerlich dem Schierling vorgezogen n), und Haram o) rühmt Gewächsſäuren als das beſte Hülfsmittel gegen ihre gefährlichen Wirkungen.

5) Schierling, geflekter Schierling, Wiener Schierling, groſer Schierling, Wuthſchierling, Arzneiſchierling, Würgerling, Wüterich, Tollkörfel, Tollkraut, Ziegerkraut, Bangenkraut, Kelber, Teufelspeterlein, Kazenpeterlein. Conium maculatum Linn. Cicuta, Blackwell a. a. O. Pl. 451. 573. a. und 573. b.

Er wächſt in ganz Europa in ziemlicher Menge, auf Weiden und Wieſen, an ungebauten Stellen, auch an Waſſern, und blüht vornemlich im Brach- und Heumonat.

Seine Wurzel hält ungefähr zwei Jahre aus; ſie iſt runzlicht, und von einer mittlern Dike und Länge; ſie hat beinahe die Geſtalt einer Spindel, und iſt mit vielen Zaſern beſezt, die ſich wieder in ſehr viele kleinere theilen; ihr Geruch kommt dem Geruche der Paſtinakwurzel ſehr nahe, und ihre Farbe ſpielt aus der weiſſen in die gelbe. Der Stengel wächſt bald höher, bald niedriger, je nachdem er in dieſem oder jenem Boden ſteht; zuweilen wird er über drei Schuhe hoch und über einen Zoll dik; er iſt glatt, rundlicht, inwen-

n) Lindwal obſervat. in Mater. medic. Upſal. 1772.

o) Bei Rozier Obſervations ſur la phyſique &c. 1773. B. 1. 4. Ianv. S. 35.

www.dlibra.wum.edu.pl

dig hohl, und gemeiniglich von der Wurzel an bis an den Gipfel mit blutrothen Flekken gezeichnet; er hat seiner ganzen Länge nach viele Knoten, aus welchen die Aeste entspringen, die dem Stengel gleich stehen, unten von der Blattscheide umfaßt werden, sich öfters wieder in Zweige theilen, wie ein Arm ausgestrekt sind, gerade wie die Pastinakwurzel riechen, und gleichfalls viele Knoten haben, aus welchen die Blumenstiele entspringen. Seine Blätter haben vor allen andern Theilen des Gewächses einen giftigen, und äuserst ekelhaften Geruch, der manchmalen ganz besonders ist; öfters aber, vornemlich in dem daraus gedrükten und durch Einkochen verdikten Safte, kommt dieser Geruch demjenigen von spanischen Fliegen nahe; ihre Oberfläche ist glatt, und glänzend, und ihre Farbe spielt aus der grünen in die schwarze; sie sizen ohne eigene Stiele wechselsweise an den Knoten ihrer Aeste, und entspringen aus einer rothgeflekten Scheide, welche da steht, wo der Zweig entspringt; alle theilen sich in Blättchen, welche auf kleinen Stielchen an dem gemeinschaftlichen Blattstiele schief gegen einander über sizen, so daß sie, wie näher sie der Spize des Blattstiels sind, desto kürzer werden; diese sind wieder in kleinere gespalten, welche in der gleichen Ordnung, aber ohne eigene Stiele sizen, und an ihrem Rande Zähne haben. Seine grose Blumendolde hat eine Hülle von drei, vier, bis acht kleinen, ziemlich schmalen, und umgebogenen Blättchen, welche, wenn die Samen zeitig zu werden anfangen, abfallen. Sie theilt sich in neun, vierzehn, oder mehrere kleinere Blumendolden, von welchen die äusern meistens auf längern Stielen stehen. Diese kleinern Dolden haben gemeiniglich nur auf einer Seite des Stengels eine Hülle von drei, oder nur einem Blättchen, das in drei Abschnitte gespalten ist. Ihre Blümchen sind insgesammt fruchtbar, und

haben

www.dlibra.wum.edu.pl

haben alle eine weisse Krone; die Blättchen derselbigen sind bei den äusern Blümchen in ihrer Gröse und Gestalt sehr von einander verschieden; alle haben ihrer ganzen Länge nach in der Mitte einen erhabenen Strich, und sind an ihrer Spize ganz seicht eingeschnitten, und einwärts gebogen. Jede Blume hinterläßt zween Samen; diese sind nakend, gedüpfelt, auf der einen Seite glatt, und auf der andern gewölbt; und stosen so zusammen, daß sie mit einander eine Kugel vorstellen; sie haben auf ihrer Oberfläche fünf Streifen, die sich mit Querstrichen kreuzen, so daß es aussieht, als ob sie gekerbt wären; auch diese haben gemeiniglich einen heslichen Geruch. Ehrmann fand sie doch zuweilen wohlriechend, und Quer p) in Spanien eine Spielart, welche gar keinen Geruch hatte. Ohne Zweifel hat die Verschiedenheit des Bodens grosen Einflus auf die Eigenschaften dieses Gewächses; so wie sie überhaupt, und vornemlich die Cultur, ungezweifelt die heilsamen und schädlichen Kräfte der Pflanzen ändert, jene gemeiniglich schwächt, und diese mildert.

Da diese Pflanze noch häufiger als der Wüterich, mit andern theils ganz unschädlichen, theils schädlichern, Gewächsen verwechselt worden ist; so wird es allerdings der Mühe werth sein, die Merkmale anzugeben, wodurch sie sich von jenen unterscheidet.

Von der Spargelwurzel unterscheidet sich die Wurzel des Schierlings dadurch, daß sie mehr die Gestalt einer Spindel, und gemeiniglich, wenigstens im Frühlinge, einen weit merklichern Geruch hat. Wenn die Pflanzen einmahl Sprosen, und noch mehr, wenn sie Blätter, Stengel, Blumen

p) Flor. Espan. Pl. 41.

und Früchte getrieben haben, so wird sie auch der Unwissendste nicht mehr verwechseln.

Von dem Samen des Johanniskrauts (Hyperic. perforat. Linn.) zeichnet sich der Samen des Schierlings dadurch aus, daß er gemeiniglich, wenn er nicht zu alt ist, so bald er zwischen den Fingern gerieben wird, einen häslichen Geruch von sich gibt, daß er weit gröser, auf seiner Oberfläche gestreift, und an seinem Rande gekerbt, besonders aber dadurch, daß die eine Seite gewölbt, und die andere platt ist, und gleichsam eine halbe Kugel vorstellt.

Von dem Samen des Harmelkrautes (Peganum Harmala Linn.) unterscheidet sich der Samen des Schierlings dadurch, daß er sehr viel gröser, und daß er nicht länglicht und zugespizt, sondern ganz rund und stumpf ist.

Von dem Fenchel unterscheidet sich der Schierling dadurch, daß er einen widrigen, oder doch wenigstens nie den eigenen gewürzhaften Geruch des Fenchels hat, daß die Blätter lange nicht so fein zertheilt, daß die Blumenkrone weis, und die Früchte nicht rund wie ein Ei, sondern vielmehr wie eine halbe Kugel gestaltet sind.

Von der Petersilie, mit welcher der Schierling so häufig verwechselt worden ist, wenn anders die Fälle, die davon erzählt worden, nicht vielmehr auf die Gleisse passen, ist der Schierling dadurch leicht zu unterscheiden, daß er nie den feinen, angenehmen und eigenen Geruch und Geschmak hat, den wir in allen Theilen der Petersilie bemerken, daß seine Blätter viel feiner zertheilt sind, und eine dunklere Farbe haben, daß seine Blumendolden gröser sind, und aus mehreren Blümchen bestehen, daß sie beständig eine Hülle haben,

www.dlibra.wum.edu.pl

daß die Blättchen ihrer Blumenkrone bei den äusern Blümchen von ungleicher Gröse sind, und daß ihre Samen mehr die Rundung einer halben Kugel, als die Rundung eines Eies haben.

Von dem Pastinak unterscheidet sich der Schierling, daß sein Geruch weit unangenehmer ist, daß seine Wurzel weicher, saftiger, diker, und nicht so sehr in Aeste zertheilt ist, als bei dem wildwachsenden Pastinak, daß sie, vornemlich im Frühling, schärfer ist, als die Wurzel des Gartenpastinaks, und nicht die milde Süsigkeit hat, daß seine Blätter viel feiner zertheilt, und weit dunkler gefärbt, daß seine Blumendolde mit Hüllen versehen, daß seine Blumenkrone weis, und seine Samen wie eine halbe Kugel, und nicht oval und platt gedrükt sind.

Von dem Gartenkörbel zeichnet er sich dadurch aus, daß er weder den feinen, angenehmen, durchdringenden, und eigenen Geruch, noch den feinen Bau hat, den wir in allen Theilen dieser heilsamen Pflanze bemerken, daß seine Wurzel viel gröser, seine Stengel geflekt, seine Blumendolden gröser und Blumenreicher, und seine Samen nicht länglicht sind.

Von dem Myrrhenkörbel zeichnet er sich dadurch aus, daß er in keinem seiner Theile den angenehmen Anisgeruch und Anisgeschmak hat, wodurch sich diese Pflanze so beliebt macht, daß seine Stengel geflekt, seine Blätter glatt und dunkelgrün, seine Blumendolden gröser, und seine Samen kleiner, und gar nicht länglicht sind.

Von dem berauschenden Kälberkropfe (Chaerophyllum temulentum), der wegen seiner geflekten Stengel häufig statt des Schierlings gebraucht worden ist, unterscheidet sich der Schierling durch seine ganz glatte Oberfläche, da bei der ge-

www.dlibra.wum.edu.pl

nannten Pflanze Stengel und Blätter haarig sind, durch die Hülle an der grosen Blumendolde, durch die gerade Stellung derselbigen, da sie bei der genannten Pflanze öfters überhängt, durch die Fruchtbarkeit aller seiner Blümchen, da unter den Blümchen von jenem Gewächse viele unfruchtbare sind, und vornemlich auch durch die Gestalt seiner Samen, welche bei dem berauschenden Kälberkropfe länglicht sind.

Von dem zotigen Kälberkropfe (Chaerophyllum hirsutum Linn.) weicht er dadurch ab, daß seine Wurzel bei weitem nicht so lang ist, daß die Oberfläche der übrigen Pflanze ganz glatt ist, da sie bei dem zotigen Kälberkropfe mit seinen Haaren bekleidet ist, daß sein Stengel viele Knoten hat, daß seine allgemeine Blumendolde weit gröser und mit einer Hülle versehen ist, daß seine Blümchen alle fruchtbar, und daß seine Samen wie eine halbe Kugel gestaltet, aber nicht cylindrisch und gefurcht sind.

Von dem Liebstökel aus Peloponnes läßt er sich dadurch unterscheiden, daß seine Wurzel weit kleiner und saftiger, daß sein Stengel ganz glatt, und geflekt, daß seine Blätter dunkelgrün, daß seine Blumendolden und Blümchen kleiner, daß seine Staubbeutel gelblicht sind, und daß seine Samen mehr die Rundung einer halben Kugel, als eines Eies haben, und mit keinem Kelche bekränzt sind.

Von dem Wasserpferdesamen zeichnet er sich dadurch aus, daß sein Stengel nicht so dik, und seine Blätter nicht so fein zertheilt sind, daß seine grosen Blumendolden eine Hülle, seine Blumen aber keinen grünen Kelch haben, endlich, daß seine Samen gestreift sind, und weder die Trümmern von Griffeln noch eine Spur von einem Kelche tragen

www.dlibra.wum.edu.pl

Von der röhrichten Rebendolde ist er dadurch unterschieden, daß seine Wurzel lange nicht so weit durch die Erde kriecht, daß sein Stengel geflekt, daß seine Blätter alle einander ähnlich, daß seine grose Blumendolde immer in mehr als drei kleinere getheilt, und beständig mit einer Hülle versehen ist, daß seine Blumen alle fruchtbar sind, und alle auf gleich langen Stielen stehen, und vornemlich, daß seine Samen keine fünfekige Pyramiden, sondern eine halbe Kugel vorstellen, und ohne alle Spur eines Kelches sind.

Von der safrangelben Rebendolde zeichnet er sich durch die gleichen Merkmale an den Blumen und Samen aus, ferner auch dadurch, daß sein Stengel grün und roth geflekt, aber nicht rothgelb ist, noch, wenn man darein schneidet, einen stinkenden, safrangelben Saft von sich fliesen läßt, daß seine Blätter dunkelgrün, und seine Staubbeutel nicht braun, sondern gelblicht sind.

Wie er sich von dem bolligen Kälberkropfe, von dem wilden Körbel, der Gleisse, und dem giftigen Wüterich unterscheide, habe ich bereits in der Geschichte dieser Gewächse gezeigt.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die ältern griechischen und lateinischen Aerzte unter ihrem κωνειον und Cicuta dieses Gewächs verstanden haben; allein das ist noch gewisser, daß sowol diese, als viele neuere Aerzte, die in der Kräuterkunde nicht zu Hause sind, mehrere andere Pflanzen damit verwechselt haben. Dadurch werden die Erfahrungen und Beobachtungen, die sie damit angestellt und uns aufgezeichnet haben, unzuverlässig; und sie können nur dann brauchbar seyn, wann uns in ihrer Nachricht die Uebereinstimmung des Bodens, auf welchem sie ihre Pflanze gefunden, der Art, wie sie hervorkommen, blühen, und Sa-

www.dlibra.wum.edu.pl

men tragen, der Zeit, zu welcher diese Veränderungen mit ihnen vorgehen, und vornemlich ihrer allgemeinen und besondern Wirkungen auf den thierischen Körper, unter verschiedenen Umständen, einen gültigen Schluß machen läßt, daß die beschriebene Pflanze der Schierling ist.

Von dieser berüchtigten Pflanze erregen also die Wurzel q), die jedoch nicht zu allen Jahrszeiten und in allen Ländern eine beträchtliche Schärfe hat r), das Kraut s) und

---

q) Statt der Pastinakwurzel, Matthiol Comment. L. VI. S. 1415. Limprecht Act. Acad. C. Nat. Cur. Vol. I. obs. 52. S. 97. u. f. Graf ebend. obs. 200. S. 438. Hee ebend. Vol. X. obs. 87. S. 327. Abhandlung der Römischkaiserl. Akad. der Naturf. 3 Th. obs. 345. S. 484. und, wenn es nicht vielmehr die Wurzel des wilden Körbels war, Toppetti Relazioni d'alcune viagge &c. II. 1754. S. 398. statt der Spargelwurzeln, Bussius und Schurigius bei Cramer'n Commerc. litt. Noric. 1733. S. 251. statt der Fenchelwurzel, Behrens ebend. 1734. S. 20. statt der Petersilienwurzel, Kircher scrutin. physico-medic. de Peste S. 2. c. 2. S. 203. und H. Timäus a Güldenklee Cas. medicinal. &c. L. 7. Cas. 4

r) So fand sie Hirschel, Betrachtungen über den jetzigen innerlichen Gebrauch des Mercur. sublim. corros. und des Schierlings, Berl. 1765. Hr. v. Haller saftlos, Hist. stirp. Helvet. indig. I. S. 337. Ehrhard Diss. de Cicuta, Argentin. 1763. S. 20. nur wenig scharf, Hr. v. Störk aber Libell. quo demonstratur, cicutam non solum usu interno tutissime exhiberi, sed et esse simul remedium valde utile in multis morbis qui hucusque curatu impossibiles dicebantur. Vindob. 1760. äusserst scharf, auch Curtis Flor. londinens. 1777. in England nicht immer schädlich.

s) S. Paulli Quadrip. Botanic. unter dem Titel: Cicuta major. Ehrhard a. a. O. S. 29. 30. Reismann Diss. de Ci-

www.dlibra.wum.edu.pl

die Samen t), vornemlich so lange sie frisch sind, sie mögen nun unter der Gestalt eines Salats u), oder eines Zugemüses x), oder einer Arznei y), oder unter einer andern z)

---

cuta, et an sit remedium cancri, Duisb. 1763. S. 34. Noch bin ich nicht gewiß, ob die Erfahrungen, deren Matthiol a. e. a. O. S. 1416. gedenkt, und die Köfferlin, und Drelincourt bei Wepfer Hist. Cic. aquat. S. 71. 312. erzählten, hieher, oder vielmehr zu der Gleisse gehören.

t) Statt der Samen des Harmelkrautes G. Rondelet de Ponderibus Patav. 1555. S. 82. B. Maranta Method. cognosc. simplic. L. III. Venet. 1539. S. 57. statt der Samen des Johanniskrautes Brassavola Examen medicament. simplic. Venet. 1545. S. 222.

u) Ehrhard a. a. O. S. 29.

x) Ebenders. a. a. O. S. 30. Köfferlin, Limprecht, Graf, Matthiol, Kircher, Güldenklee a. d. a. O. geröstet Hee a. a. O.

y) 1) Reismann a. a. O. 2) Andry Quaestio medica, an cancer ulceratus cicutam eludat? Paris 1763. 3) Lang Dubia cicutae vexata. Helmstad. 1764. 4) Whytt Nervous disorders S. 22. 5) Hr. v. Haller Götting. Anzeig. von gelehrten Sachen. 62 St. 1775.

z) So wie die Griechen, vornemlich zu Athen (Dresig und Steger Diss. de Cicuta Athenienſibus poena publica. Lipſ. 1734), andere zu Chio und Marseille den Missethätern ein tödliches Getränk gaben, zu welchem der Schierlingssaft kam; (So mußte nach Xenophon ἑλληνικων ἱστοριων βιβλ. β. κεφ. V. καὶ Opp. omn. Ed. Oxford. 8. B. III. S. 403. Sokrates und Theramenes κωνειον trinken), oder wie sich Thrasias rühmte, er habe ein Mittel, das ohne Schmerzen umbringe, und das, nach Einiger Muthmasung, aus Schierlings- und Mohnsaft bestand. Theophrast. Hist. L. IX. c. 17.

www.dlibra.wum.edu.pl

innerlich a) gebraucht werden, bald schneller, bald langsamer, die grausamsten Zufälle a*), Steifigkeit b), Geschwulst c), Zittern d) und Schmerzen e) auf der Zunge, einen überaehenden Verfall der Sprache f), Entzündungen g), Schmerzen h) und gewaltige Ausspannung i) oder auch eine völlige Unthätigkeit k) des Magens und der Gedärme, Ekel und Mangel der Esluſt l), heftiges Erbrechen m), Schluchzen n),

---

a) So schadet die Pflanze gemeiniglich; aber auch äuſerlich iſt ſie nicht ganz unſchuldig. Börhaave de morb nerv. S. 236. fühlte blos von dem Geruche der Pflanze, die er zwiſchen den Fingern zerrieb, Schwindel; und Andry a. a. O. ſahe, blos auf den äuſerlichen Gebrauch Wahnwiz, Schwindel Zukungen, Lähmung erfolgen, und die monatliche Reinigung ausbleiben.

a*) H. G. Schlegel Materialien für Staatsarzneiwiſſenſchaft, und praktiſche Heilkunde, Jena. 8. zweite Sammlung 1801. n. VI. 3.

b) Störk a. e. a. O.

c) Ebenderſ. a. e. a. O.

d) Daß er nicht ordentlich ſprechen konnte, ſondern ſtammlen muſte, ebenderſ. a. e. a. O.

e) Ebenderſ. und S. Paulli a. d. a. O.

f) Hr. v. Störk und Ehrhard a. d. a. O.

g) Köfferlin und Sallin a. d. a. O.

h) Limprecht und Hee a. a. O.

i) Köfferlin a. a. O.

k) Daß man zwanzig Grane Brechweinſtein nöthig hatte, um ein Erbrechen hervorzubringen. Marquart obſ. 25.

l) Lange a. a. O. S. 11. Andry und Graf a. d. a. O.

m) Harder Apiarium obſervat. Baſil. 1685. obſ. 25. Ehrhard a. a. O. S. 30. in einem Falle Graf a. a. O.

n) Abhandl. der kaiſerl. Akademie der Naturforſcher und Güldenklee a. d. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Bauchflüsse o), unausstehlichen Durst, Brennen in dem Schlunde, Hindernisse im Hinunterschlingen der Speisen p), ein ungeheures Aufschwellen des Unterleibes q), verschiedene Fehler in dem Umlaufe des Blutes, einen schnellen r), langsamen, seltenen und schwachen Aderschlag s), ein gänzliches Ausbleiben desselbigen t), Ausbleiben der monatlichen Reinigung u), unerträgliche Bangigkeiten und Beängstigungen x), Schwachheit y), Trägheit z), Zittern a), Auszehrung b) des ganzen Leibes, Harnwinde c), Blutharnen d), eine blasse oder schwarzblaue Farbe über den ganzen Leib e), und vornemlich über das Gesicht f), Schwere g), Lähmung h) oder

---

o) Ehrhard a. a. O. S. 29.

p) Ehrhard a. a. O. S. 29. §. 9. auch Hee a. a. O. sah Schwierigkeiten in dem Hinunterschlingen flüssiger Speisen.

q) Ehrhard a. a. O. S. 30. Köfferlin a. a. O.

r) Ehrhard a. a. O. S. 30.

s) S. Paulli a. a. O.

t) S. Paulli a. a. O.

u) Andry a. a. O.

x) Limprecht, Graf, Hee, Güldenklee a. d. a. O.

y) Whytt, Güldenklee, Hee in einem Falle, Limprecht in zween, Graf a. d. a. O.

z) S. Paulli und Graf a. d. a. O.

a) Kircher, Andry, Ehrhard a. d. a. O.

b) Reismann a. a. O. S. 34.

c) Ehrhard an seinem Bruder a. a. O. S. 30.

d) Hr. v. Haller Götting. Anz. 62 St. 1775.

e) Ehrhard a. a. O.

f) S. Paulli, Limprecht, Hee a. d. a. O.

g) An dem berühmten Beispiele von Sokrates.

h) Andry a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

beſtändiges Zittern i) in den Gliedern, Stumpfheit aller äuſerlichen Sinne k), Unempfindlichkeit gegen alle äuſerliche Gegenſtände l), Blindheit m), Schmerzen durch den ganzen Leib n), Berauſchung o), Schwindel p), Schlummer q), mancherlei Arten des Wahnſinns r), ganz ſtille Toll-

---

i) Kircher und Andry a. d. a. O.

k) S. Paulli und Graf a. d. a. O.

l) Harder a. a. O.

m) Martine Phil. Transact. nr. 273. Güldenklee und Graf a. d. a. O.

n) Kircher a. a. O.

o) Abhandlung der kaiſerl. Akad. der Naturf. und Matthiol a. d. a. O.

p) Abhandlung der kaiſerl. Akad. der Naturf. Börhaave, Whytt, Andry, Reismann, Graf a. d. a. O. Floyer Pharmacobaſ. Lond. 1691. S. 113.

q) Harder, Paulli, Limprecht, Floyer a. d. a. O. Watſon Philoſ. Transact. nr. 473. Helwig obſervat. phyſico-med. poſthum. Aug. Vindel. 1680. 4. auch Weinmann ſah ihn auf den innerlichen Gebrauch des Decokts bei einem Krebſe an der Bruſt erfolgen; einen Schlummer, der einem Schlagfluſſe gleich ſahe, bemerkte Graf a. a. O.

r) Helwig a. a. O ſolche, die plözlich kommen, und bald vorüber gehen. Buſſius, Schurigius und Behrens a. d. a. O. einen leichten, Andry a. a. O. gefährlichere, Andry und Hee a. d. a. O. Wolf obſervat. chirurg.-medic. Quedlinb. 1704. Hagedorn Obſervat. et Hiſt. medic. practic. Cent. III. Lipſ. 1698. S. 79. 80. Fritſch ſeltſame jedoch wahrhafte juriſtiſche, medicinische, und phyſicaliſche Geſchichte. Leipz. 1730. B. II. nr. 8. Büchner Miſcell. Vratislau. 1727. S. 58.

www.dlibra.wum.edu.pl

heit s), oder Wuth t), Schlaflosigkeit u), unmäßigen Trieb zum Beischlaf x), Zukungen an dem ganzen Leibe oder an einzelnen Theilen y), Kinnbakenzwang z), eine Auflösung der Säfte, welche zunächst an Fäulung gränzt a), kalte Schweiß-

---

P. Boccone Muſeo di Fiſica di eſperienze. Ven. 1697. S. 148.

s) Hee, Kircher, in mehrern Beiſpielen Limprecht, an einem Weingärtner, und an einem Mönche, Matthiol a. d. a. O. eine ſolche, die das ganze Leben hindurch dauerte. J. C. Ammann in not. ad Cael. Aurelian. de morb. acut. et chron. Amſtel. 1722. B. I.

t) Matthiol und Kircher a. d. a. O.

u) Reismann a. a. O. S. 34.

x) Bei einem Mädchen Limprecht a. a. O.

y) Watſon, Martin a. d. a. O. in mehreren Fällen, Limprecht a. a. O. dahin rechne ich auch die Zukungen und Krämpfe in der Kehle, das Aufſpringen der Sehnen an der Handwurzel, welche Ehrhard a. a. O. S. 29. 30. aufgezeichnet hat.

z) Auch dieſen führt Ehrhard unter den Wirkungen an, a. a. O. S. 30.

a) Reismann a. a. O. S. 35. Daher kamen die Petechen S. Paulli a. a. O. Daher zeigen ſich gleich nach dem Tode ſolcher Unglüklichen ſo viele Braundfleken; daher laufen die Leichen ſo entſezlich auf; daher ſtröhmt, oft noch bei lebendigem Leibe, das Blut mit ſolcher Gewalt aus der Naſe; Zufälle, welche Ehrhart a. a. O. S. 29. aufgezeichnet hat; daher kommt die ſchwarzblaue Farbe, entweder noch bei lebendigem Leibe, oder gleich nach dem Tode.

www.dlibra.wum.edu.pl

se [b]), und häufig den Tod [c]), der oft schnell und unversehens erfolgt [d]).

Geschichte [e]).

Ein Weingärtner auf dem Lande in Italien kam von ungefähr, da er in dem Weinberge arbeitete, mit der Hake auf die Wurzel des Schierlings; er grub sie heraus, nahm sie mit sich nach Hause, kochte sie statt Pastinakwurzeln, und speiste sie Abends mit seiner Frau. So gleich nach dem Essen giengen sie beide zu Bette; mitten in der Nacht aber

---

b) Hee a. a. O.

c) Der schon längst in Marseille, Chio, und Griechenland, vornemlich zu Athen, eine sehr bekannte Wirkung dieses Gewächses war, wie die berühmten Beispiele eines Phocion, Plutarch Τα Σωζομενα παντα cum interpr. Hermanni Cruser. Francof. 1620. T. I. παραλληλ. S. 758. und Sokrates zeigen. S. davon P. Petit Observat. miscell. L. I. C. 17 S. 46. J. C. Scaliger Exoteric. exercit. de subtilitate. S. 152. Mehrere Beispiele S. bei Fritsch, Wolf, Brassavola, Kircher a. d. a. O. Sammlung zur Geschichte von Obersachsen III. S. 221. Heins Pharmac. ration. S. 376.

d) Köfferlin a. a. O. Bei einer ganzen Familie. Toppetti a. a. O. in einer Viertelstunde, Drelincourt a. a. O. in Zeit von einem Tage. S. Paulli a. a. O. Sollte vielleicht bieher der Tod einer Büchsenmachers Frau gehören, die Lerchen, welche dieses oder ein anderes verwandtes Gewächs gefressen und noch im Kropfe hatten, und auch andere, welche davon zu sich nahmen, todkrank machten, genossen hatte? Reichspostreuter 1778. 17. Jenn.

e) Matthiol a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

erwachten sie, hatten allen Verstand verloren, liefen im Hause hin und her, und waren ganz toll und rasend: sie stiesen dabei den Kopf, vornehmlich das Gesicht, und die Augen so sehr an die Wände, daß sie von der Geschwulst und dem unterlaufenen Geblüte abscheulich aussahen. Der Arzt, der gerufen wurde, kam sogleich auf den Grund des Uebels; er gieng in den benachbarten Weinberg, und fand an dem Orte, den man ihm angezeigt hatte, in der That die Wurzeln des Schierlings, welche schon anfiengen Blätter zu treiben. Er ging zu seinen Kranken zurük, und hatte das Glük, sie in kurzer Zeit wieder herzustellen.

Indessen zieht dieses Gewächs, nach mehrern Erfahrungen, doch nicht immer jene unglüklichen Folgen nach sich, die ich so eben erzählt habe. Henley f) verschlang acht Loth von der Wurzel; ein anderer g) acht Tage hintereinander alle Morgen sechs Loth von dem Safte, der aus dem Kraute gedrükt war; Petiver h) ein Loth von der Wurzel ohne Schaden; P. Reneaulme i) gab sie ungescheut bis zu zwei Quentchen; Sextus Empirikus sah eine Frau von dem Saft, zu einem Quentchen ohne Nachtheil nehmen k), und auch Ehrhart l) fühlte weder von der Wurzel, noch

---

f) Rai Hist. plantar. univ. B. III. S. 257.

g) Ephem. Acad. Caes. Natur. Curios. Dec. I. A. IV et V. S. 156.

h) Rai a. e. a. O.

i) Ex curation. observat. Par. 1606. obs. 3. 4.

k) Hypothes. Lib. I.

l) a. a. O. S. 20. 21. Hr. Hofr. Richter sahe den im Sommer frisch ausgedrükten Saft dieser Pflanze zu ganzen Löffeln voll ohne Schaden nehmen.

www.dlibra.wum.edu.pl

von ihrem Safte, den er kostete, einigen Nachtheil. Fallopius sah einige Knaben Wurzel und Blätter ohne Schaden speisen m). Selbst Matthiol sagt n), das Kraut sei in Italien nicht so gefährlich; Miller o) behauptet, die junge Pflanze werde ohne Schaden in England gespeist. Ehrhard nahm auch den Extrakt, der mit Weingeist aus dem Kraute gebraucht war, ohne Schaden, und verschlang die Samen bis zu einem halben Loth p).

Vielleicht beruht die Verschiedenheit dieser Erfahrungen auf dem verschiedenen Boden, in welchem, und auf dem verschiedenen Himmelsstriche q), unter welchem diese Pflanze wächst. Ungezweifelt wirkt sie nicht zu jeder Zeit ihres Lebens und in jedem ihrer Theile gleich stark; durch Troknen, Kochen oder langes Aufbewahren verliert sie etwas von ihren flüchtigen Theilen, und mit diesen einen grosen Theil ihres Giftes. Gewisse Menschen sind auch von der Natur, durch ihre Lebensart, oder durch Arzneimittel und Krankheiten, mehr gegen die Wirkungen dieser Gifte versichert. Und niemals fällt der Verdacht ganz, daß man nicht eine andere

---

m) De Ulceribus S. 45.

n) a. a. O.

o) Gärtnerlexicon I. S. 798.

p) a. a. O. S. 15. 22.

q) Doch äusert der Schierling seine unseligen Wirkungen in dem wärmern Griechenland und Italien, Matthiol und Köfferlin a. d. a. O. eben sowohl, als in dem kältern Teutschland, Güldenklee, Bussius a. d. a. O. und, in den Niederlanden, Drelincourt a. a. O. und in dem noch mitternächtlichern Dännemark. C. Paulli a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

minder schädliche Pflanze mit dem Schierling verwechselt habe.

Der Schierling ist aber auch einigen Thieren tödlich. Ein brasilianisches Kaninchen, das den Schierling für sich nicht frißt, starb bald darauf, nachdem man ihm den Saft mit Gewalt eingegossen hatte, unter einem Schwindel. Ein Hund, dem man drei Loth von dem ausgedrükten Safte eingegeben, und ein anderer, dem man sechs Loth in die Adern gesprüzt hatte, starben in kurzer Zeit davon: aber viele andere konnten vier, sechs Loth von dem ganz frischen Safte, da er gerade in der Gährung begriffen war, und auch die frische geskosene Wurzel in unbestimmter Menge zu sich nehmen. Gänsen ist er tödlich; indessen fressen viele andere Vögel den Samen gerne und ohne Nachtheil. Schweine bringt er oft in eine Wuth, die sich nur mit dem Tode endigt. Pferde bekommen davon Schwindel; aber Maulthiere können ihn bis zu sechs Lothen ertragen, ohne eine andere Wirkung, als daß er auf Schweis und Stuhlgang treibt. Das Hornvieh läßt ihn unberührt stehen, oder frißt ihn zu seinem Schaden r). Ziegen, und nach einigen Nachrichten, auch Schafe fressen ihn ohne Schaden. Füchsen und Wölfen erregt er einige schlimme Zufälle, die aber bald wieder vorüber gehen.

Eben diese Pflanze war schon bei den ältesten Aerzten als ein äuserliches, und nach sehr wahrscheinlichen Vermuthungen, auch als ein innerliches Mittel in Geschwulsten und Verhärtungen der Drüsen, Eingeweide und andern Theilen im Gebrauche. Aber lange nach ihnen wagte es kein Arzt,

r) Hacquet a. e. a. O. S. 55.

www.dlibra.wum.edu.pl

sie innerlich zu geben. Reneaulme war in neuern Zeiten der erste, der die getrokneté Wurzel von ℈ij —ℨij innerlich in Verhärtungen der Eingeweide verordnete. Nach ihm fand der kaiserliche Leibarzt, Hr. von Störk s) in eben diesem Gewächse, und vornehmlich in dem aus dem Kraute gedrükten und eingekochten, Hufeland s*) mehr in dem frischen Safte oder in dem getrokneten und zart abgeriebenen Kraute, vornemlich wenn es an tiefliegenden, sumpfigen Stellen gewachsen war, ein treffliches schmerzstillendes Mittel, das in der Hand eines klugen Arztes in Geschwulsten und Verhärtungen von Eingeweiden und Drüsen, mit welchen kein Fieber verknüpft ist, und ihren Folgen, selbst in dem Krebse und andern bösartigen Geschwüren, beinahe von allen Arten, in Krankheiten der Haut, in Verstopfungen der kleinsten Gefässe, und den sämtlichen Krankheiten, welche davon ihren Ursprung haben; auch in Schmerzen von mancherlei Art und in mancherlei Theilen von den glüklichsten Wirkungen ist. Störk's Erfahrungen wurden bald durch die Erfahrungen anderer, unter den Teutschen eines Collin t), eines von Qua-

---

s) Libello de Cicuta &c. Libell. secund. quo confirmatur, cicutam non solum &c. Vindob. MDCCLXI. Supplementum necessarium de cicuta. Vind. MDCCLXI. Libell. quo continuantur experimenta & observat. circa nova sua medicamenta. Vindob. MDCCLXV.

s*) Iournal der praktischen Arzeneykunde und Wundarzeneykunst B. IX. St. 3. S. 85. 86.

t) Nosocomii Pazmanniani annus medic. tert. Vindob. 1764. S. 104. u. f. und bei Störk libell. alt. de Cicuta. S. 235. u. f.

www.dlibra.wum.edu.pl

Quarin u), Molinari x), Lochner y), Leber z), Lebmacher a), Manderlier b), Cambon c), Koller d), Kaisin e), Gleißner f), Hasenöhrl g), Auenbrugger h), Gasser i), Crampagna k), Kaiml), Hezel m), Baader n), OHehir o), ab Armis p), Strack q), Jos. und Pet. Polzer r), Thadd. Baier s),

---

u) Tentam. de Cicuta. Vindob. 1761. und Störk libell. alt. de Cic. S. 230. u. f.

x) Epistol. ad Ant. Störk qua mulieris a scirrho curatae histor exponitur. Vind. 1761.

y) Observat. practic. Vienn. 1762.

z) Abhandlung von der Nuzbarkeit des Schierlings in der Wundarzneykunst. Wien 1762.

a) Bei Störk in Supplem. necessar. S. 41.

b) Bei Störk Libell. quo confirmatur, Cicutam &c. S. 205. u. f.

c) Ebendas. S. 208. u. f.

d) Ebendas. S. 221. u. f.

e) Ebendas. S. 211. u. f.

f) Ebendas. S. 218. u. f.

g) Ebendas. S. 229. u. f.

h) Ebendas. S. 232. u. f.

i) Ebendas. S. 243. u. f.

k) Ebendas. S. 243. u. f. und S. 200. u. f.

l) Ebendas. S. 228.

m) Bei Störk in Lib. quo continuantur &c. S. 166.

n) Bei Störk Lib. quo confirm. &c. S. 191.

o) Ebendas. S. 262. u. f.

p) Ebendas. S. 191.

q) Bei Störk Lib. quo contin, S. 173. u. f.

r) Ebendas. S. 191. 199.

s) Ebendas. S. 207.

www.dlibra.wum.edu.pl

Haan t), Hart u), Markmüller x), Kollmann y), Joſ. Müller z), Hartmann a), Hudemann b), Ludwig c), Engelberg d), Lauth e), Feuermann f), Ehrmann g), Ottmann h), Spielmann i), Ziegenhagen k), Ehrhart l), Sulzer m), Conſbruch n), Oſterdinger o), Murray p) u. a. q), und ſelbſt in

---

t) Bei Störk Lib. quo contin. S. 209.

u) Ebendaſ. S. 209.

x) Ebendaſ. S. 211.

y) Bei Störk Lib. quo confirm. &c. S. 198.

z) Bei Störk Lib. quo contin. &c. S. 268.

a) Aletophilor. elucid. neceſſar. epiſt. de Cicut. quam Celebr. Haenius ſcripſit ad Tralles. Vindob. 1766. S. 97.

b) Diſſ. de Cicut. Helmſtad. 1764.

c) Commentar. de reb. in medic. et ſcient. natur. geſtis, Vol. XVII. p. II. Lipſ. S. 302.

d) Bei Störk in Lib. quo confirm. &c. S. 258.

e) Bei Ehrhart a. a. O. S. 64. u. f.

f) Unterſuchungen S. 240. 241.

g) Bei Ehrhart a. a. O. S. 59. u. f.

h) Ebendaſ. S. 62. u. f.

i) Inſtit. mater. medic. Argent. 1774. S. 511.

k) Bei Ehrhart a. a. O. S. 67. u. f.

l) Diſſ. de Cicuta, S. 68. u. f.

m) Nov. Act. Caeſ. Acad. Nat. Cur. B. III.

n) Ebendaſ. B. IV.

o) Ebendaſ B. V.

p) In den Anmerkungen zur dritten Ausgabe von Roſenſtein's Anweiſung in Kinderkrankheiten 1774. S. 719.

q) In den Störkiſchen Schriften, welche dieſen Gegenſtand betreffen, und Alethophili Viennenſes a. a. O. Laurenti de reptilibus Auſtriae &c. Vienn. 1768. Fränk. Sammlungen ꝛc. B. VI. Geſſner in Schwaben an die Arzneyge-

www.dlibra.wum.edu.pl

mehreren Fällen von Hufeland q*), in einigen nach dem Geſtändnis eines von Haen r) und Lange s); unter den Schweizer durch die Bemerkungen eines Schinz t), Tiſſot u), Hirzel x), J. H. und K. Rahn y), Arpli z), Burkhart a), H. H. Ziegler b), Friedrich c) und Nacher d); unter den Italiänern: durch die Verſuche eines Ripamonti e), eines Virenti f), eines Brambilla g), eines Krapf h); unter den Franzoſen: eines Lalle-

---

lahrheit, I. Th. und Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneygelahrheit und Naturkunde, III. B. Nördl. 1771. Böhmer und Junker in Andreu diff. de uſu ſalutari extract. aconit. in arthritide. Hal. 1768.

q*) a. e. a. O. S. 85—87.

r) Epiſt. ad Tralles. de Cicuta, S. 55.

s) In einem bösartigen Samenfluſſe, in der Harnwinde, in Verſtopfungen der monatlichen Reinigung. Miſcell. verit. de reb. medic. Faſc. I.

t) Abhandlung der naturforſch. Geſellſchaft in Zürich, II. B. 1764. S. 434. u. f.

u) Anl. für das Landvolk in Abſ. auf ſeine Geſundh. Zürich 1762. S. 362.

x) In der Ueberſetzung dieſer Anleitung S. 536. 537.

y) Abhandlung der naturforſch. Geſellſchaft in Zürich, II. Th. S. 420. u. f.

z) Ebendaſ. S. 429. u. f. 441.

a) Ebendaſ. S. 453. u. f.

b) Ebendaſ. S. 451. u. f.

c) Ebendaſ. S. 428.

d) Ebendaſ S. 504.

e) Saggio degli effetti della cicuta. Milano. 1766.

f) Comment. de Cicuta Neapol. Ed. III. 1770.

g) Bei Störk in Lib. quo continuant. S. 267. u. f.

h) Ebendaſ. S. 231. u. f.

www.dlibra.wum.edu.pl

rent i), Marteau k), Desmilleville l), Maupoint m), Aubrelique n), Landette o), Decotes p), Port q), Bieshaar r), Larroutture s), Mutteau de Roquemont t), du Puy de la Porcherie u), Lottinger x), Du Chemin y), Molzans de Cazelle z), Rochard a), Le Comte de Proval b), Villaine c), Le Cat d), Bridaut e), Guering f), Pavis g), und andere h), unter den Spaniern: eines Caſ. Com. Ortes

---

i) Vandermonde Iournal de medecine, de chirurg. et de pharmacie &c. B. XIII. S. 511.

k) Ebendaſ. B. XIV. S. 121.

l) Ebendaſ. B. XIV. S. 322.

m) Ebendaſ. B. XIV. S. 509.

n) Ebendaſ. B. XV. S. 129.

o) Ebendaſ. B. XV. S. 223.

p Ebendaſ. B. XVI. S. 35.

q) Roux Iournal de medecine &c. B. XVII. S. 346.

r) Ebendaſ. B. XVIII. Mon. May, nr. 8.

s) Ebendaſ. B. XX. S. 502.

t) Ebendaſ. B. XX. S. 554.

u) Ebendaſ. B. XXII. S. 219.

x) Ebendaſ. B. XXIV. S. 235 242.

y) Ebendaſ. B. XXIV. S. 366—368.

z) Ebendaſ. B. XXVIII. Supplem.

a) Ebendaſ. B. XXXVII. Mon. Jenn.

b) Ebendaſ. B XXXVIII. Mon. Aug.

c) Ebendaſ. B. XXXVIII. Mon. Sept.

d) Bei Hauteſierk in Recueil d'Obſervations de Medecine des hopitaux militaires. Paris 1768. B. I. S. 388. u. f.

e) Ebendaſ. B. II. 1772.

f) Bei Ehrhart a. a. O. 55. u. f.

g) Ebendaſ. S. 60. u. f.

h) Spielmann und Ehrhart a. d. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

ga i), und Nolano k); unter den Britten: eines Fothergill l), Colebrooke m), Morris n), Macbride o), Butler p), Letſom q) u. a. r); unter den Niederländern: eines Joh. van der Belen s); eines Mart. van der Belen t), eines Heers u), und Cloſſius x); unter den Schweden: eines Roſenſtein y); unter den Polen: eines Rumpelt z) beſtätigt.

---

i) Commentar. de Cicuta. Madrit. 1763.

k) Commentar. de Cicuta. Neapoli 1767.

l) Medical obſervations and Inquiries. B. III. 1767.

m) Philoſ. Transact. B. LIII. Lond. 1764. nr. 48. S. 346.

n) Ebendaſ. B. LIV. nr. 32. S. 172. u. f.

o) Methodic. Introduct. into the Theory and Practice of Phyſik 1772.

p) In dem Krampfhuſten. Treatiſe on the Chincough wirh an Appendix containing an Account of Hemlock and its preparations. Edinb. 1773.

q) Medical Memoirs of the general Diſpenſary for part of the Years 1773. and 1774. Lond. 1774.

r) 1) Cullen Lectures on materia mediea. Lond. 1772. 2) Rutty obſervat. by a Society of Phyſicians in London. B. III. 1769. 3) Nicolſon ebendaſ. B. IV. 4) Farr ebendaſ. B. IV. 5) Warner an Account of the Teſticles, their common Coverings and Coats, and the Diſeaſes, to which they are liable. Lond. 1774.

s) Bei Störk Lib. quo confirmatur &c. S. 216. u. f.

t) Ebendaſ. S. 193. u. f.

u) Obſervat. medic. Lugd. 1685.

x) Nova variolis medendi method. Traject. ad Rhen. 1766. 8.

y) Anweiſung in Kinderkrankheiten, III. Ausg. S. 719.

z) Beobachtungen über den Gebrauch des Schierlings. Dresd. 1762.

www.dlibra.wum.edu.pl

Allein was das Schikſal ſo vieler Gegenſtände der Arzneikunſt iſt, das war auch das Schikſal des Schierlings. So wie viele der angeführten Schriftſteller ſeine Heilskräfte himmelhoch erhoben, ſeine Wirkſamkeit beinahe auf alle Krankheiten ausdehnten, und, um dieſe gegen ihre Gegner zu behaupten, ihre Beobachtungen vielleicht nicht immer mit der gebührenden Aufrichtigkeit beſchrieben, die Krankheiten oft gefährlicher machten, als ſie wirklich waren, und nicht ſelten dem Schierling beimaſen, was vielleicht die Natur, oder andere zu gleicher Zeit gebrauchte Arzneimittel gethan hatten; ſo zweifelten andere an ſeinen Heilskräften a), oder hielten ihn wenigſtens in andern Fällen, in welchen er empfohlen wurde, für unzulänglich b); andere hielten ihn für ganz kraft-

---

a) 1) Reismann a. a. O. 2) Leidenfroſt ebendaſ. S. 26. u. f. 3) Lange Diſſ. Dubia cicutae vexata? Helmſtad. 1764. 4) Frey Adverſar. de apoſtematib. Lipſ. 1776. 5) M. W. Schwenke Beſchryving der Gewaſſen, welke meeſt im Gebruyk zyn. Haag 1766.

b) Unter den angeführten Aerzten fanden ſich Ludwig, Ehrhart, Ehrmann, Ziegenhagen, Tiſſot, Rahn, Burckhart und Rutty a. d. a. O. Collebroke Philoſoph. Transact. Vol. LIV. nr. 29. ſelbſt Störk Lib. quo contin. &c. S. 79. 206. ferner Plenci Opp. Phyſico-medic. T. I. Sect. II. S. 266.. Hazon in Roux Iournal de Medecine &c. B. XVII. S. 533. u. f. Agaſſon ebendaſ. B. XVIII. S. 127. Hayes ebend. B. XVIII. S. 14. Quer Flor. Eſpannol. IV. S. 293. der Verfaſſer von New Diſpenſatory, II. Ed. Lond. 1765. S. 401. und Bierchen Inträden tal om Kräftſkadar, ſcrophuloſe och veneriske ſär och ſvullnaders igenkännende hallit för Coll. Med. Stokh. 1771. in ihren Erwartungen zuweilen betrogen.

www.dlibra.wum.edu.pl

les c) und andere verdammten seinen Gebrauch, als höchst gefährlich d).

---

c) Die meisten nach dem Erfolg ihrer Wahrnehmungen: Kaltschmidt Diss. de Cicuta. Ien. 1768. Lentin und Hirschel a. d. a. O. Henkel, Anhang von äusserlichen Arzneymitteln, S. 107. Buchholz Sammlung auserlesener Briefe, 2ter Th. Nürnb. 1773. Tralles de insit. variol, S. 234. 235. Schmucker chirurgische Wahrnehmungen 2 Th. Sebastiani Diss. de Scirrhis, Cancrisque mammarum, Erf. 1776. Rossi Observat. et experim. de nonnullis plantis, quae pro venenatis habentur, Pisis 1762. S. 15. Orteschi Diario B. I. Veneb. 1763. Raulin Fleurs blanches II. S. 595. Gamet Theorie de maladies cancreuses. B. II. Par. 1776. Andry Quaest. an Cancer ulceratus cicutam eludat. Paris 1763. Der Verfasser des Nouveau Dictionaire de Medec. et de Chirurg. Par. B. II. Der Arzt, der die Ausgabe des Avis au peuple sur &c. par Tissot. Lyon besorgt hat. S. 455. Gibson Medic. Observ. and Inquiries, Vol. IV. 1771. art. 14. Gataker in der Einleitung zu Essay on medical subjects. Lond. 1764. Akenside Medic. Transact. Lond. Vol. I. 1768. nr. 6. Brookes New and accurate system of natural History B. VI. Lond. 1763. Haar Verhandeling oover de Natuur en Art van de Klierknoest en Kanker Gezwellen. Te Amsterd. 1761. Roupp Lib. de morbis navigantium. Lugd. B. 1764. S. 327. u. f. Bikker in der Uebersetzung der Tissotischen Schrift mit der Aufschrift: Raadgeeving voor de Gezondheit van den gemeenen Mann van Landlieten &c. int' fransch geschreven door den H. Tissot. Naar den tweden Druck vertaald, met Anleekeningen, en Involgselen vemeerdert, en verder naar de Gesteldheit van ons Land geschikt, te Rotterdam 1764. S. 288. u. f. Agrell Täl om Nodwändigheten och förmanen of de chirurgiska Handalagens för-

www.dlibra.wum.edu.pl

Ungezweifelt rühren diese so sehr verschiedenen Versicherungen, wenn sie auch immer Wahrheit zum Grunde haben, wenigstens zum Theil, daher, daß man andere Pflanzen statt des Schierlings gebraucht, daß man das Kraut zu spät gesammelt, zu lange aufbewahrt und getroknet, den Saft zu kurz, oder zu lange bei starker Hize gekocht, oder gar abgeschäumt, das Extrakt nicht mit der gehörigen Sorgfalt aufbewahrt, es nicht mit der rechten Behutsamkeit, nicht in den Fällen, wo es helfen konnte, und sehr oft viel zu spat gebraucht hat; daß man den Körper, den man vor sich hatte, nicht immer genug gekannt, und die Krankheiten selbst nicht genau von einander unterschieden hat. Höchst ungerecht ist übrigens die Forderung, an dem Schierling ein Mittel zu verlangen, das in der Hand eines Wagehalses oder Dummkopfs nicht Unglük stiften könnte, oder in allen Fällen ohne Unterschied untrügliche Hülfe verschaffen müßte; eine Forderung, welche selbst die kräftigsten unserer sichern Arzneimittel nicht erfüllen.

Einige Viehärzte gebrauchen den Schierling innerlich in dem Roz der Pferde. Nüsse, die in seinem Safte gekocht sind, können sehr gut benuzt werden, um in Gärten Maulwürfe und Mäuse zu vertreiben, wenn man sie in ihre Löcher stekt.

---

kortende Utöfningen. Stockh. 1767. S. 40. 41. Wahlborn Medecinal Verkets tilstand i Riket S. 105. u. f. und Oberteuffer a. a. O. S. 81—85.

d) Von Haen Epistola de Cicuta ad Tralleſium. Andry on the virtues of Hemlock 1761. Whitt on nervous Disorders &c. S. 22.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sollte nicht auch der Pastinak, Pastinaca sativa Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 379. hieher gehören?

Er wächst in ganz Europa, den mitternächtlichsten Theil ausgenommen, auf Schutt und Weiden, wird häufig in Gärten gebaut, und hält zwei Jahre aus.

Seine Blätter sind einfach gefiedert, und die Blättchen, woraus sie bestehen, am Rande eingeschnitten; seine Blumen sind von gleicher Gröse, und, die mittelsten ausgenommen, durchaus fruchtbar; sie haben eine allgemeine Hülle, welche aus vier bis fünf ungleichen kaum merklichen Blättchen besteht; ihre Krone ist gelb, und die Blättchen derselbigen eingewickelt und ohne Ausschnitt, diese Blumen hinterlassen eine elliptische breitgedrükte geblätterte glatte Frucht, die aus zween Samen mit dünnem schmalem Rande besteht.

Diese ganze Pflanze hat einen eigenen gewürzhaften Geruch; vornemlich findet man diesen in den Samen, welche einige e) als ein vorzüglich kräftiges Mittel, Fieber zu vertreiben, andere f) mit Süsholz oder dessen Saft gegen Stein und andere Harnbeschwerden gerühmt haben.

Die Wurzel, welche bei der wilden Pflanze dünn und holzig ist, wird in Gärten saftig, dik, esbar und süs, und ist früh und frisch zubereitet eine unschädliche Speise, auch mit Milch gekocht, Auszehrenden g) und das damit gekochte

---

e) 1) Garnier bei Geoffroy a. a. O. suppl. I. S. 340. 2) Linné Flor. suec. S. 95.

f) Börhaave Hist. plant. hort. L. B. S. 108. und bei Haller Hist. stirp. Helvet. indig. n. 808.

g) Ebenderf. hist. plant, &c. a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Wasser in Wechselfiebern h) empfohlen worden; auch löst dieses Wasser sowohl als der aus der Wurzel gedrükte Saft auserhalb des lebendigen Leibes den Blasenstein auf i); aber ist die Wurzel alt, und schon ein Jahr lang in der Erde gewesen k), und wird im Winter herausgenommen l), so erregt sie leicht Wahnsinn m), Raserei n), Schwindel o), heftiges Brennen im Mund und Magen p), und im ganzen Leibe q), Aufschwellen der Augen und Lippen r), und andere Zufälle s); schon Willis t) sah auf ein Gericht solcher Wurzeln in einem vornehmen Hause, Frau, Töchter und alle Mägde wahnsinnig werden, so daß sie ganz toll redeten und durch das ganze Haus tanzten, endlich aber müde wurden und einschliefen, den andern Morgen aber gesund erwachten. Weickard u) erzählt, 1775 habe ein Beamter im Frühling mit seinem Sohne solche Wurzeln, die den Herbst zuvor von dem gleichen Bette ohne allen Schaden

---

h) Geoffroy a. e. a. O.

i) Lobb Treat. on diſſolvents of the ſtone, S. 120.

k) Reichsanzeiger 1795. St. 75. S. 725. 726.

l) Trew Commerc. litter. Nor. 1740. S. 390. not. g.

m) Rai a. e. a. O. I. S. 410.

n) Ebenderſ. a. e. a. O.

o) 1) Conſt. de Rebecque Med. helvet. prodr. Obſ. ſubn. 51 S. 73. 2) Albrecht Ephemer. Acad. Caeſ. Nat. Curioſ. Dec. III. Ann. 2. S. 321.

p) Conſtant de Rebecque a. e. a. O.

q) Albrecht a. a. O.

r) C. de Rebecque a. a. O.

s) Camerer Act. Acad. Caeſ. Natur. Curioſ. I. S. 247. ꝛc.

t) De anima brutorum. S 423.

u) Vermiſchte mediciniſche Schriften. Th. I. S. 76. 77.

www.dlibra.wum.edu.pl

genossen wurden, gegessen, nach dem Essen sei es dem Vater, welcher mehr davon genossen, so übel geworden, daß er sich dem Tode nahe glaubte, er hatte trokenen Mund und starken Durst; der Sohn reichte ihm Wein, er wurde verwirrt, bald lag er in Unmacht, bald war er gelähmt und gleichsam vom Schlage getroffen; der Geistliche, den er rufen lies, gab ihm Citronensaft; er brach die Wurzeln aus, und fühlte Erleichterung, vier Stunden nach dem Essen bekam auch der Sohn Bangigkeiten, redete irre und raßte.

IV. Pflanzen mit vielen Staubfäden in den Blumen.

1) Stephanskörner, Läusesamen. Delphinium Staphis agria Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 265.

Man findet diese Pflanze in Kandien, Istrien, Dalmatien, Apulien, Kalabrien und in dem mittägigen Frankreich wild. Ihre Blätter sind in stumpfe Lappen getheilt, welche wieder in drei Abschnitte gespalten und wie eine Hand ausgebreitet sind; oft sind es sieben solcher Lappen, deren Abschnitte eine scharfe Spize und weisse Adern haben. Ihre Blumen zeigen sich in Brachmonat; sie haben drei Staubwege, und keinen Kelch; ihre Krone ist blau, und besteht aus fünf Blättchen, welche länger, als das Honigbehältnis sind; an diesem sind auch fünf Blättchen und ein ganz stumpfes Horn. Jede Blume läßt drei ganz trokne Samengehäuse nach sich. Die Samen, die darinn liegen, sind rundlicht, unten etwas breiter, oben aber in eine Spize zusammen gezogen: auf ihrer breitgedrükten Fläche haben sie der Länge

www.dlibra.wum.edu.pl

nach einen Strich, und unter einer schwarzen und runzelichten Schale enthalten sie einen ölichten und weislichten Kern von ekelhaftem und bitterm Geschmak.

Diese Samen haben eine ungemeine entzündende Schärfe x), die einem wahren Arzte den innerlichen Gebrauch gänzlich untersagt, und selbst bei dem äuserlichen die größte Behutsamkeit empfiehlt y). Ein Hund z), dem man fünf Skrupel davon in Wasser gegeben hatte, bekam eine Viertelstunde darauf leere Reize zum Erbrechen; er fiel zur Erde nieder, und konnte weder den Kopf, noch überhaupt den Leib wieder aufrichten. Er weigerte sich das Wasser zu trinken, das man ihm darbot, zitterte, und verlor alle Stimme; man gab ihm zwei Stüke Braten in den Mund, mit groser Mühe konnte er sie kaum kauen, und mußte alle Kräfte anwenden, um sie hinunter zu schlingen. Er bekam Zukungen und legte sich immer auf die rechte Seite. Es flos sehr wenig Harn von ihm. Seine Zunge hieng gelähmt zum Munde heraus; wenn er sich aufgerichtet hatte, so fiel er sogleich wieder auf die Seite. Nach einigen Stunden gieng, ohne daß er es bemerkte, zuerst Unrath, dann Harn in Menge von ihm. Er lag fast ganz unbeweglich still, schluchzete zuweilen, und bewegte die Füse nur ganz schwach; aber es war alles ganz matt, und bald darauf war er gegen alle Art von Quaal, die man ihm anthat, unempfindlich. Nach zwo, oder drei Minuten hörte der Schlag des Herzens, der zuvor sehr leb-

---

x) Vogel Hist. mater. med. S. 185. 2) Spielmann Instit. mat. S. 488.

y) Schulze Mater. med. S. 435.

z) Hillefeld a. a. O. S. 20. u. f.

www.dlibra.wum.edu.pl

haft war, auf, und der Hund starb, ohne gewaltsame Zukungen, ehe noch drey Viertelstunden vom Anfang an verflossen waren.

Sogleich nach seinem Tode war die Zunge schwarzblau; der Magen auf dem Grunde von aufen entzündet; die Gefässe des Gekröses und der Gedärme voll Blut; die Gedärme selbst von aufen gesund; die dunnen Gedärme aber hatten inwendig hin und wieder entzündete Düpfelchen und Flecken; in der Mitte des leeren Darms fand man, neben noch lebendigen muntern Würmern, Stephanskörner, die in Schleim eingehüllt waren; die innere zotige Haut dieses Darms war wie eine Welle aufgeworfen, und die Entzündung zeigte sich an dem obersten Theile des Darms am heftigsten, so daß die Oberfläche schwarzroth war. Der Magen war größtentheils mit Stephanskörnern und grünlichtem Schleim angefüllt, und von der obern nach der untern Mündung zusammen geschnürt. Die ganze Oberfläche des Zwölffingerdarms war entzündet und blauroth. Alle Gefässe strozten von schwarzem Blute; die Nieren waren gesund; die Gallenblase ein wenig entzündet; die Galle gelbroth und dünn; der rechte Lungenflügel mit schwarzem Blute unterlaufen und ganz zusammen gefallen und geflekt, der linke aber ausgedehnt und nicht so geflekt; der Herzbeutel ganz dünn; die Spize des Herzens nach der rechten Seite zu etwas entzündet, und in dem Herzen selbst nur weniges geronnenes dikes Blut.

Nach diesen Zufällen zu urtheilen, wird es wahrscheinlich, daß die Stephanskörner unter dieser Klasse von Giften schon eine Stelle verdienen, und daß es nicht wohl zu glauben ist, daß sie blos durch ihre Schärfe die erzählten Zufälle bewirkt hatten.

www.dlibra.wum.edu.pl

2) Stinkende Nieswurz, Christwurz, wilde Christwurz, Läusekraut. Helleborus foetidus Linn. Helleboraster. Blackwell a. a. O. Pl. 57.

Sie wächst in Frankreich, Teutschland und in der Schweiz, vornemlich auf unangebauten Bergen und in Wäldern wild.

Sie hat, so lange sie noch frisch ist, einen scharfen unangenehmen und zugleich starken Geruch, und erfüllt damit oft die ganze benachbarte Luft, besonders wenn diese eingeschlossen ist.

Ihre Wurzel ist lang, rundlicht, und so lange sie frisch ist, saftig und scharf. Ihr Stengel wächst kaum höher, als die Blätter, zuweilen aber doch zween Schuhe hoch; er ist sehr blatt- und blumenreich, übrigens weich und ekig, und treibt wechselsweise aus den Winkeln der Blätter Aeste. Ihre untersten Blätter stehen auf langen, blassen Stielen; sie sind stark, gros, fest, dik, und auf ihrer obern Fläche glänzend und sattgrün; auf der untern aber blaß. An ihrem Rande haben sie spizige und sägenartige Zähne und theilen sich in drei Lappen, von welchen nur der mittlere einfach, die übrigen aber wieder in vier kleinere gespalten sind; die obern Blätter hingegen haben gar keine eigene Stiele; sie sind ganz blaß, weich, unzertheilt, und an ihrem Rande fein gekräuft. Ihre Blumen hängen in den Winkeln der obersten Blätter, an weichhaarigen Stielen, und haben keinen Kelch. Ihre Krone ist blaß grün und vest, und besteht aus fünf rundlichten Blättchen, welche auf ihrer inwendigen Fläche hin und wieder einen dunkelpurpurrothen Fleken haben; innerhalb dieser stehen fünf bis acht kürzere Röhrchen im Kreise herum, welche gleichsam in zwo Lippen getheilt, an ihrem Rande

www.dlibra.wum.edu.pl

fein gezakt, und nach innen zu gleichsam abgestumpft, nach aussen zu aber verlängert sind. Diese Blumen zeigen sich vom Heu- bis in den Erndemonat; jede von ihnen hinterläßt drei trokene runzelichte Samengehäuse, welche ziemlich aufrecht, und nur an ihrer Spize umgekrümmt sind, aus zwei Schalenstüken bestehen, und eine grose Menge Samen enthalten. Diese stehen in zwo Reihen, und ihre Gestalt hält gleichsam das Mittel zwischen der Gestalt eines Eies und eines Dreieks.

Diese Pflanze wirkt stärker, als die schwarze Nieswurz a), und erregt unmäsige Bauchflüsse, die sich zuweilen mit dem Tode endigen b).

Neuerlich empfielt sie Busset c) unter mancherlei Gestalten wider die Würmer der Kinder, als vorzügliches Mittel.

Die Viehärzte gebrauchen die Wurzel in verschiedenen Krankheiten des Viehes zu einem Haarseile, das sie dem Vieh durch die Ohren ziehen, und die Einwohner des Delphinats, als ein Gegengift gegen die weisse Nieswurz.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch andere Arten dieser Gattung hier eine Stelle verdienen, wie es von der schwarzen Nieswurz entschieden ist; allein, da ich von jenen keine besondern Erfahrungen von einem tödlichen Erfolge vor mir habe, und der Saft von dieser auch unmittelbar mit dem Blute vermischt, tödliche Wirkungen äusert, so will ich

---

a) Lewis Mater. med. S. 560.

b) 1) Threlkeld synops. stirp. Hibernic. Dublin. 1727. 2) Cook Oxfort's Magazine for March. 1769. S. 99.

c) Essay on the medical Constitution of great Britain. Lond. 1762. S. 229. u. f.

www.dlibra.wum.edu.pl

ich jener hier nicht ausführlich gedenken, und diese unter anderer Abtheilung beschreiben.

Hingegen sei es mir erlaubt, hier noch das Harmelkraut, Peganum Harmala Linn. Bulliard Herb. de la France. Pl. 243. aufzuführen.

Es wächst zu Madrit, Alexandria, in Kappodocien, Galatien und im ganzen mittägigen Rußland im Sande wild, hält mehrere Jahre aus, und hat einen starken unangenehmen Geruch, und in seinen Blättern einen bittern, etwas scharfen Harzgeschmak.

Seine Blätter sind in viele kleine Abschnitte gespalten; seine grosen Blumen haben zwischen zehen und zwanzig Staubfäden, einen Staubweg, und eine weisse Krone, welche, wie der Kelch (wenn er anderst nicht mangelt) aus fünf Blättchen besteht; sie hinterlassen ein troknes Samengehäus, welches aus drei Schalenstüken besteht, innwendig in drei Fächer getheilt ist, und in diesen viele Samen enthält.

Diese Samen erregen einen lustigen Wahnsinn d), in welchen sich die Türken zum Scherz dadurch versezen.

V. Gewächse mit einer einfachen Blumendeke.

1) Beständiges Bengelkraut, wild Bengelkraut, Hundskohl. Mercurialis perennis Linn. Oeder Flor. Dan. Pl. 400.

Es wächst in ganz Europa in Hainen und Wäldern, vornemlich, wenn sie gebirgig sind, wild.

Seine

---

d) Linné Amoenit. academ. B. VI. S. 123.

www.dlibra.wum.edu.pl

Seine Wurzel bleibt über Winter. Sein Stengel ist ganz einfach und mit Haaren bekleidet. Seine Blätter sind rauh, und an ihrem Rande, wie eine Säge, gezakt; sie stehen etwas von dem Stengel ab, und ihre Gestalt nähert sich der Gestalt eines Eies, nur daß sie an beiden Enden spizig zulaufen. Seine Blumen zeigen sich im Maimonat; sie haben keine Krone, aber einen glatten Kelch, der in drei, höchstens in vier vertiefte und eirunde, jedoch etwas spizige Abschnitte gespalten ist. Auf der einen Pflanze haben sie nur Staubfäden und keine Staubwege; auf der andern nur Staubwege und keine Staubfäden; jene stehen in ganzen Klumpen beisammen, und mehrere dieser Klumpen bilden dünne Aehren, welche auf ziemlich langen Stielen in den Winkeln der Blätter stehen; sie schliesen bald zwölf, bald sechzehen lange und dünne Staubfäden ein, deren jeder zween Staubbeutel trägt; diese hinterlassen keine Spuren von Samen. Die andere Art Blumen stehen zuweilen ganz einzeln, meistens aber zu zwo auf langen Stielen. Sie enthalten nur einen Eierstok mit zween zurük gekrümmten Griffeln, der in der Mitte der Länge nach eine Furche, und in derselbigen zween dünne Ansäze hat, die wie eine Schusterpfrieme gestaltet sind. Von diesen lezten Blumen hinterläßt jede zwei rauhe und kugelrunde Samengehäuse, deren jedes nur einen Samen hat.

Es zeichnet sich von dem gemeinen Bengelkraute (Mercurialis annua Linn.) dadurch sehr deutlich aus, daß dieses kleiner, weicher, saftiger und ein Sommergewächs ist, daß sich sein Stengel in viele Aeste theilt, seine Blätter kleiner sind, und eine ganz glatte Oberfläche haben.

Ziegen fressen es ohne Nachtheil. Die ältern Naturforscher hielten es gröstentheils, auch in Absicht anderer Thie-

www.dlibra.wum.edu.pl

re und der Menschen, für unschädlich; viele unter ihnen, selbst K. Gesner, dessen Einsichten, Scharfsinn, Genauigkeit im Beobachten, und Wahrheitsliebe allen seinen Nachfolgern zum Muster dienen können, empfohlen seine Blätter zum Zugemüse; aber nach einer neuen Beobachtung, ist es nicht nur den Schafen tödlich, sondern Sloane sah auch auf seinen Genus bei Leuten, die allerlei wildwachsende Kräuter zum Zugemüse sammleten, heftiges Erbrechen, einen gewaltsamen Bauchfluß, Brennen in dem Kopfe, Zukungen, tiefen Schlummer, und bei einigen unter ihnen wirklich den Tod erfolgen e).

Da wir sonst keine Wahrnehmungen haben, welche die schädliche Kraft dieses Gewächses bekräftigen; so bin ich noch nicht ganz gewis, ob nicht vielleicht die unwissenden Leute in dem Sloanischen Falle, welche die Kräuter zu ihrer Speise sammelten, die Blätter eines andern Gewächses, dessen Schädlichkeit entschieden ist, mit untergemischt haben.

2) Gemeiner Hanf. Cannabis sativa Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 322. a. b.

Dieses Sommergewächs wächst in Indien und Persien wild, und wird in einem grosen Theile Asiens und Europens gebaut; es hat einen eigenen Geruch, der den Kopf einnimmt, und gibt aus allen seinen Theilen, vornemlich wenn es geröthet wird f), betäubende Ausdünstungen von sich.

Seine Blätter sind gefingert; von seinen Blumen haben einige fünf Staubfäden, und einen in fünf Abschnitte

---

e) Philosoph. Transact. 203. S. 640.

f) J. G. Zimmermann Erfahrungen Th. II. S. 219.

www.dlibra.wum.edu.pl

getheilten Kelch, andere, welche aber auf verschiedenen Stämmen sizen, einen Staubweg mit zween Griffeln, und einen ganz unzertheilten Kelch, der zur Seite aus einander klaft; diese hinterlassen eine aus zwei Schalenstüken bestehende Nuß, welche in dem vest geschlossenen Kelche liegt.

Ich übergehe den nüzlichen Gebrauch, den man von dem Splint seiner Stengel, von seinen Samen und dem daraus gedrükten Oele macht; es hat in mehreren seiner Theile, was seine Wirkung auf den Menschen betrift, grose Aehnlichkeit mit dem Mohnsafte g), und das Bang oder Bangue, welches die Morgenländer gebrauchen, um sich in einen angenehmen Rausch und Benebelung des Verstandes zu versezen, besteht, mit etwas Honig versezt, gemeiniglich daraus h); vornemlich gebraucht man darzu die weiblichen Blüthen, entweder blos getroknet und klein gestosen zu Messerspizen voll, oder frisch oder getroknet in allerlei Getränke gehängt, die, wenn sie damit durchdrungen sind, genommen werden, oder in den sogenannten Frölichkeitspillen; man legt sie nemlich frisch und in Kohlblätter eingewikelt in heisse Asche, wenn sie da recht schwizen, in Milchrahm, nun wieder in Kohlblättern in heisse Asche, und, wenn sie darein zu Brei geworden sind, macht man Pillen daraus i). Auch die obersten Blätter werden in den Morgenländern vom gemeinen Volke, wie Mohnsaft, gebraucht, und wirken, wie dieser;

---

g) Hooke philosophical Experiments and observations. London 1726. 8.

h) S. G. Gmelin Reisen durch Rußland. Petersburg. 4. III. 1774.

i) Falck Beiträge zur topographischen Kenntniß des russischen Reichs II. S. 265.

www.dlibra.wum.edu.pl

sie bewirken bei Leuten, welche sich daran gewöhnen, ein hesliches Ansehen, wilden Blik und Zittern der Glieder k); Leute, die sich in Persien den Mohnsaft abgewöhnen wollen, rauchen die grünen getrokneten Hanfblätter, werden davon betäubt, berauscht, schlafsüchtig, und kommen einige Minuten lang gleichsam auser sich, fallen auch, wenn sie dieses öfters wiederholen, wohl in Raserei l); auch die Indianer rauchen, um sich zu berauschen oder wütend zu machen, Hanfblätter, oder trinken ein Getränk, welches daraus, aus Mohnsaft und stinkendem Assant gemacht ist m).

3) Osterlucei, Aristolochia.

Die Pflanzen dieser Gattung haben einen eigenen schweren nicht unangenehmen Geruch und herzförmige Blätter; ihre Blumen, welche immer einzeln stehen, haben keinen Kelch, aber eine aus einem Stüke bestehende, zungenförmige, unzertheilte Krone, und sechs Staubfäden, welche auf eben so vielen Fruchtknoten sizen, und hinterlassen ein trokenes Samengehaus, welches inwendig in sechs Fächer getheilt ist.

α) Schlangentod, Aristolochia Anguicida Linn. Jacquin Stirp. amer. pict. Pl. 220.

Sein Stengel ist holzig, und schlingt sich an andern Körpern hinauf; seine Blätter sind scharf zugespizt, und ha-

---

k) Essais philosophiques sur les moeurs de divers animaux. à Paris 1783. 8.

l) Reineggs bei Blumenbach medicinische Bibliothek. Göttingen 8. B. II. St. 2. 1785. S. 380. 381.

m) Sprengel allgemeiner historischer Almanach für 1786. S. 28.

www.dlibra.wum.edu.pl

ben auch herzförmige Nebenblättchen. Schon seinen Geruch fliehen die Schlangen, und wenn auch gleich Menschen einige Tropfen von dem Safte seiner Wurzel nichts geschadet haben, so machen doch einer oder einige Tropfen Speichel, womit man die Wurzel gekaut hat, wenn man sie einer Schlange in den Mund fließen läßt, diese so betäubt und gelähmt, daß sie sich mit der Hand greifen läßt, doch nach einigen Stunden von selbst wieder zu sich kommt; bringt man ihr aber mehrere Tropfen bei, so fällt sie plözlich in Zittern und Zukungen, welche sich nur mit dem Tode endigen [m1]). Er ist in beiden Indien zu Hause.

Sollte wohl auch

β) die runde Osterlucei, Aristolochia rotunda Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 256.

welche sich durch ihre stumpfen, sehr kurz gestielten Blätter, und, wie die folgende, durch ihren schwachen Stengel auszeichnet, auch, wie sie in Spanien, Italien und dem mittägigen Frankreich wild wächst;

γ) die lange Osterlucei, Aristochia longa Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 257.

die sich durch ihre nicht ganz so stumpfen, glattrandigen und ungestielten Blätter unterscheidet, und

δ) die wilde Osterlucei, Aristolochia Clematitis Linn. Knorr thes. rei herbar. II. Pl. A. 15.

welche in der Tatarei, in Teutschland und Frankreich wild wächst, und, wie die beiden vorhergehenden, mehrere Jahre

---

m1) Jacquin a. a. O. S. 114.

www.dlibra.wum.edu.pl

ausdauert, aber sich von ihnen durch ihren aufrechten Stengel, noch mehr aber dadurch, daß ihre Blumen in den Winkeln der Blätter gedrängt beisammen stehen, unterscheiden läßt, welche sonst insgesammt mehr durch ihre Arzneikräfte bekannt waren, nach Puihn [m2]) hieher zu zählen sein?

Sollten endlich folgende Pflanzen überhaupt unter den giftigen und unter welchen eine Stelle verdienen?

a) Eupatorium faſtidioſum

aus Surinam [m3]), deſſen Blumen aus mehreren in einen gemeinschaftlichen aus schupenweise auf einander liegenden Blättchen bestehenden länglichten Kelch eingeschlossenen und auf einem nakenden Boden stehenden Blümchen zusammengesezt sind. Diese Blümchen sind alle gleich, und haben eine röhrichte Krone, fünf in einen holen Staubbeutel vereinigte Staubfäden, und einen Staubweg mit einem langen halb entzwei gespaltenen Griffel, und hinterlassen Samen mit einer Federkrone.

b) Altmannskraut, Erigenon [m4]).

Auch bei den Pflanzen dieser Gattung bestehen die Blumen aus mehreren in einen gemeinschaftlichen Kelch eingeschlossenen, und auf einem nakenden Boden stehenden Blümchen, welche insgesammt vollkommenen Samen mit einer Haarkrone zurüklassen; aber die Blümchen in Umkreise haben nur weibliche Befruchtungstheile, und zeichnen sich auch durch ihre strichförmige, sehr schmale Krone aus.

---

m2) a. e. a. O. S. 143.

m3) Rottböll a. a. O. S. 298.

m4) Puihn a. e. a. O. S. 139.

www.dlibra.wum.edu.pl

α) Schwerriechendes Altmannskraut, Erigeron graveolens Linn. Lobel Icon. 346.

Dieses Sommergewächs wächst in den Morgenländern, aber auch bei Montpellier wild, und zeichnet sich durch einen schweren Geruch aus; der Stengel treibt seine Aeste zur Seite, und diese tragen viele blaßgelbe, gestralte Blumen; die Blätter haben am Rande keinen Einschnitt, und sind lang und ziemlich gleicher Breite.

Sie sind, so wie die Blätter der folgenden Art, scharf und betäubend, und bringen bei Ziegen, welche davon fressen, den Tod n).

β) Leimichtes Altmannskraut, Erigeron viscosum Linn. Jacquin Hort. Vindob. II. Pl. 165.

Es wächst in Spanien, in Languedok und in Italien wild, und kommt dem vorhergehenden nahe, ist aber gröser.

Seine Blätter sind lanzenförmig, am Rande gezakt, an der Grundfläche umgebogen, und durchaus mit Haaren bekleidet, zwischen welchen sich klebrichte Drüschen befinden; seine Blumenstiele stehen zur Seite, und tragen jeder eine Blume mit sparrichtem Kelche.

γ) Scharfes Altmannskraut, Erigeron acra Linn. Jungshans Plant. offic. icon. Pl. 12.

---

n) 1) Zeviani Memorie di matematica e fisica della Società italiana III. 1786. 2) Brugnatelli Giornale fisico-medico 1795. n. 8. b. 3) M. T. Ellrodt Schwammpomona für Aerzte und Köche. Bayreuth. St. 1. 1799. 4) Heberden Medical Transactions. B. II. S. 216. 5) K. v. Kropf Beschreibung ꝛc.

www.dlibra.wum.edu.pl

Es wächst in ganz Europa an trokenen und sonnigen Orten wild, und hält, wie die vorhergehende, mehrere Jahre aus.

Seine Blumenstiele stehen alle in ungleicher Höhe, und tragen nur eine Blume, mit bläulichter Krone; seine Samen haben eine Federkrone. Auch seine Blätter haben einen scharfen Geschmak.

VI. Schwämme.

Diese Klasse von Gewächsen, deren Arten und Spielarten, so lange wir die Art ihrer Vermehrung noch nicht besser einsehen, noch nicht genug bestimmt sind, und auch nicht sein können, ist, wie die Klasse der Amphibien in dem Thierreiche, voll von Giften. Diese Gifte sind um desto gefährlicher, wie unmöglicher es dem gemeinen Volke, oder auch andern, die in der Kräuterkunde nicht bewandert sind, ist, die wahrhaftig schädlichen Arten durch andere, als unbestimmte und trügliche Merkmale von den übrigen zu unterscheiden, und wie schwerer es sogar einem geübten Auge fällt, hier hell zu sehen.

Alle Schwämme, sowohl schädliche als unschädliche unterscheiden sich von den übrigen Gewächsen dadurch, daß sie ein sehr weiches Fleisch, und weder deutliche Blumen, noch wahre Wurzeln, wenigstens keine von der Art haben, wie wir sie bei andern Pflanzen bemerken.

Es würde wider den Entzwek sein, den ich mir bei dieser Geschichte der Gifte vorgesezt habe, alle Schwämme,

www.dlibra.wum.edu.pl

von welchen die Schriftsteller gerade zu behaupten o), daß sie schädlich sind, ausführlich, und botanisch zu beschreiben; da ich mir einmal zum Gesez gemacht habe, nur diejenigen Pflanzen, als wirkliche Gifte, zu beschreiben, von welchen mich sichere Erfahrungen oder höchst wahrscheinliche Folgerungen aus solchen, welche an Thieren gemacht sind, belehren, daß sie insbesondere auf Menschen tödliche Wirkungen gehabt haben, oder äußern würden; da überdies die Schriftsteller, welche uns Bemerkungen von dem tödlichen Erfolge der Schwämme aufgezeichnet, die Art derselbigen nur sehr selten so genau beschrieben haben, daß man sie daraus botanisch bestimmen könnte; so halte ich es für nüzlicher, den allgemeinen Schaden, den die Schwämme, selbst die esbaren, anrichten, die Merkmale, an welchen man überhaupt die schädlichen und verdächtigen Schwämme erkennen kann, und die Zufälle, die sie überhaupt hervorbringen, zu beschreiben, und dann erst diejenigen insbesondere anzuführen, von welchen ich bestimmte Erfahrungen erzählen kann. Ich muß meine Leser zum voraus bitten, daß sie ja daraus nicht den Schlus ziehen, daß ich alle übrigen, deren ich hier nicht mit Namen gedenke, für unschuldig erkläre.

---

o) So erklären l'Ecluse u. a. den Mistschwamm (Agar. fimetar. Linn.) und andere Arten des Blätterschwamms, welche Hr. von Haller Histor. stirp. Helv. III. S. 165. 180. nr. 2397. 2482. 2484. 2485. eine Art des Becherschwamms, den er unter 2222 beschrieben hat; so erklärt l'Ecluse den Gichtschwamm (Phall. impudic.) und Fallopius den purgierenden Schwamm in den Apotheken, wenn er an der Eiche wächst, für tödlich; aber sie führen keine Erfahrungen an, um dieses zu beweisen.

www.dlibra.wum.edu.pl

Alle Schwämme, selbst diejenigen, die man insgemein für die unschädlichsten hält, schaden, wenn man sie nicht mäßig genießt, durch die Menge des zähen Schleims, den sie enthalten, und den die Werkzeuge der Verdauung kaum bezwingen können; durch die Fäulung, in welche sie nur gar zu leicht, und allzuschnell übergehen, und durch die ungeheure Anzahl von Ungeziefer, oder Würmern, und ihren Eiern, die sich sehr häufig darinn einnisteln p). Einige schaden durch eine zusammenziehende Kraft, und verschließen dadurch die Mündungen der Gefäße, durch welche der Nahrungssaft zu dem Blute gebracht wird, und noch andere schaden durch eine offenbare und beißende Schärfe q).

Allein auch dieser vierfache Schaden berechtigt mich noch nicht, die Schwämme überhaupt unter die Gifte zu zählen; denn es wäre übereilt, einen Schwamm zu verdammen, wenn ihn das Vieh auf der Weide nicht anrührt r), aber dann mus ein Schwamm äuserst verdächtig sein, wenn sein Ansehen sehr unangenehm und seine Farbe schwarz, schwarz-

---

p) 1) S. J. Bouillet des mauvais effets des Champignons. Beziers 1744. 2) Watson Philosoph. Transact. nr. 474. 3) Schreber Sammlung verschiedener Schriften ꝛc. VI. Th. 1760. S. 331. u. f. 4) J. Vennier de Longchamp sur les truffles et les champignons. Avignon. 1766. 5) Böhmer Progr. de dubia Fungorum collectione. Vimb. 1776. 6) Zeviani, der alle ihre Schädlichkeit davon ableitet a. a. O.

q) Daß es immer eine scharfe Säure sei, wie Göze zweite kleine Harzreise S. 310. behauptet, ist durch Erfahrungen nicht erwiesen, nicht einmal durchaus wahrscheinlich.

r) Göze a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

blau, grün, oder buntschäkig ist, oder wie ein Pfauenschwanz spiegelt; wenn er noch überdies einen faulenden Geruch hat, oder geschwind fault; wenn er im Kochen hart, oder wenigstens härter wird, als er zuvor war; wenn er ganz klebricht und zäh ist, und wenn er einen hohlen Stiel hat. Wenn ein Schwamm einige, oder mehrere, und noch mehr, wenn er die meisten dieser Eigenschaften in sich vereinigt, so hat man alle Ursache, sich vor seinem Gebrauch zu hüten.

Das Unheil, das die Schwämme anrichten, ist immer nach der Menge, die man davon genießt, nach der Gegend, in welcher sie sind, dem Boden, auf welchem sie wachsen, dem Alter, der Leibesbeschaffenheit, und der Lebensart derjenigen, die sie genießen, verschieden, gemeiniglich gröser, wenn sie roh, als wenn sie zugerichtet sind.

Sie erregen Verstopfungen des Leibes s), Ekel t), eine beschwerliche u), oder schmerzhafte x) Empfindung in dem

---

s) Nic. Andry Traité des aliments du Carême et des differentes qualités de legumes. Paris 1710. ch. 6.

t) Schon blos durch ihren Geruch. Pennier des trufles. S. 57.

u) 1) Galen de aliment. facultat. L. II. C. 69. 2) Vidus Vidius de curat. general. Florent. 1582. L. II. C. 3.

x) In andern Beispielen Ebendieselben a. d. a. O. Bei dem Mädchen des Pausanias, Hippokrates Epidemic. L. VII. nr. 110. Bei andern Amatus Lusitanus Curat. Centur. I. cur. 39. Scribonius Largus a. a. O. C. 66. S. 167. Taglioni Toppetti Relazzione de alcuni viaggi &c. B. I. Flor. 1751. S. 347. bei einem Mann Meyer neues Magazin für Aerzte B. IV. St. 6. S. 488. bei vier Menschen Zeviani a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Magen, ein y) oft vorübergehendes z) Aufblähen deſſelbigen, zuweilen auch den Brand darinnen z*), Entzündung der Lippen a), Anſchwellen der Zunge und des ganzen Kopfes b), übergehende Blindheit c), Brandfleken in der Kehle d), Erbrechen e) oder leere Reize darzu f), Schluchzen g), eine Art Keichhuſten h), ſchneidende und ſtechende Bauchſchmerzen i),

---

y) Timäus von Güldenklee Caſ. medic. L. VII. Caſ. IV.

z) Meyer und Zeviani a. d. a. O.

z*) Hatte in Recueil periodique d' obſervations de Medic. &c. III. S. 299.

a) Fabricius von Hilden obſerv. et curat. chirurg. IV. Obſ. 34.

b) Meyer a. a. O.

c) De Thauſer und Barrere Hiſt. de la Societ. de Medecine à Paris pour les ann. 1777 et 1778.

d) Hatte a. a. O.

e) Bei einigen ſeiner Kranken Toppetti a. a. O. bei zween Vidus Vidius a. a. O. Bei einem, Fabricius von Hilden a. a. O. bei vier Zeviani a. a. O. Anhaltendes Erbrechen, Stalpart van der Wiel obſervat. rarior. Anatom. Chirurg. et Medic. Cent. I. obſ. 40. Fr. van Sterrebeek Theatrum fungorum of het Tonneel der Campelnoelgien. 3. Antw. 1675. 1676. 1712.

f) Meyer a. a. O.

g) Güldenklee a. a. O.

h) Meyer a. a. O.

i) Güldenklee, Meyer, Zeviani und Scribonius, Largus a. d. a. O. Ein anderer journal de Medecine &c. B. IV. c. 4. Bianchi bei Battarra Fungorum agri Ariminenſis Hiſtor. Favent. 1755. S. 21. Parmentier bei vier Menſchen aus einem Dorfe in Anjou an der Loire Recreat. phyſiq. oeconomiq. et chirurg. à Paris 1774. B. II. S. 315.

www.dlibra.wum.edu.pl

Bauchflüsse mit beständigem Reize zum Stuhlgang k), oder auch mit Abgang von Blut l), Ohnmachten m), Schlummer n), Schlagfluß o), Wahnwiz p), Wuth q), Zittern r), Zukungen s), Fallsucht t), schweren Athem u), Bangigkeit x), Furcht vor Erstiken y), Fieber z), insbesondere Nes-

---

k) 1) Bianchi a. e. a. O. 2) Allen Synopf. univerf. medicin. add. S. 154. 3) Sterrebeek, Zeviani und Meyer a. d. a. O.

l) Guiſart Hiſtoire de Chirurg. II. S. 295. Zeviani a. a. O.

m) Galen, Am. Luſitanus, auch in einigen Toppetti a. d. a. O. Belfortis ad Galen. de urinis. Binninger Obſerv. et curat. Cent. I. Obſ. 56. Scharf Ephem. Ac. Caeſar. Nat. Curioſ. Dec. III. A. 2. S. 97.

n) Vidus Vidius, Sterrebeek und Zeviani a. a. O.

o) Vidus Vidius, Zeviani a. d. a. O. und Kollichen Act. Hafnienſ. II. S. 294.

p) Fabricius von Hilden, Zeviani und Vidus Vidius a. d. a. O. de la Broſſe de la Nature des plantes et deſſein d'un jardin royal de Medecine. Par. 1628.

q) Am. Luſitanus a. a O. bei einer Frau, Foreſtus Schol. ad obſerv. 116. L. 10.

r) Güldenklee a. a. O.

s) Scharf a. a. O. Bei einem Mädchen ein ſardoniſches Gelächter, Foreſtus a. e. a. O.

t) Foreſtus de venenis obſ. II. S. 36.

u) Galen, Am. Luſitanus und Güldenklee a. d. a. O.

x) Hippokrates, Binninger, Stalpart van der Wiel und Meyer a. d. a. O.

y) Hippokrates, Zeviani, und Güldenklee a. d. a. O.

z) Foreſtus a. ſa. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

felfieber a) und Gallenfieber, Gelbſucht, Speichelfluß, Ermattung, Käite in den Gliedern a*), diken b) oder blutigen c) Harn, kalte Schweiſe d) und ſehr oft, manchmalen ſehr ſchnell den Tod e). Schon ihre Ausdünſtungen erregen allerlei beſchwerliche Zufälle f).

---

a) Meyer a. a. O.

a*) Zeviani a. a. O.

b) Am. Luſitanus a. a. O.

c) Guiſart a. a. O.

d) Seribonius Largus, Velfortis und Güldenklee a. d. a. O.

e) Daher leiten einige bei Zonaras im Jovian den Tod dieſes Kaiſers, daher Martialis Epigramm. ad Caecilianum Epigr. L. I 77. Suidas Lexicon Edit. Kuſteri. Cantabr. 1705 B. II. S. 121. und Plinius Hiſtoria mund. L. XX. C. 23. den Tod des Kaiſers Tiber; Claudius den Tod mehrerer ganzer Familien; davon J. Clr. Rumler Obſerv. poſthum. Cent. med. ed. Welſchii. Ulm 1668. 8. den Tod des Grosherzogs von Florenz und ſeiner Gemahlin Bianca Capella. Davon ſahe auch Cardanus ganze Familien ausſterben, de ſanitate tuenda L. II. Rom 1580. C. 44. Mehtere Todesfälle haben Vidus Vidius, Stalpart van der Wiel, Hatte, Toppetti, van Sterrebeek a. d. a. O. Binninger a. a. O. I. obſ. 28. Sloane Voyage to Iamaica, Madera, Barbados &c. Lond. B. I. 1707. S. 65. Sylvaticus Conſil. et reſponſ. medicinal. Cent. IV. Patav. 1656. 12. aufgezeichnet. Von vier Perſonen in Anjou, und einem franzöſiſchen Bedienten im Hannöveriſchen Parmentier a. a. O. B. II. S. 315. S. auch Iournal de Medecine &c. 1768. und wie viele, die aus der gleichen Urſache erfolgt ſind, bleiben wohl auf immer vor den Augen der Welt verborgen!

f) Linné de viribus plantarum, Amoenit. acad. I. S. 45.

www.dlibra.wum.edu.pl

Geschichte g).

Mittwochen den 17ten October, sammleten siebenzehen Holzhauer von verschiedenem Alter und Geschlecht währenden Holzhauen in dem Walde Schwämme, kochten sie, und speiseten sie des Abends. Freitag Morgens darauf fiengen sie, der eine eher, der andere später, an, grausame schneidende Schmerzen in der Gegend des Magens zu fühlen, und einige von ihnen erbrachen sich; zwischen dem Freitag und Sonnabend, noch ehe der Tag anbrach, waren schon neun von ihnen gestorben, und einige starben noch hiernach mit verschiedenen Zufällen. Einige blieben ganz auser sich, andere hatten Schwindel, andere starben, indem sie sprachen; keiner aber starb an Zuckungen, oder mit Flecken auf der Haut, oder mit eingezogenem Unterleibe.

Alle gewöhnlichen Mittel waren ohne Erfolg. Bei einem kachektischen Mädchen von fünfzehen Jahren, das man zergliederte, fand man den Magen, ungefähr sechs Zoll breit, den ganzen Zwölffingerdarm, und noch einen Theil des leeren Darms mit Flecken, wie sie sich in dem Flekenfieber zeigen, gleichsam besäet, in dem Magen selbst aber nur ein wenig gelblichtes Wasser.

Auch Hunden sind giftige Schwämme gemeiniglich tödlich g*).

Auch hier ist die allgemeine Heilart, die ich oben erzählt habe, die beste. Brechmittel, vornemlich die Brechwurzel, oder weisser Vitriol, oder Brechweinstein in etwas starken, und wiederholten Gewichten, mit vielem lauen, wässerichten, schleimigen, oder öhlichten Getränke, als Milch,

---

g) Taglioni Toppetti a. a. O.

g*) Parmentier Recreations &c. S. 318. 319.

Honig u. dgl. gegeben, um die giftige Schärfe des Schwammes zu entkräften, wenn ja etwas davon im Leibe zurückgeblieben, oder in die Säfte übergegangen sein sollte, sind immer die besten Waffen gegen diese gefährlichen Feinde. Marabelli h) findet im ätzenden Salmiakgeiste ein sicheres Rettungsmittel; er läßt zwölf Tropfen davon in wenigem Wasser eingeben, ein Röllchen Papier damit angefeuchtet in die Nase stekken, und, wenn das nicht hilft, noch vier bis fünf Tropfen ohne Wasser in einem knöchernen Löffel eingeben: es erfolgt Erbrechen und Stuhlgang; wo das lezte nicht geschieht, gibt man dem Kranken ein abführendes Mittel, und zwo Stunden nachher Milch.

Ich werde also hier nur noch die wenigen Schwämme mit Namen anführen, von deren tödlichen Wirkungen bestimmtere Erfahrungen vorhanden sind.

Sie stehen beinahe alle unter der Gattung des Blätterschwamms: sie sind weich, und tragen auf einem Stiele, der senkrecht auf der Erde aufsteht, einen Hut, der wagerecht aufsizt; dieser Hut ist aber gemeiniglich lederartig, in der Mitte fleischig, und unten mit Blättchen, oder Scheibchen besezt, welche von der Einsenkung des Stiels, gleichsam wie Strahlen aus ihrem Mittelpunkte, auslaufen.

1) Fliegenschwamm, wilder Fliegenschwamm. Agaricus muscarius Linn. Agaricus, 24. 79 et 80. Schäffer Icon. fungorum. I. Pl. XXVII. XXVIII.

Er wächst in ganz Europa, und in dem mitternächtlichen Asien in Wäldern, und auf Waldwiesen wild, wo er sich vornemlich im Ernde- und Herbstmonat zeigt.

Das

h) Opuscoli scelti di Milano XIII. S. 48.

www.dlibra.wum.edu.pl

Das Ansehen dieses Schwammes ist sehr veränderlich, und gemeiniglich von einer verführerischen Schönheit. So lange derselbe noch ganz jung ist, so ist der Stiel sehr dik, sehr kurz und gleichsam, wie eine Zwiebel; wenn er aber älter wird, so ist er dünner; doch bleibt er zu unterst etwas knollig, und ist daselbst entweder mit sehr vielen Schuppen, oder mit kurzen Zäserchen bekleidet. Uebrigens ist er weis, nur sehr selten röthlicht, zuweilen gestreift, etwas gekrümmt, durch und durch vest, und etwas hart; er senkt sich nach einem geraden Winkel in den Hut ein, und hat zunächst an demselben einen breiten, weissen, häutigen Ring, der unten durch Abschnitte von andern ehmals vorhandenen Ringen verstärkt ist.

So lange der Schwamm noch ganz zart ist, ist der Hut mit einem kleinen Schleier überzogen, der sich aber bald verliert, doch Spuren seines Daseins unter der Gestalt erhöhter Fleken auf der Oberfläche des Huts zurük läßt. Anfangs ist er rund, wie ein Ei; bald spizt er sich, wie ein Kegel zu; dann nimmt er einigermasen die Gestalt einer Gloke an; nachher wird er blos stark gewölbt, und zulezt ganz flach, wie ein Teller, nur daß der Rand umgerollt bleibt. Nur selten ist er wie ein Trichter vertieft.

Seine Oberfläche ist oft ganz gleich blutroth, und nur am Rande weisgelb, oder gestreift; sie wird aber doch immer mit der Zeit entweder goldgelb, oder sehr blaßgelb; zuweilen ist sie menningroth, und hin und wieder mit weissen Zoten oder Warzen besezt, und dabei manchmalen nach dem Rande zu hellbraun und gestreift. Zuweilen hat sie sehr grose Erhöhungen, und ist, wie die Oberfläche des Stiels, ganz hellbraun; zuweilen ganz aschgrau; zuweilen spielt sie aus der

www.dlibra.wum.edu.pl

grünen in die aschgraue Farbe, und hat in der Mitte ohne bestimmte Ordnung weisse Düpfelchen und Fleken, nach dem Rande zu aber feine Streifen oder Strahlen; zuweilen spielt sie aus der schwarzen, oder braunen Farbe in die aschgraue, und ist entweder gestreift, und mit wenigen, aber desto grösern weislichten Fleken, oder mit einer ungeheuren Menge kleiner weisser Fleken gezeichnet. Sein Fleisch ist gemeiniglich gelblicht, zuweilen weis, oder röthlicht. Seine Blättchen stehen ganz gedrängt in groser Menge beisammen; sie sind dünn und oft staubig, anfangs weis, aber, wenn der Schwamm älter wird, braun oder gelblicht.

Der Geschmak dieses Schwamms ist scharf, und sein Geruch häslich: die Fliegen, denen er mit Wasser hingestellt wird, betäubt er, daß, wenn sie von diesem Wasser trinken, sie wie todt dahin fallen i); auch tödet er die Wanzen, wenn man ihn blos zerreibt, und in die Fugen der Bettstellen streicht k). Selbst auf Menschen äusert er die gefährlichsten Wirkungen, er mag nun roh und unvermischt, oder mit andern Körpern vermischt l), oder auf verschiedene Art zubereitet, und in etwas verändert sein m); er erregt in denselben

---

i) J. Chr. Seyffert de Fungis diss. Ien. 1744. S. 19.

k) Linné It. Scan. S. 430.

l) So bereiten die Kamtschadalen mit dem schmalblätterichten Weiderich (Epilob. angustifol.) ein starkes Getränk daraus. Krascheminikow Natural History of Kamtschatka S. 208. 209.

m) So gar der Harn derer, die ihn genossen haben, soll schädlich sein. Ebendersl. a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Berauschung n), Wahnwiz o), Tollkühnheit p), Wut q), Zittern, und den Tod selbst r).

Inzwischen wird selbst dieser Schwamm, den auch die Schafe ohne Schaden fressen sollen s), nicht nur hin und wieder in dem kalten Rußland, sondern auch in dem wärmern Frankreich, und Teutschland t) gespeist; vielleicht mildert die Art der Zubereitung, oder die unbeträchtliche Menge, in welcher er gespeist wird, seine schädlichen Eigenschaften.

Dieser Schwamm soll vormals zu einer fürchterlichen einen ganzen Tag daurenden Raserei der alten schwedischen Helden (Berserkagäng) gebraucht worden sein, so wie noch jezt Ostjaken, Samojeden und Jukagiren, um ihre Vernunft zu erstiken, in zwölf Stunden einen bis drei dergleichen Schwämme zu sich nehmen u): überhaupt gebrauchen verschiedene Völkerschaften des mitternächtlichen Asiens diesen Schwamm, um sich lustig zu machen; sie essen einen bis drei getroknete Schwämme allein oder mit gestoßenen kleinen Fi-

---

n) Entweder zehen rohe Schwämme, oder das daraus zubereitete starke Getränk. Ebendersf. a. e. a. O.

o) Ebendersf. a. e. a. O.

p) Ebendersf. a. e. a. O.

q) Daß die Leute aus Verzweifelung in Schwerd und Feuer rennen, Ebendersf. a. e. a. O.

r) Bei sechs Litthauern, Lösel Flor. Prussic. op. Gottsch. Regiomont. 1703 S. 88.

s) J. Chr. Seyffert a. a. O.

t) Popowitsch Untersuchungen vom Meere. Nürnb. 1750. S. 387.

u) Oedman Kongl. Svensk. Vetensk. Academ. nya Handling. B. V. för ar 1785. 3. Q. nr. 12. S. 240.

www.dlibra.wum.edu.pl

schen, oder trinken das damit gekochte Wasser, und werden zwar anfangs davon frölich, dann aber unsinnig, und schlafen vest ein, wachen aber mit aufgedunsenem Gesichte, schwerem Kopfe, und einem Gefühl von zerschlagenen Gliedern auf, werden auch bei öfterer Wiederholung dumm und stumpf x).

Auch Aerzte haben sich dieses Schwammes bedient y); so wohl äuserlich als Pulver aufgestreut in fressenden und andern, vornemlich hartnäkigen und holen Geschwüren, selbst auch um ihren erhärteten Rand hinweg zu äzen, in Balggeschwulsten, um sie gänzlich auszurotten, im Brande, in Bläschen der Hornhaut, in Kropfgeschwulsten, als auch theils um die Wirkung des äuserlichen Gebrauchs zu unterstüzen, theils ohne diesen, innerhalb 24 Stunden von einem halben Skrupel bis zu einem Quintchen mit Essig oder dem von schwarzen Kirschen abgezogenen Wasser in Erhärtungen der Mandeln und anderer Drüsen, und in der Fallsucht, vernemlich wenn sie von einem zurükgetretenen Ausschlage entstanden ist; man sammlet in dieser Absicht im Ernde- und Herbstmonate den Theil des Schwammes, der in der Erde steke, schält ihn, zieht ihn auf Fäden, troknet ihn im Schatten an freier Luft, oder bei Regenwetter auf dem Ofen, reibt ihn auf dem Reibeisen zart, und bewahrt ihn, damit er nicht

---

x) 1) Falk a. a. O. II. S. 279. 280. 2) Georgi Beschreibung aller Nationen des russischen Reichs. S. 78. 267. 281. 321. 329. 352.

y) 1) Bernhardt chymische Versuche und Erfahrungen. Leipzig 1755. S. 315. ꝛc. 2) Whistling diss. praes. C. G. Gruner de virtutibus agarici muscarii, vulgo Fliegenschwamm tam internis quam externis experimentis atque observationibus comprobatis. Ienae 1778. 4.

www.dlibra.wum.edu.pl

feucht werde, an einem warmen und trokenen Orte in wohl zugestopften Gläsern auf.

2) Pfefferschwamm, Agaricus piperatus Linn. Schäffer fung. Pl. 83.

Man findet ihn in ganz Europa auf Weiden, und in Wäldern. Er kommt sehr frühe, und ist, so lange er noch jung ist, schneeweis; verändert aber seine Farbe mit der Zeit, anfangs in eine gelblichte, dann in eine hirschbraune, feuerrothe, und kastanienbraune. Der Hut ist anfangs beinahe, wie ein Polster, ziemlich flach, in der Mitte nur wenig vertieft, und am Rande unter sich gebogen; allein, wenn der Schwamm älter wird, so vertieft sich der Hut, wie ein Trichter; das Regenwasser sammlet sich darinnen, und ein zäher Kleber bekleidet die ganze Oberfläche. Die Blättchen sind ziemlich vest, ganz gerade, und in Aeste getheilt, die sich durch Zweige wieder mit einander vereinigen; anfangs sind sie weis, aber ihre Farbe verändert sich, wie die Farbe des ganzen Schwamms: der Stiel ist ganz nakend. Das Fleisch zwischen den Blättchen und der Oberfläche des Hutes gemeiniglich voll von einem scharfen, beinahe äzenden Milchsafte, der, wenn man ihn troknet, zwar seine Farbe in eine schwarzgelbe, aber seine Schärfe durchaus nicht verändert.

Schon durch diese Schärfe des Saftes z) scheint uns die Natur vor dem Gebrauche dieses Schwammes zu warnen, der zwar in Preussen und Curland gespeist wird, aber nach

z) 1) Lister in Lowthorp abridgement of Philos. Transact. II. S. 624. 2) Gleditsch method. fungor. Berol. 1753. S. 98.

www.dlibra.wum.edu.pl

der Erfahrung eines Botallus a) bei einer ganzen Familie Erbrechen, heftige Bauchflüsse b) und Ohnmachten verursacht hat.

3) Agaricus Necator. Bulliard Herb. de la France. Pl. 13.

Er kommt auf der einen Seite dem Pfefferschwamm, auf der andern aber dem Reizker nahe; er gibt einen weislichten Saft, und hat einen vollen Strunk, einen umberbraunen Hut, der am Wirbel concentrisch gestreift, am Rande aber unter sich gebogen und fasericht ist, und Blättchen, welche abwechselnd blasser sind.

Mit ihm kommt Agaricus torminosus, Schäffer a. e. a. O. Pl. 12.
nahe überein. Doch hat er einen gelben Saft, einen gelblichten Hut, dessen Wirbel niedergedrükt, der Rand haaricht und gestreift ist, und ungleiche gelbe Blättchen.

Sollten nicht dahin die gelben Pfifferlinge, Champignons jaunes gehören?

Zwo Haushaltungen zu Lausanne hatten sich viele Schwämme gesammlet, die sie bisher für Reizker (Agaricus delicios. Linn.) c) hielten; sie speisten nur sehr wenig davon,

---

a) Opp. omn. med. et chirurg. Lugd. 1660. S. 72.

b) Auch nach der Erfahrung eines Micheli bei einem Maler und seiner Frau. Nova plantar. genera / Flor. 1729. S. 200.

c) So mus ich die Orongas oder Oronges des Herrn Vicat Histoire des plantes veneneuses de la Suisse. Yverdun 1776. S. 355. übersezen; und wenn eben dieser Schriftsteller in den

aber sie hatten davon solche Zufälle zu leiden, daß der Arzt Mühe genug hatte, sie dem Rachen des Todes zu entreissen; Zittern der Glieder, Wahnsinn, Ohnmachten; Zukungen in dem Gesichte, Schlagflüsse u. dgl. d).

4) Milchschwamm, wilder bramer Brätling, Agaricus lactifluus Linn. Krapf Beschreibung der Schwamme ꝛc. H. II. Pl. III. Abb. I.

Er hat einen angenehmen Geruch und ein seinem Safte nur wenige Schärfe; sein Hut ist bräunlicht und vest; seine Blättchen brüchig und gelblicht oder fleischroth; sein Strunk voll, stielrund und schwammig.

Er hat im Munde eine ausnehmende Schärfe; auch der Dampf, welcher aufsteigt, wenn man ihn mit Wasser kocht, erregt Niesen und Thränen, obgleich der Schwamm sowohl als das Wasser nach dem Kochen ohne Geschmak sind; hat er etwa zehen Tage an der Luft gelegen, so erregt er Zwiken im Leibe, und, wenn er auch ganz troken und auf mancherlei Weise zubereitet ist, Bangigkeit, Magenschmerzen, Erbrechen und Durchfall e).

Errat glaubt, es seien Agaric. specios. Linn., so mus ich einmal gestehen, daß ich diese Art nirgends bei Linné finde, und daß der Reizker die gelbe Farbe, und alles angenehme hat, was sich die beiden unglüklichen Haushaltungen von ihrem Gerichte versprechen konnten.

d) Bei eben diesem Schriftsteller S. 355. 356.

e) Krapf a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

5) Sehr scharfer Blätterschwamm. Agaricus acerrimus. Krapf a. e. a. O. H. II. Pl. II. Abb. 5. Pl. IV. Abb. 8. 9. Pl. V. Abb. 1. 2. 5. 8. Pl. VI. Abb. 4—9.

Er hat keinen oder einen schweren Geruch, und einen ausnehmend scharfen Saft, einen vesten bräunlichten Hut, brüchige gelblichte oder fleischrothe Blättchen, und einen vollen stielrunden und schwammigen Strunk.

6) Blätterichter Blätterschwamm, Agaricus pustulatus. Pollich hiſtor. plantar. in palatin. Elect. naſcentium. B. III. S. 286.

Er wächst im Weinmonat in Nadelwäldern, und hat einen weissen Strunk mit einem Ringe, einen gewölbten aschgrauen Hut, und weisse Warzen und Blättchen. J. Bauhin zählt ihn e*) zu den giftigen.

7) Speiteufel. Agaricus emeticus Linn. Schäffer Icon. Fung. I. Pl. 15. 16. 254.

Er wächst in Baiern häufig, aber immer einzeln. Sein Stiel hat keinen Ring und Samendecke, und ist bald ganz gerade, bald etwas gekrümmt, bald länger, bald kürzer, unten bald breiter, bald schmäler, gemeiniglich weis, zuweilen graulicht, oder röthlicht. Sein Hut ist anfangs stark gewölbt, nachher aber ganz flach, und zulezt wie ein Trichter vertieft. An Farbe ist er gemeiniglich schön blutroth, oder auch feuerroth; zuweilen ganz blaßröthlicht, und manchmalen unangenehm gelb, mit einer rothen, oder braunen Schatti-

e*) a. a. O. III. S. 826.

www.dlibra.wum.edu.pl

rung. Oefters ist er stark, aber ganz fein gedüpfelt, oder am Rande fein gestreift. Sein Fleisch ist weich; seine Blättchen haben eine krumme Richtung, und sind ganz weis, oder blaßgelb. Er erregt sehr starkes Erbrechen t).

8) Rosenrother Täubling, Agaricus Russula. Krapf a. e. a. O. H. I. Pl. I. Abb. 1—7. Pl. II. Abb. 4—6. Pl. IV. Abb. 1—4. 7. und Pl. V. Abb. 1. 2. Schäffer a. a. O. Pl. 75.

Er wächst einzeln, und hat einen angenehmen Geruch und einen süsen Geschmak, einen rothen Hut, weislichtes, zartes aber vestes Fleisch, und dike, gleiche und steife Blättchen.

Auch er erregt Erbrechen, so wie er überhaupt auch in seinem Aeusern mehr Aehnlichkeit mit dem Speiteufel zeigt, so wie Persoon's (Observ. mycolog. Lipf. P. I. 1796. S. 108.) Russula ochraleuca, durch ihren scharfen, und der Agaricus fuscatus Linn. durch seinen bitterlichten Geschmak eine ähnliche Wirksamkeit erwarten läßt.

9) Blaugelber Täubling, Agaricus cyanoxanthus. Krapf a. e. a. O. Pl. VI. Abb. 1—6. Pl. VII. Abb. 1—7. Pl. VIII. Abb. 1. 2. 4. 7. 8.

Auch er kommt beiden vorhergehenden nahe, erregt Erbrechen, und hat weder Ring noch Samendeke; aber sein Hut ist blaßgelb oder röthlicht und am Rande bläulicht; seine Blättchen weislicht, und sein Strunk stielrund, kurz und voll.

---

t) Schäffer a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

10) Grünlichter Täubling, Agaricus virescens. Krapf a. e. a. O. Pl. IX. Abb. 6. 7. Pl. X. Abb. 1. 2. 3. 7.

Er kommt dem vorhergehenden sehr nahe, nur hat er einen klebrichten bunt-schäkigen oder schmuzig grünen Hut.

11) Täubling, Agaricus integer Linn. Bolton fung. 1. Pl. 1.

Er wächst allenthalben, aber immer nur einzeln in Wäldern, und kommt dem vorhergehenden sehr nahe, nur hat er einen purpurrothen Hut, und unzertheilte Blätter.

So wohl frisch als wann er einige Tage lang an freier Luft getroknet, oder gekocht, oder mit Oel und Pfeffer angemacht ist, selbst das Wasser, womit man ihn gekocht hat, erregt Brennen im Munde, und auf der Zunge, Niesen, Thränen, Drüken im Magen, Schwäche der Augen, Blähungen, Ekel, Neigung zum Erbrechen, wirkliches Erbrechen, heftige Bauchflüsse, Beängstigung, Schwindel, kalten Schweis, Unmachten, anhaltende Leibschmerzen und zuweilen den Tod g).

12) Stinkender Blätterschwamm, Agaricus graveolens, H. Ad. Schrader Spicileg. flor. german. Hannov. 8. P. I. 1794. S. 120.

Er wächst in den braunschweigischen Forsten zwischen abgefallenem moderndem Laube, ist milchweis, und riecht schwer und widrig, fast wie Ruprechtskraut.

Sein Strunk wächst meist aufrecht, etwa anderthalb Zolle hoch, und ist vest, sehr brüchig und mehlig, sein Hut

---

g) Krapf a. e. a. O. H. I. S. 10—12.

www.dlibra.wum.edu.pl

ist klebricht und flach gewölbt, seine Blättchen sind dünn, und stehen in einer doppelten Reihe ziemlich weit-aus einander.

Sollte ihn nicht sein Geruch verdächtiger machen, als andere Schwämme?

13) Schildförmiger Blätterschwamm, Agaricus clypeatus Linn. Schäffer a. e. a. O. Pl. 22. 23.

Er wächst in ganz Europa auf Waldwiesen, und hat weder Ring noch Samendeke, aber einen halbkugelförmigen zugespizten klebrichten Hut, weisse Blättchen und einen dergleichen langen und walzenförmigen Stiel. Auch er gehört zu den schädlichen h).

14) Gewurzelter Blätterschwamm, Agaricus radicosus. Bulliard herbier de la France. Pl. 160.

Er wächst im Herbst in Wäldern, und hat einen abscheulichen scharfen Geschmak.

Er hat eine spindelförmige zaserichte Wurzel, einen geschupten Strunk, mit einem Ringe, aber, ohne Samendeke, zahlreiche umberbraune und an ihrem Rande etwas sägenartig gezähnte Blättchen und einen gewölbten braunen und weis geflekten Hut.

15) Frühlingsschwamm, Agaricus vernus. Bulliard a. e. a. O. Pl. 108.

Er findet sich in Frankreich im Frühling in Wäldern, und ist ganz weis, von unangenehmem Geruch und Geschmak.

---

h) Puihn a. e. a. O. S. 169.

www.dlibra.wum.edu.pl

Er hat einen vollen ſtarken unten etwas bolligen Strunk mit Ring und Samendeke, zahlreiche getheilte Blättchen, und einen etwas feuchten, platten und in der Mitte eingedrükten Hut.

Wenn man ihn nur acht Minuten lang im Munde behält, erregt er ein Brennen, wie Pfeffer; ein Mann, der ihn nebſt ſeinem Kinde im Walde von Boulogne zu ſich nahm, in der Meinung, es ſeie der gewöhnliche Champignon, von welchem er ſich doch durch die Samendeke, den platten in der Mitte vertieften Hut und die getheilten beſtändig weiſſen Blättchen unterſcheidet, bekam davon das heftigſte Erbrechen, Bangigkeit und Unmachten, und beide ſtarben den andern Tag i).

16) Blutſchwamm, Agaricus ſanguinolentus, Bulliard a. e. a. O. Pl. 42.

Er wächſt bei Paris in Wäldern im Ernde- und Herbſtmonate, iſt ohne Milchſaft, und anfangs auch ohne Geruch, nimmt aber zulezt einen beslichen Geruch an, und hat einen ſo ſcharfen Geſchmak, daß er auf der Zunge brennt, und Blaſen erregt.

Er hat einen vollen Strunk, der ohne Ring und Samendeke, aber, ſo wie der trichterförmige Hut, blutroth iſt; ſeine Blättchen ſind brüchig, weislicht, einfach und an der Spize geſpalten, und hängen mit dem Strunke zuſammen.

17) Zuſammenſchnürender Blätterſchwamm, Agaricus ſtypticus. Bulliard a. e. a. O. Pl. 140.

---

i) Paulet Eſprit des journaux. 1788. VIII. Août. S. 363.

www.dlibra.wum.edu.pl

Er wächst immer, mehrere beisammen, auf faulem Holze, und schnürt, wenn er in Mund genommen wird, den Hals zusammen.

Sein Strunk sizt zur Seite, und ist breitgedrükt, und nach oben zu immer breiter ohne Ring und Samendeke; sein Hut ist blaßgelb und gleichsam mit Kleien bestreut; seine Blättchen beinahe zimtbraun.

18) Klebrichter Blätterschwamm, Agaricus viscidus Linn. Schäffer a. e. a. O. Pl. 36.

Er wächst in Wäldern im Herbst, und hat einen kurzen etwas diken und weissen Strunk, einen klebrichten aus einer matten Purpurfarbe in die braune spielenden Hut, und braune Blättchen, welche in eine matte Purpurfarbe spielen k).

19) Mistschwamm, Agaricus fimetarius Linn. Flor. danic. Pl. 834.

Er wächst im Herbst auf Mist und an Zäunen, und hat einen langen, weissen, holen Strunk, einen ei- oder glokenförmigen, schupichten oder zerschlissenen Hut, und dunkelgraue Blättchen, welche sich seitwärts schlingen, und zu einer schwarzen Feuchtigkeit zerfliesen l).

20) Halbkugelichter Blätterschwamm, Agaricus semiglobatus. Batsch Elench. fung. c. 141. f. 110.

Er hat einen glatten lederartigen, halbkugelichten, gelblichten Hut, einen beinahe eben so gefärbten undurchsichtigen

---

k) Puihn a. e. a. O. S. 168.

l) l'Ecluse hist. plant. II. S. 282.

www.dlibra.wum.edu.pl

in der Mitte gleichsam schwarz bereiften dünnen langen Strunk, auf welchem der Hut vest sizt, und zähe, häutige, aschgraue und dunkler gefletzte Blättchen, an welchen die grösern am Strunke vest sizen.

Der Genus dieser in einer verzinnten eisernen Pfanne geschmorten Schwämme erregte bei einem Vater und vier Kindern bald vorübergehenden Wahnsinn, Schwindel, Betäubung, Kälte, welche durch den Gebrauch von Brechweinstein, Ricinusöl, mit Wasser verdünnten Essigs, flüchtigen Laugensalzes, und (bei einigen) von Blasenpflastern gehoben wurden [11]).

Sollte wirklich auch der Genus der Champignons Agaricus campestris Linn. Bulliard a. a. O. Pl. 134. gefährliche Zufälle verursacht haben [12])?

21) Agaricus pileolo campanulato in centro depresso, lamellis tenuibus, petiolo sulcato gracili. Fungus mediae magnitudinis totus albus.

Dieser Schwamm ist milchweis, von mittlerer Grösse, und etwas klebricht. Sein Hut hat einigermassen die Gestalt einer Gloke, nur daß er in der Mitte vertieft ist. Sein Stiel, der einige Risse hat, wie auch die Blättchen, sind dünn. Durch diesen Schwamm wurde zu St. Germain eine

---

11) Eb. Brande physisch-medicinisches Journal. Leipzig 8. Merz 1801. n. 7. S. 195—200.

12) J. Ant. Dardana in agaricum campestrem veneno in patria infamem acta ad amicis. Victorium Picum Augusta Taurin. 1788. 8. S. 32.

www.dlibra.wum.edu.pl

ganze Haushaltung vergiftet, und konnte kaum noch vom Tode errettet werden m).

22) Pfifferling, Mericlius Cantharellus. Schäffer a. a. O. Pl. 82.

Er hat einen angenehmen Geruch, und eine dottergelbe Farbe, einen vollen stielrunden nach oben zu breiteren Strunk, wenn er älter wird, einen vertieften, am Rande wollenförmig aufgeworfenen und in Lappen getheilten Hut, und statt der Blättchen am Stiel herablaufende etwas krause Adern.

Er wächst in ganz Europa auf Wiesen und in Wäldern im Ernde- und Herbstmonat häufig, und erregt, wenn er genossen wird, heftige Leibschmerzen, und Durchfall n).

23) Gelbe Kuhpilsen, Boletus luteus Linn. Schäffer a. e. a. O. Pl. 114. 115.

Sie wachsen in ganz Europa häufig in Wäldern, riechen ganz schwach nach Schwefel, und sind schleimig und ohne Geschmak. Ihr Stiel hat einen Ring, ihr Hut ist klebricht, wie ein Polster gewölbt und hoch gelb, und die Röhrchen, womit er auf der untern Fläche besezt ist, gerundet, gewölbt, und gleichfalls hochgelb.

Sollten sie hieher gehören o)? Zeviani will auf ihren Genus bei sechs Menschen eine sehr gefährliche Ruhr wahrgenommen haben o*).

---

m) Monnier Memoires de l'Academ. des sciences à Paris pour l'ann. 1746.

n) Puihn a. e. a. O. S. 166.

o) Ebendersf. a. e. a. O. S. 170.

o*) a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

24) Ausgeschweifter Stachelschwamm, Hydrum repandum Linn. Flor. dan. Pl. 310.

Er wächst in Wäldern an öden Stellen, ist blaßgelb, und schmekt zwar anfangs nicht unangenehm, aber hintennach scharf und widrig; sollte er dadurch eine Stelle unter den Giften verdienen p)?

Er hat einen nach unten zu dikeren Strunk, und einen gewölbten fuchsrothen Hut, der auf seiner untern Fläche mit weissen pfriemenförmig zugespizten Fasern besezt ist.

25) Wilde Morcheln, Phallus impudicus Linn. Flor. dan. Pl. 175.

Sie wachsen in ganz Europa in Wäldern, schmeken scharf, und geben, wenn sie zerfliesen, einen abscheulichen Geruch von sich q).

Ihr Strunk hat zu unterst eine Samendeke; ihr Hut hat die Gestalt eines Kegels, und ist auf der untern Fläche glatt, auf der obern mit nezförmig in einander laufenden Zellen besezt, am Rande fein gekerbt, und am Gipfel durchstochen.

26) Mokusin, Phallus Mocusin Linn. Act. Acad. Imper. Petropol. B. XIX. Pl. 5.

Er wächst in Schina bei Peking auf den faulen Wurzeln und verwesenden Blättern des Maulbeerbaums, verwelkt schon in den ersten 12 Stunden seines Lebens und geht dann in Fäulung.

Er

p) Puihn a. e. a. O. S. 170.

q) Ebendersl. a. e. a. O. S. 171.

www.dlibra.wum.edu.pl

Er hat einen fünfekigen Strunk, und an der Wurzel eine Samendeke; sein Hut hat mit demjenigen der Morcheln Aehnlichkeit, ist aber spizig und in fünf zusammenstosende Lappen getheilt.

27) Gemeiner Bovist, Lycoperdon Proteus, Bulliard a. a. O. Pl. 32.

Er wächst auf unfruchtbaren Feldern, und ist glatt, rundlicht oft wie eine Birne, reisst in Lappen, und hat einen sehr kurzen Strunk, ein weisses Fleisch, und schwarze staubförmige Samen, welche an Fäden, und durch diese mit den innern Wänden des Behälters zusammen hängen.

Dieser Samen erregt, wenn er in die Nase gezogen wird, heftiges Niesen und Bluten aus der Nase, wenn er in die Augen geblasen wird, Entzündung r).

28) Warziger Bovist, Lycoperdon verrucosum Linn. Bulliard a. c. a. O. Pl. 22.

Er wächst in ganz Europa auf unfruchtbaren Feldern, und weicht von dem gemeinen nur darinn ab, daß er auf seiner Oberfläche Warzen hat.

Auch seine Samen erregen, wenn sie in die Nase und an die Augen kommen, Entzündung dieser Theile, und sollen verschlukt ein wahres Gift sein s).

29) Sternförmiger Bovist, Lycoperdon stellatum Linn. Flor. danic. Pl. 360.

Er wächst auf Hügeln und in Wäldern, und kommt dem gemeinen nahe, hat aber eine offen-stehende, in viele

---

r) Ebendersf. a. c. a. O. S. 172.

s) Ebendersf. a. c. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

ungleiche Lappen getheilte Samendeke, und ein kurz gestieltes Köpfgen mit gezahnter und scharf zugespizter Mündung.

Seine Samen haben einen schweren unangenehmen Geruch, und sollen den Augen sehr gefährlich sein t).

Sollten wohl auch andere Arten dieser Gattung hier eine Stelle verdienen? Die Analogie läßt es vermuthen, aber ich kenne keine Beobachtungen darüber.

30) Gitterschwamm, Clathrus cancellatus Linn. Bulliard a. e. a. O. Pl. 441.

Er wächst im mittägigen Europa, ist purpurroth, ohne Strunk und rundlicht, und hat durch fleischige Zwerge, welche sich mit einander vereinigen, das Ansehen eines Gitterwerks.

Sein Genus soll ein Frauenzimmer beinahe getödet haben, das nur noch durch Milch gerettet wurde u).

Wohin gehört wohl der Schwamm, der in der Provence Courgoumeou heißt? In einer Brühe zugerichtet tödete er zwei Kinder, deren Eltern noch durch ein Brechmittel gerettet wurden x).

---

t) Ebenders. a. e. a. O.

u) Memoires de la Societé de medecine à Paris pour l'ann. 1776.

x) Darluc a. a. O. III. S. 331.

www.dlibra.wum.edu.pl

IV.

Lähmende Pflanzengifte.

Die Gifte dieser Abtheilung wirken nur langsam, und sind von den vorhergehenden eben so verschieden, wie die lähmenden giftigen Dünste von den übrigen. Ihre Anzahl ist sehr gering; vielleicht wirken aber auch die andern, wenn sie in geringerer Menge genommen werden, wie die Gifte dieser Abtheilung; wenigstens sollte ich dieses von der zwoten und dritten Abtheilung vermuthen.

1) Platterbsen.

Diese Sommergewächse sind vornemlich in Spanien zu Hause, werden aber in Frankreich, in Mömpelgart, und in der Schweiz gebaut; ihre Stengel schlingen sich durch Gabeln, welche wenigstens mit zwei Blättchen besezt sind, an den benachbarten Körpern hinauf; ihre Blätter sind gepart, ziemlich gros, breit und oval; ihre Blumenstiele sind stark und kurz, stehen in den Winkeln der Nebenblättchen, welche fein gezakt sind, und tragen immer nur eine Blume; diese ist ziemlich klein und hat zehen Staubfäden, von welchen neun mit ihrem untern Theile in eine Scheide zusammengewachsen sind, die den Staubweg umgiebt, der zehende aber einzeln steht; über sie ragt in der Mitte der Griffel hervor, welcher platt, und oben weichhaarig ist, nach oben zu breiter wird, und eine feinhaarige Narbe trägt; ihr Kelch hat etwas von der Gestalt einer Gloke, und ist in fünf Abschnitte gespalten, von welchen die zween obern dichter beisammen stehen und

www.dlibra.wum.edu.pl

kürzer sind, als die untern; die Krone besteht, aus vier Blättchen von ungleicher Gestalt und Größe; das obere ist das größte; es ist flach ausgebreitet, und seicht ausgeschnitten, und macht mit den übrigen einen geraden Winkel; die Seitenblättchen sind oval, und haben unten einen kleinen Ansaz; das unterste Blättchen ist kürzer und unten entzwei gespalten; sie hinterlassen flache, breitgedrükte oval-länglichte Hülsen, welche mehrere eckige Samen in sich halten.

α) Purpurrothe Platterbse, gezogene Platterbse mit purpurrother Blüthe. Lathyrus Cicera Linn. Besler a. a. O. Aestiv. Ord. VI. Fol. X. f. 2.

Sie hat an ihren Gabeln nie mehr, als zwei Blättchen; ihre Blumen eine blutrothe Krone, und ihre Hülsen auf dem Rüken der Länge nach eine Rinne.

Nach den Wahrnehmungen eines Binninger und Duvernoi y) erregt der häufige Gebrauch der Samen bei Männern eine Steifigkeit in den Gelenken der Füse mit einem Hinken.

β) Zahme Platterbse, Lathyrus sativus Linn. Curtis Botan. Magaz. Pl. 115.

Sie wächst auch in Frankreich wild, und hat an ihren Gabeln oft auch vier Blättchen, eine blaue Blumenkrone, und an ihren Hülsen auf dem Rüken, der Länge nach einen gedoppelten Rand.

---

y) G. D. Duvernoi Diss. de Lathyri quadam venenata specie in Comitatu Montbelgardensi culta. Basil. 1770.

www.dlibra.wum.edu.pl

Hr. D. Hirzel z), Ott. Targioni Tozzetti a) und andere b) sahen auf den Genus derselbigen im Brod bei ganzen Haushaltungen Lähmung der Schenkel oder Kniee erfolgen.

2) Erven, Ervum Ervilia Linn. Plenk Plant. offic. Pl. 566.

Dieses Sommergewächs ist in den Morgenländern, auch in Italien und Frankreich zu Hause.

Seine Blätter sind ungleich gefiedert, und ohne Gabeln, seine Blumenstiele tragen gewöhnlich zwo Blumen; diese haben zehen Staubfäden, von welchen einer einzeln steht, die übrigen aber mit ihrem untern Theile in eine Scheide zusammengewachsen sind, welche den Staubweg umgibt; dieser hat einen wellenförmig gefalteten Fruchtknoten; ihr Kelch ist in fünf ziemlich gleiche Abschnitte getheilt, und beinahe so lang, als die Krone; diese besteht wie bei der Platterbse, aus vier ungleichen Blättchen; seine Hülsen hängen unter sich, sind inwendig nicht in Fächer getheilt, und enthalten viele Samen, welche stark hervorragen.

Seine Samen sollen Hühnern tödlich sein, und Pferde, welche sie mit der ganzen Pflanze fressen, lähmen c); auch Menschen soll ihr Genus im Weizenbrode die Beine so schwächen, daß sie ohne Stüze nicht mehr aufrecht gehen können d).

---

z) Linguet und Tissot über das Getreid und Brod, aus dem Französischen nebst der Geschichte einer giftigen Art Erbsen von dem Uebersezer. Zürich 1780. 8.

a) Memor. sulla cicerchie. Firenz. 1793. 8.

b) Atti della Società économica di Firenze. B. II.

c) Puihn a. e. a. O. S. 136.

d) Atti della Società économ. di Firenze. B. II.

www.dlibra.wum.edu.pl

V.

Auszehrende Gifte.

1) Sinnpflanze, Mimosa.

Diese Bäume sind in Brasilien zu Hause, und voll Stacheln; ihre Blätter sind gepaart und einfach gefiedert, und die Blättchen legen sich auf jeden Reiz an dem gemeinschaftlichen Blattstiele an; ihre Blumen haben keine Krone, aber Staubfäden: einige keine, andere auf dem gleichen Baume einen Staubweg, und diese hinterlassen eine breitgedrükte Hülse.

α) Mimosa sensitiva Linn. Trew Plant. select. Pl. 45.

Ihre Blättchen stehen immer zu zwei Paaren, von welchen die innersten die kleinsten sind; ihre Blumen haben fünf Staubfäden, und einen Kelch mit fünf Zähnen. Schon H. A. Otto e) erzählt, daß daraus ein schleichendes Gift bereitet werde, und Rottböll f), daß das Pulver oder der Saft davon, wie nachdem sie in verschiedener Menge genommen werden, schneller oder langsamer töden, daß sie daher Bösewichter unter die Speisen mengen, um bei wiederholtem Gebrauche zuerst Schärfe der Säfte, nachher Auszehrung zu

---

e) Diss. de arte pharmaceutica medico necessaria. Hal. 1744. 4. S. 20.

f) Act. litterar. univers. Hafnienf. B. I. 1778. n. VI. S. 303.

www.dlibra.wum.edu.pl

bewirken, so daß die unglüklichen Schlachtopfer dieser Bosheit traurig und keuchend umher wandeln, und zulezt den Tod wünschen.

β) Mimosa pudica Linn. Commelin Hort. Amstelaed. I. Pl. 29.

Ihr Stamm ist mit steifen Borsten besezt; ihre Blätter beinahe gefingert; ihre Blumen haben einen trichterförmigen Kelch, welcher in drei Abschnitte gespalten ist, von welchen einer breiter ist, und vier aufrechte fadendünne Staubfäden, welche sechsmal länger sind, als der Kelch, und die Zwitterblüten einen rundlichten Fruchtknoten mit einem pfriemenförmigen Griffel, der etwas kürzer ist, als die Staubfäden, und eine spizige Narbe.

Auch aus ihren Zweigen und Blättern sollen die Eingebohrnen Brasiliens ein schleichendes Gift bereiten g).

2) Caruna.

Ich behalte hier mit Vorsaz den Namen meines Schriftstellers bei, weil ich es nicht wage, nach seiner Beschreibung mit Zuversicht zu entscheiden, welchen Namen diese Pflanze bei Linné führt, ob ich gleich nicht ganz ungegründete Vermuthungen habe, daß sie unter die Gattung des Schellenbaums (Cerbera) gehöre, oder nahe damit verwandt sei.

Die Nachrichten, die ich hier anführe, sind ganz von Bancroft h) entlehnt.

Es ist ein kleiner Baum oder eine Staude mit einer dünnen, braunen Rinde, und kleinen, ovalen und hellgrünen

g) Puihn a. e. a. O. S. 163.

h) a. a. O. S. 97. u. f.

www.dlibra.wum.edu.pl

Blättern. Seine Blumen stehen an dem Gipfel der Zweige, und haben eine röthlichte Farbe. Die Nüsse, die darauf folgen, gleichen, wenn sie ihre äusere hülsichte Bedeckung verloren haben, nach ihrer Gestalt den amerikanischen so genannten Elephantenläusen: sie sind ungefähr zehen Linien lang, und in der Mitte ungefähr fünf, nach beiden Enden zu aber nur vier Linien, im Durchmesser stark, an der Spize krümmen sie sich etwas einwärts. Jede Nus hat eine harte braune Schale von vier Stüken, die zur Seite der Länge nach mit einander vereinigt sind; aber die kreisrunde Nath der Länge nach ist beträchtlich näher an dem einen, als an dem andern Ende, und macht dadurch Raum zu einer Höle nach dem Ende zu, welches von dieser Nath am weitesten entfernt ist. In dieser Höle ist ein mehliger, etwas ölichter, Kern, von der Gröse einer Haselnus. Das Innere dieses Kerns ist ein langsames, aber tödliches Gift, und man sagt: es sei eines von den vornehmsten Stüken zu der Mischung eines weissen mehlichten Giftes bei dem Stamme der Indianer, der sich Akkawau schreibt, welches sie zuweilen bei ihren Zusammenkünften unter ihren Nägeln verbergen, wenn sie im Sinne haben, ein erlittenes Unrecht zu rächen, bis sich eine Gelegenheit zeigt, es dem bestimmten Schlachtopfer dieser geheimen und langsamen, aber tödlichen Rache, in das Getränk zu bringen. Man nimmt die Schale dieser Nüsse von dem Kerne, scheurt sie sorgfältig mit Asche, um sie von allen schädlichen Eigenschaften zu reinigen, bindet sie dann an Schnüre, und hängt sie den indianischen Tänzern bei ihren Feierlichkeiten um die Knöchel. Aber die Indianer sind ausserordentlich besorgt, ihre Speisen nicht zu berühren, so lange sie mit diesen Schalen umgehen, auch selbst nachher nicht, ehe sie nicht ihre Hände rein gemacht haben.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sollte vielleicht hieher das Gift gehören, dessen las Santas i) gedenkt? Die Weiber im südöstlichen Theile von Afrika sollen es gebrauchen, um Kinder abzutreiben; es soll aber, wenn sie es nicht durch Beischlaf verpflanzen, sie selbst verzehren, und der Mann, dem sie es einimpfen, sogleich an den Theilen, womit er gesündigt hat, Schmerzen empfinden, und seinem Tode nicht entrinnen, wenn er nicht am gleichen Tage den Saft eines gewissen Krautes zu sich nimmt.

Auch bei diesen beiden lezten Abtheilungen von Giften leisten Brechmittel die besten Dienste, wenn man vermuthen kann, daß sie das Gift noch in dem Munde antreffen, und man zugleich ihre Wirkung durch fleisiges Trinken lauer, wässerichter, schleimiger und ölichter Getränke unterstüzt; auch dann, wenn die ersten ihre Wirkung gethan haben, den Gebrauch der lezten eine Zeit lang fortsezt, und sie mit dem etwas anhaltenden Gebrauche gelinde abführender Mittel verbindet.

i) Bei Purchas a. a. O. II. S. 1554.

www.dlibra.wum.edu.pl

Zweite Abtheilung.

Pflanzengifte, welche nur dann schaden, wenn sie durch eine Wunde unmittelbar mit dem Blute vermischt werden.

Hieher gehören beinahe alle Pfeilgifte, welche bei mehreren ältern Völkerschaften aller Welttheile im Gebrauche waren, zum Theile noch sind, und zu der griechischen in der Folge auf alle Gifte ausgedehnten Benennung τοξικον Anlas gegeben haben; denn nur einige unter ihnen, welche daher unter der folgenden Abtheilung vorkommen werden, wirken auch, wenn sie verschlukt werden, gefährlich.

Alle diese Gifte lösen das Blut ungemein auf, und zeigen überhaupt in Absicht auf ihre Wirkungen, in so ferne sie in die Sinne fallen, so viele Uebereinstimmung mit Schlangengift, daß man beinahe muthmasen sollte, die Mittel, welche gegen das Schlangengift nüzen, würden auch hier gute Dienste leisten; auch wirken sie gemeiniglich schnell, doch töden sie oft unvermerkt; zuweilen gehen Bangigkeiten, Zittern und Zukungen, und auf diese die Lähmung einzelner oder mehrerer Theile voran k).

Daß sie gerade durch die auflösende Wirkung, welche sie auf das Blut äusern, tödlich werden, möchte ich inzwischen nicht behaupten; es läßt sich wenigstens kaum denken, daß

k) Herissant Philosophic. Transact. B. XLVII. S. 81.

www.dlibra.wum.edu.pl

eine so geringe Menge eines solchen Saftes, die vielleicht zuweilen kaum einen halben Gran beträgt, mit vierzig Pfunden Blut vermischt, in weniger als einer Minute die Mischung desselbigen und den Zusammenhang seiner Theile so ändern sollte, daß blos diese Veränderung den Untergang des Ganzen nach sich ziehen sollte. Geschieht ihre Wirkung auf die Nerven, und greift sie die Quelle des Lebens selbst an, warum wirken sie durchaus nicht durch ihre Ausdünstungen? auch nicht, wenn sie hinuntergeschlungen werden, da sie doch auf diesem Wege dem gemeinschaftlichen Sitze der äuserlichen und innerlichen Sinne viel näher sind, und, ohne sich vorher mit einem so grosen Uebermase von Säften zu vermengen, auf mehrere Nerven unmittelbar wirken können? Warum wirken sie nicht anders, als wenn sie sich unmittelbar mit dem Blute vermischen, und sind selbst dann nicht einmal tödlich, wenn die Wunde nicht blutet? Warum erregte ein Dolch mit solchem (amerikanischen) Gifte bestrichen, der schon zehen Jahre in Teutschland gewesen sein mochte, auf eine warme schwizende Hand gebracht, noch Geschwulst und Geschwüre, welche erst nach einem Vierteljahre heilten l)? Bisher kennt man noch kein Gegengift, welches gegen diese Gifte zuverläsige Hülfe leistete. In der That wirken sie auch zu behende, als daß es wahrscheinlich wäre, daß Mittel, die man durch den Mund zu sich nimmt, ihren tödlichen Wirkungen zuvorkommen könnten. Condamine gibt zwar m) Salz und Zuker, als untrügliche Gegengifte an; allein mit

---

l) Göze zweite kleine Harzreise. S. 311. Dritte S. 196.

m) Relation abrégée d'un voyage fait dans l'interieur de l'Amerique meridionale &c. à Paris 1745. S. 68.

www.dlibra.wum.edu.pl

dem ersten hat man bisher noch nicht Versuche genug gemacht, um seine Kräfte unwidersprechlich zu erweisen n), und Zuker, oder vielmehr der Saft des Zukerrohrs, den auch die Europäer in Gujana für das beste Gegengift des Akkawanagiftes halten, hat doch bei mehreren Versuchen an Thieren die Erwartung der Beobachter getäuscht o). Auch die Regenwürmer, welche die Karaiben essen, um sich gegen seine Kraft zu schützen o*), lassen nicht viel erwarten. Schon die Celten sollen gegen ihr Pfeilgift Eichenrinde p); die Einwohner von Futa in der Nähe des Gambia, ein Kraut, das

---

n) Auch die wenigen Versuche, welche Herissant a. a. O. S. 85. damit an Vögeln gemacht hat, beweisen eher das Gegentheil.

o) Bei einem Versuche, welcher zu Leyden in Winter in Gegenwart einiger Aerzte angestellt wurde, wirkte er (Condamine a. a. O. S. 209.) nichts, auch bei einem Huhne, bei welchem es Condamine (a. e. a. O.) selbst versuchte, nichts, eben so wenig bei drei andern Vögeln (Herissant a. a. O. S. 85) und bei zween andern Brocklesby ebendas. B. XLII. Th. 2. S. 411.

o*) Nach einem Ungenannten H. Präs. von Schreber Naturforscher St. XIX. Halle 1783. 8. S. 145.

p) Aristoteles περὶ θχυμχσνου ἀκουσματων. Opp. Edit. du Val. II. S. 724. "Εὑρηθχι δε τουτῳ (Φαρμακῳ) λεγουσιν ἀντι Φαρμακον, τον της δρυος Φλοιον· οἱ δ' ἑτεροντε Φυλλον, ὁ καλουσι κορακιον, δια το κατανοηθηναι ὑπ' ἀυτων κορακα, γευσαμενον το Φαρμακον; και κακως διατιδεμενον ἐπι το Φυλλον ὁρμησαντα τουτο, και καταπιοντα, παυσαντος της ἀλγηδονος.„

sie sogleich auf die Wunde legen q); so die Portugiesen in der Gegend von Rio Nongue an der Abendküste ein Salz, das im Geschmak dem Alaun nahe kommt, zu einem Quintchen in warmem Wasser aufgelößt, äuserlich oder innerlich r) gebraucht haben.

Eines solchen Pfeilgiftes, das sehr schnell wirkte, bedienten sich mehr zur Erlegung des Wildes als zum Tödten von Menschen, nach Aristoteles s) die Celten; auch Strabo beschreibt einen in Frankreich wachsenden Baum, der nach seiner Beschreibung einem Feigenbaume, und in seinen Früchten den Kornelkirschen gleiche, dessen Saft damals zum Vergiften der Pfeile gebraucht wurde; auch Ammianus Marcellinus gedenkt t) eines mit einem Kraute getränkten Oeh-

---

q) New Collection of voyages &c. for Astley &c. B. II. S. 239. b.

r) Ebendas S. 114. a. b.

s) Aristoteles a. e. a. O. "Φασὶ δε παρα τοις κελτοις φαρμακον ὑπαρχειν το καλουμενον ὑπ' αὐτων τοξικον· ὁ λεγουσιν οὑτω ταχειαν ποιειν την φθορην, ὡστε των κελτων τους κυνηγουντας, ὁταν ἑλαφον ἡ ἀλλο τε ζωον τοξεύσωσιν, ἐπιτρεχοντας ἐκ σπουδης ἐκτεμνειν της σαρκος το τετρωμενον, προς το φαρμακον μη διαδουναι, ἁμα μεν της προσφορας ἑνικα, ἁμα δε ὁπως μη σαπη το ζωον."

t) L. XXIII. C. VI. S. 289. "In hac regione oleum conficitur medicum, quo illitum telum si emissum lentius laxiore arcu (nam ictu exstinguitur rapido) haeserit usquam tenaciter cremat: et si aqua voluerit abluere quisquam, aestus excitat acriores incendiorum, nec remedio ullo quam jactu pulveris consopitur. Paratur autem hoc modo. Oleum usus

les, womit Pfeile bestrichen werden; werden solche Pfeile aus einem nicht zu sehr gespannten Bogen geschleudert, so brennen sie, wo sie hängen bleiben, heftig, und will man mit Wasser helfen, so wird die Hize noch heftiger, und läßt sich mit nichts stillen, als wenn man Staub darauf wirft.

In Butan gebrauchen die Einwohner als Pfeilgift einen bis zum Teig eingedikten Saft, der zwar stechend scharf schmekt, und die Entzündung vermehren, auch eine schlimme oder vernachläßigte Wunde tödlich machen kann, aber, wenn man die Wunde rein hält und erweitert, nicht tödlich ist u).

Die Räuber zwischen Tigremahon und Angote in Abyssinien gebrauchen ein Pfeilgift x); auch bei Bombian an der Sklavenküste vergiften die Schwarzen ihre Pfeile mit dem Safte eines Krautes y); als 1447 Nunno Tristan sechzig Meilen jenseits des grosen Vorgebirges an der Mündung des Flusses landete, und in seinem Bote den Flus hinauf fuhr, wurde er von den Schwarzen so sehr mit vergifteten Pfeilen verfolgt, daß die meisten seiner Reisegefährten todt waren, ehe sie wieder zu dem Schiff kommen konnten, und

---

communis herba quadam infectum condiunt harum rerum periti, ad diuturnitatem servantes, et coalescens durant ex materia venae naturalis similis oleo crassiori: quae species gignitur apud Persas, quam naphtham vocabulo appellaverunt gentili.„

u) Saunders Philosoph. Transact. B. LXXIX. for the Year 1789. Th. I. S. 89.

x) P. Alvarez bei Ramusio navigazioni e viaggi. Venet. fol. B. I. S. 188.

y) Carli Reise nach Congo 1667. S. 566.

www.dlibra.wum.edu.pl

er selbst an seinen Wunden starb z); am Gambia, wo sich die Schwarzen eines schwarzen Pfeilgiftes bedienen, das aber, so wie in der Meinung dieser Schwarzen, jedes andere, sein Gegengift hat a), vornemlich aber im Königreiche Fura b) werden die Pfeile in den Saft eines gewissen Baums getaucht, der Menschen und Thiere, wenn sie davon verwundet werdet, sinn- und gefühllos macht, doch so, daß Thiere, welche damit getödet sind, ohne Gefahr gespeist werden können; auch den gelben Kern eines grosen und schlanken in den Wäldern von Sierra Leona wachsenden einer Büche ähnlichen Baums, der in einer sehr harten Schale einer viereckigen Bohne liegt, dergleichen sich vier bis fünf in einer Hülse befinden, gebrauchen die Schwarzen dieses Erdstrichs zum Vergiften der Pfeile c); vornemlich bedienen sich die Einwohner des mittägigen Amerika, und insbesondere diejenigen von Gujana solcher Pfeilgifte, welche bei Menschen, die sie treffen, Blutverlust, Mundsperre d), zuweilen Raserei, und ein Ausfallen der Gedärme, welche so schwarz und stinkend sind, daß sich den Unglüklichen niemand nähern kann, und Tod verursachen, und gegen welche die Einwohner auch auf

---

z) De Faria y Sousa 4. Asia Portugueze. B. I. K. 1.

a) Fr. Moore travels into the inland parts of Africa in New Collection of voyages &c. B. VI. S. 314.

b) New collection of voyages for Astley &c. B. II. 1745. S. 239. b.

c) Ebendas. S. 306. b.

d) Zehen Tage, ehe sie starben F. Hawkins (1568) bei Hakluyt Principal navigations, voyages, traffiques and discoveries of the english nation. London. fol. 1600. B. III. S. 521.

www.dlibra.wum.edu.pl

der Folter, auf die sie von den Spaniern gespannt wurden, kein Gegengift anzeigen wollten e).

Hauptsächlich bereitet sich ein Stamm von Eingebohrnen, der sich Waquayu nennt, von andern aber Arkawahs oder Aquaijen genennt wird f), ein solches sehr wirksames Pfeilgift aus der Rinde von fünf Gewächsen, die sie zart schaben, eine Viertelstunde lang bei schwacher Hize sachte kochen, den Saft behutsam, daß nemlich ihre Haut unverlezt ist, mit den Händen ausdrüken, und ihn, nachdem sie die übrige Rinde hinweggeworfen haben, bei schwacher Hize zur Dike des Theers einkochen, dann, nachdem sie ihn vom Feuer genommen haben, flache Stüke vom Holze des Kokarito (Bactris major) darein tauchen, an welchen das Gift, wenn es kalt ist, hängen bleibt, und einem braunröthlichten Harze ähnlich sieht; diese Stüke Holz verwahren sie in breiten holen Röhren, welche an beiden Enden mit Leder verschlossen sind, und wollen sie etwas von dem Gifte gebrauchen, so legen sie es entweder in Wasser, oder halten das Holz über das Feuer, bis das Gift schmelzt, und schmieren die Spize des Pfeils damit ein.

So zubereitet schmelzt dieses Gift in der Hize, und löst sich beinahe in allen Flüssigkeiten auf; es zeigt in keinem Ver-

---

e) Walt. Raleigh ebendas. S. 639.

f) Ein Ungenannter bei Schreber a. e. a. O. S. 143. Zween andere Völkerstämme die Worrows oder Warrauen, und die Arrowaks oder Arrawaken sezen noch andere Dinge, welche aber die Wirksamkeit des Giftes nicht andern, die lezten sogenannten spanischen Pfeffer und Zähne und Leber von giftigen Schlangen zu.

www.dlibra.wum.edu.pl

Versuche weder mit Laugensalz, noch mit Säure Aehnlichkeit, und wird von dieser nicht verändert, nimmt aber von jenem eine gelblichtbraune Farbe an, schmekt bitter, und ausnehmend brennend oder beissend, und verhindert, wenn auch nur wenige Grane davon mit mehreren Lothen Menschenblut so warm, als es aus der Ader kommt, vermischt werden, das Gerinnen desselbigen und das Absondern des Blutwassers g).

Hinunter geschlungen h) oder äuserlich auf die Haut geschmiert i), schadet das Gift, wenn sie anderst ganz unverlezt ist, nichts, auch kann man Thiere, welche mit denen damit vergifteten Pfeilen getödet sind, ohne Gefahr speisen, wenn nur die Theile, welche das Gift unmittelbar berührt, ganz unverlezt sind k). Wenn aber das Gift in einer kaum sichtlichen Menge durch einen vergifteten Pfeil oder auch andere Weise durch eine Wunde unmittelbar mit dem Blute vermengt wird, tödet es Menschen l) und Thiere m), zuweilen ohne alle vorhergehende Zeichen einer innerlich erregten Unordnung, manchmal erregt es noch vor Verlauf einer Minute einige Zukungen, schon wenn es durch eine Wunde der lymphatischen Gefässe unmittelbar mit dem Blutwasser vermischt wird, erregt es starke Entzündung mit schreklicher Geschwulst, die sich bald auch über andere Theile verbreitet,

---

g) Bancroft a. a. O. S. 99. ꝛc. 283.

h) Ebenderſ. a. a. O. S. 302.

i) Ebenderſ. a. e. a. O.

k) Ebenderſ. a. e. a. O.

l) Ebenderſ. a. e. a. O. 289.

m) Ebenderſ. a. e. a. O. vornemlich Meerkazen. S. 306.

www.dlibra.wum.edu.pl

und mit allen Zufällen eines Entzündungsfiebers begleitet ist n).

Die meisten Pflanzen, von welchen dieses Gift bereitet wird, gehören zu den Buschtauen (Nibbihs der Engländer, Lianen der Franzosen, Bejucos der Spanier).

Sie sind alle, sagt Bancroft, gleichsam ein hölzernes Strikwerk, von beträchtlicher Länge und verschiedener Gröse, von einem halben Zolle im Durchmesser, und bis zu achtzehen Zollen im Umfange. Sie sind in dem innern und höhern Theile des Landes äuserst zahlreich, wo man sie ganz ohne Blätter und Aeste bis auf die Gipfel der höchsten Bäume klettern sieht, von da sie wieder nach der Erde heruntersteigen, in derselben Wurzel fassen, und sich von neuem an dem nächsten Baume hinauf schlingen. So laufen sie oft in einer grosen Entfernung in schiefer, wagerechter und senkrechter Richtung, wie das Tauwerk an einem Schiffe, von einem Baume zum andern, wobei sie sich zuweilen unter einander verwirren, und dann die Stämme der benachbarten Bäume rund umzingeln, in einer Schnekenlinie an ihnen hinauf steigen, und sie durch bloses Zusammenschnüren tödten. Einige senken ihre Fasern in die Rinde anderer Bäume, und zerstören sie, indem sie denselben ihre Nahrung entziehen. Die grösern Arten dieser Buschtaue werden häufig gebraucht, um Lastschiffe vor Anker zu legen; die kleinern aber werden in kleine Bänder gespalten, und von den Eingebohrnen zu verschiedenen nüzlichen Absichten, vornehmlich um die Strohdä-

n) So erzählt Bancroft a. a. O. S. 303. 306. einen Fall, wo die Krankheit auch gänzlich wie ein Entzündungsfieber behandelt, und so glüklich geheilt wurde.

www.dlibra.wum.edu.pl

cher auf ihren Häusern zusammen zu binden, angewandt. Diese Buschtaue sind von verschiedener Art; diejenigen, welche rund sind, sind insgemein unschädlich; hingegen diejenigen, welche entweder platt oder wie eine Rinne ausgehölt sind, sind gemeiniglich Gifte von der schlimmsten Art. Von dieser Regel giebt es aber doch einige Ausnahmen. Das Gift verschiedener Gifttaue ist so wirksam und tödlich, daß viele Indianer sich scheuen, sie nur abzuschneiden; man erzählt sich sogar Fälle von Menschen, die von dem Spalten derselbigen mit dem Messer, oder weil ein solches Gifttau über der Hausthüre aufgehängt, oder unter der Hangmatte Feuer davon gemacht worden war, gestorben sind *).

Unter diese von den erwähnten Völkerschaften zu ihrem Gifte angewandte Buschtaue gehören:

1) Wurabi, Toxicaria americana bei Schreber a. e. a. O. S. 146. Rouhamon? bei Aublet a. a. O. I. S. 93. Pl. 36. Wooirara bei Bancroft a. e. a. O.

Dieser Baum treibt paarweise stielrunde, vom Baume selbst abstehende, braune, mit kurzen gelblichten Haaren bekleidete Aeste, die in etwa 13 Gelenke getheilt sind, und hat an diesen auf sehr kurzen oben ziemlich platten Stielen zween bis drei Zolle lange Blätter immer zwei einander gerade gegen über, welche eiförmig, doch gegen das äusere Ende zugespizt, am Rande ohne alle Einschnitte, auf beiden Seiten glatt, und auf der untern mit drei Ribben versehen sind; aus den Winkeln, welche sie mit den Aesten machen, kommen hier und da einzelne über zween Zolle lange aufrechte einfa-

*) Bei Schreber a. e. a. O. S. 157.

www.dlibra.wum.edu.pl

che feinhaarige nach oben zu sich verdikende an der Spize aber wieder dünnere und in eine einfache Schlangenlinie gerollte Gabeln; auch in diesen Winkeln (wenn anderst Aublet's Rouhamon diese Pflanze ist) sizen die Blumen in sehr kurz gestielten flachen Sträusen, deren immer zween einander gerade gegen über stehen; sie haben vier zu unterst haarige Staubfäden mit länglichten Staubbeuteln, einen eiförmigen Fruchtknoten, mit einem Griffel, der länger ist, als die Krone, und einer stumpfen Narbe, einen in vier spizige Lappen getheilten Kelch, der an der Grundfläche mit zwei Schüpchen besezt ist, und eine weisse aus einem zusammenhängenden Stüke bestehende Krone, deren Röhre walzenförmig und länger als der Kelch, und deren Saum in vier kurzhaarige und spizige Lappen gespalten ist, und hinterlassen ein gelblichtes kugelrundes trokenes Samengehäus, das inwendig nicht in Fächer getheilt ist, und zwei eiförmige, auf einer Seite platte, auf der andern gewölbte Samen in sich hat.

Die Rinde der Wurzel, welche braunroth und ungefähr so dik als ein Nagel am Finger ist, soll, wenn man daran lekt, schmeken, als wenn man Schiespulver auf der Zunge hätte, von ihr kommen zu dem nach ihr benannten Wuraragifte gegen zween Theile der nächst folgenden, und einen von jedem der drei übrigen sechs Theile.

Muthmaslich ist diese Pflanze in andern Gegenden des mittägigen Amerika unter dem Namen Curare bekannt, aus deren Wurzel ungefähr so, wie man in Europa die wässerichten Extrakte in Apotheken bereitet, die Caveneren am Orenoko ein Pfeilgift bereiten p).

---

p) P. Gumilla hist. naturelle de l'Orenoque. B. III. K. 37. 2) Gili Saggio di storia americana B. II. 3) Von

2) Warakabba kurru, Piper geniculatum. Schreber a. c. a. O. S. 150—152.

Diese Staude hat einen stielrunden gestreiften und gefurchten, rothbraunen Stamm, der in drei bis fünf Zolle lange, $\frac{3}{4}$ – $1\frac{1}{2}$ Linien dike Gelenke getheilt ist; ihre Blätter sizen auf sehr kurzen runden Stielen, alle in verschiedener Höhe; sie sind eiförmig, zum Theil länglicht-eiförmig, ohne Einschnitte am Rande, und mit einer langen Spize am Ende, auf beiden Flächen glatt und geadert, aber ohne Nerven, ihre Blumenähren kommen einzeln und den Blättern gegen über aus eiförmigen, doch etwas spizigen Scheiden, und stehen aufrecht, und wenn die Blüthen aufgegangen sind, sehr gerade; ihre Blumen haben kleine weislichte Staubbeutel, und zahlreiche vestsizende eiförmige Fruchtknoten. Sie schmekt nicht unangenehm gewürzhaft.

3) Kauranapai, Caraipa angustifolia (?) bei Aublet a. a. O. I. S. 561. Pl. 223.

Sie hat einen starken lange anhaltenden unangenehm gewürzhaften Geruch, etwa wie die Blumen der Nieswurz mit schwarzer Blüthe, ihre Aeste haben eine aschgraue runzelichte Rinde und treiben bald an dieser, dann wieder an der andern Seite aus einander laufende Zweige, welche mit dünnem rostbraunem Filze bekleidet sind; ihre Blätter sizen, alle in verschiedener Höhe, auf sehr kurzen runden, unten gefurchten, oben in die Quere gerunzelten mit rostbraunem Filze beklei-

---

Pauw de l'usage des flèches empoisonnées chez les peuples des deux continens. Recherch. philosophiq. &c. sur les americains B. II. Sect. 3.

www.dlibra.wum.edu.pl

deten Stielen; sie stehen von den Zweigen ab, und sind gros, neun Zolle lang, und drei Zolle breit, geadert ohne Einschnitt am Rande mit einer verlängerten feinen Spize, auf der obern Fläche glänzend und fattgrün, auf der untern blasser, ihre Blumen haben (nach Aublet) viele dem Fruchtboden einverleibte Staubfäden mit zweifächerichten Staubbeuteln, einen Staubweg, und einen in fünf Abschnitte getheilten Kelch, und hinterlassen ein trokenes beinahe dreiekiges Samengehäus, welches aus drei Schalenstüken besteht, inwendig in drei Fächer getheilt ist, und in jedem derselben einen Samen enthält.

4) Bikiti, Puteria gujanensis. Aublet a. a. O. I. S. 86. Pl. 33.

Dieser Baum wächst bis vierzig Schuhe hoch, hat eine runzlichte, rauhe, braungraue, säuerlichte Rinde, und treibt an der Krone nach allen Seiten gerade Aeste.

Seine Blätter sizen auf langen Stielen, alle in ungleicher Höhe, mehrere zusammengedrängt; sie sind eiförmig länglicht, aber spizig glatt, steif und ohne Einschnitt am Rande.

Seine Blumen sizen auf kurzen Stielen an den Zweigen und in den Winkeln der Blätter zwo bis drei beisammen; sie haben vier Staubfäden mit länglichten Staubbeuteln, einen eiförmigen kurzhaarigen vom Kelche umschlossenen Fruchtknoten mit einem viereiigen Griffel und einer vierspizigen Narbe, einen bleibenden in vier eiförmige doch spizige Abschnitte getheilten Kelch und eine grünlichte auch aus einem Stüke bestehende Krone mit einer kurzen Röhre, und vier spizigen Zähnchen am Rande, zwischen welchen eine länglichte

www.dlibra.wum.edu.pl

Borste steht; ihr Samengehäus ist troken und holzig, eirund, inwendig röthlicht und in vier Fächer abgetheilt, von ausen mit einer dünnen schwarzbraunen Rinde bekleidet, welche ganz dicht mit kurzen steifen Borsten besezt ist; ihre beiden Schalenstüke sind unten zusammen gewachsen und inwendig nach einem spizigen Winkel gestreift; in jedem Fache liegt ein länglichter nach ausen zu gewölbter, nach innen ekiger Same, der in ein dünnes purpurrothes Häutchen eingehüllt ist.

5) Hatibali.

Die Rinde dieses Baums hat weder Geruch noch Geschmak, theilt aber dem Wasser eine gelblichte nachher röthlicht-bräunlichte, dem stärksten Weingeist aber eine blässere Farbe mit; sie ist glatt und kaum etwas runzelicht, braunschwärzlicht mit vielen blos rothbraunen etwas vertieften Düpfelchen, inwendig zimtbraun mit vielem weislichten Harze q).

Sollte vielleicht hier das mit Gift getränkte Kleid, welches Dejanira Herkules schikte r), sollte die Prüfung (Belliprobe), welche unter den Quojas in Afrika üblich ist s), hier eine Stelle verdienen? Wenn nemlich unter diesem Volke jemand eines Verbrechens beschuldigt wird, das nicht erwiesen werden kann, so nimmt der Priester oder Belli-mo ein Gemisch von einer Baumrinde und Kräutern,

---

q) Schreber a. e. a. O. S. 155.

r) Diodor a. a. O. IV. S. 243.

s) New collection of voyages &c. for Astley. II. 1745. S. 540. a.

www.dlibra.wum.edu.pl

und legt es ihm auf die Hand; verbrennt es ihm plözlich die Hand, so erklärt man ihn für schuldig; thut es ihm aber keinen Schaden, so hält man ihn für unschuldig; manchmal läßt er ihn auch einen Trank aus der Rinde zwei dieser und unter die Gifte gezählter Bäume (Nelle und Quoni) trinken; ist er unschuldig, so erbricht er ihn sogleich wieder von sich, ist er es nicht, so bekommt er einen Schaum vor dem Munde.

Man erwarte nicht, daß ich hier diejenigen Körper anführe, welche durch Einsprüzen in die geöfneten Adern oft Thieren tödlich geworden sind. Ich kann mich nicht überwinden, das auf die Rechnung dieser Körper zu schreiben, was wahrscheinlicher Weise nur Wirkung der zugleich damit in das Geblüt eintretenden Luft, eine Folge der Gewalt, mit welcher das Einsprüzen gemeiniglich geschahe, und welche nothwendig eine nachtheilige Aenderung in dem Lauf der Säfte machen mußte, oder auch anderer Umstände gewesen ist.

www.dlibra.wum.edu.pl

Dritte Abtheilung.

Endlich gibt es natürliche Pflanzengifte, die so wohl, wenn sie hinunter geschlungen, als wenn sie durch eine Wunde unmittelbar mit dem Blute vermischt werden, unter den erforderten Umständen, den unvermeidlichen Tod bringen. Es ist wahrscheinlich, daß mehrere Pflanzen, als ich hier nennen werde, und mehrere von denen, welche bereits aufgeführt sind, vornemlich aus der Ordnung derer, die zugleich scharf sind, und betäuben, hier ihre Stelle verdienen; da mir aber darüber noch keine entscheidenden Versuche oder Beobachtungen bekannt sind, und vielmehr einige wenige das Gegentheil zu zeigen scheinen: so werde ich hier nur solcher gedenken, wo mir Wahrnehmungen, oder gegründete Vermuthungen zeigen, daß sie hier einer Stelle werth sind.

Die Zufälle, die ihr äuserlicher Gebrauch, wenn sie nemlich durch eine Wunde unmittelbar in das Blut kommen, verursacht, sind eben die, welche die Gifte der vorhergehenden Abtheilung erregen, und erfordern auch die gleiche Begegnung.

In Absicht auf die Zufälle, welche der innerliche Gebrauch bei Menschen verursacht, kommen einige mehr mit den scharfen Pflanzengiften überein, und erfordern also die gleiche Heilungsart; andere kommen den betäubenden Pflanzengiften näher, und erfordern also mit diesen die gleichen Gegengifte.

www.dlibra.wum.edu.pl

Erster Abschnitt.

Scharfe Pflanzengifte, die durch den innerlichen sowohl, als durch den äuserlichen Gebrauch tödlich werden.

1) Manchinellbaum, Hippomane.

Diese Bäume wachsen auf den karibäischen Eilanden, hauptsächlich an Orten, welche öfters überschwemmt werden; ihre Blumen zeigen sich in Käzchen, sind von getheilten Geschlechtern, und haben keine Krone; die männlichen einen entzweigespaltenen Kelch, und einen Staubfaden, auf welchem vier Staubbeutel sizen, die weiblichen haben einen in drei Abschnitte gespaltenen Kelch, und einen Fruchtknoten mit einer in drei oder mehrere Lappen getheilten Narbe, und hinterlassen eine dreikörnige trokene oder Steinfrucht.

α) Gemeiner Manchinellbaum, Hippomane Mancinella Linn. Jacquin stirp. Americ. pict. Pl. 238.

Er wächst in seinem Vaterlande so hoch, als unsere Eiche, und hat im Wuchse viele Aehnlichkeit mit dem Aepfelbaume. Sein Stamm hat eine glatte braune Rinde, und zuweilen zween Schuhe im Durchmesser, er theilt sich oben in viele Aeste, und hat ein schönes, weisses und dauerhaftes Holz; seine Zweige sind dik belaubt, und entspringen gemeiniglich drei beisammen; seine Blätter sizen auf eigenen und kurzen Stielen, die unten zwei kleine Drüschen haben, und

www.dlibra.wum.edu.pl

sind glänzend grün, an ihrem Rande seicht wie eine Säge gezakt, und in ihrem Umfange eiformig, nur daß sie sich in eine scharfe Spize verlieren. Seine Blumenkäzchen stehen in kurzen Aehren an der Speige, die Blumen haben insgesamt keine Krone; einige nur Staubfäden und keinen Staubweg, andere nur einen Staubweg und keine Staubfäden, bei jenen ist der Kelch, der unter der abfallenden Schuppe des Käzchens neben zwei kleinen Drüschen steht, entzweigespalten, und nur halb so lang, als der Staubfaden, der in seiner Mitte steht, bei diesen, welche gemeiniglich einzeln, oder doch nur wenige beisammen unten am Blumenkäzchen sizen, besteht der Kelch, der auch zwischen zwei Drüschen sizt, aus drei Blättchen, welche aber bald wieder abfallen; ihr Staubweg hat einen ganz kurzen Griffel mit einer vertieften Narbe, welche in drei, sechs oder mehrere Abschnitte gespalten ist. Nur die lezten hinterlassen eine Steinfrucht, welche einen süsen Geschmak, und in Geruch, Gestalt und äuserlichem Ansehen Aehnlichkeit mit einem Holzapfel hat, und in einem weissen Marke eine harte runzlichte Nus enthält, die inwendig in sechs bis zwölf Fächer getheilt ist, und in jedem derselbigen einen gleichsam wurmfrasigen aber nicht in allen einen vollkommen ausgebildeten Kern hat.

Dieser Baum ist in allen seinen Theilen, vornemlich aber in seiner Rinde und in dem Marke seiner Früchte voll eines äuserst scharfen Milchsaftes, der auf Leinwand Fleken, und, wenn sie gewaschen wird, an denselbigen Stellen, wo sie waren, Löcher macht; die Amerikaner behaupten sogar, daß Regen oder Thau, wenn sie von dem Baume fallen, auf der Haut Blasen ziehen; dieses geschieht inzwischen nur, wenn ein Blatt zerrissen und sich Regen oder Thau bei den

www.dlibra.wum.edu.pl

Herunterfallen mit seinem Safte vermischt haben t); so viel ist gewis, daß dieser Saft alle Theile des Leibes, welche er unmittelbar berührt, anfrißt und entzündet u), wenn er auf die Haut fällt, Blasen x), in den Augen aber Entzündung, und auf einige Zeit Blindheit y) verursacht; auch bereiten daraus die Karaiben ein Pfeilgift, dessen sie sich auf der Jagd und im Kriege bedienen z).

Wird der Saft oder die damit reichlich getränkte Frucht hinuntergeschlungen, so erregen sie brennende Hize in den Gedärmen, ein Aufschwellen des ganzen Leibes, kalte Schweise, Unmachten und Schwäche a), auch wohl manchmalen den Tod b), sogar die in dem Vaterlande dieses Baums gewöhn-

---

t) 1) Peyssonell Philosoph. Transact. Vol. I., P. 2. art. 105. S. 172. 173. 2) Reisen eines Schweizers in verschiedene Kolonien von Amerika, während des lezten Krieges aus dem Französischen übers. Leipzig 1786. 8.

u) Peyssonell a. a. O. ein schmerzhaftes Aufschwellen der Theile, welche unmittelbar davon berührt werden Frezier Reise nach der Südsee aus dem Französ. übers. Hamburg 1718. 8. S. 35.

x) Bancroft a. a. O. S. 37.

y) Schon der Sägespäne des Holzes, Jacquin stirp. Amer. Pl. 159.

z) 1) Voyage to Madera &c. S. 91. 2) Rottböll Act. litterar. univers. Hafniens. I. n. 6. S. 302. 3) Schreber a. e. a. O. S. 130.

a) Vandermonde Recueil periodique d'observations de medecine &c. B. VII. Dec. art. S. 401.

b) Bancroft a. e. a. O. zuweilen ist er doch unschädlich; so verschlang z. B. eine schwangere Frau eine Frucht ohne Nachtheil. Götting. Anzeigen von gel. Sachen.

www.dlibra.wum.edu.pl

liche Landkrabbe (Cancer ruricola) leidet zwar, wenn sie davon frißt, so wenig als die Affen, welche der Frucht sehr nachgehen c), für sich Schaden davon, aber ihr Fleisch wird dadurch für den Menschen giftig d).

Geschichte e).

Vincent Banchi von Turin, ein starker Mann und alter Soldat, unter der Reuterei, ungefähr fünf und vierzig Jahre alt, der bei einer Belagerung von Belgrad in türkische Gefangenschaft gerieth, und eilf Jahre lang darinn blieb, gieng einmal am Strande, und sah eine grose Menge Aepfel auf der Erde liegen; ihr schönes Ansehen, und ihr süser Geschmak lokten ihn an, sie zu sich zu nehmen, und davon zu genieſen; er fand ihren Geschmak säuerlicht, as ungefähr zwei Duzende davon, füllte seine Taschen damit, gieng nach Hause und verzehrte sie da: die Schwarzen sagten ihm, als sie dieses sahen, die Frucht seie tödlich, und jezt erst hörte er auf, davon zu speisen und warf die übrigen hinweg. Ungefähr um vier Uhr Nachmittags, eine Stunde nach dieser Mahlzeit, schwoll ihm der Leib sehr auf; er fühlte gleichsam ein brennendes Feuer in seinen Eingeweiden, und konnte sich nicht aufrecht halten, Geschwulst und Schmerzen nahmen die Nacht über zu; seine Lippen waren von der Schärfe des Saftes angefressen, und er bekam kalte Schweise. Es wurde ihm zu wiederholten Malen ein Trank von den Blättern

---

1751. S. 70. und eine andere drei. Gazette salutaire 1761. n. VI.

c) Rottböll a. e. a. O.

d) Jacquin a. e. a. O.

e) Peyssonell a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

der französischen Purgirnus (Iatropha multifida) gereicht, der ein Erbrechen und darauf einen starken Stuhlgang zuwege brachte; doch hatte er noch vier Stunden so zu leiden, daß man seinen Tod erwartete, endlich aber verminderten sich die Zufälle, und er lernte nach und nach wieder gehen. Fleisiger Genus von Reisgrüze machte allem ein Ende, und in vier und zwanzig Stunden klagte er über nichts mehr.

Auch hier sind starke abführende und Brechmittel in Verbindung mit solchen, welche durch ihre milde Natur das Gift einhüllen und unschädlich machen, die wirksamsten Gegengifte; in Amerika bediente man sich zu diesem Zwecke eines Tranks von den Blättern der französischen Purgirnus f), der Brechen und Durchfall erregt, und gibt zugleich Reissuppe g), Feigensaft h), oder Meerwasser und Limoniensaft, oder auch den Saft von (Leucadendron) Weisholzbaum i).

Sein Holz wird wegen seiner ausnehmenden Bitterkeit von keinem Wurme berührt und läßt sich auch wohl glätten; daher taugt es sehr wohl zu Kabinetchen, Bücherschränken, Planken und Dielen k).

β) Manchinellbaum mit Lorbeerblättern, Hippomane biglandulosa Linn. Jacquin a. e. a. O. Pl. 237.

Er wächst in dem wärmern Theile von Amerika, und den demselben gegen überstehenden Eilanden, und kommt dem

---

f) Vandermonde a. e. a. O.

g) Hughes natural history of Barbados London 1750. fol. S. 122. ꝛc.

h) Peyssonell a. a. O.

i) Bancroft a. a. O.

k) Hamburg. Magazin B. IV. S. 246.

www.dlibra.wum.edu.pl

gemeinen, auch in den schädlichen Eigenschaften seines Saftes l), sehr nahe; aber seine Blätter sind mehr länglicht, seine Samengehäuse troken und dreikörnig.

γ) Surioamischer Manchinellbaum, Hippomane dioica.

Er hat ganz getrennte Geschlechter, und ist in seinem Safte äuserst giftig m).

2) Nieswurz, Veratrum.

Ihre Blumen haben keinen Kelch, aber eine aus sechs Blättchen bestehende Krone und sechs Staubfäden, die zu unterst aus den Blättchen der Krone entspringen, und, die obern Blumen ausgenommen, vollkommene Staubbeutel tragen; die untern Blumen haben statt des Staubwegs nur einen kleinen Knoten, die obern aber, welche daher allein reifen und vollkommenen Samen nach sich lassen, drei vollkommene Staubwege; jede von den lezten hinterläßt drei trokene Samengehäuse, welche den Schoten ziemlich nahe kommen, ihre dünnern Spizen nach aufen zu krümmen, und inwendig ganz dicht mit Samen angefüllt sind.

α) Weisse Nieswurz, weisse Nieswurz mit grünlichter Blume, Hemerwurz, Brechwurz, Champagnerwurz. Veratrum album Linn. Helleborus albus. Jacquin Flor. austr. IV. Pl. 335.

Sie wächst in Griechenland, Italien, in der Schweiz, in Oberdeutschland, Rusland und Sibirien an bergichten Orten, hält mehrere Jahre aus, und blüht im Sommer.

---

l) Pluckenet Almag. boran. S. 369.

m) Rottböll a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ihre Wurzel entsteht aus einem weissen, und länglichten Knollen, aus welchem unzählig viele lange, weisse, und rundlichte Zasern auslaufen. Ihr Stengel schießt gerade in die Höhe, oft bis zu vier Schuhen; er treibt sehr wenige Aeste, ist aber dicht mit Blättern besezt, welche einen beträchtlichen Umfang, und auf ihrer Oberfläche viele erhöhte Nerven haben. Diese haben einige Aehnlichkeit mit den Blättern des gelben Enzians, oder des breiten Wegerichs, und ihre Gestalt nähert sich der Gestalt eines Eies, nur daß sie an beiden Enden etwas spiziger zulaufen; sie sind glatt, und weich, ohne eigene Stiele; und ohne allen Einschnitt an dem Rande. Ihre Blumen sizen alle aufrecht, und bilden dichte Aehren, welche sich zu gröseren, und diese endlich in grose Büschel vereinigen; sie haben eine gestrichelte, etwas weniges haarige, weisse, von aussen grünlichte Krone.

Ihre Wurzel, welche zu einer Art Bier, dem Brausebüttel kommen soll n), hat eine äzende brennende Schärfe, welche Lippen und Schlund entzündet o), und, wenn sie hinunter geschlungen wird, Schlund und Magen zusammenschnürt p) den Magen entzündet, und kalten Brand darin verursacht q), leere Reize zum Erbrechen r), sehr oft das alterge-

n) Plaz de removendis sanitatis publicae impedimentis §. III. S. 13.

o) Grew Anatomy of Plants with an Idea of a Philosophical History of Plants and several other Lectures. London 1682.

p) 1) Winter Miscell. Vratisl. 1724. Mon. Nov. S. 268. 2) Reimann ebendas. S. 535. 3) Muralto Ephem. Ac. Caes. Nat. Cur. Dec. II. A. 2 S. 239.

q) 1) Muralto a. a. O. 2) Schröder de venenis et antidot. Leid. 1679.

r) Forestus Observat. et curat. medicin. L. XXX. et obs. 9.

www.dlibra.wum.edu.pl

lergewaltſamſte Erbrechen s), Schluchzen t), Brennen u) oder die grauſamſten Schmerzen in dem Magen und in den Gedärmen x), unüberſchwinglich ſtarken y), äuſerſt ſchmerzhaften z), oder blutigen Stuhlgang a), ein Aufblähen des

---

s) 1) C. Plinius Hiſtor. mund. L. XXV. nr. 21. 2) Rhazes ad Manforem L. III. C. 61. 3) J. Meſue de re medica L. II. c. 30. 4) Fallopius de purgantibus ſimplicib. c. 69. 5) Benivenius de abditis nonnullis ac mirandis morbor. cauſis Baſil. 1529. 8. S. 254. nr. LII. 6) Van Helmont Diſpenſator. modern. Oper. omn. S. 467. 7) Lentilius Eteodrom. medico-pract. Stuttgard 1711. S. 868. 8) Ledelius Ephem. Acad. Caeſ. Nat. Cur. Dec. III. A. I. S. 92. 9) Graß ebendaſ. Dec. I. A. 4. 5. S. 92. 10) (mit Brandewein oder Bier angegoſſen) Schröck ebendaſ. Dec. III. ann. I. obſ. 65. 11) Ettmüller Colleg. medico-chirurg. S. 478. 12) Lorry a. a. O. II. 313. 314. Reimann, Winter, Schröder, Foreſtus a. d. a. O. und mehrere andere.

t) Muralto a. a. O.

u) Ebenderſ. a. a. O.

x) Reimann, Foreſtus und Graß a. d. a. O. Wepfer Hiſt. Cicut. aquat. S. 48.

y) Benivenius a. a. O. c. LI. S. 253. Meſue, Graß, Ledelius, Reimann, Foreſtus a. d. a. O. Röder in Alberti Medic. legal. obſ. 15.

z) Ledelius a. a. O.

a) Deſſenius de compoſition. medicam. L. X. Francf. 1555. S. 442.

Unterleibs b), Zukungen in den Gliedern c), den Augen d) und der Zunge e), Spannen der Glieder f), Krampf in den Waden g), Kopfschmerzen h), Schwindel i), Verfall der Sprache k), Schlagfluß l), Blindheit m), leichten Wahnsinn n), Bangigkeit o), Aufhören des Aderschlags p), Ohnmachten q), blutigen Schweis an den Nägeln r), kalten Schweis über den ganzen Leib s), Frost über alle Theile t),

---

b) Reimann a. a. O.

c) Muralto, Ledelius, Winter, Schröck, van Helmont, Rödder, Lorry a. d. a. O. Lentilius Ephem. Acad. Caes. Nat. Curios. Dec. III. App. S. 130.

d) Borrichius Act. Hafnienf. B. V. S. 146.

e) Ein Stammeln, Graß a. a. O.

f) Ledelius a. a. O.

g) Reimann und Lorry a. d. a. O.

h) Ledelius a. a. O.

i) Ledelius und Reimann a. d. a. O.

k) Rödder a. a. O.

l) Dobolewsky Ephem. Acad. Caes. Nat. Cur. Dec. I. a. 2. S. 279.

m) Borrichius a. a. O.

n) Graß a. a. O.

o) Wepfer, Benivenius, Foreſtus, Muralto, Reimann, Lorry, Rödder a. d. a. O.

p) Rödder a. a. O. Eine ungemeine Schwachheit, Benivenius, a. a. O. S. 254.

q) Wepfer und Foreſtus a. d. a. O.

r) Lentilius Ephem. Ac. Caes. Nat. Cur. a. a. O.

s) Reimann, Rödder, Benivenius, Wepfer a. d. a. O.

t) Rödder a. a. O. An den äuſern Theilen Wepfer a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

sehr oft den Tod u), und dieſen zuweilen plözlich erregt x).

Geſchichte y).

Ein Schneider ſezte ſich mit ſeiner Frau, Kindern und Geſellen zu Tiſche. Die Frau nimmt eine Tute von Papier, worinn ſie Pfeffer zu finden glaubte, um ihn nach ihrer Gewohnheit auf die Suppe zu ſtreuen. Allein, ſtatt des Pfeffers, war es fein geſtoſene weiſſe Nieswurz, womit ſich ihr Schwiegervater von Zeit zu Zeit den Kopf beſtreute, um ſich die Läuſe zu verjagen. Sie irrte ſich darinn deſto eher, weil ſie ſonſt ihren Pfeffer an eben dem Orte liegen und dieſes gefährliche Pulver eben die Farbe, wie der Pfeffer hatte. Jedermann beklagte ſich, daß die Suppe einen unangenehmen Geſchmak hätte; man ſpeiſte ſie aber doch, und beinahe ſogleich darauf waren alle dieſe Leute in einem ſehr kümmerlichen Zuſtande; ſie wurden an dem ganzen Leibe kalt, und hatten einen eiskalten Schweis; ſie waren dabei äuſerſt ſchwach, faſt ohne Aderſchlag, und ohne Empfindung. Es waren beinahe zwo ganze Stunden verfloſſen, ehe ſie Hülfe ſuchen konnten, bis endlich von ungefähr einer ihrer Nachbarn zu

---

u) Benivenius, Fallopius a. d. a. O. von einem Skrupel bei einem Markgrafen C. Spinelli bei van Helmont a. a. O. Häufig unter den Einwohnern Sibiriens, welche ſie in ganz unbeſtimmten Gewichten als Arznei einnehmen J. G. Gmelin Flor. Sibir. Th. I. S. 75. Vielleicht iſt auch der Tod der zween Knaben auf die Rechnung dieſer Wurzel zu ſchreiben. Act. Helv. B. V. S. 326.

x) Innerhalb ſechs Stunden. Benivenius a. a. O.

y) Vicat a. a. O. S. 166.

www.dlibra.wum.edu.pl

ihnen kam, und nach dem Arzte gieng. Dieser wollte ihnen eben Brechweinstein geben, als die Kinder, von welchen das älteste noch nicht vier Jahre alt war, sich stark und mit sehr vieler Heftigkeit zu erbrechen anfingen. Die Frau fieng bald darauf auch an, und zulezt erbrachen sich alle zusammen. Man gab ihnen viel laues Wasser mit Oel, um das Erbrechen zu erleichtern, und nachher einen Aufsaz von Pappeln, mit Honig versüßt, in groser Menge. Einige Stunden darauf befanden sie sich wieder ziemlich wohl, aber sie waren noch sehr schwach, vornemlich in den Schenkeln, welche noch immer zitterten.

Es sind freilich die erzählten Zufälle nicht immer gleich heftig, niemals alle mit einander bei einem Kranken, und zu jeder Zeit der Krankheit beisammen. Denn roh und frisch wirkt die Wurzel am heftigsten; aber doch wirkt sie auch noch sehr stark, wenn sie nicht mehr frisch, wenn sie mit Wasser, Bier, oder einer andern Speise gekocht, oder mit Wein oder Brandwein angebrüht wird. Ohne Zweifel macht das mehr oder minder starke Gewicht, in welchem man sie einnimmt, und die natürliche oder widernatürliche Beschaffenheit des Menschen, der sie zu sich nimmt, einige Veränderung in ihren Wirkungen. Vielleicht trägt auch der Boden, in welchem sie wächst, etwas dazu bei z).

Nur der Mauleſel weidet in Alpengegenden ihre Blätter ab; alle andere Thiere aber lassen sie, wenn sie gesund, und an die Weide gewohnt sind, stehen. Betrügt man ih-

---

z) So soll die Nieswurz, welche in Trient und den benachbarten Ländern wächst, nicht so schädlich sein, als diejenige, die man in warmen Ländern findet.

www.dlibra.wum.edu.pl

ren natürlichen Widerwillen durch List, oder zwingt man ihnen Gewalt davon ein, so erfolgen, nach den Versuchen, die man bisher an Hunden, Kaninchen und Hünern gemacht hat, gemeiniglich heftiges Erbrechen, grausame Bauchflüsse, Zukungen, Bangigkeiten, Entzündung des Magens, Wuth und nicht selten der Tod. Bei Hornvieh a) erregt sie, wenn es sie aus Hunger frißt, unmäsige Bauchflüsse, und so wie bei Schafen b), wenn sie die im Frühling blos liegenden Wurzeln abfressen, oft den Tod.

Auch dieses Pflanzengift erfordert, die gleiche Heilungsart, die ich oben bei den scharfen Pflanzengiften angegeben habe: durch weiche Brühen rettete Foreſtus c) einen solchen Kranken; Hahnemann hat mit starkem Koffee als Trank und Klistir beigebracht zwei Kinder von seinen Wirkungen befreit c*).

Aber auch äuserlich gebraucht, ist die Nieswurz gar nicht unschuldig. Unter der Gestalt eines feinen Pulvers in die Nase gezogen, erregt sie das allerheftigste und gefährlichste Niesen d); nur auf den Bauch gelegt macht sie gewaltsames Erbrechen e); eben dieses erregt sie auch nebst andern schlimmen Zufällen, wenn sie als ein Stuhlzäpfchen in den

---

a) Hacquet a. e. a. O. B. I. S. 40—44.

b) Falk a. a. O. II. S. 269.

c) a. a. O. L. XVIII.

c*) Bei Hufeland Iournal der practischen Arzneyk. B. V. St. I. S. 16—18.

d) Muralto a. a. O.

e) Ettmüller in der Vorrede zur Chirurg. infusor.

www.dlibra.wum.edu.pl

After gestekt wird f). Vicat sahe auch g), daß kräzige Schafe, welchen ihre unwissende Hirten den Saft der Nieswurz, mit Butter zu einer Salbe gekocht, eingerieben hatten, aufgetrieben wurden, und starben.

Auch das Wasser, das mit der Wurzel gekocht war, tödete einen Hund, dem es in die Adern gesprizt wurde. Das Extrakt der Wurzel durch eine Wunde unmittelbar mit dem Blute vermischt, hat weder Hunden, noch Kazen, noch Kaninchen den Tod gebracht; allein der Saft der Wurzel auf eine gewisse Art zubereitet, und durch eine Wunde, wie sie z. B. durch Pfeile gemacht wird, unmittelbar mit dem Blute vermengt, tödet alle Thiere plözlich h), ob er gleich auf diese Art zubereitet und verschlukt nicht sehr schädlich, wenigstens niemalen tödlich ist i). Er ist wahrscheinlicher Weise das pharische Gift der Alten; eben das, womit die alten Gallier und Lusitanier die Spizen ihrer Pfeile beschmierten k), und dessen sich die Jäger in Spanien zu der nemlichen Absicht bedienen.

---

f) Schröder a. a. O.

g) a. a. O. S. 383.

h) Esel, Crato Consilia L. II. Francf. 1592. S. 216. Matthiol Comment. in Dioscorid, S. 1226. Nach Heuchern Mithridates Opp. B. I. S. 435. ist der gegohrne Saft der weissen Nieswurz das pharische Gift der Alten, womit sie die Spizen ihrer tödlichen Pfeile beschmierten.

i) Nach der täglichen Erfahrung der spanischen Jäger, welche nicht nur das Gift selbst, als abführendes Mittel, einnehmen, sondern auch Thiere, die sie damit erlegen, ungescheut und ohne Schaden speisen. Matthiol a. a. O.

k) Cäsalpin Tr. de venenis S. 141.

www.dlibra.wum.edu.pl

Der schrecklichen Wirkungen ungeachtet, welche die weisse Nieswurz auf Thiere äusert, vertritt sie doch bei den Aerzten, selbst bei Hippokrates, roh, oder in ihren verschiedenen Zubereitungen, die Stelle eines Heilmittels. Sie verordneten sie nicht nur äuserlich in Salben wider die Kräze, und das damit gekochte Wasser in einer ähnlichen Krankheit des Hornviehs, sondern auch innerlich in lange anhaltenden viertägigen Wechselfiebern, in ähnlichen Kopfschmerzen, in der fallenden Sucht, in Blödsinn und Wuth [1]).

Wenn uns aber das Ansehen und die Erfahrungen der ältesten Aerzte berechtigen, ihrem Beispiele auch hierin zu folgen, so müssen wir bei dem Gebrauche eines so zweideutigen Mittels auch die Behutsamkeit anwenden, die sie sich zum Geseze gemacht hatten. Sie gebrauchten sie meistens nur in den hartnäkigsten und verzweifelten Krankheiten, welche auf gelindere Arzneyen nicht weichen wollten: nur bei starken, aber nicht bei zärtlichen Leuten, oder Kindern und Greisen, auch nicht bei dem andern Geschlechte; erst dann, nachdem sie den Leib mit Speise und Trank angefüllt hatten. Sie suchten auf allerlei Weise, ihre allzuheftige Wirksamkeit einzuschränken. Sie pflanzten sie in ihre Weinberge neben ihre Reben, und glaubten dadurch den Wein, den sie von den lezten erhielten, mit ihren Kräften zu schwängern; oder sie hohlten einen Rettig oder Apfel aus, legten in diese Höhlung ein Stükchen von der weissen Nieswurz, liesen den Rettig oder Apfel, dessen Höhlung sie mit einem Dekel zugedekt hatten, einige Tage so liegen, nahmen alsdann, nachdem er gebraten war, die Nieswurz wieder heraus, und ga-

1) In der lezten vornemlich Mayerne a. a. O. B. I.

www.dlibra.wum.edu.pl

ben ihn nun ihren Kranken. K. Gesner schränkte ihre Heftigkeit durch die Beimischung ihrer kräftigsten Gegengifte, des Essigs und Honigs ein. Und so suchten sich andere Aerzte dadurch sicher zu stellen, daß sie sie nur in schwachen Gewichten, oder ihren Aufgus mit Wasser, oder das Extrakt, das mit Wasser oder Weingeist daraus gezogen war, verordneten. Auf diese Art hatten sie vorher etwas von ihren flüchtigen Theilchen, welche am meisten zu ihrer Wirkungen beitragen, in die Luft gejagt, ohne sie doch ganz unthätig zu machen. Auch noch neuerlich empfielt H. Dr. Müller das Pulver der getrokneten Wurzel zu halben Granen mit Zuker gegeben aus Erfahrung in Erstickungszufällen 1*).

In Amerika weicht man die Körner des türkischen Weizens, die man zur Saat bestimmt hat, in Wasser ein, worinnen diese Wurzel gekocht worden ist, um sie gegen raubersche Thiere, Mäuse u. dgl. zu verwahren, welche davon getödet werden. In der nemlichen Absicht diese und andere Feinde der Feldfrüchte und der Bienen umzubringen, legt man an Orte, die sie fleisig besuchen, Brod, oder andere ihnen angenehme Speisen, die mit dem Pulver dieser Wurzel gewürzt sind.

β) Weisse Nieswurz mit schwarzen Blumen, rothe Hemerwurz, Veratrum nigrum Linn. Jacquin Flor. austr. IV. Pl. 336.

Sie wächst in Ungarn und Sibirien an trokenen und sonnigen Orten wild, hat schwarzrothe weit offen stehende Blumenkronen, und schmale gleich breite Dekblätter.

1*) Bei Hufeland a. e. a. O. B. XII. St. 1. S. 164—166.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ihre nahe Aehnlichkeit mit der weissen läßt ähnliche Gefahren von ihrem Genusse befürchten, wirklich ist sie auch dem Hornvieh eben so schädlich m).

γ) Sabadillsamen, Veratrum Sabadilla. Retzius observ. botan. II. S. 31.

Diese Pflanze ist in Mexiko zu Hause.

Ihre Blumen sizen auf eigenen Stielen an einem einfachen ährenförmigen Traubenkamm nach einer Seite hin, und hängen etwas über; jede der fruchtbaren Blumen hinterläßt drei trokene Samengehäuse, welche eiförmig länglicht, breitgedrükt, etwa einen halben Zoll lang und strohgelb sind, und (jede) zween Samen enthalten; diese sind länglicht, an einem Ende stumpf, am andern scharf zugespizt, auf einer Seite etwas platt, auf der andern gewölbt, am Rande scharf, von aussen etwas runzlicht und dunkel braun, inwendig aber weislicht, von ekelhaftem unangenehm bitterm und sehr scharfem Geschmak, aber ohne Geruch, ob sie gleich, wenn sie gestossen in die Nase gezogen werden, sehr heftiges Niesen erregen.

Schon auf den äuserlichen Gebrauch dieser Samen sah man schlimme Zufälle n); Plenk sah bei einem Jünglinge, welchem man sie häufig auf den Kopf gestreut hatte, Raserei, die nur durch Waschen des Kopfes mit kalten Wasser gestillt wurde o), ausbrechen; Lentin p) einen Säugling, dessen

---

m) Hacquet a. e. a. O. I. S. 41.

n) Oberdeutsche Beyträge zur Naturkunde und Oekonomie B. I.

o) Mater. chirurg. S. 339.

p) Beobachtungen einiger Krankheiten. Göttingen 1774. 8. S. 167. 168.

www.dlibra.wum.edu.pl

Amme sich etwas davon in die Haare gestreut hatte, an Zukungen sterben.

Noch heftiger wirken sie bei dem innerlichen Gebrauche; denn davon nichts zu erwähnen, daß sie manchem Ungeziefer, namentlich Wanzen q) und Läusen r) tödlich sind, und mit gutem Erfolge dagegen gebraucht werden, auch Kazen und Hunde Krämpfe, Erbrechen und Zukungen davon bekommen s), so erregten sie bei einer Frau, die sie, da sie dieselbigen mit andern Samen verwechselte, einnahm, heftige, zulezt brennende Magenschmerzen, Würgen und Uebelichkeit, welche sich auf den Gebrauch eines Brechmittels und fleisiges Trinken etwas mit Leinsamen gekochten Wassers verloren t); doch bedient man sich ihrer sowohl in Klistiren, als innerlich in Pulver, Pillen und Bissen mit Nuzen gegen Würmer u),

---

q) 1) Seeliger bei Schmucker vermischte Bemerkungen. B. II. S. 272. 2) Willemet Nouv. Memoires de l'Academ. de Dijon. 1782. S. 200.

r) 1) Schmucker a. e. a. O. B. III. S. 8. 2) Van der Beck Act. Acad. Caes. Nat. Curios. B. I. 1727. Append. S. 120. 3) Königl. Preußisches Feldlazaret S. 374. 4) Oberteuffer a. a. O. S. 102.

s) Willemet a. a. O. S. 201.

t) a. e. a. O.

u) Löfecke auserles. Arzneymittel. 4te Ausg. S. 363. 2) Seeliger a. a. O. II. S. 271. 3) Schmucker a. e. a. O. III. S. 12—18. 4) Carger Vekoskrift för Läkare och Naturforskare B. V. S. 297. 5) Hagström ebendas. B. IV. S. 361. und B. V. S. 297. 6) Hufeland Iournal der praktischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. B. IX. St. 3. S. 102. Doch nicht immer Oberteuffer a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

selbst gegen den Bandwurm x), auch in Zukungen und Fallsucht, selbst wenn sie nicht aus dieser Quelle zu entspringen scheinen y).

3) Schwarze Nieswurz, Christwurz, Helleborus niger Linn. Schmiedel Icon. Plant. et Analys. partium Norimb. 1747. Pl. VI. Blackwell a. a. O. Pl. 505. 506. 507.

Ihre Wurzel hat von aussen eine schwarzbraune, inwendig aber eine weisse Farbe, so lange sie frisch und gut ist, einen scharfen Geruch, und einen bittern ekelhaften Geschmak. Sie besteht aus vielen, zum Theil ziemlich diken Fasern, die einige Zolle lang sind, und aus einem dünnen Köpfchen entspringen; oben hat sie gemeiniglich etliche Schuppen. Sie treibt viele Blätter und Blumenschäfte; die ersten sind glänzend und gemeiniglich dunkelgrün, vest und hart wie Leder, und überhaupt, wie die untern Blätter der stinkenden Nieswurz. Ihre Blumenschäfte erreichen eine mittlere Höhe; sie sind rundlicht, ihrer ganzen Länge nach auf grünlichtem Grunde rothgeflekt, und nur mit einem, oder zwei blassen Blättchen besezt, die in ihrer Gestalt und Gröse weit von den untern abweichen, und aus einer bauchigen Scheide entspringen; jeder von ihnen trägt eine, gemeiniglich aber zwo schöne grose Blumen; diese haben eine weisse, auf ihrer äussern Fläche hin und wieder blaßroth gewölkte, oder geaderte Krone, die aus grosen, rundlichten Blättchen besteht. Im

x) Seeliger, Schmucker, Carger a. d. a. O. Herz Briefe an Aerzte 2te Sammlung, S. 50.

y) Schmucker und Seeliger a. d. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

übrigen kommt die Pflanze mit der stinkenden Nieswurz überein.

Sie ist in Griechenland, Hetrurien, auf den pyrenäischen und apenninischen Gebirgen und in Oestreich zu Hause. Sie wächst daselbst auf rauhen Stellen, behält ihre Blatter den ganzen Winter über grün, und blüht auch gemeiniglich mitten im Winter. Ohne Zweifel verliert sie durch das Verpflanzen in einen andern Boden, als der ihr von der Natur angewiesen ist, etwas von ihrer Kraft.

Ob sie gleich in keinem ihrer Theile so heftig wirkt, als die weisse Nieswurz, wenn dieser nicht Alter, oder Kunstgriffe etwas von ihrer Wirksamkeit entzogen haben; ob sie gleich ihre schädlichen Kräfte verliert und diese leichter einschränken läßt; und ob sie also gleich zum Arzneigebrauche weit sicherer ist; so sahe man doch auf den innerlichen Gebrauch der fein gestoßenen Wurzel, oder des daraus zubereiteten Extrakts die grausamsten Bauchflüsse z), auch anhaltendes gewaltsames Erbrechen a), Entzündung der Gedärme b), Zukungen c) und den Tod selbst d) erfolgen. Die Alten

---

z) 1) Rhazes a. a. O. L. VIII. C. 50. 2) Tim. v. Güldenklee a. a. O. L. VII. C. VI. S. 276.

a) 1) Tim. von Güldenklee a. a. O. 2) Döring de Opii usu, qualitate calefaciente &c. Ien. 1629. S. 242.

b) Morgagni nach Hallern Hist. stirp. Helvet. II. S. 86.

c) 1) Tim. v. Güldenklee a. a. O. 2) Tournefort Voyage au Levant III. S. 347—348.

d) 1) Fabricius von Hilden a. a. O. S. 913. 2) S. Schaarschmid Medicin. und Chirurg. Nachrichten. Berl. 1738. I. nr. 18. 3) Harder apiar. observat. obs. 69. An dem gleichen Tage Tim. v. Güldenklee a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

glaubten sogar beobachtet zu haben, daß der Genus von Wachteln, welche diese schwarze Nieswurz gefressen hatten, eine allgemeine Starrsucht nach sich ziehe e).

Auch bei Ziegen, die sie abweiden, erregt sie Bauchflüsse; Hunde, denen man das Extrakt, oder das davon gebrannte Wasser eingiebt, erfahren die gleichen Zufälle. Theophrast sah auf ihren Genus Pferde, Schweine und Rindvieh darauf gehen.

Aber auch äuserlich ist sie nicht unwirksam, auf der Haut zieht sie Blasen f); in eine Fontanelle gelegt, treibt sie auf den Stuhlgang g); in die Nase gezogen, erregt sie ein höchst gewaltsames, sehr gefährliches Niesen h); eine ihrer Fasern soll einen Hahn getödet haben, welchem man sie durch den Kamm gezogen hatte; mit ihrem Safte kann man Pfeile vergiften i); auch soll das Extrakt zu dem Gifte kommen, womit die alten Spanier ihre Pfeile vergifteten, und die mit solchen Pfeilen gemachten Wunden Steifigkeit, Schlummer, Blindheit, Erbrechen, Schaum vor dem Munde, eine ungemeine Ermattung, und, wenn die Wunde nicht ausgesogen, oder Blätter von Quitten oder Gersten gekaut darauf gelegt werden, den Tod verursachen k).

---

e) Cassanus Florentinus a. a. O. L. XIV. c. 24.

f) Roncalli Parolini Europ. medicin. Brix. 1747. S. 214.

g) Du Hamel bei Hallern a. c. a. O.

h) Fabricius von Hilden a. a. O. IV. obs. 12.

i) 1) Plinius a. a. O. L. XXV. nr. 25. 2) Lang Epistol. medicin. L. II. 20.

k) Thuanus Histor. sui temp. B. II. Lond. 1733. L. XLVIII. S. 823.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sie bleibt aber doch, durch verschiedene Kunstgriffe oder Vermischungen ihrer schädlichen Kräfte beraubt, in der Hand eines klugen Arztes ein herrliches Mittel in allen Krankheiten, welche zu ihrer Bekämpfung abführende oder eröfnende Arzneien, oder heftige Erschütterung nöthig haben. Aeuserlich kann sie als blasenziehendes Mittel, oder um Läuse zu vertreiben, und das damit gekochte Wasser in alten Geschwüren und Fisteln gebraucht werden.

Nur muß die Wurzel, vornemlich wenn sie zum innerlichen Gebrauche bestimmt ist, nicht mit andern theils kraftlosen, theils heftiger wirkenden verwechselt werden; vornemlich nicht mit der weissen Nieswurz und der Wurzel des Eisenhütchens, von welcher man sie durch die bereits beschriebenen oder noch anzuführenden Merkmale unterscheiden kann.

Sollte nicht auch die stinkende Nieswurz, Helleborus foetidus Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 57.

hier eine Stelle verdienen?

Sie wächst im mittägigen Europa, aber auch im übrigen Frankreich, in der Schweiz, in Teutschland und England wild, und weicht von der schwarzen darinn ab, daß sie keine Blätter unmittelbar aus der Wurzel treibt, sondern alle am Stamme stehen, und daß dieser viele gleichsam geschlossene Blumen mit grüner an der Spize röthlichter Krone trägt, selbst durch ihren eigenen unangenehmen Geruch.

Sie erregt heftige Bauchflüsse [1]), Magenkrampf, Erbrechen, Ohnmachten, Abfallen der Haare und Nägel, Ab-

1) Threlfeld synopsis stirpium Hibernicarum Dublin. 1727. 12.

www.dlibra.wum.edu.pl

schälen des Oberhäutchens m), und selbst den Tod n): sogar starb ein Kind innerhalb zween Tagen, welchem man etwas davon mit weichgekochten Aepfeln gegeben hatte o).

4) Schweizerischer Hahnenfus, Ranunculus Thora Linn. Jacquin Observat. botan. I. 25. Pl. 13.

Er wächst auf den schweizerischen und pyrenäischen Gebirgen wild.

Seine Wurzel besteht aus einem ganzen Büschel einwärtsgekrümmter Hacken, die sich unten in lange Fasern verlieren, oben aber den untern Theil des Stengels vest umfassen. Sein Stengel ist vest, und bleibt niedrig; er trägt eine, höchstens zwo Blumen, welche bald gröser, bald kleiner, und zuweilen gefüllt sind. Er ist nur mit einigen wenigen Blättern besezt, deren Anzahl nicht über drei geht; unmittelbar aus der Wurzel kommen keine; sie sind alle hart wie Leder, nervenreich und meergrün; das unterste ist rund, beinahe wie eine Niere, und hat an dem eingedrükten Theile des Randes kurze Zähne: gemeiniglich hat es zween tiefe Einschnitte, und neben diesen Einschnitten spizige sägenartige Zähne; das mittlere Blatt ist dem untersten ähnlich, nur daß es in drei spizige Stüke getheilt ist; das oberste aber ist ganz einfach und schmal. Die Blume hat einen umgeschlagenen Kelch, der in die gelblichte Farbe spielt; ihre Krone ist glänzend gelb und gestrichelt, und besteht beständig, wenn sie ein-

m) J. Cook Oxford. Magaz. for March. 1769. S. 99.

n) Threlkeld a. e. a. O.

o) London Chronicle 1769. n. 1760.

www.dlibra.wum.edu.pl

fach ist, aus fünf Blättchen. Ihre Staubwege haben lange, Griffel, und das Köpfchen, in welches sich die wenigen, aber grosen Samengehäuse vereinigen, ist rundlicht. In den übrigen Merkmalen kommt er mit den andern Arten des Hahnenfuses überein.

Er hat in allen seinen Theilen eine ausnehmende Schärfe, welche über die Schärfe des Gifthahnenfuses geht p), die er selbst durch die Veränderung seines natürlichen Standortes, und durch die Verpflanzung in Gärten nicht verliert, die aber, wenn er Samen angesezt hat, um sehr viel milder wird, und wenn er getroknet wird, gänzlich vergeht.

Sein Saft, durch eine Wunde unmittelbar mit dem Blute eines Thiers vermengt, erregt Schlummer q), ob er gleich nicht zu jeder Zeit des Lebens der Pflanze tödlich ist r), Mit eben diesem Safte sollen die Waldenser ihre Pfeile, Spiese, Kugeln u. dgl. so sehr vergiften, daß Menschen und Thiere, welche damit verwundet werden, plözlich und unvermeidlich dahin starben s). In der nemlichen Absicht bedienten sich die alten Einwohner von Lucern desselbigen t). Und vielleicht ist es auch das celtische Gift, dessen Aristoteles in dem Buche περι θυμασιων ακουσματων gedenkt; und das Limeum,

---

p) Krapf a. e. a. O. S. 62.

q) Collinson bei K. Gesner de aconito primo adseveratio. Tigur. 1577. S. 20.

r) Manget Biblioth. pharmaceutico - medica. Genev. 1703. sah ihn in seinen Versuchen niemalen tödlich.

s) Thuanus Hist. sui temporis. B. II. Lond. 1733. L. XXVII. S. 95.

t) K. Gesner de aconito primo adseveratio &c. S. 106.

www.dlibra.wum.edu.pl

Limeum, deſſen Saft die Gallier in dem gleichen Endzweke gebrauchten u). Die Bewohner der Alpen beſchmieren mit dieſem Gifte die Spizen der Meſſer, womit ſie ihr Geflügel erſtechen, theils um es geſchwinder zu tödten, theils das Fleiſch zärter zu machen x). Die auf dieſe Art getödeten Thiere können ohne die mindeſte Gefahr geſpeiſt werden y).

5) Waldanemone, kleine Waldanemone, wilde weiſſe Anemone, weiſſer Waldhahnenfus, weiſſes Waldhähnlein, weiſſe Windblume, Storchblume, Merzenblume, weiſſe Aprilblume, Luck, Lickt, Augenwurz. Anemone nemoroſa Linn. Flor. Dan. Pl. DIL.

Sie wächſt in ganz Europa in harten, rauhen Gegenden, in Gehölzen und Bergheken wild, wo ſie vom Merz bis in den Maimonat blüht. Ihre Wurzel iſt länglicht rund und klein; ſie läuft in die Quere, und treibt unter einem geraden Winkel einen einigen, einfachen und geraden Stengel, und keine Blätter. Dieſe ſtehen immer zu drei beiſammen, ohne eigene Stiele an dem Stengel; jedes von ihnen theilt ſich wieder in drei Stüke, welche an ihrem Rande ſpizige Zähne haben. Ihre Blumen ſtehen einzeln an dem Gipfel des Stengels, und hängen zuweilen unter ſich; ſie ſind von verſchiedener Gröſe, meiſtens weis, und zuweilen auf einer, oder der andern, oder auch auf beiden Flächen röthlicht, oder purpurroth. Ihre Krone beſteht aus ſechs bis

u) Plinius a. a. O. L. XXVII. n. 76.

x) Thuanus a. e. a. O.

y) Ebenderſ. a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

acht abgesonderten Blättchen, welche eirund sind. Ihre Samen haben weder Wolle noch Federn, sondern nur einen gekrümmten Schwanz; sie vereinigen sich in ein gewölbtes Köpfchen.

Ihre gröste Schärfe steckt vornemlich in der Wurzel, die auch auf der Haut Blasen zieht z). Schon dieses läßt mich vermuthen, daß ihr innerlicher Gebrauch noch schlimmere Folgen haben muß, und, nach einigen Nachrichten, erregt sie die entsezlichsten Bangigkeiten, und in gröserer Menge genommen, den Tod a). Wenn sie das Vieh aus Hunger frißt, so bekommt es davon Blutharnen b), das Rindvieh insbesondere die rothe Ruhr c), und die Schafe das sogenannte rothe Wasser und Entzündung der Gedärme d).

Die so nahe Verwandschaft mit dem folgenden Gewächse, macht es sehr wahrscheinlich, daß auch der Saft dieser Pflanze eben die Wirkungen habe, wenn er äuserlich durch eine Wunde angebracht wird, als der Saft der folgenden.

Man kann sie äuserlich, als blasenziehendes Mittel, vornemlich in Zahnschmerzen gebrauchen.

---

z) Ephem. Ac. Caes. Nat. Curios. Dec. II. A. I.

a) S. G. Gmelin Flor. Sibir. B. IV. S. 199. Dreisig Pflanzen, ohne die Wurzeln, gespeist, tödten einen Menschen, der nicht sehr stark ist.

b) Schreber Sammlung vermischter Schriften, 3r Theil. S. 54.

c) Gunner Flor. Norweg. B. I. S. 166.

d) Schreber a. e. a. O. 12. Th. S. 305.

www.dlibra.wum.edu.pl

6) Hahnenfusartige Anemone, gelbes Waldhähnlein, gelbes frühes Waldhähnlein, Goldhähnlein. Anemone ranunculoides Linn. Flor. Dan. Pl. CXL.

Man findet sie in ganz Europa, vornemlich in den kältern Gegenden desselben, in Gehölzen und auf Wiesen, welche zunächst daran liegen.

Sie kommt in Wurzel, Stengel, Blättern und Samen gänzlich mit der Waldanemone überein; aber ihr Stengel trägt meistens zwo Blumen an seinem Gipfel, welche eine goldgelbe Krone haben, die gemeiniglich nur aus fünf rundlichten Blättchen besteht.

Die ganze Pflanze hat einen brennend scharfen Geschmak e), der ihren innerlichen Gebrauch höchst gefährlich macht. Die Kamtschadalen beschmieren mit dem Safte, der aus der Wurzel gedrükt wird, die Spize ihrer Pfeile und Bögen; die Wunde, die sie damit machen, ist unheilbar, wenn das Gift nicht sogleich ausgesogen wird; sie wird plözlich blau, und schwillt auf, und ist in zween Tagen tödlich. Mit solchen Pfeilen erlegen die Kamtschadalen selbst die grösten Wallfische f).

7) Bergsturmhut, Eisenhütchen, blaues Eisenhütchen, blaue Wolfswurz. Aconitum Cammarum Linn. Aconitum magnum, s. Napellus. Blackwell a. a. O. Pl. 561. Napellus, Störk Lib. de Stramonio,

e) J. Bauhin a. a. O. III. Th. II. S. 413.
f) Krascheminikow a. a. O. S. 92. 93.

www.dlibra.wum.edu.pl

Hyoscyamo et Napello &c. übersezt durch Schinz. Zürch 1763. Pl. III.

Er wächst in Steiermark und der Schweiz auf hohen Gebirgen, und hält mehrere Jahre aus.

Seine Wurzel ist knollig beinahe wie eine Stekrübe, und giebt mehrere Zasern von sich. Sein Stengel wird sehr hoch, zuweilen sechs Schuhe hoch, theilt sich in viele Aeste, und verliert sich zulezt in eine Rispe. Uebrigens ist er meistens aufrecht, fest, dik belaubt, und blumenreich. Seine Blätter sind dunkelgrün und glänzend, vest, breit, und in mehrere keilförmige, auseinandergesperrte, eingeschnittene und spizige Stüke zerschlissen; sie stehen ohne bestimmte Ordnung, die untern auf kurzen Stielen, die obern, welche keinen Glanz haben, fast ohne Stiele. Seine zahlreichen und lokern Blumenähren sizen in den Winkeln der Blätter auf eigenen Stielen, welche zuweilen einen Zoll lang, und gemeiniglich in kleinere getheilt sind, und viele Blumen tragen. Seine Blumen haben keinen Kelch, aber über dreisig Staubfäden mit breiten elastischen Stüzen, und ausgeschweiften Staubbeuteln, fünf einfache Staubwege, sechs ganz kurze, gefärbte Schuppen, welche im Kreise herum stehen, und zwo hohle krumme Röhren, die aus dem Umfange des Eierstoks entspringen, hinter dem obersten Blättchen der Blumenkrone stehen, sich hintenzu in einen saftreichen krummen Sporn endigen, oben aber mit einem Blättchen bedekt sind, das in drei Stüke gespalten ist. Ihre Krone ist dunkelblau, und hin und wieder grün schattirt; sie hat eine grösere Länge als Breite, und besteht aus fünf ziemlich vesten Blättchen von sehr ungleicher Gestalt und Grösse, welche etwas weit auseinander stehen; das oberste ist das gröste; es ist stark gewölbt, inwendig vertieft,

www.dlibra.wum.edu.pl

und verliert sich in eine steife ziemlich lange Spize: es hat überhaupt sehr viele Aehnlichkeit mit einem Helme. Die beiden Seitenblättchen sind in die Quere oval, und an ihrem Rande fein gekraust; die zwei untersten sind die kleinsten, und eirund, nur daß sie etwas spiziger sind. Jede Blume hinterläßt fünf trokene Samengehäuse, deren jedes nur aus einem Stüke besteht, und viele schwarze, rauhe, und beinahe viereke Samen enthält.

Schon auf der Zunge erregt er in allen seinen Theilen g), vornemlich in dem daraus gedrükten Safte h), einen

g) In der Wurzel, Matthiol in vier Fällen. Comment. in Dioscorid. S. 1095. Dodoens stirp. hist. Pent. III. L. IV. C. 12. aus Turnere. J. Bauhin a. a. O. III. Th. 2. S. 656. aus Richard, Kasp. Bauhin de lapide Bezoar. Basil. 1613. S. 273. Valentini Pandect. medico-legales P. I. S. 6. in dem Stengel, Matthiol a. e. a. O. Störk a. a. O. S. 60. in dem Kraute, Matthiol und Störk a. d. a. O. Fabricius von Hilden. Vorrede ad opera chirurgica Helmontii tumul. pestis Herkules a Saxonia Opera omnia medico-practica. S. 857. Willis a. a. O. Th. II. C. 12. R. Lentilius Miscell. med. pract. Th. II. S. 381. Bacon Philos. Transact. nr. 432. Mordus Kongl. Svenska Academ. Handlingar, 1739. trim. aest. nr. 6. Doch sollen nach Thielisch Abhandlungen der hallischen naturforschenden Gesellschaft, Dessau und Leipzig. 8. B. I. 1783. auf den östreichischen Gebirgen die Ziegen die Blätter ohne Schaden fressen, wenn die Pflanze einmal in der Blüthe ist: in den Blumen, Valvasor Ehre des Herzogthums Crain. Laybach 1689. B. I und II. S. 389. Bradley new Improvenings of planting and gardening. Lond. 1724. S. 131. in dem Samenstaube, Miller Gärtnerlexicon, I. S. 25. in dem Samen, Mathiol a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

beissenden i), brennenden k) und stechenden Schmerzen l); der oft ziemlich lange anhält m), einen starken Zufluss von Speichel n), eine Verschwürung o) und Lähmung der Zunge p), ein Zerfressen q) und eine blaue Geschwulst der Lippen r). Wird er hinunter geschlungen, so sind starkes Erbrechen s), Drüken t) und Schmerzen in dem Magen u), und die Empfindung, als wenn ein kalter Stein darinn läge x), die Empfindung einer Kugel, die sich von dem Nabel nach den obern Theilen des Leibes wälzt, und bis an den Gipfel des Hinterhaupts einen kalten Wind verbreitet y),

---

h) Störk a. e. a. O. Rödder bei Alberti Medic. legal. B. VI. obs. 23. Wepfer Hist. Cicut. aquat. S. 48.

i) Störk a. a. O. S. 61.

k) Störk und Wepfer a. d. a. O.

l) Störk a. e. a. O. S. 60.

m) Wepfer a. a. O. S. 48.

n) Störk a. e. a. O.

o) Bei einem Missethäter, an welchem er einen Versuch angestellt hatte. Matthiol a. e. a. O.

p) Bei einem andern, Matthiol ebendas.

q) Ebendersl. a. e. a. O.

r) An einem andern Beispiele, Matthiol a. e. a. O.

s) Dieses ist oft heilsam; in zween Fällen bei Matthiol und Turner a. e. a. O. in einem bei Reichard a. a. O. S. auch Hünerwolf Ephem. Acad. Caes. Nat. Curios. Dec. II. A. 5. obs. 23. und Sage Analyse chimique &c. I. S. 246.

t) In einem Beispiele Matthiol und Sage a. d. a. O.

u) Richard und Rödder a. d. a. O.

x) Richard a. a. O.

y) In dem dritten Falle, Matthiol a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

die grausamsten Bauchflüsse z) und Bauchgrimmen a), Aufschwellen des Unterleibs b), ein Brennen in dem Hirne c), die Empfindung, als wenn Ameisen durch den ganzen Leib kröchen d), eine Kälte in allen Theilen e), Schmerzen in den Gliedern f), in dem Halse g), in den Kinnladen h), auf der Brust, in den Nieren i) in dem Haupte k), die oft von einem Ohre nach dem andern ziehen l); Entzündung der Augen m), Schwindel n), vorübergehende Blindheit o), Lähmung auf der einen ganzen Seite des Leibes, die oft von einer Seite nach der andern zieht p); Schlummer q),

---

z) Valentini a. a. O.

a) Fabricius von Hilden a. e. a. O.

b) Richard, und in einem Falle Matthiol a. d. a. O.

c) In dem dritten Matthiol a. e. a. O.

d) Bacon a. a. O.

e) In zween Fällen, Matthiol a. e. a. O.

f) Bacon, Sage und Richard a. d. a. O.

g) Richard a. a. O.

h) Ebendersf. a. a. O. und in einem Beispiele Matthiol a. e. a. O.

i) Stechende Schmerzen Richard a. a. O.

k) Ebendersf. a. a. O.

l) Ebendersf. a. a. O.

m) Mit sehr vielen Schmerzen Richard a. a. O.

n) Matthiol, Richard, Sage und Valvasor a. d. a. O.

o) Matthiol a. e. a. O. Von zween oder dreien Tagen. Miller a. a. O. S. 26.

p) Richard, und in einem Beispiele Matthiol a. d. a. O.

q) Bacon und Moräus a. d. a. O. In einem Beispiele Matthiol a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

ungemeine Ermattung und Schwachheit r), Wahnsinn s), Wuth t), Starrsucht u), Zukungen in dem Munde x), den Augen y) und Gliedern z), unerträgliche Bangigkeit a) und Ohnmachten b), gefährliche Veränderungen in dem Aderschlage c), schwarzblaue Farbe in dem Gesichte d), kalte Schweisse e), Harnwinde f), und Aufschwellen der Glieder g), nach den Wahrnehmungen der Aerzte die leidigen Folgen. Sehr oft macht der Tod h), und zwar nicht selten in kurzer

---

r) Trew Commerc. litter. Noric. 1740. S. 395. Richard und Bacon a. d. a. O. In einem Falle Matthiol a. d. a. O.

s) Matthiol a. e. a. O. bei einem Mädchen, welches das Extrakt täglich einigemal zu zween Skrupeln genommen hatte, Herz Briefe an Aerzte Samml. II.

t) Willis a. a. O.

u) Valvasor a. a. O. vornemlich in den Augen.

x) Matthiol und Valvasor a. d. a. O.

y) Matthiol a. a. O.

z) Bacon und Sage a. e. a. O.

a) Matthiol und Richard a. d. a. O.

b) In zween Fällen Matthiol a. a. O. ein todenblasses Gesicht, Valvasor und Sage a. d. a. O.

c) Matthiol, Bacon, Richard a. d. a. O.

d) In seinem lezten Falle Matthiol a. a. O.

e) Bacon a. a. O. auf der Stirne Matthiol a. a. O.

f) Richard a. a. O.

g) Rödder a. a O.

h) Zween Fälle hat Matthiol, zween Valvasor a. d. a. O. einen Mitis bei Sage a. e. a. O. S. 248. einen andern von der Wurzel, welche statt schwarzer Nieswurz gegeben wurde, Willius Beschreibung der natürlichen Beschaffenheit der Markgrafschaft Hochberg. Nürnberg 1783. 8. S. 117. mehrere Dodoens, Turner,

www.dlibra.wum.edu.pl

Zeit l), dem traurigen Auftritte ein Ende; zuweilen erfolgt er, ohne in dem lebendigen Leibe durch die Schrecklichkeit der Zufälle seine nahe Ankunft zu verrathen k).

Geschichte l).

Ich gab einem Missethäter, der zum Tode verdammt war, im Jahre 1561 ein Quentchen von der Wurzel des Eisenhütchens mit Rosenzuker ein, in Gegenwart einiger

---

Fabricius, Willis, Moräus, Bradley, Valentini a. d. a. O. Sigel Nov. Act. Acad. Caesar. Natur. Curios. B. VI. S. 129. davon soll Aristoteles gestorben seyn, Diogenes Laertius de vitis, dogmatibus, et apophthegmatibus Graecorum Philosophorum. Graece et latine cura Meibom. Amstel. 1692. B. V. S. 272.

i) Dodoens, Matthiol a. d. a. O. Nach sehr wenigen Stunden Valentini a. a. O. Nach 24 Stunden Willis a. a. O. Nach zween Tagen Turner a. a. O. ein Mann von 33 Jahren, dem ein Marktschreier einen Skrupel von der Wurzel gegeben hatte, nach heftigem Blutbrechen und blutigen Stühlen auch krampfigten Bewegungen innerhalb einer halben Stunde. Zorn bei Kölle Observation. de aconit. S. 36.

k) So bedienten sich seiner schon ruchlose Giftmischer in den ältern Zeiten, der Tyrann der Herakler Klearch, Athenäus, Deipnosophist. cur. Dalechamp. Lugd. 1683. II. S. 64. Calpurnius bei Plinius a. a. O. XXVII. n. 2. Andere, die noch dazu die unselige Kunst zu wissen vorgeben, auf eine bestimmte Zeit von zween, drei, sechs Monathen, von einem oder zween Tagen zu tödten. Theophrast de Histor. plant. B. IX. S. 124.

l) Sie ist von Matthiol, den ich hier selbst reden lasse, a. e. a. O entlehnt.

www.dlibra.wum.edu.pl

Kaiserlichen Leibärzte, welche sehen wollten, ob ein Gegengift, das sich zuvor bei einem Menschen, der ein halbes Loth weissen Arsenik zu sich genommen hatte, sehr kräftig erzeigte, auch in diesem Falle wirksam wäre. Er nahm es sehr gerne, zumal, weil er lieber im Kerker an Gift sterben, als öffentlich gehangen sein wollte; und dann, weil er immer noch Hofnung zur Rettung hatte. Nach anderhalb Stunden zeigte sich noch nichts, und wir befürchteten alle, es möchte entweder die kalte Luft in Böhmen schuld sein, daß das Eisenhütchen hier nicht giftig wäre, oder es möchte sich deswegen nichts äusern, weil die Wurzel, nachdem sie schon Stengel, Kraut und Blumen getrieben hatte, keinen Saft mehr hatte; wir gaben ihm also noch ein Mal ein solches Pulver, aus dem Stengel, den Blättern, den Blumen und den Samen des Eisenhütchens, aber auch darauf erfolgte nach zwo Stunden nichts. Man führte daher den Gefangenen wieder in den Kerker zurük, und befahl mir auf seine Umstände acht zu haben. Nach einer Stunde zeigte mir der Wächter an, jezt wäre er krank; ich hörte ihn über Mattigkeit in dem ganzen Leibe, über grose Schwachheit und Bangigkeit klagen; er redete zwar schon ziemlich frech, doch war er sich ziemlich bewußt, und sahe mich lebhaft an. Als ich seine Stirne betrachtete, so sahe ich, daß ein kalter Schweis darauf stund, und da ich bemerkte, daß der Aderschlag immer matter wurde, so lies ich ihm das Gegengift reichen; so bald er dieses ausgetrunken hatte, verdrehte er sogleich die Augen, verzog den Mund, zog den Kopf in die Schultern zurük, und fiel in eine starke Ohnmacht so, daß er in der That auf den Boden gefallen wäre, wenn die Wächter ihn nicht gehalten hätten. Ich lies ihm Wein in das Gesicht sprengen, und ihn an den vordern Haaren schütteln; auf dieses kam er so gleich wieder

www.dlibra.wum.edu.pl

zu sich selbst, und hatte einen Stuhlgang. Ich hies ihn nachher auf Stroh bringen, das für ihn zubereitet war, um zu sehen, was weiter mit ihm vorgehen würde. Er beklagte sich über Frost, und erbrach kurz darauf zu seiner Erleichterung faulen, gallichten und schwarzen Unrath heraus. Indessen wandte er sich auf die linke Seite, als wenn er schlafen wollte; indem ich damit umgieng, ihn vom Schlaf abzuhalten, verstummte er auf einmal, ohne alle andere Zufälle, und verschied. Sein Gesicht wurde nach dem Tod schwarzblau, wie wann er gehangen worden wäre.

Was auch die alten Aerzte von ihrem Gifttheil (Aconitum Anthora), ein anderer Arzt von einer goldgelben Fliege, die sich von dem Safte des Eisenhürchens nähre m), und andere von andern besondern Gegengiften gedichtet haben, so leisten auch hier die Brechmittel, und überhaupt das Verfahren, das ich bei den scharfen und betäubenden Pflanzengiften angerühmt habe, die sicherste Hülfe.

Die erwähnten Zufälle zeigen sich aber niemalen alle in ihrer ganzen traurigen Gesellschaft, und nicht immer in ihrer vollen Stärke. Die Pflanze ist nicht in allen ihren Theilen gleich giftig n); sie verliert etwas von ihrer heftigen Wirksamkeit durch Cultur o); sie wirkt nicht mehr so stark,

---

m) Valvasor a. a. O. B. I. und III. S. 379.

n) Theophrast a. a. O. hielt die Wurzel für den giftigsten Theil, und Matthiol glaubte sich davon ebenfalls durch seine Versuche überzeugt zu haben.

o) Darauf, oder auf der Verwechslung mit dem weit mildern Napell (Aconitum Napellus Linn.), scheint es zu beruhen, daß man in Polen, Rußland, Lappland, und Britannien seine Blätter für unschädlich, und sogar für esbar hält, und daß auch S. A. Spielmann de

wenn sie getroknet und alt, als so lange sie noch frisch ist p), nicht mehr so stark, nachdem sie Stengel und Blumen getrieben hat, oder gar in Samen geschossen ist, als da sie kaum aus der Erde hervor sproßte q), nicht mehr so stark, wenn sie durch das Ausdünsten über dem Feuer etwas von ihren flüchtigen Theilchen verlohren hat, oder diese durch allerlei Zusäze gemildert sind r), und dann nicht so stark auf einen Körper, der sich schon darauf zubereitet hat s).

Pferde fressen dieses Gewächs ohne Schaden; andere Thiere aber verabscheuen es; nur hungeriges Hornvieh kostet es im späten Herbste t) und auf den Schweizeralpen nur junges Vieh, welches die Weide noch nicht kennt u); selbst

---

Aconito. Argentor. 1769. seine Blumen als ganz unschädlich angibt, von welchen doch Valvasor und Moräus a. d. a. O. so traurige Folgen erzählen.

p) S. A. Spielmann a. e. a. O.

q) Ritter verschlukte den Saft, der aus dem Stengel flos, als die Pflanze in der Blüte war, ohne Schaden Nov. Act. Acad. Caes. N. C. T. III. App. S. 225.

r) K. Gesner konnte auch einen starken Aufgus der Blätter mit Wasser ohne Nachtheil verschlingen. Hortus S. 244. b. und auch Störk fand die Wirkung des Extrakts weit gelinder, als die Wirkung der fein geriebenen Blätter a. a. O. Der Missethäter, der das Eisenhütchen mit Zukerbrod einnahm, kam davon. Matthiol a. e. a. O.

s) Dem Missethäter, der sich mit Oel eingeschmiert hatte, war das Eisenhütchen nicht schädlich. Matthiol a. e. a. O.

t) von Wulfen bei Kölle a. a. O. S. 34.

u) Raimond Schweizerisches Museum Jahrg. II. 1784. St. 3. S. 202.

www.dlibra.wum.edu.pl

Ziegen x) nicht mehr, wenn es einmal blüht y), aber Ziegen, Schafe und Kühe, die, wenn sie die Weide nicht gewohnt sind, seine Blätter abfressen, kommen gemeiniglich nach den heftigsten Zufällen dadurch um; doch sollen es auf den östreichischen Gebirgen Ziegen ohne Schaden fressen z); wenn Hunde, Kazen und Wölfe, denen man sie mit List, oder Gewalt beigebracht hat, auch nicht immer das Leben einbüssen, so haben sie doch unvermeidlich mit den allergrausamsten Zufällen zu kämpfen.

Noch gewisser ist, nach einigen Nachrichten, bei Menschen und Thieren der Tod, wenn der Saft der Pflanze unmittelbar durch eine Wunde mit dem Blute vermischt wird a), wenigstens erregt er, wenn es auch noch so wenig ist, Magenkrampf, Ohnmachten, Bangigkeiten, grose Hize und Durst, ein Aufschwellen des Arms, und den Brand an demselbigen b); auch sollen ihn die spanischen Jäger zu ihrem Pfeilgifte gebraucht haben c).

Wenn man diese Pflanze äuserlich auflegt, so zieht sie Blasen, und die Wurzel kann wie eine Haarschnur gebraucht

---

x) Heumann und Haller bei Kölle a. e. a. O.

y) Thielisch Abhandlungen der hallischen naturforschenden Gesellschaft. I. S. 379. 380.

z) Ebenderf. a. e. a. O.

a) 1) Avicenna Canon. Venet. 1488. L. IV. 2) Dodoens de purgant. herb. Histor. L. III. C. 72. 3) K. Gesner de lunarib. herbis S. 77. 4) Capivaccius Medicin. pract. L. 7. c. 7.

b) Rödder bei Alberti Medic. legal. T. VI. obs. 23. S. 724. 725.

c) Thuanus a. a. O. B. II. 48. S. 823.

www.dlibra.wum.edu.pl

werden d). Nach einigen Nachrichten e) kommt sie auch unter die Salben, womit sich vormals die Hexen einschmierten. Ihre Wirkung, in welcher sie denen Giften, die scharf, und zugleich betäubend sind, so gleich kommt, läßt allerdings vermuthen, daß sie zu solchen Träumereien gebraucht werden könne.

Auch den Ausdünstungen der Pflanzen hat man schädliche Kräfte zugeschrieben, und Bangigkeiten, Schwachheit, und Ohnmachten auf ihre Rechnung geschrieben f), so gar der Dampf der brennenden Pflanze soll, nach einigen Wahrnehmungen, nachtheilige Folgen für die Gesundheit gehabt haben g).

Wenn diese Beobachtungen auch nicht gerade zu unrichtig, oder falsch sind; so ist doch so viel gewis, daß die Ausdünstungen dieses Gewächses weder Vieh h) noch Menschen i) immer und allenthalben schaden.

---

d) Ehrhart ökonomische Pflanzengifte. II. S. 42.

e) 1) Thuanus a. e. a. O. 2) Valvasor a. a. O. B. III. S. 359. 3) Wier de lamiis übersezt durch Rebenstok. Frankf. 1586. S. 35.

f) 1) Hain Ephem. Ac. Caes. N. C. Dec. I. a. 3. obs. 223. S. 344. 2) Grundelius ebend. Dec. III. a. 9. obs. 92. 3) Trew Commerc. litt. Nor. 1740. S. 395. 3) Bayer bei Scopoli Flor. Carniol. S. 550. 5) Vividet des causes de la production du bon chyle. Par. 1735. S. 203. 6) Miller Gärtnerlexikon I. S. 26. B. 7) Ehrhart ökon. Pflanzenh. IX. S. 94.

g) 1) Quer Flor. espannola II. S. 95. 2) Matthiol Comment. in Dioscorid. S. 1095.

h) Memoir. oeconomiq. de Berne 1762. n. 4.

i) An seinem eigenen Beispiele Herr von Haller. Hist. stirp. Helvet. II, S. 92.

www.dlibra.wum.edu.pl

In Krasnojar gebraucht man die Wurzel, die man mit gehaktem Fleisch zu Kugeln macht, und in die Wälder legt, um Wölfe zu tödten; und schon zu den Zeiten eines Helmont, und Herkules a Saxonia die Blätter äuserlich als blasenziehendes Mittel in der Pest. Stahl rieth den Viehärzten ihren innerlichen Gebrauch in dem Wurm der Pferde an, und Afterärzte waren verwegen genug, die Wurzel bis zu einem halben Lothe selbst Menschen innerlich zu verordnen.

Herr v. Störk fand in dem Safte des Krauts, den er bei schwacher Hize so dik als Extrakt einkochen lies, und zu wenigen Granen meistens in Verbindung mit Zuker gab, ein herrliches Mittel in den meisten Krankheiten, deren Grund in einer Verstopfung kleiner Gefäße lag; auch in venerischen Zufällen, Mutterweh, Wechselfiebern, in anhaltendem Samenflusse, im grauen Staar, und in mehreren Krankheiten der Knochen. Diese Heilskräfte wurden durch die Wahrnehmungen anderer Aerzte, der Leipziger Aerzte k), eines Collin l), Lebmacher m), Thonhäuser n), Gesner o), Andree p), Reinhold q), Spielmann r), Baldin-

---

k) Comment. Lipsienf. Vol. XVII. P. II. S. 302.

l) Obfervat. in morbis acut. et chronic. fact. B. II. art. II.

m) Bei Störk a. e. a. O.

n) Analyf. aquar. Egranar. &c. Vienn. 1772.

o) Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneykunst und Naturkunde, I. Th. 18. St.

p) Diff. de usu salutari extracti Aconiti in Arthritide praef. Boehmer. Hal. 1768.

q) Diff. de Aconito Napello Argent. 1769.

r) Bei Reinhold a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

ger s), Oberteuffer s1), Hufeland s2), Bäck t) und anderer schwedischen Aerzte u) bestätiget. Kämpf fand die Essenz, die er mit Weingeist aus dem getrokneten Kraute gemacht hatte, als ein herrliches Mittel in Gicht und Verhärtung der Drüsen.

8) Napell, blauer Sturmhut, Kappenblume, Narrenkappe, Teufelswurz, Wolfswurz mit grosen Blumen. Jacquin Flor. austr. Pl. 381.

Er wächst in Frankreich, in der Schweiz, in Schwaben und Baiern wild, und hat sehr viele Aehnlichkeit mit dem Eisenhütchen; aber sein Stengel wächst niemalen so hoch, höchstens zween Schuhe hoch. Er ist dicht mit Blättern bekleidet, und endigt sich mit einer dichten, langen und walzenförmigen Blumenähre; seine Blätter sizen auf eigenen Stielen, und sind schmäler, und gleichsam wie die Hand in fünf Finger getheilt; ihre Abschnitte behalten länger die gleiche Breite, und sind überhaupt schmal und wieder zerschlissen; sie sind nicht so auseinander gesperrt, und an den obern haben sie der Länge nach einen vertieften Strich. Seine Blumenstiele sind kurz, und nur mit einer einigen Blume, und einem

---

s) Pharmacop. Edinburg. additam. auct. Brem. 1776. S. 163.

s1) a. a. O. S. 92. 93.

s2) Ebendas. S. 93. 94.

t) Chronic. Sjukdom. bot. S. 29.

u) Rosenstein und Ribe bei Reinhold a. a. O. Ein anderer schwedischer Arzt Kongl. Svensk. Vetensk. Academ. Handling. 1733. 3. art. 7.

www.dlibra.wum.edu.pl

einem einigen einfachen Blättchen besezt. Seine Blumen sind etwas gröser und satt blau; die Blättchen der Krone sind dichter beisammen, und das obere kürzer. Sie haben gemeiniglich nur drei Staubwege, und hinterlassen auch nur drei Samengehäuse.

Er wirkt gelinder, als das Eisenhütchen, ist aber nichts weniger als unschädlich. Da seine grose Aehnlichkeit mit dem Eisenhütchen häufigen Anlas gegeben hat, ihn damit zu verwechseln; so muß allerdings ein Theil der Wirkungen, die von dem lezten erzählt sind, auf die Rechnung des Napells geschrieben werden.

Wirklich sah van Helmont x) Wahnsinn davon erfolgen, und nach Hacquet y) erregt er bei dem Vieh Entzündung der Eingeweide und löst das Blut sehr auf.

Die Brühe aus den Blumen färbt mit mancherlei Zusäzen grau, grünlichtgelb, gelblicht und meergrün, aber meist schlecht und matt, und selten beständig z).

9) Wolfswurz, gelbes Wolfsgift, gelbes Eisenhütchen, gelber Sturmhut. Aconitum lycoctonum, Blackwell a. a. O. Pl. 563.

Sie wächst in Italien, in der Schweiz, Oberteutschland und Lappland auf Alpengebirgen wild.

---

x) Oper. omn. S. 264.

y) a. e. a. O. I. S. 36. 37.

z) Sieffert Versuche mit einheimischen Farbematerien zum Nuzen der Färberei. Altenburg 8. Erstes Stük 1775 S. 200—207.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sie hat viele Aehnlichkeit mit dem Napell. Ihre Blätter sind breiter und haarig, und die Lappen, in welche sie sich theilen, wie die Finger an einer Hand ausgestrekt. Ihre Blumenähren sind lange nicht so dicht und Blumenreich; die Blumenkrone ist zotig, und gemeiniglich gelbgrün, und das oberste Blättchen derselbigen mehr wie eine Walze gestaltet. Sie blüht im Brach- und Heumonate.

Ihre Wurzel als Salat gespeist, hat einer ganzen Tischgesellschaft zu Antwerpen den Tod gebracht, und ihre Blumen erregen, wenn man sie auch nur kaut, auf der Zunge, und in dem Schlunde einen brennenden Schmerzen mit einer Geschwulst, worauf bald Schwindel erfolgt a).

Pferde, Hornvieh b) und Ziegen fressen dieses Gewächs ohne Schaden, aber anderem Vieh, auch Wölfen, Mäusen, Fliegen, Wanzen und Läusen ist es ein gewisses Gift. Man braucht zu solchen Absichten vornehmlich die Wurzel; in einigen Ländern kocht man sie mit Haberbrei, und stellt sie den Mäusen als Gift hin; in andern kocht man sie mit Wasser, oder Lauge, und wäscht damit den Kopf, um ihn von Läusen zu reinigen; oder man stößt sie fein, macht sie mit Oel zu Salbe, und schmiert sie in der nehmlichen Absicht auf c).

Noch erwähnt Ramond d) einer Art Eisenhütchen mit weissen Blumen, die schon an die Haut gebracht durch bloße Berührung Menschen vergifte; nach seiner Erzählung

---

a) J. Baubin a. a. O. B. III. Th. II. S. 653.

b) Hacquet a. e. a. O. I. S. 38.

c) Georgi Bemerkungen einer Reise im russischen Reiche, im Jahre 1772. Petersburg 1775.

d) a. a. O. S. 202. 203.

www.dlibra.wum.edu.pl

soll Herr v. Pfeiffer, als er einmal die Pflanze pflükte, an der Hand und einem Theile des Vorderarms steif geworden, und ein Brautpaar, weil der junge Mensch den ganzen Tag, den er mit seiner Braut tanzte, einen Straus davon in Händen hatte, einige Stunden darauf gestorben sein.

Ob diese Pflanze zu der Linnéischen Gattung Aconitum gehöre, unter welcher auch die neuesten Kräuterkundige keine europäische Art mit weisser Blüthe aufstellen e), möchte ich eben so wenig behaupten als daß die Aconita, welche bei den Alten f) in so üblem Rufe standen, insgesammt unter diese Gattung gezählt werden müssen.

10) Giftige Euphorbie, Euphorbia virosa Willdenow g).

Sie ist in dem mittägigsten Theile von Afrika zu Hause, und unterscheidet sich dadurch von andern verwandten Arten dieser Gattung, daß sie mit vielen Stacheln, welche immer zu zwei stehen, und wie eine Schusterpfrieme zugespizt sind, besezt, übrigens aber nakend und vieleig ist, und daß ihre Blumen auf eigenen Stielen sizen.

Die Hottentotten legen Zweige davon in das Wasser, welches vom Wilde am meisten besucht wird, das dann davon stirbt, auch drüken sie den Saft daraus, vermischen ihn

---

e) Z. B. die Willdenowische Ausgabe von Linnaei species plant. B. II. Th. 2. S. 1232—1239.

f) Z. B. Juvenalis Satyr. X. S. (bei mir) 70.

"sed nulla aconita bibuntur
Fictilibus: tunc illa time, cum pocula sumes
Gemmata, et lato setinum ardebit in auro.„

g) A. t. a. O. S. 882.

www.dlibra.wum.edu.pl

mit dem Safte einer Raupe, die sich auf einer auch giftigen Art Sunach aufhält, und vergiften ihre Pfeile damit h).

11) Zweizeilige Amaryllis, Amaryllis disticha Linn. Paterson a. a. O. S. 51. Abb.

Auch dieses Zwiebelgewächs ist an und hinter dem Vorgebirge der guten Hofnung zu Hause.

Seine Blätter stehen zweizeilig, liegen auf einander und nach auswärts gebogen, vor seinen Blumen steken mehrere in einer Scheide; sie haben sechs an der Röhre der Krone vestsizende, in ihrer Richtung oder in ihrer Gröse ungleiche Staubfäden, und einen Staubweg, auf dessen Fruchtknoten die Krone aufsizt, und dessen Narbe in drei Lappen gespalten ist; die Krone ist glokenförmig und besteht aus sechs unten verwachsenen Blättchen von gleicher Gröse.

Das Vieh, das ihre Blätter frißt, bleibt auf der Stelle tod liegen i); aus der Zwiebel, welche sie, wenn die Blatter so eben ausbrechen, in die Quere zerschneiden, drüken die Hottentotten den Saft, verdiken ihn an der Sonne, bis er ungefähr so dik wie Kleber ist, und bereiten sich so ein Gift, womit sie ihre Pfeile zur Jagd beschmieren k).

---

h) Paterson narrative of four journeys into the country of the Hottentots and Cafraria in the Years 1777, 1778 und 1779. London 1789. S. 62. 170.

i) Ebendersf. a. a. O. S. 51.

k) 1) Ebendersf. a. a. O. S. 169. 2) Thunberg Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770—1779. Upsala 8. Th. I. 1789. S. 182.

www.dlibra.wum.edu.pl

Von den noch folgenden Gewächsen oder Gewächssäften bin ich ungewis, ob sie diesem, oder vielmehr denen des zweiten Abschnitts zugezählt werden müssen.

12) Cestrum.

Eine Gattung Bäume, welche, auserhalb Europa, nur in wärmern Ländern zu Hause ist; die Arten, welche hieher gehören, haben Blumen mit fünf Staubfäden und einem Staubwege, dessen Fruchtknoten vom Kelche umschlossen wird, und eine trichterförmige aus einem zusammenhängenden Stüke bestehende Krone, und tragen Beeren, welche, ohne in Fächer getheilt zu sein, viele Samen enthalten.

α) Cestrum nocturnum Linn. Gärtner de fruct. et semin. plant. Cent. 7. Pl. 71. Abb. 9.

Dieser Baum ist in Jamaika, Cuba, Chili zu Hause. Seine Blätter haben einen Umris, der gleichsam in der Mitte zwischen der Gestalt eines Herzens und der Ründung eines Eies ist, und sind so lang als die Blumenstiele, welche immer mehrere Blumen zugleich tragen, und eine Art von Traubenkämmen bilden; die Blumen haben bei Nacht einen sehr angenehmen Geruch, eine grünlichte Krone mit trichterförmiger Röhre, und eiförmigen Lappen, zwischen deren jedem ein Zähnchen steht, und an den Staubfäden in deren Mitte auch einen Zahn.

Schon von seinem Laube glauben die Einwohner von Chili, daß es dem Hornvieh Gift ist, obgleich absichtliche Versuche nichts entscheiden l). Seine Beeren sind Menschen äuserst giftig m).

---

l) Molina a. a. O. S. 166.

m) Sloane hist. of Iamaica &c. II. S. 96.

www.dlibra.wum.edu.pl

β) Ceſtrum laurifolium. l'Heritier ſtirp. nov. IV. Pl. 34.

Es wächſt auch in Jamaika wild, hat glänzend glatte lederartige und elliptiſche Blätter, die den Lorbeerblattern nahe kommen, und längere Stiele als die Blumen haben, blaßgelbe Blumen und in dieſen an den Staubfäden bald ein Zähnchen, bald keines, und ſaftige, dunkel purpurrothe ſehr giftige n) Beeren.

γ) Ceſtrum veſpertinum. Jacquin ſtirp. amer. pict. Pl. 16.

Auch dieſes iſt in Amerika zu Hauſe.

Es hat elliptiſche oder länglicht eiförmige Blätter, in deren Winkeln die Blumen auf ſehr kurzen Stielen gedrängt in einer Art Aehre beiſammen ſizen; ſie haben an ihrer Krone eine ſehr lange fadendünne Röhre und ſcharf zugeſpizte Lappen, und an ihren Staubfäden kein Zähnchen.

Auch ſeine Beeren ſind giftig o).

δ) Ceſtrum venenatum. Burmann Flora indica accedit ſeries zoophytorum nec non prodromus florae capenſis. Amſtelod. 1768. 4. S. 5.

Es wächſt am Vorgebirge der guten Hofnung, und hat eine harte braune riſſige Rinde, und ganz glatte, lederartige, lanzenförmig, länglichte, geäderte, ausgeſchweifte, auf der untern Fläche weis gelblichte Blätter, welche auf kaum merklichen Stielen ſtehen; ſeine Blumen ſizen auf ſehr kurzen

---

n) Ebenderſ. a. e. a. O.

o) Puihn a. e. a. O. S. 53.

www.dlibra.wum.edu.pl

diken Stielen in den Winkeln der Blätter in Büscheln beisammen, und haben einen sehr kleinen Kelch, an der Krone eirunde Lappen, welche dreimal kürzer sind als die Röhre, sehr kurze Staubfäden mit aufrechten eirunden Staubbeuteln, und einem Staubwege, einem fadendünnen Griffel, der so lang ist, als die Staubfäden; seine Beeren sind länglicht und blau. Seinen Saft gebrauchen die Buschhottentotten mit Schlangengift vermengt zum Vergiften ihrer Pfeile p); und der Landmann gebraucht seine Samen gestampft und mit Fleisch vermengt, um Raubthiere damit zu tödten q).

13) Chrysospermum grandiflorum. Rolander Act. litter. Univers. Hafnienf. B. I. S. 288.

Scheint der Linneischen Gattung Echites anzugehören, hat einen Milchsaft, schmekt sehr bitter, und wird für giftig gehalten r). Sie ist im mittägigen Amerika zu Hause.

14) Polymnia graveolens. Rolander a. a. O. S. 299.

Sie ist in Surinam zu Hause, und hat einen schweren Geruch. Ihre Blumen sind aus mehreren kleinen zusammen gesezt, welche auf einem mit Spreu besezten gemeinschaftlichen Boden stehen, und in einen doppelten Kelch eingeschlossen sind, von welchen der innere aus zehen nachenförmigen, der äusere aus vier bis fünf Blättchen besteht; die mittlere dieser Blümchen haben eine röhrenförmige Krone und fünf in

p) Thunberg a. e. a. O. S. 181.
q) Burmann a. e. a. O.
r) Rolander a. e. a. O. S. 6.

www.dlibra.wum.edu.pl

einen hohlen Staubbeutel sich verlierende Staubfäden, mit einem unvollkommenen Staubwege, und hinterlassen daher keine Samen; die äusern hingegen hinterlassen, ob sie gleich nur einen Staubweg ohne Staubfäden in sich haben, reife Samen, doch ohne Krone.

Sie wird für giftig gehalten s), doch der Absud davon von den Eingebohrnen und Schwarzen in der Lustseuche gebraucht.

15) Sternanis, Illicium anisatum Linn. Regnault botan. Pl. 396.

Er ist in den wärmern Theilen Asiens zu Hause. Seine Blumen haben sehr viele Staubfäden und Staubwege, welche auf dem Fruchtboden aufsitzen, einen aus sechs Blättchen bestehenden Kelch, und eine gelblichte aus 27 Blättchen bestehende Krone; jede derselbigen hinterläßt sechs bis acht Samengehäuse, die nach Anis schmeken und riechen, im Kreise herumsitzen, etwas breit gedrukt, und auswendig rauh sind, aus zwei Schalenstüken bestehen, und jede einen Samen enthalten.

Ich würde dieses heilsamen Gewächses hier nicht gedenken, wenn nicht Kämpfer t) erzählte, daß man in Persien mit seinen Zweigen die Kräfte eines in Persien allgemeinen als giftig anerkannten Trankes verstärke.

Hier scheint denn auch das Gift der Tikunas und Yamkas einiger Stämme von Eingebohrnen am Maragnon und

---

s) Ebendersf. a. e. a. O.

t) Amoenit. exotic. Fasc. V. S. 883.

www.dlibra.wum.edu.pl

Orenoko u) eine Stelle zu verdienen, von deſſen Zuſammenſezung Condamine x) weiter nichts erfahren konnte, als daß der Saft von mehr als dreiſig verſchiedenen Arten von Wurzeln und Kräutern dazu komme, deren Stengel ſich gröſtentheils um andere Körper herum ſchlingen.

In ſeiner Farbe, Dike und Geruch hat es Aehnlichkeit mit Süsholzſaft; wenn auch Wild, mit damit beſchmierten Pfeilen erlegt ohne Gefahr genoſſen werden kann y), ſogar das Gift, wenn es bei geſunder und unverlezter Haut hinunter geſchlungen wurde, nicht immer z) geſchadet hat, und durch Vermiſchung mit mineraliſchen Säuren unſchädlich wird a), ſo hat es doch ſo wohl hinunter geſchlungen, als wenn Fäden darein getaucht unter der Haut und dem Fleiſch durchzogen wurden, getödtet b); am gefährlichſten aber wirkt es, wenn es durch eine blutende Wunde unmittelbar mit dem Blute vermiſcht, wenn es anderſt nicht zu alt iſt; und tödet, wenn es auch Fiſchen, Würmen und Inſekten unſchädlich ſein ſollte c), oft Schlangen d) und gewis Vögel, Säugthiere

---

u) von Murr Reiſen einiger Miſſionarien von der Geſellſchaft Jeſu in Amerika. Nürnberg 1786.

x) Relation abrégée d'un voyage fait dans l'interieur de l'Amerique meridionale &c. Paris S. 68. 208. ꝛc.

y) 1) Ebenderſ. a. a. O. S. 68. 2) Heriſſant Philoſophical Transactions, B. XLVII. S. 81.

z) Condamine a. e. a. O.

a) F. Fontana Philoſophic. Transact. B. LXX. Th. I. n. II.

b) Ebenderſ. a. e. a. O.

c) Heriſſant a. a. O. S. 81. 83.

d) Fontana a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

und Menschen e), zuweilen ehe noch eine Minute vergeht f).

Darinn kommt also das Gift der Tikunas mit dem oben erwahnten Gifte der Akkawas überein, aber theils weicht es darinn ab, daß es auch hinuntergeschlungen nicht unschuldig ist, und daß, wenn anders die Nachricht, welche Herissant g) aus dem Munde Condamine's erzählt, richtig ist, die Tikunas einer Frau, die den Tod verwirkt hat, das Geschäft anvertrauen, dieses Gift zu kochen, und die Zeit ihres Todes eine Anzeige sei, daß es genug gekocht habe: vielleicht nehmen sie diese Arbeit bei starker Hize und an einem engen Orte vor, wo der Dunst, auch der unschädlichsten Dinge, schaden kann.

Selbst das Gift der Lamas, eines andern Stamms von Eingebohrnen in Peru, das zwar nicht so wirksam als das Gift der Tikunas, aber in Verbindung mit diesem, weit wirksamer ist, scheint hieher zu gehören, da es gänzlich auf die gleiche Art und unter den gleichen Umständen wirkt h).

Sollte vielleicht auch das Fledermäusegift (Bat-bane), das die Einwohner von Gujana gebrauchen, Fledermäuse zu

---

e) Herissant a. a. O.

f) Condamine a. c. a. O. wenn es älter ist, langsamer Brocklesby Philosophic. Transact. B. XLII. Th. 2. S. 409. wenn es z. B. ein Jahr alt ist, nach einer halben Viertelstunde Condamine a. a. O. S. 208.

g) a. a. O. S. 77. 78.

h) Vermuthlich dasselbige, dessen Ulloa Relacion istorica del viage al America meridional &c. und Philosophical Transact. B. XLVII. S. 75. &c. gedenkt.

www.dlibra.wum.edu.pl

töden, und aus den Beeren einer in ihrem Lande am Waſſer wachſenden, ſich an Bäumen hinauf ſchlingenden Pflanze mit breiten dreiekigen Blättern, bläulicht weiſſen Blumen, welche an der Spize an einer Art Traubenkämmen hängen, und mit kugelrunden etwas ſtumpfekigen in einer glatten und grünen Deke liegenden Früchten bereiten i); ſollte nicht ein weiſſes mehliges Gift, das bei dem Stamme Akkawas am Maragnon im Gange iſt, zu welchem der Kern der Karunnanus kommt, und das ſie manchmalen bei ihren Zuſammenkünften, wenn ſie im Sinne haben, eine Beleidigung zu rächen, unter ihren Nägeln verbergen, und nun unverſehens in das Getränk desjenigen bringen, den ſie ihrer Rache aufopfern wollen k), hieher gehören?

---

i) Bancroft a. a. O. S. 102.

k) Ebenderſ. a. a. O. S. 98.

www.dlibra.wum.edu.pl

Zweiter Abschnitt.

Betäubende Pflanzengifte, die durch den innerlichen sowohl, als durch den äuserlichen Gebrauch tödlich werden.

1) Schlafmachender Mohn. Papaver somniferum Linn. Papaver album et nigrum. Blackwell a. a. O. Pl. 482. 483.

Er dauert nicht über den Winter aus, ist in den mittägigen Gegenden Europens und in dem wärmern Asien zu Hause, und wird in beiden stark gebaut. Sein Stengel ist ganz glatt, und wächst gemeiniglich nur zween, in Persien aber bis zu vier Schuhen hoch. Die Aeste, die er treibt, sind wie Arme ausgestreckt. Seine Blätter sind auch ganz glatt, und meergrün; sie umfassen den Stengel mit ihrer Grundfläche, und haben an ihrem Rande mehrere Zähne von verschiedener Größe. Seine Blumen sind gros, und hängen, ehe sie aufgehen, niederwärts; sie haben eine grose Menge, gemeiniglich über hundert Staubfäden, welche in mehreren Kreisen dicht um das Samengehäus herum stehen, und weder mit der Krone noch dem Kelche zusammen hängen. Man hat sie auch häufig gefüllt. Ihr Kelch ist ganz glatt, fällt bald ab, und besteht nur aus zwei Blättchen. Ihre Krone besteht gemeiniglich aus vier rundlichten, weit offenstehenden, und gleichsam welken Blättchen, fällt bald ab, und ist bei der wilden Pflanze meistens grau, mit einem schwarzblauen

www.dlibra.wum.edu.pl

Flekken an dem untern Ende eines jeden Blättchens, sonst aber auch weis, blau, oder roth. Ihr Staubweg ist ohne Griffel, hat aber eine Narbe, die an der künftigen Frucht bleibt; diese sizt auf einem eigenen Stiele, und ist ganz glatt, kugelrund und mit einem runden gestreiften Dekel bedekt; unter diesem hat sie im Kreise herum zehn bis zwölf Löcher, und inwendig eben so viele unvollkommene Scheidewände. An diesen hängen unzählige, rauhe, süse, ölichte, weisse oder schwarze Samen. Dieses trokene Samengehäus wird zuweilen so gros, daß es siebenzig Loth Wasser in sich halten kann.

In heissern Ländern, wie Apulien, Egypten, Arabien, Persien l) sind schon die Ausdünstungen dieser Pflanze schädlich. Leute, die sich oft, und lang in einer damit angefüllten Luft aufgehalten haben, fallen wie todt zur Erde, sind ganz gefühllos, werden schwarzblau, bekommen ein Zittern, und zehren aus m). Auch Wasser, das mit frischen Mohnsamenköpfen gekocht wird, macht, wenn es getrunken wird, anfangs zänkisch, dann gleichsam entzükt, endlich unsinnig oder ausnehmend fröhlich; hintennach aber dumm n). Auf den Genus eines einigen Samenkopfes hat man in Ostindien den Tod unvermeidlich erfolgen gesehen o).

---

l) Chardin Voyage en Perse et autres lieux de l'Orient. Amsterd. 1711. B. I. S. 12.

m) Ebendersf. a. a. O. so wohl bei dem Sammlen, als bei dem Kochen des Saftes.

n) Ebendersf. a. a. O. B. II. S. 68. 69.

o) Grose Voyage aux Indes orientales, traduit de l'Anglois Paris 1758. S. 193.

www.dlibra.wum.edu.pl

Am bekannteſten hat ſich durch ſeine ſchädlichen, ſo wie durch ſeine angenehmen und heilſamen Wirkungen der Saft gemacht, der aus allen Theilen der Pflanze, wo man Einſchnitte macht, weis, wie Milch, fließt, und hernach gerinnt, und troken wird. Der Saft, der auf dieſe Art blos aus den Samenköpfen gewonnen wird, und eigentlich Opium heißt, iſt weit vorzüglicher, als der, den man aus Samenköpfen und Blättern ausdrükt. Sein Geruch iſt beſonders, eben nicht ſehr angenehm, aber betäubend. Sein Geſchmak iſt ſcharf und bitter. Er iſt zäh, und von einer dunkeln, röthlicht-brauner Farbe, die ſich in die gelbe verwandelt, wenn er fein zerrieben wird. Gemeiniglich kommt er in Geſtalt von Kuchen nach Europa, die oft gröſer, als eine Fauſt, und mit Blättern und andern Unreinigkeiten von Pflanzen bedekt ſind.

Die Aerzte, die ſchon in ältern Zeiten die Kraft des Mohnſafts kannten, ſtritten ſich lange über die Art, wie der Mohnſaft wirke, und über die Theile, die in dieſem Safte die wirkſamſten wären. Nur wenige Arzneimittel haben zu ſo vielen Schriften Anlas gegeben, als dieſes; ich will nur die vorzüglichſten anführen:

Mich. Doering de opii uſu, qualitate calefaciente, virtute narcotica, et ipſum corrigendi modo. Ien. 1620.

I. I. Reitter de opio et opiatis. Lugd. Bat. 1623.

Ioh. Freytag de opii natura, et medicamentis opiatis. Groening. 1632.

Dan. Winkler de opio. Vitemberg. 1635.

Ioh. Hartmann Tr. de opio. Marb. 1635.

G. W. Wedel de opio Ien. 1667. et Opiologia. Ien. 1682.

www.dlibra.wum.edu.pl

Fr. Sylvii de le Boe de opii natura et uſu medico. Leid. 1670.

Matth. Tiling Opiologia nova. Francof. 1675.

Phil. Mathon an opium hyſtericae acceſſioni noxium? Pariſ. 1677.

I. I. Waldſchmid monita practica circa opium. Marb. 1679.

M. Ettmiller de virtute opii diaphoretica. Lipſ. 1679. 1694.

Ambr. Heigel opium. Altd. 1681.

I. Birch de opio. Altd. 1681. Leid. 1716.

Ol. Borrichius de ſomno et ſomniferis maxime papaveraceis. Hafn. 1683.

A. Guerin poteſtne Indiarum opium ſine corporis animique noxa venerem accendere? Pariſ. 1688.

Henr. Heydek de uſu opii in catarrhis. Duisb. 1691.

Sam. Schroer de opii natura et uſu, Erford. 1693.

Fr. Vetzow an vires conſociare amant opium et chinchina? Pariſ. 1696.

Mich. Lubeex de opio. Lugd. Bat. 1699.

M. A. Sinapii Tr. de remedio doloris, ſeu materie anodynorum, nec non opii caufa criminali in foro medico. Amſterd. 1699.

Fr. Hoffmann de opiatorum nova eaque mechanica operandi ratione. Hal. 1700. et de opii correctione genuina et uſu. Hal. 1702.

Al. Mich. Denyaw an opium dyſenteriae ſaluberrimum? Pariſ. 1703.,

I. G. de Berger de vi opii rarefaciente. Vitenb. 1703.

I. A. Hofſtetter de Papavere et opio eſculentis Epiſt. Hal. 1704.

www.dlibra.wum.edu.pl

G. F. Reichenau de opio. Leid. 1704.

G. E. Stahl de impoſtura opii. Hal. 1707.

I. Medley de natura et viribus opii. Leid. 1716.

L. C. Bourdelin an opium hyſtericis? Pariſ. 1725.

C. Neumann lect. publ. de opio et caryophyllis aromaticis. Berolin. 1730.

I. Henr. Schulze de medicamentis opiatis officinalibus. Hal. 1737.

Sal. de Monchy de opio. Leid. 1739.

H. C. Zenker de partibus conſtitutivis opii. Goetting. 1745.

I. Iuncker diſſ. ſiſtens caſum matronae largiſſimo uſu opii per plures danos tractatae. Hal. 1744.

A. E. Büchner et Schwarz de genuinis opii effectibus in corpore humano. Hal. 1748.

G. E. Hamberger de opio Diſp. Ien. 1749.

C. H. Oberlin de opio liberius in medicina adhibendo. Argentor. 1752.

I. Ritter de purgantibus validis et opio in hydrope. Vienn. 1754.

B. L. Tralles de opio. Vratisl. T. I. 1757. II. 1759. III. 1760. IV. 1762.

Maxwell Gartſhore de Papaveris uſu tam noxio, quam ſalutari in parturientibus et puerperis. Edimb. 1764.

Sam. Bard de viribus opii. Edimb. 1765.

Triller de opii ſuſpecta ope in pleuritide curanda. Vittemb. 1774.

Rumpel diſſ. de opio. Duisb. 1773.

C. Ioſ.

www.dlibra.wum.edu.pl

C. Ioſ. Wirtenſohn diſſ. qua demonſtratur, Opium vires fibrarum cordis debilitare, et motum tamen ſanguinis augere. Hardenov. 1775.

Hirſch diſſ. de opii modo operandi in mitigandis doloribus. Hal. 1766.

I. Dreſſches diſſ. de opio ejusque uſu. Vienn. 1777. 8.

Lorry Memoir. de la Societ. de medec. à Paris pour les ann. 1777. et 1778.

Haaſe et Eſchenbach.

Haaſe et Apel de uſu opii ſalubri et noxio in morbis inflammatoriis Lipſ. Diſſ. prior. 1777. poſterior. 1779.

Fehr Abhandlung vom Mohnſafte, ins Teutſch überſ. Kaſſel 1778. 8.

Buhr de uſu opii chirurgico. Goetting. 1780. 4.

I. Chrn. Starke comment. de univerſali nuperrime celebrato partum levante adjunctoque recto opii uſu in graviditate, partu, puerperio. Ien. 1781. 4.

Schöpf von der Wirkung des Mohnſaftes in der Luſtſeuche, nebſt andern zur Arzneykunſt und Naturlehre gehörigen Beobachtungen, Nordamerika betreffend. Erlangen 1781. 4.

Schaentlich diſſ. de uſu opii in febribus intermittentibus. Goetting. 1783. 4.

H. D. Reimarus diſſ. animadverſiones de opii praecipue in febribus uſu exhibens. Lugd. Bat. 1784. 8.

Edm. Harriſon diſſ. de opio. Edinb. 1784.

Bened. Boehm diſſ. de rite aeſtimanda opii virtute in morbis et febribus inflammatoriis. Hal. 1784.

www.dlibra.wum.edu.pl

Pasta facultà dell' opio nelle malattie venenre. Bergam. 1788. 8.

C. Cph. Siebold commentat. de effectibus opii in corpus animale sanum maxime respectu habito ad ejus analogiam cum vino. Goetting. 1789. 4.

Fr. Chiarenti Memoir. de la Societé medicale d' émulation à l' école de medecine de Paris. Ann. III. 1800. 8.

Hunnius bei Hufeland Iournal der practischen Heilkunde. B. IX. St. 4. n. 3.

Einige dieser Schriftsteller suchten die Wirksamkeit des Mohnsaftes in einem Oele p); andere in einem groben gummiartigen Wesen, das in dem Gehirn stoke q); andere in einem narkotischen Schwefel r); andere in dem seifenartigen Wesen, das bei dem Kochen des Mohnsaftes in Wasser auf demselben schwimmt s); andere in den harzigen Bestandtheilen t); andere in denen, die sich im Wasser auflösen u); andere in einem flüchtigen Laugensalze, das mit einem schwefelichten Wesen innigst vereinigt ist x), und noch andere in den flüchtigen Theilchen überhaupt, die in die Luft ausdünsten y).

---

p) Stancari Comment. Bononiens. T. I. Bonon. 1731.

q) Sinapius a. a. O.

r) G. W Wedel a. a. O.

s) 1) Büchner a. a. O. 2) Fr. Hofmann de opii correct. et usu. 1702.

t) Meditat. de viribus hypnoticor. S. 167.

u) Alston Essays and observations of Edimburg T. I. und V.

x) Mead mechan. exposit. venenor. Francof. 1763. S. 101.

y) Neumann a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Da der Mohnsaft zuweilen seine Kräfte äußert, ohne merklich an Gewicht zu verlieren z); da durch Rösten und Kochen seine Wirksamkeit sehr geschwächt wird a); da schon seine Ausdünstungen berauschen b), da seine Wirksamkeit nach der Gährung zunimmt, welche immer die feinern Theilchen solcher Säfte mehr entwikelt c); so ist wohl ungezweifelt, daß, wenigstens ein Theil seiner Kräfte auf flüchtigen Theilchen beruhe; da aber das darüber abgezogene Wasser einem jungen Hunde zu ganzen Lothen gegeben, keine Wirkung geäußert hat c*), da ferner das Extrakt, das mit Vorsicht vermittelst Wassers daraus gezogen wird, ganz den Geruch und Geschmak des Mohnsafts hat d), und wenigstens auf Hunde in kleinern Gewichten stärker wirkt, als der Mohnsaft selbst e), da endlich der Mohnsaft um sehr viel schwächer wird, wenn man ihn in Wasser kocht, und fleisig abschäumt f),

---

z) 1) Kaauw Börhaave Impet. faciens Hippocratis. S. 437. 2) van Swieten Comment. in Aphorism. Boerhaavii B. I. Lugd. 1742. S. 370. 371.

a) Tralles, Büchner und Schwarz a. d. a. O.

b) Neumann a. a. O. S. 478. daß sie einen Schlummer bei den Leuten erregen, welche den frischen Mohnsaft einsammeln, bezeugt Plutarch in Sympoſion. L. III. qu. I. ähnliche Zufälle bemerkte Lorry Iournal Encyclopedique B. I. Th. II. S. 71.

c) Neumann und Büchner a. d. a. O.

c*) Buchholz bei Trammsdorf Journal der Pharmacie. B. VIII. St. I. 1800. S. 30.

d) Alston a. a. O. S. 138.

e) 1) Neumann a. a. O. S. 473. 2) Müller de correct. opii S. 17. 18. 3) Hofmann a. e. a. O.

f) Neumann a. a. O. S. 478.

www.dlibra.wum.edu.pl

so scheinen allerdings auch die schleimigen und seifenartigen Theilchen grosen Antheil an seiner Thätigkeit zu haben.

Die Alten schrieben dem Mohnsaft eine kühlende Kraft zu, und suchten sie durch Beimischung von erhizenden Gewürzen zu mildern g); andere leiteten alle seine Wirkungen aus einer erhizenden Kraft her h); andere erklärten sie daraus, daß er alle Bewegungen in dem thierischen Körper hemme i); andere dadurch, daß er die Lebenskraft vermehre k), und noch andere, daß er Blut und Blutwasser ungemein auflöse l).

Wenn ich die grose Verschiedenheit der Zufälle, welche auf den Genus des Mohnsaftes erfolgen, zu Rathe ziehe; so muß ich gestehen, daß es mir äuserst schwer scheint, sie alle aus einer Quelle herzuleiten.

Der Mohnsaft wirkt auf die thierischen Säfte so schnell und auf eine solche Art, daß man nicht wohl annehmen kann, diese Wirkung hänge von einer andern seiner Wirkungen ab. Er löst vornemlich das Blut ungemein auf m); der Aderschlag

---

g) Galenus an mehreren Orten. Method. medendi L. X. C. 8. Oper. omn. &c. op. Chart. Tom. X. S. 290.

h) Döring a. a. O.

i) Ol. Borrichius a. a. O.

k) Büchner und Schwarz a. a. O.

l) 1) Hamberger a. a. O. 2) Pitcairne diff. de circul. sang. in anim. genit. et non genitis 1701. §. 5. 3) Berger a a. O. 4) Fr. Hofmann de mechan. apiatorum egendi rationi. §. 17. 18.

m) Pechlin Diff. de Circulat. sang. S. 128. Baron in den Anmerkungen zu Lemery Cours de Chimie. S. 799. Cartheuser Fundam. mat. med. ration. Ed. nov. T. II.

www.dlibra.wum.edu.pl

wird voll n) und schnell o), das Herz schlägt stärker p); der Athem wird schwer q); es verbreitet sich eine gröſsere Warme durch den ganzen Leib r), es bricht ein Schweis aus s); zuweilen zeigt sich ein unerwarteter Trieb zum Beischlaf t);

Sect. XIII. C. V. Mead a. a. O. S. 103. u. f. Whytt Essays and Observ. of Edimb. II. S. 313. Alston ebend. V. S. 156. Willis Pharmaceut. ration. 1689. P. I. S. VII. C. I. S. 186. Hamberger a. a. O. §. 29. 44. Eller Memoir. l'Acad. de sc. à Berl. T. VII. S. 17. Berger de vi opii rarefaciente S. 110. Act. Budiff. S. 68. Alston sah in einem Versuche a. a. O. S. 160. das Blut davon gerinnen, und andere sahen keine Veränderung in der Flüssigkeit des Blutes. Lorry Iournal de Medecine &c. 1756. I. S. 77. u. f. Militia de morbis exitialibus virginem Patavinam excruciantibus. Patav. 1734. S. 32.

n) Borden Traité sur le Pouls. S. 428.

o) Tralles a. a. O. I. S. 26. auch bei einem Hunde, den man Mohnsaft in die Adern gesprüzt hatte. Alston a. a. O. II. S. 321.

p) Bei einem Hunde, Andreä de irritabilitate animal. Tubing. 1758.

q) Mead a. a. O. S. 103. u. a. m. an Hunden und Menschen.

r) Tralles a. a. O. I. S 67.

s) Wedel a. a. O. Tralles a. a. O. I. S. 132. Diese Wirkung, die durch eine Erfahrung des Herrn von Haller bestättiget ist, läugnet Zenker a. a. O.

t) Cartheuser a. a. O. Tralles a. a. O. I. S. 129. 131. auch nach den neuen Erfahrungen des Herrn von Haller. In dieser Absicht vornemlich wird er von den Morgenländern gebraucht, Alvares a. a. O. S. 56. meist in Milch, die sie verkochen lassen, Beschreibung

www.dlibra.wum.edu.pl

oft reiſſen die von dem aufgelöſten Blute ſtrozenden Gefäſſe u), und eine Wuth, welche Vollblutigkeit zum Grunde hat, wird durch den Gebrauch des Mohnſaftes heftiger x); zuweilen bemerkt man auch Entzündungen y) oder ſchwarzblaue Flekken z) an einzelnen Theilen; oft ſchwillt das Geſicht, oder das ganze Haupt entſezlich auf, und wird roth a). Alle Adern im Geſichte ſtrozen von Blute; es findet ſich Schaum vor dem Munde und Geifer in Menge b). In den daran geſtorbenen Thieren und Menſchen iſt das Gehirn zuweilen voll von ausgetretenem Blute c), ſeine Blutgefäſſe ſind ſehr erweitert d), und ſtrozen vom Blute e); oft ſchießt häufig

---

der Stadt Surate im hiſtoriſchen Porteſeuille 1786. St. X. Oct. S. 425.

u) P. Borellus Hiſtor. et obſerv. medico-phyſ. Caſtr. 1653. Cent. IV. hiſt. 57. Bei einem Schwindſüchtigen. Binninger obſerv. et curat. Montisb. 1673.

x) Lorry a. e. a. O. S. 71.

y) Bei einem Hunde von einem Skrupel Mohnſaft, in den Augen und in dem Gaumen. Act. Budiſſ. a. a. O.

z) Bei einem Jüngling, der ein Quintchen davon in Wein genommen hatte, fünfzehen Stunden, nachdem er es genommen. Hiſt. de l'Acad. des ſciences de Paris 1735. S. 6.

a) 1) Stenzel de Venenis L. I. §. 46. 2) Tralles a. a. O. I. S. 89. u. f.

b) Reineggs bei Blumenbach mediciniſche Bibliothek. Göttingen. 8. B. II. St. 2. 1785. S. 384. 385.

c) 1) Catherwood new Method of curing apoplexies. Lond. 1735. S. 40. 2) Collins ſyſtem. anatom. Lond. 1685. S. 1128.

d) 1) Catherwood a. a. O. 2) Tralles a. a. O. S. 243.

e) Catherwood, Berger, Kaauw Börhaave und Collins a. d. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

thes Blut aus der Nase f); die innere Fläche des Magens ist bei seiner obern Mündung und auf dem Boden stark entzündet, und seine Blutgefässe stark aufgetrieben g). Zuweilen ist die Leiche gleich nach dem Tode voll schwarzbrauner Beulen h), läßt bei dem geringsten Zeichen alle Haare gehen i), und verräth durch den unerträglichen, nicht immer aashaften k) Gestank, die sie gleich nach dem Tode von sich giebt, ihren schnellen Uebergang in die Fäulung l); wird aber von Hunden nicht angetastet; selbst die Raubvögel begnügen sich mit den Schenkeln m).

Ohne Zweifel liesen sich aus dieser Wirkung noch mehrere andere herleiten, wenn sie sich nicht zu schnell zeigten, als daß wir sie für mittelbar annehmen könnten.

Der Mohnsaft wirkt auch auf die Reizbarkeit der Muskelfasern, indem er sie ungemein schwächt. Von seinem Genusse verlieren verschiedene Muskeln an den Gliedern Kraft n)

---

f) Reineggs a. a. O.

g) Pyl a. a. O.

h) Histoire de l'Académie des sciences de Paris a. a. O.

i) Reineggs a. a. O.

k) Ebendersf. a. a. O.

l) Histoire de l'Académie des sciences à Paris a. e. a. O.

m) Reineggs a. a. O.

n) Whytt a. a. O. S. 281. 291. 297. 298. 302. 303. 311. ein Kaninchen wurde davon an den hintern Beinen beinahe gelähmt. Rosa letter. fisiolog. IV. S. 126. bei Anfängern in der Kunst Opium zu essen, werden oft die Muskeln der Zunge gelähmt. Reineggs a. a. O. S. 374. Bucquet, der sich so sehr daran gewöhnt hatte, daß er am Ende hundert Grane davon nahm,

www.dlibra.wum.edu.pl

ohne sich zuvor zusammenzuziehen n*); die Gallenblase o) und Harnblase p) leeren sich nicht aus; die wurmförmige Bewegung des Magens q) und der Gedärme r) wird sehr vermindert; daher auch die Verdauung Noth leidet s); es stel-

---

war zulezt in den Armen gelähmt Eloge de Mr. Bucquet in Hiſtoire de la Societé de medecine à Paris pour l'ann. 1779. S. 92. 93.

n*) In Speichel, Weingeiſt oder Aether aufgelößt und unmittelbar daran gebracht, lähmte er ſo Herz und andere Muskeln bei Tauben. F. Chiarenti Memoir. de la Societé medicale d' émulat. à Paris 8. III. ann. S. 280—282.

o) 1) Kaauw Börhaave nr. 435. 2) Sprögel a. a. O. S. 27.

p) 1) Kaauw Börhaave a. a. O. nr. 434. 2) Bacon a. a. O. S. 759.

q) 1) Fr. Hofmann de imprudenti medicatione multorum morborum, et mortis cauſſa. 2) Haller Memoires ſur les parties irritables &c. Exp. 325. 326. 3) Andreä a. a. O. S. 39. 4) Sprögel a. a. O. S. 26. 28. Mehr von den Wirkungen auf den Magen S. Memoires de l'inſtitut. nationale des ſciences et arts. Scienc. math. et phyſ. B. II. 1800. 4.

r) Hofmann und Andreä a. d. e. a. O. Kaauw Börhaave a. a. O. nr. 431. Sprögel a. a. O. S. 26. 28. 30. 37. Haller a. e. a. O. nr. 397. 390. 405. 408. 411. J. Viventi Epiſt. ad Ill. Hallerum datae. B. IV. S. 75.

s) Die Speiſen werden ſauer oder faulen. Kaauw Börhaave a. a. O. nr. 435. Sprögel a. a. O. S. 55. 70. Willis Pharmaceut. rationalis. Oxon. 1689. S. 57.

www.dlibra.wum.edu.pl

len sich Blähungen t), Mangel der Eslust u) und Verstopfung des Leibes x) ein. Auch wenn die Kinnbaken geschlossen waren, war die Leiche y) selbst nach drei Tagen und späterhin beugsam z). Schon die unläugbare Kraft des Mohnsafts, Krämpfe und ähnliche Uebel zu stillen, scheint diese seine Wirkung zu bestätigen.

Daß der Mohnsaft eine ähnliche Kraft auf die reizbaren Fasern des Herzens und der Schlagadern äusere, ist bisher durch keinen einigen Versuch oder Beobachtung ungezweifelt erwiesen z*). Die Versuche, die man an Fröschen a) und Hunden b) theils mit, theils ohne Beihülfe der Glas-

---

t) Kaauw Börhaave nr. 434. auch nach der neuern Erfahrung des Herrn v. Haller; bei hysterischen Weibern im Morgenlande geschieht das schon von einigen Granen. Reineggs a. a. O. S. 383. 384. bei einem Vernehmern von drei Lothen. Ebenders. a. a. O. S. 385.

u) Tralles a. a. O. S. 142. 143. Pr. Alpin Hist. natur. Aegypt. I. S. 133. Cheyne sanit. infirm. S. 238. 239. schon bei den Anfängern im Speisen des Opium. Reineggs a. a. O. S. 375. auch bei Pferden. Cambridge History of the Eastindies.

x) Tralles a. a. O. II. S. 146. und auch nach der neuern Erfahrung des Herrn v. Haller.

y) Pyl a. e. a. O.

z) Reineggs a. a. O. S. 384. 385.

z*) In denen Versuchen, welche Fontana angestellt hat, wirkte der Mohnsaft unmittelbar an das Herz gebracht nichts; wohl aber seine Auflösung in Weingeist, doch auch dieser allein.

a) Whytt-Essays and observations of Edimburg II. S. 282. u. f. Alston ebendas. V. S. 154.

b) 1) Whytt a. a. O. S. 283. 2) Andreä a. a. O. S. 40.

www.dlibra.wum.edu.pl

linsen gemacht hat, beweisen das nicht, was Whytt und Andreä damit zu beweisen suchten. Thiere, die unter dem Messer eines Zergliederers zittern, denen noch bei ihrem Leben das Rükenmark zerstört c), Brust und Bauch geöffnet d), das Herz ausgerissen e) und der Kopf abgeschnitten wird f), kann wohl das Herz und die Adern aus andern Ursachen matter und langsamer klopfen, als von dem Mohnsafte, den man ihnen eingegossen, oder worein man sie getaucht, oder womit man Herz und Adern berührt hat?

Wenn sich aber Aerzte auf ihre Erfahrungen an Menschen berufen; wenn sie auf den Gebrauch des Mohnsafts, oder solcher Mittel, welche Mohnsaft enthalten, bei Gesunden und Kranken eine solche Veränderung in der Stärke und Schnelligkeit des Herzens und Aderschlags bemerkt haben wollen; so vermuthe ich, daß sie ihre Beobachtungen nicht sogleich auf den Genus des Mohnsafts, sondern erst dann angestellt haben, nachdem das Herz durch die Ueberspannung seiner Kräfte ermattet, und die Häute der Adern durch die äuserst starke Ausdehnung, die sie von dem so sehr verdünnten Blute zu erleiden hatten, bereits erschlafft waren. Wenn sie zu diesem Zeitpunkte, der immer desto eher eintrift, in wie stärkerm Gewichte der Mohnsaft genommen wurde; wenn sie in den lezten Stunden des Lebens, in welchen ohnehin der Aderschlag immer matt und abgebrochen ist, wahrgenommen haben; so irren sie sehr, wenn sie daraus folgern wollen,

---

c) Whytt a. a. O. S. 292.

d) Whytt a. a. O. S. 286. 288. 290.

e) Ebendersl. a. a. O. S. 295.

f) Ebendersl. a. a. O. S. 283.

www.dlibra.wum.edu.pl

daß dieser Zufall eine unmittelbare Folge von dem Gebrauche des Mohnsafts seie, und zwar um desto mehr, da andere grose Aerzte auf den Gebrauch eben dieses Safts den Aderschlag lebhafter, voller und schneller bemerkt haben g).

Der Mohnsaft wirkt auch auf die Nerven, indem er sie betäubt, und ihre Empfindlichkeit schwächt h), ob er gleich unmittelbar daran gebracht, wenn er nicht in Weingeist aufgelößt ist, der es schon für sich thut, nichts wirkt i). Aus dieser Quelle fließt seine Kraft, die Empfindung des Schmerzens zu stillen, die ihm noch alle Aerzte zuerkannt haben. Hunde, denen man Mohnsaft eingegeben, oder in die Kehle oder gesprüzt hatte, hatten so sehr alle Empfindlichkeit verloren, daß man sie prügeln, stechen, schneiden, zwiken konnte, wo man wollte, ohne daß sie es fühlten k). Einem andern Hunde, der Mohnsaft bekommen hatte, konnte man ein brennendes Licht vor die Augen halten, ohne daß sich ihr Stern zusammen zog l). Bei anfangenden Opiumessern erregen einige Grane in Wein oder Brandewein gegeben Taumel, Schlaf und Mangel alles Bewustseins m). Bei einem Manne verursachte ein etwas starkes Gewicht wahre Blindheit n),

---

g) Eine Menge von solchen Zeugnissen S. bei Tralles a. a. O. I. S. 63. u. f. §. IV.

h) 1) Tralles a. a. O. I. S. 101. 2) Whytt a. a. O. S. 281. 297. 299. 302. 303. - 3) Sprögel a. a. O. S. 26. 27. 29. 35. 37.

i) F. Fontana a. a. O.

k) Sprögel a. a. O. Vers. XV. XVII. XX. XXIV. XLIII.

l) Haller in Opusc. minorib. S. 213. 214.

m) Reineggs a. a. O. S. 374.

n) Kurz vor seinem Tode. Willis de anima brutor. S. 298.

www.dlibra.wum.edu.pl

und ein anderer verlor davon den Gebrauch aller Sinne, Gehör und Gesicht ausgenommen o). So macht ein täglich wiederhohlter Gebrauch des Mohnsafts in kleinern Gewichten alle Sinnen stumpf p), die Menschen blöd, vergeslich, für Schmerz und Wollust immer gleichgultiger, feinerer Empfindungen und des Gefühls von Ehrbarkeit unfahig, und immer frostig q).

Durch die Nerven wirkt demnach der Mohnsaft auch auf die Seele. Ein schwaches Gewicht versezt das Gemüth in eine Ruhe und Heiterkeit, die, so lange diese Wirkung dauert, auch dem heftigsten Kummer trozt r). Trunken von eingebildeten Freuden, sieht der Mensch, der den täuschenden Saft zu sich genommen hat, den geliebten Abgott seines Herzens vor sich, und opfert ihm in seiner Entzükung Gesänge s); frei von aller Furcht, selbst von der Furcht des schrekenden Todes, fühlt er sich stark zu allen Unternehmungen,

---

o) Ephem. Ac. Caes. Nat. Curios. Dec. II. A. V. obs. 12.

p) Dies geschieht den Persern nicht nur anfangs auf jeden Gebrauch des Mohnsafts, nachdem seine angenehme Wirkung vorüber ist, bis sie wieder eine Pille davon verschlingen; sondern noch mehr, wenn sie sich schon lange an den täglichen Gebrauch gewöhnt haben. Chardin a. a. O. II. S. 68.

q) Reineggs a. a. O. S. 377. 380.

r) 1) Börhaave Praelect. in institut. propria medicinae ad §. 856. 2) Chardin a. a. O. II. S. 68. 69. 3) Tralles a. a. O. I. S. 96. u. f 4) Kämpfer a. a. O. Fasc. III. obs. XV. S. 652. im Morgenlande fühlen die Opiumesser diese Wirkung erst zwischen dem achten und eilften Tage Reineggs a. a. O. S. 376.

s) Chardin a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

und scheuet keine Gefahr t); von seiner Kraft begeistert fühlt sich der arbeitende u) und denkende Gelehrte x) zu seinen Geschäften tüchtiger, so wie der indische Lastträger Erleichterung und Stärke y).

Auf diese Entzükungen folgt zuweilen, bei schwachen Gewichten, ein süser erquikender Schlaf, der entweder ganz ruhig, oder doch nur durch angenehme Träume unterbrochen ist z).

Aber diese glükliche Wirkungen dauren nicht lange a), und nur bei schwachen Gewichten, und selbst da sind sie nicht

---

t) Geoffroi Tr. de mat. med. B. II S. 695. Daher nehmen es die Türken ehe sie in die Schlacht gehen. S. 1. Hebenstreit Anthropol. forens. Sect. II. M. II. C. II. §. 12. 2) P Belon Observations de plusieurs singularités, et choses memorables, trouvées en Gréce, en Asie, Judée, Egypte, Arabie. Paris 1553. L. III. c. 15. 3) Reineggs a. a. O. S. 377. Daher geben es die Indianer den Elephanten, ehe sie in die Schlacht gehen in einem Getränke. Wolf Reise nach Ceylon. Berlin und Stettin 1782. 8.

u) 1) Geoffroi a. e. a. O. 2) Wedel Opiol. L. II. Sect. IV. C. I. S. 165.

x) Ephem. Ac. Caes. Nat. Curios. Dec II. A. X. obs. 80.

y) Historisches Portefeuille 1786. St. X. Oct. S. 424.

z) 1) Kämpfer a. a. O. S. 102. 2) Charas Pharmac. reg. c. 51. und Nouvelles experiences sur les viperes c. 14.

a) Bei den Persianern fangen sie eine Stunde darauf an, nachdem sie den Saft zu sich genommen haben, und dauern vier bis fünf Stunden. Chardin a. a. O. II. S. 63. Bei den Egyptiern dauren sie nur zwo Stunden lang. P. Alpin de Medic. Aegypt. L. IV. C. I. S. 255. C. II.

www.dlibra.wum.edu.pl

immer ohne Nachwehen; oft lassen sie noch ziemlich lange einen schweren Kopf zurük b).

Aber nimmt man Mohnsaft in stärkerm Gewichte, so verwandeln sich alle diese angenehmen Empfindungen, auf die fürchterlichste Art. Die Heiterkeit der Seele verkehrt sich in unausstehliche Bangigkeiten c), die scheinbare Stärke in Mattigkeit und Ohnmacht d), der Muth zu grosen Unternehmungen in Tollkühnheit e), Wuth f) und Verzweifelung g), das

---

S. 261. fünf und sechzig Stunden lang nach den neuern Erfahrungen des Herrn von Haller.

b) Tralles a. a. O. I. S. 97. 101.

c) Willis de anim. brutor. S. 298. bei Anfängern in 24 Stunden nach dem ersten Genusse Reineggs a. a. O. S. 326.

d) 1) Willis a. e. a. O. Schelhammer Ephem. Acad. Caes. Nat. Curios. Dec. II. A. 5. obs. 12. alles ganz schlaff und hängend, zusammengefallen ohne Kraft und Mannbarkeit; das volle Aussehen in ein ekelhaftes, oft in Wassersucht verkehrt. Reineggs a. a. O. S 379. 381.

e) Diese Wirkung hat er bei den Türken, wenn sie in die Schlacht ziehen. Hebenstreit a. a. O. und bei den Indianern la Loubere du royaume de Siam. T. I. Amsterdam 1691. S. 200. bei andern Morgenländern. Reineggs a. a. O. S. 377.

f) Bei einer Frau von dem Sydenhamischen Laudano liquid. Lorry Iournal Encyclopéd. T. I. Th. 2. S. 72. 73. So geben die Brachmanen in Malabar ihren Vestalen ein Mittel aus Mohnsaft, wodurch diese in Raserei und Zukungen gerathen, um das Volk glauben zu machen, sie seien von dem Teufel besessen. Kämpfer a. a. O. Fasc. III. S. 651.

g) So rennen rachgierige Schwarze in Java, von diesem Safte getrieben, mit blossen Schwerdern durch die

www.dlibra.wum.edu.pl

frohe scherzhafte Gelächter in wahren Wahnsinn h), das lebhafte Gefühl der Freude in gänzliche Sinnlosigkeit i), Unempfindlichkeit gegen alle äußere Gegenstände und Martern k),

---

Straſſen, und stoſſen alles nieder, was ihnen in den Weg kommt, um gewis ihren Tod zu finden. Kämpfer a. a. O. S. 649. Falk wurde zum Theil von Sydenham's Tropfen, von welchen er zuletzt manchen Tag über ein halbes Loth nahm, so verzweifelt, daß er sich selbst das Leben nahm. Georgi in Falks Beytr. zur topographischen Geschichte des russischen Reichs. S. Petersburg. 4. B. I. 1785. S. 45. 46.

h) 1) Van Swieten a. a. O. B. I. S. 372. 2) Vicaire Elem. med. L. II. C. VI. §. 8. 3) Mauchart Ephem. Ac. Caes. Nat. Cur. Cent. I. obs. 15. 4) Kämpfer a. a. O. I. S. 124. 127. schon von drei Granen Ephem. Ac. Caes. Nat. Curios. Dec. II. A. 5. obs. 12. so begehen z. B. anfangende Opiumesser von der zwoten gemeiniglich gedoppelten Gabe eine Menge läppischer Handlungen. Reineggs a. a. O. S. 374. Eben so wirkt der Mohnsaft auch bei Katzen. 5) Bartholinus a. a. O. Cent. IV. ep. 92. 6) Sprögel a. a. O. Verf. 16.

i) Schelhammer Ephem. Ac. Caes. Nat. Cur. Dec. II. A. 4. obs. 12.

k) So war ein Mann von dem Gebrauche des Mohnsafts in einen tiefen Schlaf so ganz fühllos, daß er für todt gehalten, und lebendig begraben wurde. Salmuth a. a. O. Cent. II. obs. 90. Ein anderes Beispiel einer solchen Unempfindlichkeit S. Vicat a. a. O. S. 227. und unter den starken Opiumessern in Persien Reineggs a. a. O. S. 378. So liesen sich vor den Augen eines Kämpfer's a. a. O. S. 652. sieben vornehme Fechter von diesem Safte begeistern, und ihrer Göttin Rhaunus zu Ehren mit dem Schwerde in der einen, und einem

www.dlibra.wum.edu.pl

in Schlagfluß l) oder Lähmung einzelner Theile m), die Wachsamkeit in langen n), tiefen o), durch die entsezlichsten Träume

---

grossen Schilde in der andern Hand eine geraume Zeit aufhängen, daß sie gleichsam in der Luft schwebten, und alle Glieder auf die fürchterlichste Art verdrehten. Eben diese Unempfindlichkeit bemerkt man auch an Thieren, denen Mohnsaft gegeben wird.

l) Wepfer Hist. apoplecticor. observat. et scholiis auctae Scaphus. 1675. S. 25.

m) Vornemlich bei Thieren, Berger a. a. O. § 4. S. 10. Sprögel a. a. O. Vers. XV. XVI. XXII. XXIV. Alston a. a. O. §. 7. Schon von einem Gran Mohnsaft oder zehen Tropfen von Sydenham's Laudanum in Klistir sah Herr v. Quarin grose Angst und eine leichte Lähmung der untern Glieder entstehen.

n) 1) Thevenot Relation de divers Voyages curieux Paris 1696. Vol. II. S. 392. 2) Haller bei Sprögeln a. a. O. S 41. 3) V. Riedlin Linear. medic. A. II. Aug. Vindel 1696. Febr. obs. 27. Von zween Tagen, von einem Meisel, den man in die Nase gesteckt, und mit Mohnsaft bestreut hatte. Timäus a Güldenklee a. a. O. B. II. C. 9. So fiel auch ein Kind von der ehmals häufig gebrauchten Opiumlatwerge. Requies Nicolai in langen Schlaf. Th. Bartholin Act. medic. et philosophic. Hafnienf. T. II. 1673. obs. 20.

o) 1) Willis Pharmac. ration. P. I. Sect. VIII. C. 2. 2) Slater observ. I. obs. 15. 3) Schelhammer a. a. O. Auch bei Hunden, Bartholin a. a. O. Cent. IV. ep. 92. Sprögel a. a. O. Vers. XV. XXI. XXII. XXIV. Bei einem andern, dem man das Sydenhamische Laudanum in die Adern gesprüzt hatte. Ebendersl. Vers. XLII.

www.dlibra.wum.edu.pl

me unterbrochenen p) und ermüdenden q) Schlaf, die Freiheit der Denkungskraft in Berauschung und Schwindel r) die ruhige Stellung des ganzen Leibes in die erschrecklichsten Zukungen s). Und oft macht ein schauervoller, unerwarteter Tod dem ganzen Auftritt in kurzer Zeit ein Ende t).

---

p) 1) Belon a. a. O. L. III. c. 15 2) Schelhammer a. a. O. 3) Tralles a. a. O. I. S. 121.

q) Krüger in der Vorrede zu den Träumen. S. 6.

r) 1) Schelhammer a. a. O. 2) Tralles a. a. O. S. 101. Auch zeigt er sich bei Thieren. Lorry Iournal encyclopéd. a. a. O. Sprögel a. a. O. Vers. XXII. XXIII. XLIII.

s) Riedlin a. a. O. A. IV. Jun. obs. 22. Von zwei Quentchen Clerk bei Alexander a. a. O. S. 110. Bei einem Kinde von der Requies Nicolai. Th. Bartholin von einem Theelöffelchen voll der gleichen Latwerge bei einem andern, Hufeland Iournal der praktischen Heilkunde B. XI. St. 2. S. 18. ꝛc. Von einem halben Gran des Extrakts aus dem Mohnsaft, Tralles a. a. O. I. S. 119. Von einem starken Gewichte des Theriaks, Act. Acad. Caes. Curios. Cent. I obs. 54. Auch bei Thieren sahen Mead, Büchner, Berger, Lorry, Sprögel und andere a. d. a. O. Zukungen ausbrechen, nachdem sie ihnen Mohnsaft eingegeben, oder in die Adern gesprüzt hatten.

t) So starb der Vater Licinii Cecinnä, Plinius a. a. O. B. 20. C. 18. ein gefangener Türke, Marcellus Donatus Hist. med. mirab. L. IV. c. 18. ein Arzt, Riedlin a. a. O. A. II. Febr. obs. 27. ein Soldat von sieben Pillen, in welchen Mohnsaft war, Sanctorius Method. vitand. errores. L. VIII. C. 12. Der Nachfolger eines türkischen Kaisers, Tralles a. a. O. I. S. 366. ein Mädchen von einer Pille, Stalpart van der

www.dlibra.wum.edu.pl

Geſchichte *).

Ein ſtarker Mann nahm in einer grauſamen Kolik zur Erleichterung ſeiner Schmerzen ein ſtarkes Gewicht Mohnſaft

---

Wiel, a. e. a. O. Cent. I. obſ. 42. eine Frau von vierzig Jahren von einer hinunter geſchlungenen Salbe, in welcher Mohnſaft war, Alſton a. a. O. §. 10. Ein ſtarker Mann, Willis de anim. brutor. S. 298 und andere, von einer Pille des Laudani. Ebenderſ. Pharmac. ration. P. I. Sect. VIII. c. 2. und Helwig obſervat. phyſico. medic. poſthum. Auguſt. Vindelic. 1686. 4. Ein anderer von einem ſtarken Gewicht Theriaks Act. Acad. Caeſar. Natur. Curioſ. Cent. I. obſ. 54. Noch ein anderer von einem Quintchen des Philonium romanum. J. Abr. Rumler poſth. obſervat. Cent. medic. edend. Welſch Ulm 1668. 8. ein zween Monate altes Kind innerhalb drei Stunden an 10 Tropfen des Laudanum liquidum. Hufeland a. e a. O. S. 145. Die engliſche Königin Henriette Marie an einer Pille von Opium. Gui Patin epiſt. ad. var. amic. Pariſ. 12. Coll. I. 1685. Ueberhaupt die meiſten von dem Mohnſaft ſelbſt, Joſ. del Papa Philoſ. Transact. nr. 275. Tanarot Principes de Chirurgie I. S. 263. Helwig obſ. S. 328. Von vier Granen Birch a. a. O. II. S. 459. Von ſieben Granen Catherwood a. a. O. S. 39. Von ſechzig Tropfen von der Tinktur. Gherli obſerv. Cent. II. Venet. 1722. obſ. 97. Von zwölf Granen des Mohnſafts ſelbſt, Collins a. a. O. S. 1128. Von zwanzig Granen Eſſays of a Society at Edinb. IV. n. 6. Von zwei und zwanzig Granen, Wepfer Hiſt. apoplectic. S. 235. Von einem Quintchen Eſſays of Edimb. S. 162. Agricola Ammonius Medic. herbar. S. 181. Von dem gleichen Gewichte ein Jüngling Hiſtoire de l'Acad. des ſciences à Paris 1735. S. 6. Innerhalb ſieben Stunden

www.dlibra.wum.edu.pl

zu sich. Bald darauf beklagte er sich über heftiges Drüken auf dem Magen; man gab ihm Kraftwasser, Wein und Brandewein, aber ohne Erleichterung; das Drüken nahm immer mehr zu; er wurde matt, und fiel in Ohnmacht. Er war doch immer wach und bei sich selbst: er rief, seine Lebensgeister nähmen immer mehr und mehr ab; ungefähr nach drei

---

ein Missethäter, Fallopius Tract. de compos. C. 8. Von einem halben Loth bis zu drei Quintchen, die sie mit Wein getrunken hatten, andere Uebelthäter, Lemnius de occult. natur. miracul L. II. C. 52. von 60 Granen vorsezlich ein Jüngling bei Pyl Auss. und Beytr. I. Samml. n. 8. S. 84—92. langsamer ein anderer Mensch Selle ebendas. n. 9. S. 93—96. von drei Lothen ein vornehmer Perser. Reineggs a. a. O. S. 384. S. auch J. H. G. Schlegel a. a O. zweite Sammlung n. VI. 1. 2. und Pfündel ebendas. Erste Samml. 1800. n. XVI. Ueberhaupt ist dies das Loos aller, welche sich einmal daran gewöhnt haben und nun auf einmal aufhören Reineggs a. e. a. O. S. 380. Sollte wohl das Gift, durch dessen einem andern zugedachten Genus Alexander VI. um sein Leben, und Borgia in die gröste Gefahr kam, es auch zu verlieren, nach einer Vermuthung (Zugabe zu den Götting. gel. Anz. 8. St. 1777. S. 126.) Mohnsaft gewesen sein? Die Zufälle, die es dem Pabste selbst erregte, vornemlich das Brennen in den Eingeweiden, die Schmerzen in dem ganzen Leibe, und selbst die Erscheinungen nach dem Tode*) zeigen mir mehr Uebereinstimmung mit den Arsenikgiften.

*) Gordon Vie du Pape Alexandre et de son fils. Borgia, trad. de l'Angl. Amsterd. 1732. II. S. 40. u. f.

u) Willis a. e. a. O. S. 298.

www.dlibra.wum.edu.pl

Stunden klagte er über den Verlust seines Gesichts, und starb.

So gewis diese Wirkungen auf den Gebrauch des Mohnsafts gewöhnlicher Weise schon von einem schwachen Gewichte, von drei bis fünf Granen erfolgen; so giebt es doch Menschen, die von Natur oder durch Krankheit, oder durch Gewohnheit so erhärtet sind, daß sie auch weit stärkere Gewichte ohne Lebensgefahr ertragen. Man sahe Leute 10 x), 12 y), 15 z) Grane, einen Skrupel a), ein halbes Quintchen b), 34 Grane c), ein Quintchen d), ein halbes Loth e),

---

x) Wedel Opiolog. S. 80.

y) Zakutus Lusitanus Medic. princip. histor. Lib. I. obs. 45.

z) Van Swieten a. a. O.

a) Täglich Berger a. a. O. §. 3.

b) 1) Sinapius a. a. O. 2) Fr. Hofmann de acidi et viscidi pro causis morborum, et alcali pro iis debellandis insufficientia. Hal. 1696. S. 51. 3) S. Pauli a. a. O. S. 422.

c) 1) Philosoph. Transact. nr. 275. 2) Charas Histoire naturelle des plantes, des animaux et des mineraux, qui entrent dans la composition de la Theriaque. Paris 1680.

d) 1) Cheyne Tr. de infirm. sanitate tuenda et vita producenda. Lond. 1726. S. 38. 39. 2) S. Paulli a. a. O. S. 422. 3) Bartholin Act. Hafnienf. Vol. II. obs. 20. 4) Sachs von Löwenheim Misc. Ac. Caes. N. C. A. II. obs. 69. und Dec. II. A. X. obs. 80. 5) Gorter Medic. dogmatic. S. 21.

e) Clauder Miscell. Acad. Caesar. Nat. Cur. Dec. II. A. V. obs. 179.

www.dlibra.wum.edu.pl

dritthalb Quintchen f), drei Quintchen g), ein Loth h), zwei i), vier k), sechs l) Loth ohne gewaltsame Zufälle, oft noch mit Erleichterung verschlingen. Ueberhaupt ertragen die Morgenländer auch, wenn sie noch nicht daran gewöhnt sind, viel stärkere Gaben von Mohnsaft, und den daraus bereiteten Mitteln, z. B. einen Skrupel Storaxpillen, und Opium selbst anfangs vier Grane, nach und nach bis an den achtzehenden Tag zehen Grane ohne grosen Erfolg m). Viele bringen es täglich auf drittehalb Loth und noch höher n); die Perser gewöhnlich zulezt auf zwei Loth; man gibt dem, der sich daran gewöhnen will, zuerst einige Grane in Wein oder Brandewein, und bringt ihn dadurch in Rausch und Schlaf; nach sieben bis acht Stunden schüttelt man ihn daraus auf, und nöthigt ihn vieles kaltes Wasser zu trinken; allein er gibt jeden Becher mit Ekel und Uebelkeit wieder von sich, starrt thränend die Umstehenden an, ohne zu wissen, was mit ihm vorgeht, oder sie zu kennen; nun gibt man ihm einige Schalen Wein mit Muskatnus; er erbricht sich zwar

---

f) Hoffstetter Ep. de Papavere et Opio esculentis. Hal. 1704.

g) Philosoph. Transact. nr. 221.

h) 1) Philos. Transact. nr. 275. 2) Rondelet bei Hallern de morbis internis L. I. c. 6. 3) Junker Cas. rariff. matron. opii largissimo usu per plures annos tract. ad Roncall. S. 119. 5) Mercurialis a. a. O. l. C. VI.

i) Josselyn relation of two vovages to new England. Lond. 1674 S. 60. Z B. der indische Lastträger. Historisches Portefeuille 1785. St. X. Oct. S 424.

k) Neumann Opp. omn. cur. Zimmermann S. 947.

l) Jones the mystery of Opium revealed. Lond. 1700.

m) Reineggs a. a. O. S. 382.

n) Garcias ab Horto Aromata S. 22, ꝛc.

www.dlibra.wum.edu.pl

nicht mehr, gähnt aber stark, und erhält, ehe es wieder zum Schlafen kommt, eine doppelte Gabe Mohnsaft, wird durch Geräusch in einem bewußtlosen Zustande erhalten, sperrt den Mund auf, und kann doch nicht reden, und begeht eine Menge lächerlicher Handlungen; nach vier Stunden Ruhe weckt man ihn wieder auf, begießt ihn mit kaltem Wasser, reibt ihm die Augen mit Essig, reißt ihn von seinem Lager, und zwingt ihn zu gehen; er taumelt, stammelt, klagt über Frost, bekommt daher warmen Wein, verlangt zu essen, hat aber kaum einige Bissen hinunter, als er alle Eslust verliert; er hat Neigung zum Schlafe; man läßt ihn aber nur wenige Stunden schlafen, ehe er wieder Mohnsaft bekommt, zwischen dem achten und eilften Tage zeigt denn sein ganz eigener Blik sein glükliches Gefühl, aber gemeiniglich empfindet er vor Verflus von 24 Stunden Beängstigung, bis er wieder Mohnsaft nimmt o).

Ueberhaupt gehen die starken Opiumesser selten ohne allen Nachtheil für ihre Gesundheit aus; am allerwenigsten die Morgenländer, die sich von mehrern Zeugungen her, und schon von ihrer ersten Kindheit an, an diesen verführerischen Saft gewöhnen, und sich ihn gleichsam nothwendig gemacht haben. Ob sie gleich anfangs nur ein Stükchen so gros als einen Nadelkopf nehmen; so steigen sie doch nach und nach bis zu einem Quintchen auf. Nicht nur jedesmal, ungefehr fünf, sechs, bei Anfängern vier und zwanzig p) Stunden, nachdem sie den Lekerbissen verschlungen haben, werden sie, wenn die Begeisterung vorüber ist, traurig, niedergeschlagen,

---

o) Reineggs a. a. O. S. 374—376.

p) Reineggs a. a. O. S. 376.

www.dlibra.wum.edu.pl

kalt, gefühllos, zu allen Arbeiten untüchtig, matt und schwach q), ängstlich, unruhig und zitternd r), und seufzen schmachten nach dem glüklichen Augenblike, da sie ihren Mohnsaft wieder nehmen dürfen s), der ihnen wiederum auf einige Stunden t) Feuer und Leben giebt; sondern diese traurige Verfassung kommt immer stärker wieder; und, wenn sie auch wieder mehr von ihrem Safte nehmen, um die frölichen Stunden zu verlängern, so werden sie doch zulezt auser der kurzen Zeit ihrer Entzükungen so elend, daß sie stets matt u), schwach x), zu allem Geschäfte y), und selbst zu al-

---

q) 1) Chardin a. a. O. II. S. 68. 2) la Loubere a. a. O. I. S. 205. 3) Pr. Alpin hist. nat. Aeg. S. 133.

r) Reineggs a. e. a. O.

s) Chardin a. a. O. und wenn sie diesem Verlangen nicht Genüge leisten, so laufen sie Lebensgefahr (eine solche Geschichte s. a. e. a. O.), oder erfahren zu der Stunde, da sie ihn sonst zu nehmen pflegten, die erschreklichsten Zufälle. Kämpfer a. a. O. Fasc. III. S. 645. Fr. Alpin de medicina Aegyptiorum. L. III. c. 1. da Costa de las droghas de las Indias. Burgos. 1578. Nur Wein kann in diesem Falle seine Stelle vertreten.

t) Chardin und la Loubere a. d. a. O. nach einem Rausche von zehen bis zwölf Minuten Reineggs a. e. a. O.

u) Das bezeugt la Loubere a. a. O. von den Makassaren; Reineggs a. a. O. S. 379. überhaupt von den Morgenländern.

x) Zum Erbarmen die Perser, Chardin a. e. a. O. Die Türken, Birch a. a. O. II. S. 8. Reineggs a. a. O. S. 377. 379.

y) Ein arabischer Emir von einem Gemisch, dem sogenannten Bangé, in welches Mohnsaft kommt. Arvieux

www.dlibra.wum.edu.pl

lem Vergnügen z) unfahig sind; alle Kräfte ihrer Seele a), ihre Sinnen b) und Gefühl c) werden stumpf, sie werden viel früher alt d), oder sterben gemeiniglich noch vor dem fünfzigsten Jahre e), oder, wenn sie ja dieses noch erreichen, auch ihr Alter wohl gar noch höher treiben, so bekommen sie Lähmungen der Glieder f), die abscheulichsten Schmerzen, die bis in das Mark der Knochen dringen g), und eine immer zunehmende Verschlimmerung der übrigen Zufälle. Diese lange Gewohnheit schüzt sie doch nicht gänzlich, daß ihnen

---

Memoires par Rabat. Par. T. III. 1735. S. 21. 22. Die Perser insgemein, Chardin a. a. O.

z) Auch zum Vergnügen der Liebe, Stalpart van der Wiel a. a. O. Cent. II. obs. 47. so sehr er anfangs darauf treibt; kräftiger soll dieses, ohne je ihre Wirksamkeit zu verlieren, eine Latwerge thun, welche so bereitet wird. Man sezt zwei Loth Safran mit süsen Wein in gelinde Wärme, kocht ihn zulezt damit, drükt ihn aus, und kocht ihn so weit ein, daß er so dik, als diker Honig wird, sezt nun zwei Loth klein geschnittenen Mohnsaft, und eben so vielen geschabenen grauen Amber zu, kocht alles so weit ein, bis es troken ist, und theilt es in zween gleiche Theile, von welchen jeder auf einen Monat hinreicht. Reineggs a. a. O. S. 381.

a) Arvieux und Chardin a. d. a. O. Willis de anim. brutor. S. 232.

b) Chardin und Pr. Alpin a. d. a. O.

c) Chardin a. a O. bis zum Ekel, Reineggs a. a. O. S. 377—379.

d) Historisches Portefeuille 1786. St. X. Oct. S. 425.

e) Chardin a. a. O.

f) Vallisnere opp. omn. B. III, S. 586.

g) Chardin a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

nicht ein verstärktes Gewicht auf einmal tödlich sein könnte h).

Was ich bisher von dem Mohnsaft gesagt habe, das gilt auch von den Zubereitungen aus demselbigen, so wohl von den morgenländischen, als von den abendländischen. Ihre Wirkung ist bald schwächer, bald stärker, als die Wirkung des Mohnsafts, wie nachdem die Kräfte des leztern durch die Zubereitung selbst geschwächt, oder erhöhet sind. Ich will hier nur diejenigen nennen, von welchen ich Beispiele eines tödlichen Erfolgs aufgezeichnet gefunden habe: das Bange der Araber i), das Coquenaar k) und Bueng l) oder Pouft der Persianer, ein daraus bereitetes Getränk, das Gefangene und zum Tod verdammte Fürsten täglich zu einem gewissen Maase nehmen müssen, davon auszehren, tumm und schläfericht werden, und langsam sterben m), das Laudanum

---

h) Viele Morgenländer nehmen, wenn sie aufs äuserste getrieben werden, Mohnsaft so gros, als ein Daumen, und ein Glas Essig darauf, und sterben daran ohne Rettung, und nach Chardins Erzählung ohne Schmerzen. Chardin a. a. O. II. S. 68. so ein vornehmer Perser von drei Loth Reineggs a. a. O. S. 384. auch die Unterlassung bringt, nachdem man sich einmal daran gewöhnt hat, den Tod, wenn nicht die Leute, was jedoch selten hilft, wieder Essig trinken, oder was sie eher rettet, äzenden Sublimat kauen, der ihnen Lippen und Kinn zerfrißt. Ebenders. a. a. O. S. 379. 380.

i) Arvieux a. a. O. B. III. S. 19. u. f.

k) Chardin a. a. O. II. S. 69.

l) Chardin a. e. a. O. ist von dem Bueng der Indianer zu unterscheiden, zu welchem nichts von Mohn komut.

m) Franz Bornier Voyages. à Paris. 12. I. II. 1679.

www.dlibra.wum.edu.pl

opiatum n), der Theriak o), der Kindermithridat p), die Tinktur von Mohnsaft q), und andere Mischungen der europäischen Aerzte r).

Andere Thiere, doch die Frösche ausgenommen s), vornemlich Hunde, vertragen ziemlich starke Gewichte von Mohnsaft, ehe er ihnen tödlich wird; doch gibt es auch unter ihnen Beispiele eines tödlichen Erfolgs t). Schneller wirkt er, wenn er ihnen in die Adern, oder in das Zellgewebe gesprüzt, als wenn er ihnen durch Mund oder After beigebracht wird; doch ist er auch in dem ersten Falle nicht immer von tödlicher Wirkung u). Diese ist aber am gewissesten, wenn er ihnen troken in eine blutende Wunde gelegt wird x), ob er gleich unmittelbar um die Nerven herum gegossen, unschädlich y) ist.

---

n) 1) Willis Pharmac. ration. P. I. Sect. VIII. C. 2. 2) J. Helwig a. a. O.

o) Act. Acad. Caes. Nat. Curios. Cent. I. obs. 54.

p) Eine ganz schwache Gabe davon tödete ein kleines Kind, Pyl Aufsäze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneykunde. Berlin 8. Samml. VIII. nr. 12.

q) Gherli a. a. O.

r) 1) Sanctorius a. a. O. 2) Alston a. a. O. §. 10.

s) Sprögel a. a. O. S. 29. 30.

t) 1) Sprögel a. a. O. S. 72. 73. 2) Löseke auserlesene Arzneymittel S. 569.

u) Bei Hunden, 1) Elsholz neue Klystirkunst. Berl. 1665. 8. 2) Courten Philosoph. Transact. B. XXVII. nr. 335. auch nicht bei Katzen und Kaninchen. 3) Herissant ebendas. B. XLVII. S. 82.

x) Bei einem Hunde Lorry Recueil periodique d'observations de Medecine &c. B. IV. S. 76.

y) Caldani in Haller Memoir. sur les parties sensibles et irritables B. III. nr. 30.

www.dlibra.wum.edu.pl

Selbst der äuserliche Gebrauch ist durchaus nicht ohne schädlichen Erfolg auf den Menschen. Von den nachtheiligen Wirkungen seiner Ausdünstungen habe ich bereits gesprochen; nun nur noch einige Beispiele von seinen schädlichen Wirkungen bei dem äuserlichen Gebrauche, da er auf einem Schminkpflästerchen an die Schläfe gelegt, an den Muskeln dieser Seite, und zween Tropfen von den Sydenhamischen in einen hohlen Zahn gegossen, überhaupt die heftigsten Krämpfe erregten z); unter der Gestalt eines Klistiers a), oder eines Stuhlzäpfchens b) beigebracht, als Meisel in die Nase gesteckt c), als eine Salbe äuserlich aufgeschmiert d) und als ein schmerzstillendes Oel in den Zahn gelegt e) den Tod verursacht hat.

---

z) Lorry Memoir. de la Societé de medecin. à Paris pour les ann. 1777. et 1778.

a) Bei einem Greise Nikolaus Sermon. II. tract. I. c. 15.

b) 1) Rhazes Continent. L. IX. 2) Galen de morbis vulgarib. L. II. Ein Knabe Nikolaus Sermon. II. c. II. Eine Edelfrau Gattinaria de Soda colerica in cap. 9. Rhasis.

c) Tim. v. Güldenklee a. a. O. L. II. c. 9.

d) Cardanus de subtilitatibus. L. XVIII.

e) Jak. Justinian bei Alex. Benedictus de curandis morbis L. VI. c. 13. So erzählt Cardanus bei Heuchern Mithridates in opp. omn. Vol. I. S. 429. es hätten einen Paduaner, der in einem Turnier den Preis davon getragen hatte, seine Nebenbuhler den Helm, den er abgelegt hatte, um sich zu erholen, inwendig stark mit Mohnsaft eingeschmiert, und er sei, so bald er ihn wieder aufsezte, plözlich erstikt.

www.dlibra.wum.edu.pl

Die Heilart, und die Rettungsmittel bei Unglüksfällen, die aus dieser Quelle entspringen, sind eben diejenigen, die ich bei den betäubenden Giften überhaupt angegeben habe.

Ich würde mich zu weit auser meinem Gebiete verirren, wenn ich noch ausführlicher von dem heilsamen Gebrauche des Mohnsafts sprechen wollte. Ich überlasse dieses also denen Aerzten, welche den Mohnsaft aus einem andern Gesichtspunkte, als ich, zu betrachten haben.

Aber nicht nur in den Morgenländern, sondern auch in Europa hat der getroknete Saft aus den Samenköpfen des schlafmachenden Mohns eine beräubende Kraft: die Versuche, die man in Languedok f), Schottland g) und Teutschland h) gemacht hat, beweisen dieses augenscheinlich.

Andere Theile der Pflanzen, Blumen und Samen, sind nach der täglichen Erfahrung ganzer Länder ganz unschädlich. Das Oel, das aus den lezten gedrükt wird, wirkt durchaus wie ein anderes fettes Oel, und wird von den Malern andern Oelen vorgezogen.

Ich wage es nicht der Klapperrose (Papaver Rhoeas Linn.) unter den Giften eine Stelle anzuweisen, wozu mich die nahe Verwandschaft mit dem schlafmachenden Mohn verleiten könnte. Ich weis wohl, daß einige Aerzte behauptet haben, sie hätten aus ihren Samenköpfen i) einen ähnlichen

---

f) Charas Pharmacie S. 73.

g) Alston a. a. O. S. 112.

h) 1) Dillenius Ephem. Acad. Caes. Nat. Curios. Cent. IX. obs. 43. 2) Haller Histor. stirp. Helvet. S. 18.

i) 1) Alston a. a. O. S. 135. 2) Bouldue Memoires de l'Academie de Paris 1712. pour l'ann. 1712.

www.dlibra.wum.edu.pl

Saft erhalten, wie von dem schlafmachenden Mohn, und andere in ihren Blumen eine betäubende und die natürlichen Ausleerungen aufhaltende Kraft bemerkt; aber ich finde, so gemein die Pflanze auch in ganz Teutschland auf Feldern ist, auch nicht eine Wahrnehmung aufgezeichnet, die mich berechtigen könnte, ihrer hier als eines Giftes zu gedenken. Eben so verhält es sich mit den übrigen Arten des Mohns, von welchen die nahe Verwandschaft mit dem schlafmachenden Mohn eine Aehnlichkeit in den Kräften vermuthen läßt.

Von dem gehörnten Mohn, Chelidonium Glaucium Linn. Flor. Dan. Pl. DLXXXV.

hat man Erfahrungen, welche etwas mehr entscheiden.

Er wächst in England, Frankreich, in der Schweiz, in Italien und auf dem Eilande, Malta, vornemlich auf Sandboden wild.

Seine Wurzel treibt sehr viele Blätter und viele weitschweifige, und auf der Erde aufliegende Stengel; beide haben eine meergrüne Farbe. Der Stengel ist unten ganz glatt, oben aber mit Haaren besezt. Seine Blätter sind etwas rauh; diejenigen, welche unmittelbar aus der Wurzel kommen, sind in acht bis zehen Querstüke mit grosen und wenigen Zahnen am Rande getheilt, und werden immer breiter; diejenigen, die an dem Stengel sizen, umfassen denselbigen, und sind breit, kurz und ausgehöhlt. Seine Blumen sizen jede auf einem eigenen Stiele; sie haben eine grose Menge von Staubfäden, deren Stüzen zuweilen unten mit einander verwachsen sind, aber weder mit dem Kelche noch mit der Krone zusammenhängen; die beiden lezten fallen bald ab. Der Kelch ist haarig, und besteht nur aus zwei, die gelbe Krone aber aus vier Blättchen. Ihr einzelner Staubweg wird zu

www.dlibra.wum.edu.pl

einer gleichbreiten sehr langen Schote, welche inwendig durch eine Scheidewand, auf welcher die Samen ohne bestimmte Ordnung vest sizen, in zwei Fächer getheilt ist.

Schon der unangenehme Geruch der Pflanze läßt uns mit vieler Wahrscheinlichkeit auf eine Uebereinstimmung in den Kräften mit dem schlafmachenden Mohn schliesen. Lowthorp sah in England auf ihren Gebrauch Wahnsinn folgen k), und zu den Zeiten eines Dioskorides verfälschte man mit ihrem Safte den Mohnsaft l).

Mit diesem gehörnten Mohn hat die Natur die Gattung Hypecoum nahe verbunden; sie begreift auch nur Sommergewächse, unter sich, die meist in wärmern Ländern zu Hause sind, ihre Blumen haben auch einen aus zwei Blättchen bestehenden Kelch, und eine gelbe aus vier Blättchen bestehende Krone, und hinterlassen ein Samengehäus, das einer Schote nahe kommt, aber dieses ist bei der vorliegenden Gattung gegliedert, die Blumen haben nur vier Staubfäden mit zween Staubwegen, und von den Blättchen ihrer Krone sind die drei äusern gröser und in drei Lappen gespalten.

Sollten sie denn wirklich zu den Giften m) und zu dieser Abtheilung derselbigen gehören?

α) Hypecoum procumbens Linn. Gärtner a. a. O. Pl. 115. Abb. 4.

Es wächst auf den Steppen bei Astrachan, auf den Inseln des Archipels, im mittägigen Spanien und Frankreich,

---

k) Philos. Transact. abridg. II. S. 642.

l) De Mat. med. L. IV. c. 55.

m) Puihn a. e. a. O. S. 31. 32.

www.dlibra.wum.edu.pl

unter der Saat, und zeichnet sich durch seine breitgedrükten und wie ein Bogen gekrümmten Samengehäuse aus.

β) Hypecoum pendulum Linn. Miller Gardener's Dictionary ic. Pl. 150. Abb. 2.

Es ist in der Provence zu Hause, und hat stielrunde überhängende Samengehäuse.

γ) Hypecoum erectum Linn. Ammann Stirp. rarior. ruth. Petropol. 1739. 4. Pl. 9.

Es wächst in Dauurien wild, und unterscheidet sich durch aufrecht stehende, stielrunde, hin und wieder knotige Samengehäuse.

Gewisser gehört hieher:

Der Kirschlorbeerbaum, Prunus Laurocerasus Linn. Blackwell a. a. O. Pl. 512.

Er ist ursprünglich in der Gegend des schwarzen Meers zu Hause, und erreicht in seinem Vaterlande eine beträchtliche Höhe. Seine Aeste haben eine grüne mit erhöhten Warzen stark besezte Rinde, die bei den alten Aesten braun wird. Seine Blätter haben eine glänzende dunkelgrüne Farbe, welche sie beständig behalten; sie sind dik, wie an den Pomeranzenbäumen, haben einen angenehmen Geruch, wie nach bittern Mandeln, und sizen auf diken und grünen Stielen; an ihrem Rande, der nach der untern Fläche eingebogen ist, haben sie weit auseinander stehende Zähne, und nach dem Stiele hin ein, zwei und zuweilen drei Paare kleiner brauner Fleken. Seine Blumen stehen in länglichten Büscheln beisammen; sie haben sehr viele Staubfäden, welche am Kelche vest sizen, aber nur einen Staubweg; ihr Kelch geht um den

www.dlibra.wum.edu.pl

Fruchtknoten herum, und ist in fünf Abschnitte gespalten; ihre Krone ist weislicht, und besteht aus fünf Blättchen. Seine Früchte sind fleischig, und beinahe rund, der einzelne Stein, den sie einschliessen, ist zerbrechlich, oval und etwas zugespizt, und hat eine hervorragende Nath; der Kern selbst aber eine sehr angenehme Bitterkeit, welche ihn zum Ratafia vorzüglich tauglich macht.

Blumen und Blätter haben einen angenehmen Geruch, und theilen der Milch und andern Flüssigkeiten, worinn man sie legt, einen angenehmen Geschmak nach bittern Mandeln mit; daher werden sie, vornemlich die lezte, häufig in der Küche gebraucht; allein ihr Gebrauch ist äuserst gefährlich, wenn die Flüssigkeiten nicht damit aufgekocht werden, daß die Blätter ihre flüchtigen Theilchen, auf welchen ihre schädlichen Kräfte beruhen, verlieren.

Schon von den Ausdünstungen bekamen Leute, welche die Blätter zum Destilliren vorbereiteten, einen schweren Kopf n), und mehrere Vögel starben blos davon innerhalb einer Nacht o); auch Schafen sind diese Blätter giftig p), und die Beispiele gefährlicher Wirkungen auf andere Thiere, und

---

n) Rosa Letter. IV. sopra alcune curiosità fisiologiche. 1783. 8. S. 113.

o) J. Chr. Döl; neue Versuche und Erfahrungen über einige Pflanzengifte, herausgegeben von Ackermann. Nürnberg 1792. 8. und Nova experimenta circa quaedam venena ex narcoticorum genere. Altdorf 1793.

p) J. G. Stedmann Narrative of a five years expedition against the revolted Negros of Surinam from the year 1770 to 1777. London 4, B. I. 1796. S. 322.

www.dlibra.wum.edu.pl

und vornemlich auf Menschen sind nicht selten q); von zween Studirenden, welche zusammen eine Kanne Milch, worinn drei solcher Blätter eingeweicht waren, mit Thee getrunken hatten, fiel der eine in eine schleichende Krankheit mit Unmachten, der andere in heftigen Schwindel und grose Bangigkeiten r); überhaupt hat Milch, auch, wenn sie nur mit einigen solchen Blättern gekocht war, oft grose Ungelegenheit nach sich gezogen s).

Heftiger als die Blätter selbst, oder ihr Aufgus t), oder ihr ausgedrükter Saft u) wirkt schon das davon abgezogene Wasser, welches das Blut aus der Schlafader eines Kalbes augenbliklich dik, aber nicht, wie anders, gerinnen machte x), eine Schildkröte litt nur wenig davon y); Frösche und Fische giengen von wenigen Tropfen, welche sie verschlukt

---

q) 1) Langrisch Physical Experiments upon Brutes, to which is added a Course of Experiments with the Lauroceraſus London 1746. 2) Abr. Vater Progr. de olei animalis efficacia contra hydrophobiam et veneno lauroceraſi. Vitemb. 1740. 4. 3) Luk. J. Spandau du Cellier diſſ. de lauroceraſi viribus venenatis ac medicatis. Groning. 1798. 8.

r) Abr. Vater diſſ. de lauroceraſi indole venenata, exemplo hominum et brutorum ejus aqua enecatorum confirmata. Wittemb. 1737. 4.

s) Ingenhouß Experience ſur les vegetaux &c. S. 232 Anmerk.

t) Madden Philoſoph. Transact. B. XXXVII. n. 418. S. 92.

u) Ebendeſ. a. e. a. O. S. 94.

x) Roſa a. e. a. O.

y) Ebendeſ. a. e. a. O. S. 112.

www.dlibra.wum.edu.pl

hatten, darauf z). Tauben, denen es eingegossen oder durch den After beigebracht wurde a), Hüner a*), Kazen, denen es eingegeben b), oder zum zweitenmal c) in Wunden gesprüzt wurde, Kaninchen d), Meerschweinchen d*), Hunde und andere Thiere e) tödete es, wenn sie es hinabschlürften, und schon, wenn es auch nur zu wenigen Tropfen in den Mastdarm gesprüzt f) oder in Wunden an den entblößten Muskeln gegossen f*), doch Hunden und Kaninchen wenigstens nicht immer, wenn es ihnen durch eine Wunde beigebracht wurde g), ein Lamm, welches davon gesoffen hatte, fiel davon in Betäubung und Beängstigung; ein anderes,

---

z) J. Schaub diff. sistens Lauroceraſi qualitates medicas ac venenatas inprimis veneni essentiam. Marburgi 1792. 8. S. 28. 29. Exp. VIII.

a) 1) Ebendersf. a. a. O. 28. Exp. V et VII. 2) F. Fontana Traité sur le venin de la vipère, sur les poisons americains sur le Laurier-Cerise &c. B. II. Th. 4. in der teutschen Uebersezung 1787. 4. S. 325. 330.

a*) Penchienati Memoir. de l'Académie des scienc. à Turin pour les ann. 1786 et 1787.

b) J. Schaub a. a. O. S. 26. 28. Exp. I. VI.

c) Ebendersf. a. a. O. S. 29. Exp. X.

d) F. Fontana a. e. a. O. S. 324. 325.

d*) Ebendersf. a. e. a. O. S. 324—326. 329.

e) 1) Du Hamel traité des arbres et arbuſtes. B. I. S 347. 2) Nichols Philoſophic. Transact. for the Year 1739. S. 139. 3) F. Fontana ebendaſ. B. LXX. Th. I. S. 210. ꝛc.

f) Cigna Memor. della Societ. italiana. Veron. B. IV. S. 155.

f*) F. Fontana Traité &c. S. 328.

g) Heriſſant Philoſoph. Transact. B. XLVII. S. 82.

www.dlibra.wum.edu.pl

welchem man es in die geöfnete Kehlader gos, ſtarb davon in Zukungen h); auch Pferden zog dieſes Waſſer eine tödliche Lähmung zu i); überhaupt ſchwächt es bei Thieren die Kraft des Herzens i*); auch auf Menſchen wirkt, das Waſſer, vornemlich wenn es, ohne vorher Waſſer auf die Kirſchlorbeerblätter zu gieſen, oder durch wiederholtes Abziehen, immer wieder über friſchen Blättern gewonnen iſt, leicht tödlich, zween Dienſtboten ſtarben plözlich von zween Löffeln voll deſſelbigen, welche ſie aus Verſehen aus einer Flaſche zu ſich genommen hatten; der Mund war erſt geſchloſſen und Schaum davor k); eine Frau, welcher eine Dienſtmagd dieſes Waſſer als herzſtärkend angerühmt hatte, nahm innerhalb einer Stunde zween Skrupel über drittehalb Loth davon, und ſtarb nach einigen Magenbeſchwerden und Verluſt der Sprache bald darauf; eine andere nahm um die Schuldloſigkeit des Waſſers zu zeigen, nur zween Löffel voll davon, und verſchied ohne Klagen und Zukungen bald darauf, da hingegen eine andere, die über einen Löffel voll davon getrunken hatte, durch den ſchleunigen Gebrauch eines Brechmittels ohne allen Schaden davon kam; auch ein Jüngling, der ſtatt einer Tiſane eine Flaſche mit ſolchem Waſſer ergriff, und etwas davon hinunter ſchlürfte, ſtarb in wenigen Minuten l); ein Mädchen von achtzehen Jahren, das ſehr wohl und geſund war, nahm nicht zween ganze Löffel voll von dieſem

---

h) Roſa a. e. a. O.

i) Rattray London Chronicle 1781. n. 3797. S. 316.

i*) Wurzer actes de la Societé de medecine, chirurgie et pharmacie établie à Bruxélles. P. II. 1800.

k) Venchienati a. a. O.

l) Madden a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

Wasser, und zwar von dem einfachen, das zuerst übergegangen war; in Zeit von einer halben Stunde fiel sie nieder, bekam Zukungen und einen Schaum vor dem Munde, und kurz darauf starb sie; ihre Leiche schwoll nicht sehr auf m). Ein englischer Hauptmann Donellan brachte einem Schwager, einem Jüngling, nach dessen Erbschaft ihn gelüstet, in einer Arznei solches Wasser von Kirschlorbeerblättern bei; es wirkte so schnell, daß er beinahe innerhalb einer Viertelstunde in Zukungen fiel, und mit starren Augen, geschlossenem Munde und Schaum vor demselbigen verschied n); mit eben diesem mehr in's Enge gebrachten Wasser beförderte sich der neueste englische Goldmacher J. Price aus Verdrus, daß ihm seine Versuche sich und andere zu täuschen, zum zweitenmale nicht mehr gelingen wollten, aus der Welt o).

Aber auch dieses Wasser hat seine ganze Kraft dem flüchtigen Oele zu verdanken, womit es getränkt ist; hat man ihm dieses genommen, so ist es Tauben p), Kazen q) und Menschen r) unschädlich.

---

m) Rutty ebendas. for the Year 1739. n. 452. S. 63.

n) London Chronicle a. e. a. O.

o) In einem Briefe aus London abgedrukt in Lichtenberg's und Forster's Götting. Magazin, Jahrg. III. Th. 6. S. 886.

p) F. Schaub a. a. O. S. 31. Exp. XI. XII.

q) Ebendersf. a. a. O. Exp. XIII.

r) Konr. Mönch systematische Lehre von den gebräuchlichsten Arzneimitteln, Marburg. 8. Dritte Auflage 1791. S. 344.

www.dlibra.wum.edu.pl

Deſto heftiger wirkt das Oel ſelbſt; es tödet Blutigel s), Fiſche t), Fröſche u), Schildkröten x), Schlangen y), Tauben z) und andere Vögel a) Kaninchen b), Meerſchweinchen b*) und Kazen c), es mag ihnen durch den Mund, oder durch den After, durch die Mutterſcheide, oder durch Wunden beigebracht werden, ohne den Theil, der es berührt, ſichtbarlich zu verlezen; der Augenſtern wird weiter, und, ſo wie andere Theile gegen andere Reize, ſo gar das ſtärkſte Licht ſo unempfindlich, daß man dergleichen Thiere ins Auge, ja ins Rükenmark ſtechen kann, ohne daß ſie eine Empfindung davon zu erkennen geben d); einem ſolchen Oele hat auch das Aquavit, das man durch Einweichen der Kerne von Kirſchlorbeeren in Brandewein erhält, die Kraft zu verdanken, die es bei täglichem einige Jahre lang anhaltenden Gebrauche bei einem Manne und ſeiner Frau geaufert hat, die Sprache zu nehmen, und die Glieder zu lähmen e).

---

s) F. Fontana a. e. a. O. S. 435.

t) J. Schaub a. a. O. S. 29. Exp. VIII.

u) F. Fontana a. e. a. O. S. 331.

x) Ebenderſ. a. e. a. O. S. 330.

y) Ebenderſ a. e. a. O. S. 430—432.

z) Ebenderſ. a. e. a. O. S. 330. 332. 333. 433. 434.

a) Dölz a. d. a. O.

b) 1) Ebenderſ. a. d. a. O. 2) F. Fontana a. e. a. O. S. 330. 436.

b*) F. Fontana a. e. a. O. S. 330. 331.

c) Dölz a. d. a. O.

d) Ebenderſ. a. d. a. O.

e) Mortimer Philoſoph. Transact. B. XXXVII. S. 173.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sollte wohl das aus bittern Mandeln abgezogene Oel ähnliche Kräfte haben f)? Sollte das auch von Pfirschblättern, wenn sie mit Milch gekocht werden, zu befürchten stehen g)?

In einigen Fällen scheint der fleisige Genus der Milch solche Vergiftete gerettet zu haben h), sie scheint wenigstens mehr zu wirken, als Baumöl i) und Aezsalz, welches Fontana k) gänzlich ohne Erfolg gebrauchte; Herr Dr. Schaub versichert aber, ein Thier, dem er Kirschlorbeerwasser eingegeben hatte, und welches davon in die heftigsten Zukungen verfallen war, durch Salmiakgeist l), andere durch eine Auflösung des Kali in Wasser m) gerettet zu haben. Herr Hofr. Mönch n) rühmt starken Kaffee dagegen. Schon Kochen mit Wasser nimmt ihnen einen grosen Theil ihrer Schädlichkeit o).

Endlich muß ich noch zwoer Arten des Lattichs gedenken, die nach einigen Erfahrungen zu urtheilen, in der Kraft

---

f) Daries Epist. de amygdalis et oleo amararum aethereo. Lipsi. 4. S. 8.

g) Henning medicinische Fragmente. S. 15.

h) 1) Rutty a. a. O. S. 100. 2) Abr. Vater diss. &c. S. 15.

i) Abr. Vater a. a. O. S. 31.

k) a. e. a. O. S. 438.

l) Den schon Mead Mechanic. expos. venen. S. 195. dagegen empfohlen hatte, a. a. O. S. 34.

m) a. a. O. S. 36. Exp. XIV. XV.

n) a. a. O. S. 345.

o) Knopf Commerc. litter. Noric. 1733. hebd. 26.

www.dlibra.wum.edu.pl

ihres Safts nahe an den Mohnsaft gränzen. Ich werde zuerst ihre gemeinschaftliche Merkmale anführen.

Sie sind beide Sommergewächse, und geben frisch einen ziemlich starken Geruch von sich, der dem Geruch des Mohnsafts nahe kommt. Ihr Stengel ist hart, rundlicht, mit vielen Stacheln besezt, und zuweilen gleichsam mit Blutstropfen besprengt; er wird bis drei Schuhe hoch, oder noch höher, und theilt sich in viele Aeste. Ihre Blätter sind gleichfalls hart, und an ihrem Rande, wie eine Säge gezart; ihre Ribbe ist weis, blätterartig, und unten mit Stacheln besezt; die obern Blätter, welche kurz und lanzenförmig sind, umfassen den Stengel; der oberste Theil des Stengels, und der darauf sizende Kelch sind klebricht; der lezte ist walzenförmig, und besteht aus mehreren Schuppen, welche einen häutigen Rand haben, und wie Hohlziegel auf einander liegen; er enthält mehrere, jedoch nicht sehr viele, blaßgelbe, und nach aussen etwas in das Röthlichte spielende Blümchen, welche auf einem nakenden Fruchtboden aufsizen; jedes hat fünf haarzarte Staubfäden, welche sich in einen einigen hohlen cylindrischen Staubbeutel vereinigen, der dem obern Theil des einzelnen Staubwegs gleichsam zur Scheide dient. Ihre Samen sind glatt, gestrichelt, und beinahe eirund; sie haben nur eine einfache Krone, welche auf einem einfachen Stiele steht.

Beide sind voll von einem bittern, hizigen, milchweissen Safte, der, wenn er getroknet wird, am Lichte Feuer fängt. Beide finden sich in den mittägigen Ländern Europens, auch in der Schweiz und in Oberteutschland.

www.dlibra.wum.edu.pl

1) Wilder Lattich, wilder Salat. Lactuca Scariola Linn. Regnaul Botan. mise à la portée de tout le monde. Pl. 345.

Seine Blätter stehen mehr schief, und die untern sind nach der Quere in aufgeworfene Lappen getheilt; die obern umfassen den Stengel, und haben mehr die Gestalt eines Pfeils, eine glatte Scheide und einen rauhen Rand; seine Aeste sind nicht so weitschweifig, als bei dem giftigen; seine Blumen haben einen blasseren Kelch; seine Samen eine Federkrone, und sind oben mit steifen Borsten besezt.

2) Giftiger Lattich, giftiger Salat. Lactuca virosa Linn. Lactuca sylvestris odore viroso. Morison a. a. O. III. S. 7. Pl. 2. Abb. 16.

Diesen findet man nicht nur in dem mittägigen Europa, sondern auch bei Strasburg und in England. Sein Geruch ist stärker. Sein Stengel ist unten stachlicht; seine Blätter haben die Gestalt eines Pfeils, sizen vest auf, sind an dem Rande und der Schneide mit Stacheln besezt, stehen mehr von dem Stengel ab, und die untersten sind breiter, und ganz einfach und unzertheilt.

Nicht nur sein innerlicher Genus, sondern auch schon sein Dunst erregt Schwindel p). Aus seinem Safte gewinnt man durch Abrauchen einen Stoff, der dem Mohnsafte gänzlich gleich kommt q); schon zu Dioskorides Zeiten verfälschte man damit den wahren Mohnsaft r).

---

p) Andry Traité des alimens du carême &c.

q) Essays of a Society at Edimburgh. V. S. 124.

r) Dioskorides de Mater. med. L. IV. c. 55.

www.dlibra.wum.edu.pl

Hieher scheint auch das Gift zu gehören, womit die Makassaren die Spize ihrer Pfeile beschmieren.

Es kommt von einem Baume, der vornemlich auf den Inseln des indischen Meers an öden Stellen, auf unfruchtbarem und ausgebranntem, steinichtem oder Sandboden wächst, und bei den Einwohnern von Malakka Lupo-Matta-Ju, bei den Malaien Caio-upas oder Boa-upas, bei den Makassaren und Celebensern Ipo, bei den holländischen Pflanzern Giftboom, makassarischer Giftboom und Spattenboom heißt, auch von Rumpf unter dem Namen Arbor toxicaria s) beschrieben und abgebildet, aber in Absicht auf Blüthe und Frucht noch nicht näher bekannt ist.

Er hat einen diken Stamm mit runzelichter, rissiger und graubrauner Rinde, und einem vesten gelblicht weissen und schwarzgeflekten Holze; seine Aeste stehen weit vom Stamme ab; seine Blätter sizen auf ganz kurzen Stielen ohne bestimmte Ordnung an den Zweigen; sie sind unzertheilt, zween Zolle breit und eine Spanne lang, übrigens länglicht, spizig, mit gleichlaufenden Nerven besezt, auf der obern Fläche runzelicht, auf der untern wollig.

Schon die Ausdünstungen dieses Baums wirken so gefährlich, daß Vögel, welche sich auf seine Aeste sezen, todt davon niederfallen; andere die ganze Gegend vermeiden, und Menschen, welche sich ihm unbedekt nähern, in allen Gliedern gleichsam eine Frostkälte erfahren, und, wenn sie

s) Herbarium Amboinense. B. II. S. 263. Pl. 87.

www.dlibra.wum.edu.pl

mit bloſem Kopfe darunter ſtehen, ihnen die Haare ausfallen, und der Kopf aufſchwillt.

Um daher den Saft, der, ſo lange er noch flüſſig iſt, eine blutrothe Farbe hat, aber bei dem Erhärten beinahe ſchwarz wird, doch immer bei gelinder Hize wieder ſchmelzt, zu erhalten, ſteken Männer, die ſich Kopf, Hände und Füſe ſorgfältig bewikelt haben, lange Bambusrohre, die oben wie ein Wurfſpies zugeſpizt ſind, mit auſerſter Gewalt ſchief in die Borke des Baums; ſo füllt ſich das äuſerſte Gelenk des Rohrs mit Saft, der, ſo lange er noch weich iſt, in Stengelchen oder Kügelchen gedreht, und in ſolchen Röhren aufbewahrt, nachher an einem mäſig warmen Orte in zehnfache Leinwand eingewikelt hingelegt, und alle Wochen, damit er nicht ſchimmele oder durch Ausdünſten an Kraft verliere, wohl abgewiſcht wird. Man prüft, ob das Gift gut und wirkſam iſt, mit der Wurzel von Zerumbet, die man zu Schleim ſtampft, den Schleim durchdrükt und durchſeiht, nachher etwas Waſſer und nun von dem zu prüfenden Gifte zuſezt; entſteht davon plözlich ein Aufbrauſen, ſo ſchließt man auf die gute Beſchaffenheit des Giftes, deſto mehr, wie lebhafter dieſes Aufbrauſen iſt.

Obgleich das Gift oft ſchon in einigen Monaten, meiſt innerhalb eines Jahres etwas, und gewöhnlich in zwei Jahren ſeine ganze Kraft verliert, ſo wirkt es doch friſch auf Pfeile geſchmiert, ſo heftig, daß Leute, welche davon getroffen werden, eine äuſerſt heftige Hize, Schwindel, Zittern der Glieder, Hüpfen der Sehnen bekommen, und zuweilen in 16 Minuten unter den gröſten Bangigkeiten ſterben, ſelbſt durch ſchnelles Abnehmen des verwundeten Gliedes nicht ge-

www.dlibra.wum.edu.pl

rettet werden können t). Zuweilen soll es doch erst nach einigen Jahren töden u).

Man kennt in Ostindien bisher kein kräftigeres Gegengift, als die wahre Schlangenwurzel, die die Indianer nicht nur mit Wasser einnehmen, sondern auch mit Speichel zu Brei gemacht äuserlich auflegen x); auch rühmen die Einwohner des Vaterlandes dieses Baums den blos äuserlichen Gebrauch der blos gestampften frischen Blattstiele und Wurzeln von Momordica Charantia Linn. den Saft der Melonenkürbisse, die Rinde der Ficus racemosa blos gekaut, die Rinde des weissen Saijang und die Wurzel des Kajo Radia, den äuserlichen und innerlichen zugleich von den Wurzelfasern einer Art Feige (Varinga), und die Zwibel des asiatischen Krinum y).

So gefährlich aber auch immer dieses Gift ist, so wird es doch roh und unvermischt äuserlich und innerlich gegen die Verlezungen von giftigen Fischen und Skolopendern, und eine daraus mit dem Mark von Pisang gemachte Pille in Geschwüren und Kräze innerlich gebraucht z).

---

t) K. P. Thunberg diss. resp. Chr. Aeimelaeus, de arbore toxicaria Macassarienſi. Upsal. 1788. in dissert. academ. Goetting. 8. B. I. 1799. S. 259—268. 2) E. W. Martius gesammelte Nachrichten über den makassarischen Giftbaum. Erlang 1792. 8.

u) Kämpfer a. a. O. III. S. 575.

x) Ebendersl. a. e. a. O.

y) K. P. Thunberg a. e. a. O.

z) Rumpf a. e. a. O. S. 269.

www.dlibra.wum.edu.pl

Sollte endlich hieher das Gift gehören, von welchem Aristoteles a) erzählt, daß es in Italien am Berge Circäus wachse, und auf der Stelle die Haare ausfallen mache, und schnell abzehrende Bauchflüsse verursachte?

---

a) Περι θαυμασιων ακουσματων Ed. du Val. II. S. 722. "λεγεται δε περι την Ιταλιαν εν τω κιρκαιω ορει Φαρμακον τι Φυεσθαι θανασιμοι, οἱοιαυτην εχει την δυναμιν, ὡστε ἂν προσρανθη τινι, παραχρημα πιπτειν ποιει και τας τριχας τας ἐν τω σωματι ἀπομαδαν, και το συνολον του σωματος διαῤῥειν τα μελη, ὡστε την ἐπιφανειαν του σωματος ειναι των ἀπολλυμενων ἐλεεινην· τουτο δε Φασι μελιοντας διδοιαι κλεωνυμῳ τῳ Σπαρτιατῃ παυλον τον πευκεσιον, και Γαιον Φωραθηναι και ἐξεταθεντας ὑπο Ταραντωιον θανατωθηναι."

Zweite Klasse.

Widernatürliche Pflanzengifte.

Viele Gewächse haben nach dem gewöhnlichen Laufe der Natur so gar keine giftigen Eigenschaften, daß sie vielmehr Menschen und Thieren zur angenehmsten und gesundesten Nahrung dienen, oder wenigstens ganz und gar unschädlich sind. Aber Umstände, die in den Veränderungen der Luft, so wohl nach ihrer Trokenheit, als auch ihrer Wärme, in verschiedenem Ungeziefer, und in der Nachläßigkeit, oder in der geflissentlichen Bemühung des Menschen ihren Grund haben, können diese, an sich so unschuldige Natur dieser Gewächse so sehr umschaffen, daß sie nun Menschen und Thieren zum wahren Gifte werden.

Diese Gifte entstehen blos, wenn diese Pflanzen, oder ihre Theile sich selbst überlassen sind, ohne daß wir vorsezlich diese nachtheilige Veränderung unterstüzen.

Auf diese Art leiden vornemlich Getreidesamen, Kohlkräuter, ölichte Samen, und Wasserpflanzen, die nach ihrer eigentlichen Natur nicht schädlich sind.

Das Getraide wird nicht selten, so lange es noch auf dem Halme steht, von verschiedenen Krankheiten heimgesucht, die oft in grosen Ländern, bald in kleinen Revieren, bald nur in gewissen Strichen, unter dieser oder jener Art, selten unter mehreren Arten zugleich, einreissen, und nicht so wohl ansteckend,

www.dlibra.wum.edu.pl

als vielmehr gleichsam epidemisch sind. Sie zeigen sich am häufigsten bei öfterer Abwechselung von strenger Kälte, und groser Hize; in nassen Jahren, vornemlich, wenn im Frühling, und zu der Zeit, da sich der Keim zum künftigen Samen bilden sollte, starker anhaltender Regen gefallen ist, und die Befruchtung des Keims, und durch die damit gemeiniglich vergesellschaftete Kälte die Ausdünstung und den Wachsthum des noch weichen Samens verhindert hat. Weit häufiger zeigen sie sich auf Feldern, welche einen kalten Thonboden haben, oder tief liegen, und oft überschwemmt werden, als auf andern, und dann vornemlich, wenn man schlechten, leichten, unvollkommenen, unreinen und zu frischen Samen ausgesäet, oder ihn zu stark geschrappt hat.

Unter diese Krankheiten zähle ich nun:

1) das Mutterkorn, 2) den Brand, 3) den Rost.

Das Mutterkorn, Hungerkorn, Afterkorn, Martinskorn, Achterkorn, Zapfenkorn, Rankkorn, die Kornmutter, der Todenkopf, Erdenkopf, Rezroggen, Roggenmütterlein, oder Hahnensporn greift vornemlich den Roggen, zuweilen auch die Gerste, an, und scheint hauptsächlich in einer Fäulung der Säfte in dem Samenkorne zu bestehen, welche schon anfängt, ehe es noch vest wird. Es zeigen sich nemlich hin und wieder an den Aehren sehr grose Körner, welche wie eine Pfrieme spizig zulaufen, einen häslichen Gestank haben, und hart, schwammig und troken, von aussen gemeiniglich schwarz, inwendig aber weis und bläulicht sind; die Fäulung zerstöhrt das junge, noch weiche Samenkorn, nimmt ihm seinen Schleim, und mit diesem seine nahrhaften Eigenschaften, und dehnt seine Hülsen gewaltig aus; die Samen ha-

www.dlibra.wum.edu.pl

ben einen bittern, zuweilen süslichten, immer aber etwas scharfen und ekelhaften Geschmak. Das Mehl, das daraus gemahlen wird, hat eine braunblaue Farbe, und einen heslichen Geruch, der noch stärker wird, wenn man es mit warmem Wasser vermengt. Der Brodteig wird davon fliesend, und gar nicht vest, und das gebakene Brod bekommt leicht Risse, und zerfällt zuweilen, so bald es aus dem Ofen kommt, in Stüke. Hühner und Schweine, denen man das Mutterkorn zu fressen, oder das Wasser, worinn dieses gewaschen worden ist, zu saufen giebt, werden davon krank b); die lezten, auch Enten c), Hühner, Truthühner c*), Gänse und Fliegen d), die man durch Hunger, und durch Vermischung mit Kleien, oder durch Kochen mit Milch dazu zwingt, sterben oft davon. Hunde, denen man das davon gebrannte Wasser eingoß, erbrachen sich davon heftig d*).

In Ländern, und in Jahren, wo diese Krankheit unter dem Roggen gemein war, sahe man unter den Einwohnern, vornemlich unter denen, die nur Roggenbrod speisten, die ihre Dürftigkeit etwas geschwächt, und nach der Ernde schmachten gemacht hatte, und die sie nun nöthigte, ihr Getreide so gleich nach der Ernde zu verbaken und zu speisen,

---

b) Hallische gelehrte Zeitung 1771. 17. St. S. 135.

c) 1) Sauvages Nosol. Method. T. III. P. II. S. 549. 2) Bourit Memoires sur la nature et les effets du seigle ergoté pour servir de refutation au memoire de Mſr. Schlaeger. Paris 1771. 3) Tessier Memoir. de la Societé de medecine à Paris pour les ann. 1777 et 1778.

c*) Tessier a. e. a. O.

d) Buddäus Consil. medic. von der Krampfsucht S. 13.

d*) Tessier a. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

ſehr oft, bald nach der Ernde eine umgehende Seuche entſpringen, die mit den fürchterlichſten Zufällen begleitet war e), und

---

o) 1) Die ſogenannte Krampfſucht oder Kriebelkrankheit; in Heſſen Tr. von der Kriebelkrankheit oder ziehenden Seuche a Facultate medic. Marpurg. 1597. 2) L. L. Nebel Diſſ. de Secali corniculato ejusque noxis experientiis, et experimentis chemicis nixa. Gieſſ. 1771. Im Voigtlande in den Jahren 1648. 1649. 1675. Fr. Hofmann Me. dic. ration. ſyſtem. T. II. S. 300. in Weſtphalen, Kölln, Waldeck, Witgenſtein und Heſſen im Jahr 1596. 1597. Horſt Opp. omn. Quaeſt. med. qu. 7. S. 109. In Holland und Weſtphalen, 1) Barbeſk de morbis convulſivis. Duisb. 1673. 2) Leidenfroſt Diſſ. inaug. med. de morb. convulſivo epidemico Germanorum caritatis annonae comite vulgo die Kriebelkrankheit. Duisb. 1771. überſetzt durch Akermann im Magazin für Aerzte IV. S. 332. u. f. In Holſtein, Waldſchmidt de morbo epidemico per Holſatiam graſſante. Kilon. In der Schweiz 1) J. J. Scheuchzer Miſcell. Lipſienſ. T. V. 2) C. N. Lang Beſchreibung des ſchädlichen Genuſſes der Kornzapfen, Lucern 1717. 3) Tiſſot Nachricht von der Kriebelkrankheit, und ihren wahrſcheinlichen Urſachen, 1770. In Sachſen und in der Laufnitz 1) Haberkorn Gedanken von der Ziehe- oder Nervenkrankheit, welche durch das inficirte Korn in Sachſen und Laufnitz eingeriſſen. Buddiſſin 1717. 2) Buddäus Conſil. med. von der Krampfſucht 1717. 3) G. W. Wedel de morbo ſpaſmodico epidemico maligno in Saxonia, Luſatia vicinisque locis graſſato. Ien. 1717. und Act. medic. Berolin. Dec. II. S. 51. 4) Baldinger Progr. Secale corniculatum perperam ab infamia liberatum. Ien. 1771. In der Mark Brandenburg, 1) Müller Diſſ. de morbo epidem. ſpaſmodico convulſivo contagii experte, Francof.

www.dlibra.wum.edu.pl

und die bei Kindern gefährlicher, als bei Erwachse-

ad Viadr. 1742. 2) Gleditsch vermischte Abhandlungen 1. Th. S. 143. 3) Brukmann und Feldmann Commerc. litt. Noric. 1743. hebd. 7. S. 50. 51. In Schlesien, 1) Breßlauer Samml. 1723. Mon. Januar und Junius. 2) Vater de morbo spasmodico populari Silesiacó. Vitemb. 1723. 3) Burkhard Satyr. medic. Silef. spec. III. obs. 4. 4) Steine ebendas. spec. IV. obs. 5. In Frankreich, 1) Memoires de l'Academie de Paris 1710. 1740. 1748. 1752. 2) Dodart Iournal des Savans 1769. c. 16. Mars. 3) Tillet Dissertation sur la cause, qui corrompt et noircit les grains du bled dans les épis, et les moyens de prevenir ces accidens 1755. und Hist. de l'Acad. des Sciences à Paris 1763. 4) Beguillet Diss. sur l'ergot au blé cornu Dijon 1771. 5) Bourjé a. d. O. 6). Vatillard ebend. 7) Sauvages a. a. O. III. B. 2. Th. S. 547. u. f. In Niedersachsen: 1) Hannöv. Magaz. 1764. St. 79. 2) Berichte und Bedenken, welche von den Schleswigholsteinischen Physicis die Kriebelkrankheit betreffend an die Königl. deutsche Cammer zu Kopenhagen eingesandt worden, nebst dem deshalb ausgefertigten Responso des königl. Collegii med. daselbst, und einem Unterrichte an das Landvolk. Koppenh. 1774. 3) Wichmann Beytrag zur Geschichte der Kriebelkrankheit. Celle 1771. 4) Taube deutsche Schriften der königl. Societät zu Göttingen. I. B. 1774. 10. 11. St. und Geschichte der Kriebelkrankheit, besonders derjenigen, welche in den Jahren 1770 und 1771 in den zellischen Gegenden gewütet hat. Göttingen 1782. 8 In Schweden 1) Mählin Konigl. Svensk. Vetenskap's Academiens Handling för ar 1771. I. 2. II. 6. 2) Lindwall 3) Bergius und 4) Colliander Veckoskrift för Läkare och Naturforskare B.VII. in England Birch history of the royal Society for 1676.

www.dlibra.wum.edu.pl

nen f) und unter dem männlichen Geschlechte gemeiner, als unter dem weiblichen war g).

Anfangs fühlen die Kranken eine Mattigkeit, ohne eine andere Ursache angeben zu können, und in der Spize der Finger und der Zähne ein Grübeln, als wenn Ameisen darinnen herum liefen; sie werden blaß, an einigen Stellen schwarzblau, und zuweilen erbrechen sie sich bei dem ersten Anfalle gewaltig; ihr Bauch bläht sich auf, und wird hart; ihre Sinnen sind stumpf, und werden es immer noch mehr. Sie bekommen heftige Zukungen an Händen und Füsen; nachher auch in den Knien, den Schultern, den Ellenbogen, dem Munde und den Lippen. Die Zukungen ziehen von einer Stelle zur andern, sind gemeiniglich mit unerträglichen Schmerzen, und bald mit heftigem Frost, bald mit brennender Hize verbunden, lassen nach und kommen wieder, und dauern auf diese Art einige, oder mehrere Wochen fort. Zuweilen ist der ganze Leib in eine Kugel zusammen gezogen, oder liegt ganz starr und ausgestrekt. Kinder vornemlich sterben in diesen Anfällen von Zukungen, die oft in Fallsucht übergehen. In der Zwischenzeit schlummern die Kranken gemeiniglich in einem fort. Sie haben meistens starke Esluft, ohne daß sie sich sättigen könnten; sie sind äuserst schwach und matt, und klagen über Schwindel und schweres Gehör. Ihre Glieder liegen steif und ohne alle Bewegung da. Einige fühlen die äuserste Kalte: andere die heftigste Hize; zuweilen haben sie gewaltige Bauchflüsse. Oft werden sie ganz wahnsin-

---

f) Diese sterben gemeiniglich in Zukungen. Fr. Hofmann Medicin. ration. syftem. II. S. 301.

g) Sauvages a. a. O. III. 2. S. 547.

www.dlibra.wum.edu.pl

nig und toll; dann verlieren sich die Schmerzen, aber mit diesen auch nach und nach alle Empfindung. Hände und Füsse troknen gleichsam ein; ihre Haut wird schwarz, und runzelt sich zusammen, als wenn sie im Rauch gehangen hätte. Oft und fast immer, wenn die Krankheit so weit kommt, zeichnet sich eine Gränzlinie zwischen dem absterbenden und dem noch lebendigen Theile, als ob man sie mit einem Aezmittel gezogen hätte; so fallen oft, zuweilen ohne daß es die Kranken merken, ganze Glieder oder Stüke derselbigen ab; zuweilen hängen sie noch eine Zeit lang an einigen Fasern von Sehnen oder Bändern. So entgehen die Kranken ihrem gänzlichen Tode, und schleppen ihren verstümmelten Körper noch einige Monate oder Jahre herum, vornemlich, wenn sie keine äuserlichen Mittel gebrauchen. Viele sterben aber doch noch viel eher h).

Geschichte.

Eine Frau von acht und dreisig Jahren fiel den 22sten Jenner 1771, da sie früh ganz gesund gewesen war, Mittags, gleichsam als ob sie vom Schlage gerührt wäre, zu Boden. Es entstunden darauf die heftigsten Zukungen, und, nachdem sich diese gelegt hatten, in allen Gliedern eine mit den heftigsten Schmerzen verbundene Erstarrung, und ein lang anhaltender Kopfschmerz. Sie wurde eine Viertelstunde darauf munter, und kam wieder zu sich; sie hatte an dem

---

h) Vom Herbstmonat 1741 bis in den April 1742 mehr als vierzig, Brückmann; von hundert Kranken fünf, Feldmann a. d. a. O. von mehr als fünf und dreisig Kranken vier, Nebel a. a. O. S. 17. S. auch Journal für Deutschland 1785. St. 9. S. 202.

www.dlibra.wum.edu.pl

nemlichen Tage dieſen Anfall noch zweimal; er kam auch hernach innerhalb ſechs Wochen täglich ein=zwei= bis dreimal wieder, wurde aber nach und nach gelinder. Die Kranke war beſtändig im Kopfe verrükt, und gleichſam trunken; ſie aß ſehr viel, und tränkte die ganze Zeit ihr Kind an der Bruſt, welches geſund und munter blieb i).

Die Mittel, dieſe ſchauervollen Zufälle zu bekämpfen, ſind eben diejenigen, die ich gegen die Folgen ſcharfer und betäubender natürlicher Pflanzengifte angegeben habe. Brechmittel, abführende Arzneien, Säuren, und ölichte, ſchleimichte und waſſerichte Getränke, lau und in groſer Menge genommen, leiſten auch hier, nach dem Zeugniſſe aller guten Beobachter, treſliche Dienſte, ſo wie hingegen ſchweistreibende Mittel unausbleiblich ſchaden.

Freilich haben mehrere der angeführten Aerzte, ſelbſt ſolche, denen man mehrere botaniſche Kenntniſſe zutrauen ſollte k), das Mutterkorn theils mit andern Gewächſen l), theils mit andern Krankheiten unter dem Getraide verwechſelt m) und dadurch ihre Wahrnehmungen unſicher gemacht. Nach mehreren Verſuchen hat das Afterkorn mit Wikenſamen vermengt, mit gutem Roggen und Waizen zu Mehl gemacht,

---

i) Leidenfroſt a. e. a. O. S. 550.

k) Sauvages verwechſelte a. d. a. O. Brand und Mutterkorn.

l) Häufig wird es mit dem Sommerlolch verwechſelt. Ein Beiſpiel davon ſ. bei Parmentier Recreations phyſiques, économiques, et chemiques, Paris. B. II. 1774. S. 391.

m) 1) Sauvages a. e. a. O. 2) Brückmann a. a. O. 3) Trautmann Miſcell. Vratislav. 1723. Jan. A. IV. Art. III. mit dem Brande.

www.dlibra.wum.edu.pl

und, in verschiedenen Verhältnissen, damit zu Brod gebaken, Tauben n), Hühnern o) und Menschen p) nicht die mindesten schlimmen Zufälle verursacht q), und verliert nach der einstimmigen Erfahrung aller Aerzte, schon viel von seiner vorgege-

---

n) 1) Parmentier a. e. a. O. S. 417. §. XXVI. S. 425. 426. 2) Spielmann instit. mat. medic. Argent. 1774. S. 26.

o) 1) La Hire Memoir. de l'Acad. des sciences à Paris pour l'ann. 1710. 2) Spielmann a. a. O. 3) Nebel a. e. a. O. S. 39. §. LII. 4) Parmentier a. a. O. S. 426. und weder diese, noch die Tauben zeigten, da man sie nach dem Genusse einer beträchtlichen Menge Mutterkorns zergliederte, etwas Widernatürliches in irgend einem Theile. Parmentier a. e. a. O. S. 429. auch andere Vögel litten nichts davon. Ebendersf. a. e. a. O. S. 429.

p) Weder mit Brod und Fleisch vermischt, noch mit acht, oder vier Theilen Roggenmehls zu Brod gebaken, noch die Knochen von Hühnern und Tauben, die mit Mutterkorn gefüttert waren. Parmentier a. e. a. O. S. 426—429. J. P. G. Kürcheisen Beobachtungen über das Mutterkorn und dessen Entstehung mit einer Vorrede von G. H. Gruner. Altenburg 1800. 8. S. auch Spielmann a. e. a. O., und wenn auch andere Aerzte, wie z. B. Renou bei Parmentier a. a. O. S. 587. Nebel a. a. O. S. 39. §. LI. auf den Genus dieses Mutterkorns bei Hunden gefährliche Zufälle erfolgen sahen, so war er ihnen doch niemalen tödlich.

q) Weder das rohe Mutterkorn, an sich selbst Parmentier a. a. O. S. 407., noch zu Mehl gemahlen, und mit acht oder vier Theilen Roggenmehl, Parmentier a. a. O. S. 428., oder mit gleich vielem Roggenmehl zu Brod gebaken, Model bei Parmentier a. e. a. O. S. 418.

www.dlibra.wum.edu.pl

benen schädlichen Wirksamkeit, wenn es alt ist r) oder wenn das Brod, das daraus gebaken wird, so lange es warm ist, nicht gespeist wird s). Dessen nicht zu gedenken, daß der schlimme Erfolg von dem Genus eines solchen Brodes, oft in schlechtem Wasser, womit man das Mehl angemacht hat, in der schlechten Zubereitung des Brodes, in einer andern Art von Verderben in dem Samenkorne, oder in dem Mehl, in allerhand Ungeziefer, das sich in das Mehl eingeschlichen hat, oder darinn, daß das Getraide zu alt oder zu neu war, seinen Grund gehabt haben mag; so hat man Beispiele, daß in ganzen Häusern, welche mit der Kriebelkrankheit zu kämpfen hatten, einige Personen frei geblieben sind, ob sie gleich

---

noch viel weniger, das Fleisch der Thiere, die damit gefüttert wurden. Parmentier a. e. a. O. S. 429. Aehnliche Erfahrungen haben S. L. A. Schläger Versuche mit dem Mutterkorn, Cassel 1770. H. M. C. Hanov Seltenheiten der Natur und Oekonomie II. S. 289. u. f. Vogel Schutzschrift für das Mutterkorn. Götting. 1771. Spielmann a. e. a. O. Model Chemische Nebenstunden II. Th. Petersb. 1768. Ein Ungenannter, Frankf. gelehrte Anzeigen den 12. und 16. Jan. 1776. S. 31. gemacht. Wenn wenig davon unter das Brod kommt, halten es selbst seine Gegner für unschädlich. Nebel a. e. a. O. §. XX. S. 16.

r) Gemeiniglich hört die Seuche im Frühling auf, Parmentier a. e. a. O. S. 390. 441. Doch sah Nebel a. e. a. O. S. 40. §. LIV. noch im Heumonate des darauf folgenden Jahrs, also zehn Monate nach der Ernde, noch einige Familien davon erkranken.

s) Fr. Hofmann a. a. O. II. S. 300. S. auch Journal für Deutschland Jahrg. II. 1785. St. 9. S. 202.

www.dlibra.wum.edu.pl

mit den andern die nemliche Kost genossen t); daß es 1789, wo es in der Grafschaft Ravensberg sehr gemein war, der Landmann mit anderem Korn im Brode, ohne allen Schaden speiste u); daß in ganzen Ländern, wo das Mutterkorn in nassen Jahren häufig vorkommt, und eben nicht immer sorgfältig genug von dem guten Korne abgesondert wird, wie z. B. im Elsaß x) und andern Gegenden Frankreichs y), in Sibirien z), im Herzogthum Braunschweig a), Schwaben, die Kriebelkrankheit kaum dem Namen nach bekannt ist; daß es selbst in denen Gegenden, in welchen es jene Folgen nach sich gezogen hat, sie nicht alle Jahre nach sich zieht b), und daß eine ähnliche Krankheit schon entstanden ist, in welcher man nicht den mindesten Verdacht auf das Mutterkorn werfen konnte c).

Bedenkt man endlich den Einflus, den ein nasser, kalter Frühling, und öftere Abwechselung strenger Kälte mit starker Hize, wie sie zur Erzeugung des Mutterkorns erfordert werden, auf den Menschen, vornemlich auf den Landmann, haben mus, den in solchen traurigen Zeiten Hunger und Kummer, und schlechte grobe, seiner Natur und seinen

---

t) Renou bei Parmentier a. e. a. O. S. 387.

u) Medicinische Ephemeriden, Chemnitz 1793. S. 167.

x) Spielmann a. e. a. O.

y) Parmentier a. e. a. O. S. 386.

z) Model kleine Schriften, Petersb. 1773. Vorrede S. IX.

a) Brükmann a. a. O.

b) In Schlesien Misc. Vratislav. 1717. Sept. Cl. IV. Art. 8. §. 3.

c) 1) Marquart von einer der Kriebelkrankheit ähnlichen Krampfsucht in Stade 1772. 2) Leidenfrost a. a. O. S. 352.

www.dlibra.wum.edu.pl

Arbeiten nicht angemessene Nahrung noch mehr geschwächt hat; vergleicht man die Jahrbücher der Aerzte, in welchen sie die unter dem Volke umgehenden Seuchen beschreiben, mit den Witterungsbeobachtungen der gleichen Jahre, in welchen diese Seuchen herrschten, mit dem ganzen Verlauf der so genannten Kriebelkrankheit, und mit der Heilungsart, die in dieser Krankheit, als die beste, bewährt worden ist; so wird man finden, daß sie sehr viele Aehnlichkeit mit andern faulen und bösartigen umgehenden Fiebern habe, und leicht auf die Vermuthung fallen, daß sich Mutterkorn und Kriebelkrankheit nicht so wohl wie Ursache und Wirkung, sondern vielleicht eher, wie Wirkungen einer und eben derselbigen Ursache zu einander verhalten d).

2) Brand, Brandkorn, Brenner, Tod, Ruß. Ustilago.

Diese Krankheit fällt alle Pflanzen unter gewissen Umständen, am häufigsten aber Waizen, türkischen Waizen, Spelz, Gerste und Hafer, und nur sehr selten den Roggen an. Bei dieser Krankheit leiden Blätter und Halm oft gar keine Veränderung; zuweilen sind sie röthlicht, oder gelblicht, zuweilen etwas niedriger als gemeiniglich; oft ist auch, besonders bei Waizen und Spelz die Hülse der Körner, wie bei gutem Getraide, nur sehr dünn, bei Gerste und Hafer hingegen ist sie schwärzlicht; innerhalb derselbigen findet man statt des vesten, weissen Samenkorns braunen oder kohlschwarzen, feinen, oft wie geräucherter Hering stinkenden, zuweilen kleb-

d) 1) R. J. Camerer de Ustilagine frumenti. Tab. 1709. S. 15. 2) Leidenfrost und Spielmann a. d. e. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

richten Staub, welcher abfärbt, und sich mit Wasser nicht so genau vermischt, daß er mit demselben durch ein Tuch laufen sollte e); zuweilen fühlt man mitten in dem feinen Staube harte Körnchen, welche Krankheit man den Steinbrand nennt, so wie man sie ohne diese Körnchen den Staubbrand nennt.

Wenn das Mutterkorn nur einzelne Körner in der Aehre zernichtet, so greift der Brand alle Körner in einer Aehre, und gemeiniglich alle Aehren, die aus einer Wurzel kommen, zugleich an; und meistens hat er schon angesezt, ehe noch die Aehren aus der Scheide ausbrechen. Er ist also immer eine umgehende Krankheit unter dem Getraide, welche ganze Gegenden und Länder auf einmal bestürmt, und, weil sie alles Nahrhafte in dem Samen zerstöhrt, den Ertrag der Felder um vieles vermindert. Aber anstekend, im wahren Verstande, kann man ihn nicht nennen f). Da die Aehre schon brandig ist, ehe sie hervorschießt, so kann der Brandstaub, wenn ihn auch der Wind oder Ungeziefer auf andere noch gesunde Aehren führt, nicht wohl die Ursache sein, warum in einem Striche viele Aehren auf einmal brandig werden, und man hat auch keine einige entscheidende Erfahrung, welche dieses ungezweifelt erweisen könnte. Ganz brandige Körner, in welchen der Keim, und mit diesem auch die Kraft zu wachsen, gänzlich zerstört ist, gehen auch in dem besten Boden, und bei der fleisigsten Bestellung der Felder durchaus

---

e) Eigentlich eine Art kleiner Schwämme Reticularia segetum bei Bulliard Herb. de la France I. S. 90. Pl. 472. Abb. 2. oder Uredo frumenti bei Lambert Transactions of the Linnean Society of London. B. IV. S. 193.

f) Höchstens gilt dieses von derjenigen Art des Brandes, die die Franzosen Charbon nennen.

www.dlibra.wum.edu.pl

nicht auf; solche, die nicht ganz brandig sind, in welchen also der Keim noch einige Kraft zu wachsen übrig behalten hat, treiben nur schwache Halme, die, so wie andere, welche aus einer andern Ursache schwach sind, vornemlich bei kaltem, nassem Frühling und Sommer, und brennendem Sonnenschein auf vielen Regen, bei schlechter Bestellung des Akers, in kaltem, nassem, tiefliegendem, lettigem Boden, der Gefahr des Brandes weit mehr ausgesezt sind, als die starken. Daraus mag vielleicht die irrige Meinung entstanden sein, als wenn der Brand ansteckend wäre.

Eben so wenig ist der Brand allein, oder unter dem Mehle, oder Brode schädlich, noch viel weniger aber giftig g), und man hat Beispiele, daß, ob ihn gleich der Landmann nicht sorgfältig absonderte, sondern seine Nachläßigkeit sich durch die schwarze Farbe seines Brods verrieth, dem ohngeachtet keine nachtheiligen Folgen daraus entstanden sind h).

Wenn der Brand nur die nahrhaften Eigenschaften des Samenkorns zerstört, und Mehl und Brod, unter welche er kommt, unangenehm macht, ohne gerade der Gesundheit nachtheilig zu werden, so hat hingegen der Rost, Stötlen, Carfungel, Rubigo, Rouille (der Franzosen), Ruggine (der Ita-

---

g) 1) Schreber Samml. vermischter Schriften, 14. Theil, S. 365. 2) Parmentier Histoire et Memoir. de la Societé de medecine à Paris pour l'ann. 1776. Doch will Hofer auf den Genus des brandigen Getreides eine umgehende Seuche bemerkt haben, bei Sydenham opp. omn. II. S. 273.

h) 1) R. J. Camerer a. e. a. O. S. 15. 2) Sarcone a. a. O. II. S. 22. 24.

www.dlibra.wum.edu.pl

liäner), einen weit schädlichern Einflus auf diejenigen, die damit angesteftes Getraide genieſen.

Dieſe Krankheit greift alle Pflanzen, am häufigſten aber das Getraide, und vornemlich auf Feldern an, welche ganz von Bergen eingeſchloſſen ſind, daß ſie der Wind nicht durchſtreichen kann, oder auch auf ſolchen, welche in der Nachbarſchaft von Sümpfen, und ihren, oder andern ſchädlichen Ausdünſtungen blos geſtellt ſind. Der Halm und die Blätter ſehen ganz krank aus, und gedeihen durchaus nicht; es hängt ſich ein feiner, gemeiniglich gelbröthlichter Staub an ſie an, und da, wo er ſich anhängt, iſt die Oberhaut der Blätter und Halme mit kleinen Rizen durchfreſſen, aus welchen, wenn man drükt, gelbrother Staub herausquillt.

Die Urſache und Natur dieſer Krankheit mag nun auf kleinen, den Infuſionsthierchen nahe kommenden Thierchen i), wie es ſich einige an dem Brande denken k), oder ſie mag in kleinen Schwämmchen liegen, die in dem Getraide aufkeimen l); ſo hindert ſie doch den Wachsthum des Getraides ungemein, und macht das Korn, wo nicht ganz gewis

---

i) Dies iſt die Meinung eines Plenei; opp. phyſic. med. Tr. I. Vindob. 1762. S. 170. u. f. und Benvenuti Abhandlung von den Urſachen des Brandes im Getreide, und den Mitteln dagegen, überſ. im Hamburg. Magaz. B. XXVI. 1762. S. 563.

k) 1) Von Münchhauſen Hausvater I. S. 149. 2) Linné Syſt. natur. B. I. Th. 2. Ed. XII. Holm. 1767. S. 1326. 3) Rainville bei Rozier Obſervations &c. Vol. VI. 1776. Nov. 4.

l) Fel. Fontana Oſſervazioni ſopra la ruggine del grano Lucca 1767.

www.dlibra.wum.edu.pl

schädlich m) doch zur Nahrung unbrauchbar. Inzwischen lassen sich gegen die Beobachtungen, durch welche man die Schädlichkeit des Rostes im Allgemeinen zu erweisen sucht, eben die Einwürfe machen, deren ich bei dem Mutterkorn gedacht habe n).

Alle diese Krankheiten des Getraides können durch unermüdete Sorgfalt des Landmanns einigermassen verhütet werden. Wenn er sein Getraide nicht eher einbringt, als nachdem es vollkommen reif und durchaus troken ist, in der Scheune nicht zu dicht auf einander drükt, und noch nach dem Dreschen sorgfältig aufbewahrt; wenn er seine kaltgründigen Aeker mit Kalk, Mergel oder Gips verbessert, sie gut, aber nicht zu stark, düngt, fleissig ackert, wenn sie zu tief liegen, durch darauf gebrachte gute Erde erhöht, und, wenn sie Ueberschwemmungen ausgesezt sind, das Wasser durch Wasserfurchen abzuleiten sucht; oder, wenn sie wegen ihrer Lage an öffentlichen Strassen zu viel von Staub zu leiden haben, durch Weiden- oder wilde Kastanienbäume, die er an den Rand pflanzt, den Staub abzuhalten sucht; wenn er benach-

---

m) Vornemlich dadurch, daß, wenn er auch nicht gerade von Thierchen herkommt, er doch gemeiniglich eine Menge Ungeziefer herbei zieht. 1) Act. Erud. Lipſ. 1718. S. 314. 2) Schreber Sammlung vermischter Schriften 14. Th. S. 361. 3) Plenciz a. a. O. S. 165. u. f.

n) Wenigstens ist das umgehende bösartige Flekfieber, das Plenciz a. a. O. daraus entstehen sahe, offenbar mehr eine Folge des Hungers und der unbeständigen Witterung, als des rostigen Getraides; und Plenciz selbst verwechselt den Rost mit dem Brande und dem Mutterkorn, a. a. O. S. 165. 183.

www.dlibra.wum.edu.pl

harte Pfüzen und Sümpfe, in so ferne dieses in seiner Gewalt steht, austrotnet; wenn er den Samen nicht zu dünn, noch zu dik saet; wenn er alten vollkommenen, ganz reifen, vesten, durch Dratsiebe, Staubrollen, oder durch Schlemmen mit Wasser gereinigten Samen dazu wählt, oder, wenn er auch genothiget ist, neuen Samen zu nehmen, ihn, nachdem er gedroschen, gesiebt und gereinigt ist, auf der Tenne ausbr[illegible]t, den achten Theil fein gestossenen Kalk darauf streut, ihn damit drischt, in Säke vest zusammen bindet, drei Tage lang unter das Stroh legt, und dann erst ausstreut.

Aber auch alsdann, wenn das eingeerndete Getraide mit einer dieser Krankheiten behaftet ist, kann man den fernern schlimmen Folgen zuvorkommen. Man kann durch ein muhsames Aussondern, besser durch Sieben, Schlemmen und Waschen mit Wasser das, was man zur Aussaat bestimmt hat, auf die angezeigte Art mit Kalk oder Asche vermischen, oder zuvor, ehe man es aussaet, in Kalkwasser oder Lauge einweichen, und wieder troken werden lassen.

Wenn dem Landmann seine Geschäfte nicht erlauben, alle Sorgfalt bei der Reinigung seines Getraides anzuwenden, oder wenn ihn die Dürftigkeit nöthigt, alles unter einander zu Mehl und Brod zu baken, so kann ihn das einigermassen vor den unglüklichen Wirkungen eines solchen Getraides schüzen, wenn er das angestekte Getraide einige Zeit liegen laßt; wenn er das gebakene Brod nicht warm speist, und immer eine weit grösere Menge von gesundem Korne mit dem angestekten vermischt.

Aber auch Getraide, das auf dem Halme ganz gesund ist, kann, wo nicht im strengsten Verstande giftig, doch so

www.dlibra.wum.edu.pl

schädlich werden, daß es bei seinem allgemeinen Gebrauche grausame Krankheiten unter ganzen Völkern verbreitet: wenn es nemlich Hagel, Wolkenbrüche, Plazregen, oder Sturmwinde, so auf die Erde gelegt haben, daß es sich nicht mehr aufrichtet, und deswegen beständig feucht bleibt; wenn es zu frühe, ehe es noch vollkommen reif ist, geschnitten; wenn es feucht nach Hause gebracht, und da noch die Garben recht dik auf einander gepakt werden, so ist es unvermeidlich, daß es sich nicht erhize, daß es nicht zu gähren anfange, daß es nicht dadurch seine nahrhaften Kräfte verlieren, und dagegen schädliche annehmen sollte. Aber auch dann, wann das Getraide glüklich nach Hause gebracht und gedroschen ist, ist es noch nicht gegen alle Zufälle gesichert, welche es schädlich machen können. Wenn das Getraide an einem feuchten Orte aufbewahrt, von feuchten Winden von allen Seiten bestrichen, nicht öfters gerührt und umgewandt, oder zu vest auf einander gepakt wird, läuft es noch Gefahr, auf eine ähnliche Art zu verderben: alsdann verliert es seinen süsen Geschmak, die Vestigkeit und den Glanz, welche sonst die Anzeigen eines guten Korns sind o). So bekam Sage p) von angegangenem Getraide trokene Brandflekken an den Schenkeln, vornemlich an den Knochen, von welchen ihn Salpeter und Essig, nebst dem fleisigen Genusse von Reis und Kresse wie-

o) Das geschieht vornemlich bei grosen Ladungen von Getraide, die man über das Meer in mittägige Gegenden bringt, wo warme und feuchte Winde beständig wehen. Bart. Intieri della perfetta conservazione del grano. Napol. 1754. S. 9.

p) Analyse chymique des trois regnes de la nature. I. S. 191.

www.dlibra.wum.edu.pl

der herstellten; auch le Brun q) sah auf den Genus eines Brodes, wozu schlechter Roggen (Seigle de mauvaise qualité) genommen war, nicht nur bei Hühnern, Enten und Hunden, sondern auch bei Menschen allerlei schlimme Zufälle erfolgen.

Man kann aber noch den schlimmen Folgen von dem Gebrauch eines solchen Getraides zuvor kommen, wenn man das Getraide wohl wäscht, und trokner, in den Teig etwas Wein knetet, ihn länger als gewöhnlich gähren läßt, und das Brod recht wohl ausbäkt.

Aber auch dann, wann es schon zu Mehl gemahlen ist, kann das Getraide noch schädliche Eigenschaften bekommen. Ich will davon nichts sagen, daß unachtsame Leute Eier von Kornwürmern und Mehlkäfern mit darunter lassen; oder wenn sie das Mehl auch rein aus der Mühle erhalten, es nachher noch aus einer solchen Nachlässigkeit unrein werden lassen; nichts davon, daß gottlose Betrüger von Mehlhändlern, vornemlich in theuren Zeiten, Sand, Asche, Marmor r), Kreide, Kalk, gebrannte Knochen, Alaun s), spanisch Weis u. dgl. darunter mengen. Aber auch Mehl, das keinen solchen Fehler hat, kann, wenn es in kleinern Fässern vest gestampft aufbewahrt, und vornemlich, wenn es so über Meer geschikt wird, verderben, bitter und schädlich werden t).

---

q) Histoire de la Societé de medecine à Paris pour les ann. 1777 et 1778.

r) Beispiele davon s. bei Cominale Histor. physic. medic. epidem. Neapolit. A. 1762. Neapol. 1764. S. 51.

s) 1) Unzer a. a. O. S. 277. 2) Maning Gazette salutaire 1761. nr. 51.

t) Das geschah mehrmalen bei der Theurung zu Neapel. Garçone a. a. O. II. S. 21.

www.dlibra.wum.edu.pl

Die angezeigte Verfälschung läßt sich eben so schwer nicht entdeken. Sand und Asche sollten die Finger in dem Mehle, und die Zähne in dem daraus gebakenen Brode wohl gewahr werden. Die übrigen Verfälschungen sind feiner; indessen sollte sich doch Asche, Kalk, Kreide, Marmor und gebrannte Knochen auf das Zugiesen einer Säure zu erkennen geben, die damit aufbraust. Alaun löst sich in Wasser, worein man das Brod einweicht, auf, und giebt ihm einen süslichtherben Geschmak, dessen Ursache der Kenner leicht errathen wird.

Alles dieses verfälschte Mehl verursacht hartnäkige und oft tödliche v) Verstopfungen. Das hat vermuthlich einige dieser Betrüger veranlaßt, ihrem verfälschten Mehle noch etwas Jalape zuzusezen; sie haben dadurch zwar jene Unfälle verhütet, aber durch unheilbare Durchläufe unter ihren Mitbürgern Tod und Verderben verbreitet x).

Der lezte Betrug läßt sich ebenfalls sehr leicht entdeken; man darf nur die Brodkrume dünn schneiden, brökeln, und ¼ Stunden lang bei gelinder Wärme in Wasser einweichen. Der Alaun löst sich auf, und giebt dem Wasser seinen Geschmak, die Jalape schwimmt wie Hefe oben auf, und die übrigen beigemischten Dinge fallen zu Boden, und zeigen sich offenbar, wenn man das Wasser von dem Brode abgießt: oder man schneidet das Weisse vom Brode in ganz kleine Scheibchen, zerbrökelt sie, aber nicht zu klein, und bringt sie mit einer grosen Menge Wassers in einen Glaskolben, ohne sie zu

---

v) 1) Unzer a. a. O. S. 277. 2) Maning a. a. O.

x) 1) Unzer a. a. O. 2) Maning a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

zu rütteln, in ein Sandbad; man giebt ihnen da ganz schwache Hize, und laßt sie vier und zwanzig Stunden lang stehen. In dieser Zeit wird das Brod ganz weich, und die fremden Körper scheiden sich davon. Der Alaun löst sich in Wasser auf, giebt ihm seinen Geschmak, und läßt sich auf die gewöhnliche Art ausziehen; die Jalape wird, wenn sie darunter war, als Unrath auf dem Wasser schwimmen; die übrigen fremden Theile aber werden vermöge ihres Gewichtes zu Boden fallen, und gieſt man das Wasser und Brod sachte ab, so wird man sie leicht auf dem Boden finden.

Noch bei dem Zubereiten und Baken des Brodes können Fehler vorgehen, die das Brod schädlich machen: wenn man den Brodteig nicht recht aufgehen, oder gähren läßt, oder das Brod nicht recht ausbäkt; so macht es die Gefräſigkeit, die gewöhnliche Gefährtin des Hungers, die dem Magen das ganze Geſchäft des Kauens und der Verdauung der Speiſen allein anvertraut, zu einer Quelle anhaltender Uebel y).

Selbſt dann, wann das Brod auch noch so gut aus dem Ofen kommt, kann es der Geſundheit, und, unter gewiſſen Umſtänden, ſelbſt dem Leben nachtheilig werden: wenn man das Brod noch ganz warm und mit groſer Begierde, ohne es recht zu kauen, verſchlukt, oder wenn man es zu alt werden läßt z).

Mehlthau macht Hopfen und Kohlkräuter, und, unter dieſen am häufigſten den braunen Kohl, für Thiere und Men-

---

y) 13 Unzer a. a. O. 2) Sarcone a. a. O. II. S. 28.
z) Unzer a. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

schen öfters schädlich, und erregt, wenn sie häufig genossen werden, Ruhren und andere schlimme Krankheiten a). Er zeigt sich vornemlich an tiefen, feuchten, eingeschlossenen Orten, die der Wind nicht bestreichen kann, auf vielen warmen Regen, oder, wenn auf solchen Regen sogleich schwüle Hize folgt. Er entsteht meistens von einigen Arten der Nachtschmetterlinge (Phalaena Humuli Linn. b) und Phalaena oleracea Linn. c), die ihre Eier an die Wurzeln, jene an die Wurzeln des Hopfens, diese an die Wurzeln der Kohlkräuter legen; schliefen nun die Raupen aus den Eiern aus, so fressen sie die Wurzeln an; davon wird die Pflanze krank, und auser Stand gesezt, den Blattläusen (Aphis Brassicae Linn. d)), die sie belagern, Widerstand zu thun. Diese vermehren sich ungemein, zerstöhren sie gänzlich, und bringen e) das Uebel hervor, das man Mehlthau nennt f).

Diese Brut von Ungeziefer und ihr Unrath gibt den Gewächsen das Ansehen, als wenn sie mit Asche oder Mehl bestreuet wären; zuweilen liegt gleichsam ein violblauer Anstrich darauf; sie sind kraftlos, entfärbt, matt, und schwach.

---

a) Fr. Hofmann Medic. rat. system. T. II. S. 307. 308.

b) Rösel Insektenbelustigung. Nürnberg. 4. B. III. Pl. 48. Abb. 4.

c) Ebenders. B. I. Nachtvög. II. Kl. Pl. 32.

d) B. Frisch Beschreibung von allerley Insekten in Deutschland. Berlin XI. Pl. 3. Abb. 15.

e) In wie weit eine Art Schwanne Mucor Erysiphe Linn. syst. nat. Ed. XIII. Lipsi. Th. II. B. 2. S. 1486. Theil daran habe, scheint noch nicht bestimmt.

f) Schreber verm. Schrift. 12. S. 480.

www.dlibra.wum.edu.pl

Wenn man gewis ist, daß die Krankheit von den an die Wurzeln gelegten Eiern der genannten Nachtfalter herrührt, wie es bei den Gewächsen, von welchen ich hier spreche, gemeiniglich geschieht, so ist wohl eines der besten Mittel, so bald man nur die geringste Spur davon bemerkt, die Pflanzen vor ihren fernern Folgen zu verwahren, wenn man den Boden rings um sie herum mit einer Lauge von Taubenmist oder Tabaksasche so begiest, daß sie tief eindringen kann, oder in jedem Falle, die Pflanze fleisig mit frischem Wasser, oder, wenn sich schon viele Blattläuse darauf niedergelassen haben, mit der genannten Lauge besprengt. Wenn aber die Pflanze einmal diese Krankheit in ihrer vollen Stärke hat, und sie durch die angezeigten Merkmale zu erkennen gibt, so ist alle Rettung vorbei, und sie mus, als zur Nahrung untüchtig, verworfen werden.

Noch eine Art von Verderben, welche vornemlich in dem weissen Kopfkohl vorkommt, und ihn für Vieh und Menschen ekelhaft und schädlich macht, kommt von einer andern Art Raupen her, welche die Landleute in Oberteutschland den Herzwurm nennen, und welche sich ebenfalls in einen Nachtfalter verwandelt g).

Dieser kriecht im Brachmonate aus der Erde, legt nach der Parung an die untere Fläche der Kohlblätter eine ungeheure Anzahl von Eiern; aber nicht viele zusammen, sondern gemeiniglich auf einem ganzen Felde zerstreut. Nach drei Wochen schliefen die glatten grünen, und an den Seiten gelb-

g) Rösel a. a. O. I. Nachtvögel. II. Kl. S. 169. u. f. T. XXIX.

www.dlibra.wum.edu.pl

gestrichelten Raupen in unzähliger Menge aus, und zeigen sich am häufigsten in trokenen, warmen Jahren, wenn die Kohlpflanzen bereits geschossen sind. Zuerst zerfressen sie die äusern Blätter, dann bohren sie sich in das Herz hinein, und hölen oft den ganzen Kohlkopf aus, ehe man es von aussen gewahr wird. Der kleine Ueberrest davon geht durch den Unrath, den die Raupen von sich geben, vornemlich, wenn zu der Zeit warmer Regen einfällt, in Fäulung, und wird dadurch nicht nur zur Nahrung untüchtig, sondern auch schädlich.

Samen, welche vieles Oel von der fetten Art bei sich führen, Mandeln, Pistacien, Pinien u. a. verlieren, wenn sie beschädigt, oder nachläßig, mit öfterer Zulassung freier Luft, oder an einem warmen oder feuchten Orte aufbewahrt, oder unreif, oder überreif, oder feucht von der Pflanze genommen werden, ihren milden, süsen Geschmak; sie bekommen dagegen einen häslichen, ranzigen Geruch, einen bittern, widrigen Geschmak, und eine brennende Schärfe, die ihren innerlichen Genus, vornemlich wenn man sie in gröserer Menge speist, äuserst schädlich macht, die Verdauung schwächt und hindert, Entzündungen des Magens, Erbrechen und Bauchflusse erregt, und, wenn sie in die Gefässe übergeht, wie ein Ferment, alle Säfte mit ihrer Schärfe anstekt, und einen vesten Grund zu Fiebern und andern Folgen eines solchen Fehlers in den Flüssigkeiten des thierischen Körpers legt [h]).

Eben das geschieht, wenn solche an sich milde Oele au unreifen, überreifen, alten, wurmfrasigen, ranzigen Samen

h) Börhaave Elem. Chem. II. Lugd. 1732. S. 96.

gedrükt werden; wenn man die Samen zuvor stark röstet, die Presse selbst zu sehr erhizt, oder, um ja nichts zu verlieren, alles, was sich nur ausdrüken läßt, bis auf den lezten Tropfen ausdrükt, und mit dem Oele vermischt; oder wenn man auch ein mit der gröstten Sorgfalt ausgedrüktes Oel lange an einen warmen Ort stellt, wenn auch die Wärme nicht gröser ist als die natürliche Wärme des menschlichen Leibes, oder wenn man der Luft freien Zugang dazu läßt; da nimmt das an sich geruchlose Oel den häslichsten ranzigen Geruch an; es wird flüssiger, als es zuvor war; seine weisse Farbe verwandelt sich in eine gelbe; sein süser Geschmak in einen bittern; seine milde Natur in eine fressende Schärfe, die Mund, Schlund, Magen und Gedärme entzündet, und alle die Folgen nach sich zieht, welche sich sonst auf eine solche Entzündung ereignen. Selbst ganz gutes Oel kann, wenn es in einen Magen kommt, der nicht im Stande ist, es zu verdauen, und also ruhig lang an dieser warmen Stelle bleibt, auf eine ähnliche Art verderben, und die nemlichen Zufälle erregen, von denen ich so eben gesprochen habe. Das geschieht am häufigsten in hizigen Krankheiten, wenn da den Kranken das Oel in Menge gegeben wird, wie es einige Aerzte anrathen, so geben sie es oft, und das noch zu ihrem Glüke, nach wenigen, sechs bis acht Stunden so bitter, wie Galle, wieder durch den Mund von sich i).

Auch Fäulung macht manche Stoffe aus dem Gewächsreiche zum Genusse untauglich, und selbst das Wasser, worinn sie sich befinden, wo nicht immer schädlich, doch ungeniesbar. So theilt die an sich ganz unschädliche Brunnenkresse, wenn

i) Börhaave a. t. a. O.

www.dlibra.wum.edu.pl

ſie zu alt wird, dem Waſſer, in welchem ſie ſteht, eine freſſende Schärfe mit k), die es für Vieh und Menſchen ſchädlich macht. Etwas ähnliches geſchieht vom gemeinen, Armleuchter (Chara vulgaris Linn. l)) und dem nezförmigen Grasleder, (Conferva reticulata Linn. m)), wenn ſie in ſolchem Waſſer faulen; von Hanf und Lein, wenn ſie in ſtehenden Waſſer geröthet werden.

Vor ſolchem Waſſer, welches zuweilen unter den Fiſchen eine Krankheit erregt n), warnt uns meiſtens der Abſcheu des Viehes, und der häsliche Geruch, den es von ſich giebt. Aber wenn uns unſere Unachtſamkeit die Gefahr verborgen hat, in die wir uns durch ſeinen Gebrauch ſtürzen; ſo können Eſſig oder andere Säuren den Schaden verhüten, den wir davon zu befürchten haben; oder, wenn uns Mangel an gutem Waſſer zwingt, es zu trinken, ſo können wir ihm ſeine Schädlichkeit benehmen, wenn wir es zuvor kochen, durchſeihen und mit etwas Säuren vermengen, oder mit wohl ausgeglühten geſtoſenen Kohlen ſchütteln und dann durchſeihen o) oder die Gefäſſe, worinnen wir es aufbewahren, mit Schwefel ausräuchern.

---

k) Ehrhard Oekonom. Pflanzenhiſt. I S. 276.

l) A. Juſſieu bei Haller Hiſt. ſtirp. Helv. III. S. 4.

m) Bomare bei Vicat a. a. O. S. 377.

n) Memoir. de la Societé de medecine à Paris pour l'ann. 1776.

o) 1) T. Lowiz Anzeige eines neuen Mittels, Waſſer auf Seereiſen vor dem Verderben zu bewahren, und faules Waſſer wieder trinkbar zu machen. S. Petersburg 1790.

www.dlibra.wum.edu.pl

Keine Pflanzen gehen wohl leichter in Fäulung, als Schwämme. Dies ist einer der Gründe, warum selbst solche, die an sich unschädlich sind, wenn man sie schlecht aufbewahrt, schädlich werden; eine Quelle der Zufälle, die ich als Wirkungen dieser Gifte beschrieben habe. Aus dieser Ursache ist es gut, alle Schwämme, die man speist, mit Essig, oder Citronensaft, als ihrem stärksten Gegengifte zuzubereiten.

---

s. 2) Kels chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, Arzeneigelahrtheit, Haushaltungskunst und Manufakturen, von Dr. L. v. Crell, Helmstädt. Jahrg. 1792. B. I. S. 208 — 215.

www.dlibra.wum.edu.pl

Dritter Abschnitt.

Pflanzengifte, welche die Gewalt der Hize aus Pflanzen bildet, oder entbindet.

Endlich führen viele Pflanzen Theile bei sich, die, so lange sie mit den übrigen Bestandtheilen vermischt bleiben, ganz und gar unschädlich sind; aber, wenn sie das Feuer entbindet, losreisst und wieder anderst unter sich verbindet, oder durch seine Gewalt die übrigen damit verbundenen Theile davon jagt, unter dieser Gestalt zu Giften werden.

Dahin gehören nun brandige Oele und Laugensalze:

1) Eine sehr stinkende Art von brandigem Oele, die man aus Tabak gewinnt.

Schon ein Tropfen dieses Oels, innerlich genommen, erregt die gefährlichsten Zufälle, und zuweilen gar den Tod, ein Quentchen davon einer Schildkröte eingegossen, erregte die heftigsten Krämpfe, Bauch- und Harnfluß o*); nur einige Tropfen in eine blutende Wunde gegossen p) oder ein Faden, den man darein getaucht hat, mit einer Nadel durch einen

o*) Rosa a. e. a. O. S. 130.

p) Redi Opusc. Th. II. Lugd. 1729. S. 47.

www.dlibra.wum.edu.pl

Theil eines lebendigen Leibes gezogen q) oder in die Adern gesprüzt r), oder auf die Zunge gegossen s), bringt Hühnern t), Kapaunen u) auch andern Vögeln x), Hunden y), Kazen z) und andern Säugthieren a), in sehr kurzer Zeit den unvermeidlichen Tod, oder doch Erbrechen b) und andere gewaltsame Zufälle c). Auch der äuserliche Gebrauch des brandigen Oels aus Tabak ist nicht immer tödlich d); auch sollen, nicht alle Arten von Tabak ein solches gefährliches Oel geben e) und selbst von denen Arten, welche ein solches brandiges Oel geben, erhält man es nicht bei jeder Art von Behandlung f). Wenn die Wunde so klein ist, daß sie kein Blut gibt, oder Theile trift, die nicht vieles Blut haben;

---

q) Ebenders. a. a. O. S. 8.

r) Cox Philosoph. Transact. for 1665.

s) Ebenders. a. a. O.

t) Redi a. a. O. S. 8. 18.

u) Ebenders. a. a. O. S. 11.

x) Ebenders. a. a. O. S. 11. 12. 30.

y) Cox a. a. O.

z) Cox a. a. O.

a) Redi a. a. a. O.

b) F. Fontana Philosophic. Transact. B. LXX. Th. I. nr. II.

c) Redi a. a. O. S. 27.

d) Ebenders. a. a. O. S. 26.

e) Ebenders. a. a. O. S. 46.

f) Ebenders. a. a. O. S. 49.

www.dlibra.wum.edu.pl

oder wenn sie so gros ist, daß das Blut stromweise hervorschiesst, und das Gift hinwegwischt, ehe es in die Gefässe gedrungen ist; so ist das Oel ohne schlimme Folgen g).

Solche Wunden müssen auf gleiche Art behandelt werden, wie die Wunden giftiger Thiere; und man muß auch damit die nemliche innerliche Heilart verbinden.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch andere brandige Oele von Pflanzen auf eine ähnliche Art schaden können, und wirklich will Hr. Dr. J. H. G. Schlegel vom Pechöle eine solche nachtheilige Wirkung wahrgenommen haben h). Ihr häslicher durchdringender Geruch wird wohl jeden Menschen, der bei Sinnen ist, abhalten, sie so zu gebrauchen, daß sie schaden können. Ja selbst den Giftmischer wird dieser Geruch abschreken, sie zu seinen schändlichen Absichten zu misbrauchen, weil er befürchten muß, daß er durch denselben zu leicht entdekt werden möchte. Doch sind einige unter ihnen bei den Aerzten im Gebrauche, weil sie in schwachen Gewichten die treflichsten Wirkungen äusern. Würde aber ein unbehutsames Verfahren des Arztes, oder die Ungeduld und Unachtsamkeit des Kranken das Gewicht derselben so verstärken, daß sie als Gifte wirken könnten; so muß man ihren Folgen auf die gleiche Art zuvorkommen, wie bei den fetten Oelen, wenn sie als ranzig verschlukt werden.

Es könnte aber auch geschehen, daß sich Leute mit Stüken von zerbrochenen Gläsern, worinnen dergleichen Oel auf-

---

g) Ebendersf. a. a. O. S. 45.
h) a. a. O. 4 weite Samml. n. VI.

www.dlibra.wum.edu.pl

bewahret worden, verwundeten, und dadurch Gefahr liefen. So bald man also hier eine Spur von gefährlichen Zufällen hat, muß man auf eben die Art zu Hülfe kommen, wie bei andern giftigen Wunden, nachdem man die Spizen des Glases ausgezogen hat.

Beinahe alle Pflanzen haben ein Laugensalz in ihrer Mischung, das in ihrer Asche zurükbleibt, wenn das Feuer alle übrige flüchtigere Bestandtheile in Dünste aufgelöst, zerstreut und abgerissen hat, und aus dieser kann es nachher durch bloses Wasser ausgezogen werden.

Dahin gehören vornemlich Weinsteinsalz, das durch Weisbrennen aus Weinstein und die mancherlei Arten Pottasche, die in verschiedenen Ländern aus der Asche verschiedener Pflanzen ausgelaugt werden. Sie kommen alle darinnen mit einander überein, daß sie so, wie wir sie bekommen, gemeiniglich sehr unrein sind, und aus der bläulichten in die weisse Farbe spielen; daß sie an der freien Luft sehr leicht, und bald feucht werden i) und sich in Wasser auflösen, die heftigste Hize aushalten, ohne flüchtig zu werden; daß sie keinen, oder doch keinen starken Geruch haben; daß sie mit jeder reinen Säure, mit welcher man sie vermischt, aufbrausen; daß sie die blaue Farbe vieler Pflanzensäfte in eine grüne verwandeln, und das Quekfilber aus seinen Auflösungen, als einen pomeranzengelben, oder gelbbraunen Kalk nieder-

---

i) Das reine Natran zähle ich nicht hieher, weil es ohne besondere Kunstgriffe und Zusäze nicht leicht eine solche Schärfe bekommt, daß es als Gift wirken kann.

www.dlibra.wum.edu.pl

schlagen. Sie haben in ihrem Geschmak alle einige Aehnlichkeit mit Harn, und, wenn sie in ihrer vollen Reinigkeit und Stärke sind, wie z. B. das Weinsteinsalz, eine sehr beträchtliche Schärfe. Hunde, denen zerflossenes Weinsteinsalz in die Adern gesprüzt wurde, war es tödlich k); Navier l) sah auch bei Menschen vom innerlichen Gebrauche dieses Salzes heftige Zukungen erfolgen.

Noch heftiger aber wird diese Schärfe der Laugensalze, wenn sie mit ungelöschtem Kalke versezt werden; schon von den Ausdünstungen einer so geschärften Lauge will Sage m) nebst zehen andern heftige Kopfschmerzen mit darauf folgender Schwachheit empfunden haben.

Vermöge dieser Schärfe fressen solche Laugensalze, wo sie auf die Haut gelegt werden, in dieselbe plözlich Geschwüre, eine Wirkung, die sie den Wundärzten vornemlich empfiehlt. Schon diese täglich wiederholte Erfahrung der Wundärzte, die ausnehmende Schärfe, die sie auf der Zunge äussern, die Beispiele von Menschen, von welchen, da sie das Unglük hatten, in eine solche Lauge zu fallen, als man ihre Leiche herauszog, nichts mehr, als die Knochen noch übrig

---

k) 1) Ant. Dr. Heide a. a. O. 2) Ettmüller de chirurgia infusoria. Lipf. 1668. 4.

l) Contrepoisons de l'arsenic, du sublimé corrosif, du verd de gris, et du plomb. à Paris 1777. 8.

m) Analyse chymique des trois regnes de la nature. B. II. S. 24.

www.dlibra.wum.edu.pl

waren n) und die Bemerkungen eines Börhaave o), der uns versichert, es hätten sich verruchte Bösewichter einer solchen durch Kalk geschärften Lauge, unter der Gestalt eines Klistiers bedient, um unschuldige Mitmenschen ihrer Wuth aufzuopfern, lassen keinen Zweifel übrig, daß der Schaden, den sie, wenn sie unvermischt verschlungen werden, in den innern Theilen des Leibes anrichten, noch weit beträchtlicher und tödlich sein müsse, wenn wir auch keine Wahrnehmungen vor uns haben, welche diese Wirkung bestätigten. Wirklich litt auch ein junger Mensch, der aus Versehen einen Schluk Seifensiederlauge nahm, davon die heftigsten Schmerzen, und wurde kaum noch durch vielen Essig mit Wasser und hintennach durch Milch gerettet p). Die Häute des Magens und der Gedärme werden davon gleichsam in weichen Teig aufgelößt q).

Einige Pflanzen geben, wenn sie bei gewaltsamer Hize destillirt werden, eine andere Art Salz, bald in flüssiger, bald in trokener Gestalt, die, wenn sie auch in den meisten Eigenschaften mit dem oben genannten Laugensalze übereinkommt, sich doch durch ihren starken, durchdringenden Geruch durch ihre ungemein grose Flüchtigkeit, in welcher sie das

---

n) 1) Börhaave Praelect. in propr. Instit. op. Halleri B. VI. S. 389. §. MCXL. 2) Esprit des journaux 1780. B. VIII. Act. S. 361.

o) a. e. a. O.

p) Esprit des Iournaux. a. e. a. O.

q) Gallin a. a. O. S. 356.

www.dlibra.wum.edu.pl

Wasser weit übertrift, durch die weisse Farbe, mit welcher sie das Quekſilber aus äzendem Sublimat niederschlägt, und durch die hochblaue Farbe, die sie sehr leicht von Kupfer und Kupferkalken annimmt, deutlich unterscheidet. Noch häufiger erhalten wir sie durch Fäulung, am reinsten aber aus Salmiak.

Wenn diese Art von Laugensalzen von dem brandigen Oele, und dem vielen Wasser, das sie gemeiniglich mit sich führt, vollkommen gereinigt ist, und in ihrer rechten Stärke erscheint, wie z. B. in einem guten, flüchtigen Salmiaksalze, oder in einem guten, reinen Salmiakgeiste; so hat sie einen durchdringenden Geschmak, wie Harn, und vornemlich, wenn die lezte Zubereitung über ungelöschtem Kalke abgezogen ist, auf der Zunge eine äzende Schärfe, wie Feuer. Wenn ein Skrupel von diesem Laugensalze auf die warme Haut eines Thiers gebracht, und mit einem Heftpflaster verwahrt wird, daß es nicht hinwegdünsten kann, so erregt es auf der Stelle unerträgliche brennende Schmerzen, eine Röthe, und zulezt den Brand r). Welche Zufälle müssen nicht erfolgen, wenn solche Salze die innern, weit empfindlichern Theile des menschlichen Leibes berühren, oder sich gar mit den Säften vermischen, die sie unwiderstehlich, und mit der äuserſten Gewalt und Geschwindigkeit auflösen? Wenn die Aerzte der Syl-

r) Börhaave Elem. Chem. II. S. 336, 337. 369.

www.dlibra.wum.edu.pl

vischen Schule, in der Absicht, eine chimärische Säure, als die Ursache der Krankheiten, zu bekämpfen, diese Salze auch nicht immer so gebrauchten, daß sie als eigentliche Gifte wirken konnten; so ist doch so viel gewiß, daß sie in den meisten Krankheiten, vornemlich in Fiebern, damit Oel in das Feuer gosen, und bei manchen ihrer Kranken den Tod beförderten. Wirklich sahen Enaux und Chaussier s) vom innerlichen Gebrauche des Salmiakgeistes, Blindheit und Abschälen des Schlundes und Magens, Hurham t) und J. H. G. Schlegel u) andere schlimme Zufälle, Martinet x) den Tod erfolgen.

Die Zufälle, welche auf den unvorsichtigen Genus der Laugensalze, erfolgen, erfordern beinahe die nemliche Heilart, wie die scharfen Gifte. Laue, wässerichte Getränke in groser Menge getrunken; eben solche Klistire öfters wiederholt; verdünnte Säuren, Oel und Schleime unter das Getränk gemischt, und, wenn der Aderschlag voll, und hart ist, eine Aderlässe, werden hier die besten Dienste thun. Starke

---

s) Methode de traiter les morsures des animaux enragés et de la vipere, suivie d'un précis sur la pustule maligne. Dijon 1785. 8.

t) On the malignous Sore-throat. S. 68.

u) a. e. a. O. VI. 5.

x) Experiences nouvelles sur les proprietés de l'alcali volatile fluor. à Paris 1780.

www.dlibra.wum.edu.pl

Säuren könnten bei Laugensalzen, die nicht durch Kalk geschärft sind, schädlich werden; das viele Gas, das sich bei ihrem Aufbrausen mit dem verschlungenen Laugensalze mit vieler Gewalt und Heftigkeit entwikelt, würde die Häute des Magens, die ohnehin entzündet oder zerfressen sind, zu sehr ausspannen, und dadurch die Schmerzen, und die Gefahr eines Brandes, und des daraus erfolgenden Todes vergrösern.

www.dlibra.wum.edu.pl

A.

	Seite
De Abano.	89
Abbas Haly.	87
Abdalla.	88
Abraham Ben Jehudoch.	88
Abrus.	329
Abubeker Mohammed Yesdensis.	87 88
Abul.	88
Achterkorn.	782
Ackermann, J. Fr.	95
Aconitum.	707—723
Actaea.	471—474
Actuarius, F.	86
Adamboe.	507
Adenanthera.	138
Adlerholz.	374
Adonis.	272. 273
Aegagropilae.	131
Aegidius.	89
Aegineta.	86
Aegolethron.	455
Aelius Promotus.	87
Aeskulapie.	241—244
Aethusa.	566—572
Αετιος.	86
Aezlauge.	812. 813
Aezsalz.	123. 812. 813
Affensteine.	131
Affodill. röhrichter.	198
Afterkorn.	782
Agallocha.	373
Agaricus.	640—655
Aglei.	133
Agnus castus.	349
Agrostemma.	403
Ahovai.	231
Ajub.	88
Akerhahnenfus.	295
Akkawahs-Gift.	662
Alaunerde.	128
Albericus.	89
Albinus, B.	93. 553
Album graecum.	130
Alexipharmaca.	122
Alexiteria.	122
Ali.	88
Alisma.	260. 261
Alkukani.	88
Allium sativum.	199

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Almaleki.	87
Aloe.	132
Aloeholz.	374
Alpendaphne.	360
Alpenhahnenfus.	291. 300
Alpenroſe.	464-468
Alraun.	409-412
Altercum.	437
Altmannskraut.	630-632
Amaryllis.	
diſticha.	724
ſarnienſis.	197
Ammann.	93
Amyris	
toxifera.	364
Anacardium.	378. 379. 381
Anagyris.	138
Andromachus.	13
Andromeda.	468
Anemone.	266-272. 705-707
Anemonroslein.	266
Angelica.	
atropurpurea.	247. 248
Anguicida.	620
Anthora.	715
Antidota.	101
Antimonium	
diaphoreticum.	130
Antirrhinum.	458. 459
Apei.	737
Aphis	
braſſicae.	802
Apocyna.	227-244
Apocynum.	239-241
Apollonius.	13
de Apono.	89
Aprilblume.	705
Arbor	
excaecans.	37
toxicaria.	777
de Ardoynis Santes.	89
Ariſtolochia.	624-630
Arma, J. Fr.	90
Armleuchter.	806
Arnoldus Villanovanus.	89
Aron.	331-341
Aronsbaum.	339
Aronskraut.	335
Aronswurz.	335
Arzneiſchierling.	591
Arum.	331-341
Aſklepiades.	13
Aſclepias.	241-244
Aſclepium.	257
Aſperifoliae.	404. 455-457
Aſphodelus fiſtuloſus.	198. 199
Aſſant ſtinkender.	138
Aſtranz.	132
Atropa.	409-412. 523-545

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Augenwurz.	705
Aurelianus.	12. 13
Ausdünstungen.	136-144
Austernschalen.	125
Auswürfe	
thierische.	130. 131
Autumoncelli.	95
Averrhoes.	88
Avicenna.	88
Aytuy.	508
Azalea	
pontica.	452-455
Azadarach.	383

B.

Baccius, A.	91
Bachblume.	273
Bachuone, Arn.	89
Bactris.	672
Bälle vom Rindvieh.	131
Bärwurz.	131
Baigneres, J. B.	65
Baillart, E.	552
Baillieria.	503
Baldi, J.	552
Balsam	
morgenländischer.	132
Bang.	627
Bangenkraut.	591
Bangue.	627
Bara-Mareka.	330
Bard.	736
Barringtonia.	474
Barschensteine.	128
Barstein, H.	552
Barzenkraut.	575
Bat-bane.	730
Bataller.	62
Bauhinia.	382
Baum.	177
blindmachender.	373
Baumann, J. Nik.	551
Baur, L. L.	93
Baurentabak.	556
Baxana.	177
Baylies.	62
Beck, G. B.	553
Behennusbaum.	381
Beidel offhar.	242
Beinbruchstein.	125
Bejucos.	674
Belemnites.	125
Belladonna.	523-545
Belliprobe.	679
Ben Abul.	88
Ajub.	88
Jehudah.	88
Bengelkraut.	624-626
Benzoe.	138
Bergkristall.	129
männlein	
grau.	267

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Bergpfeffer.	354
sturmhut.	707
wolfsmilch.	325
Berufkräuter.	459
Bezoar	131. 132
abendländischer.	132
morgenländischer.	131
Bezoardica.	122
Bezoardicum	
joviale.	130
lunare.	130
martiale.	130
minerale.	130
solare.	130
Bezoartinctur.	134
Biberhödlein.	279
Bibernell.	132
Bieber, J. A.	163
Bignonia.	214. 215
Bitti.	678
Bilsenkraut.	429-452
Bilsensamen.	430
Bittererde.	124
Bittersüs.	409
Blätterschwamm.	640
Blaschke.	16
Blatterkraut.	279
Blé cornu.	785
Bleiwurz.	225-227
Blumen	
vergiftete.	162
Blutschwamm.	652
Boa-Upas.	777
Bocconia.	386
Böckler, J.	94
Böhmer, G. R.	165
Börhaave, H.	16
Kaauw.	4
Bohnenblüthe.	137
Boksbart.	267
Boletus.	655
Bollen.	390
Bollwurz.	523
Bolus.	128
Bonamici.	89
Bondotrank.	402
Borrichius, Ol.	16
Bose.	62
Bouchart, A.	91
Bovist.	687
Brätling.	647
Brand.	792
Brandkorn.	792
Braun, Nik.	551
Brechmittel.	103 ic.
Brechnus.	331. 345-349
Brechwurz.	687
Brenner.	792
Brennkraut.	276. 289
Brennwurzel.	263. 264. 354
Briefe	
vergiftete.	162

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Brod verfälſchung.	799
Brugnatelli.	167
Brunnenkreſſe.	805
Bryonia.	558-561
Buchekern.	507. 804
Bueng.	761
Buhr.	737
Büche.	507
Büchner, A. E.	94. 554
Bulgetius, Att.	92
Bulliard.	164
Burſer, J.	91
Buſchmöhre.	563
Buſchtaue.	674
Bywald, L.	166

C.

	Seite
Cadel - avanaeu.	352
Caels, Ch. P.	164
Caio - Upas.	777
Cajou.	378
Caltha.	273. 274
Cameraria angustifolia.	235. 236
Camerer, El.	94
Cammarum.	707-720
Cannabis.	626-628
Cantharellus.	655
Cantira, Fr. J.	554
Capsicum truncatum.	139
Caraipa.	677
Cardanus, H.	90
Cardinalis.	222
Carfungel.	794
Cartheuſer, J. Fr.	94
Caruna.	663
Caryota.	379
Caſſada.	347
Caſſava.	347
Caſſavi.	347
Caſtello, Th.	92
de Caſtro, A. A.	92
— — J.	551
Cataputia.	313
Cato, M. Porcius.	12
Cerbera.	231-233
Ceſtrum.	725
Chaerophyllum.	562-566
Chamaelaea.	360
Champagnerwurz.	687
Champignon.	646. 654
Chara vulgaris.	806
Characias.	323
Charantia.	779
Charbon.	793
Chelidonium glaucium.	765
majus.	393
minus.	279
Chenopodium.	490
Chriſtophskraut.	471-474

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Christophswurz.	471
Christwurz.	622. 699
Chrysospermum.	727
Cicera.	660
Cicuta.	566. 575-591
Cicutaria.	564
Citronenblüthe.	133
schalen.	133
samen.	133
Clathrus.	658
Clematis.	260-266
Clematitis.	629
Cneorum.	362. 363
Cocculus.	513
Colchicum.	199
Colocasia.	333
Colocynthis.	186
Colubrina.	521
Compositae.	404. 503
Conferva reticulata.	806
Conium.	591-619
Contortae.	227-244
Contrayerva.	132
Contugi, C.	553
Convolvulus.	228. 229
Cooke, J.	95
Coquenaar.	761
Coriandrum.	508
Coriaria.	514-516
Courgoumeou.	658
Cranz, H. J. M.	95
Crinum asiaticum.	779
Croton.	331. 350-352
Cucumis.	186. 187
Cucurbitaceae.	186-190
Curare.	676
Curcas.	345
Cycas circinalis.	177
Cyclamen.	224. 225
Cynanchum.	236-239
Cynapium.	566
Cynoglossum.	457
Cynosurus.	486. 487
Cyparissias.	321
Cypressenwolfsmilch.	321

D.

	Seite
Dampf von brennenden Körpern.	144
Daniel, Augustin.	91
Daphne.	354-363
Datura.	412-429
Davie.	94
Dejanira.	679
Delphinium.	619
Democrit der falsche.	12
Denyaw, Al. M.	735
Detharding.	16
Diascordium Fracastorii.	121

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Digitalis.	215
Dioscorea.	331. 352. 353
Διοσκορίδης περ.	85
Dippelhaber.	476
Diptam.	132
Doktorblumen.	273
Dölz, Fr. Chr.	164
Döring, M.	734
Doldengewächse.	244–258. 511 562–619
Dolichos.	330
Doliocarpus.	386. 387
Dollbeeren.	523
Dollkraut.	413. 430. 523
Dollwurz.	523
de Dondis, Jak.	89
Dornapfel.	413
Dorsten, J. D.	552
Dorycnium.	561
Dotterblume.	273. 274
Doublet.	65
Drachenwurz.	332
Dracontium.	333
Dracunculus.	332
Drescher.	737
Drosera.	259. 260
Drüswurz.	289
Dudaim.	409
Duft von Blumen	137 ꝛc.
Dulcamara.	409
Duncker, J. H. A.	163
Durant.	458
Durt.	476
Dutroa.	426

E.

	Seite
Eau de luce.	123. 124
Eberwurz.	132
Ebn Raschid.	88
Ebn Sina.	88
Echites	727
suberecta.	230
Edelstein.	129
Edera.	371
Ehrmann, J. Fr.	
Eibenbaum.	492–500
Eienbaum.	492
Eierschalen.	125
Eisenbaum.	492
Einbeeren	133. 547
Einhorn.	127
Eisenhütchen.	707
Elaterium.	188
Electuarium Diascordium Fracastorii.	121
Elendshorn.	127
Elendsklauen.	127
Elephantenlausbaum.	378. 381
Elfenbein.	127
Elfenbeingeist.	123

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite

Elixir
proprietatis. 134
Engelwurz. 132. 247
Enzian. 132
weisser 558
Ephedra. 502. 503
Eppich. 279. 281
Erdäpfel. 224. 409
Erden. 124–129
Erdenkopf. 782
Erdgerste. 279
Erdscheibwurz. 224
Ergot. 785
Erigeron. 630–632
Erven. 661
Ervilia. 661
Ervum. 661
Erysiphe. 802
Erythrina. 469
Eschenbach. 737
Eselskürbisse. 188
Eselsmilch. 318
Essentia
alexipharmaca Stahlii. 134
anodina officinalis. 121
dulcis Halensis. 134
theriacalis. 134
Essenzen
balsamische. 134
Essig. 112—117
Esteve, J. J. 164

Seite

Esula. 241. 318
Ettmüller, M. 735
— — M. E. 95
Euonymus latifolius. 385
Eupatorium
fastidiosum. 630
Euphorbia. 304–328
Euphorbium. 307. 309–312
Everard, Aeg. 551
Excaecaria. 373
Extractum opii. 121

F.

Fabricius, Wilh. 62
Färberkroton. 337
Fäulung. 805. 806
Fäulungsluft. 143
Fagon, G. Chr. 553
Fagus. 507
Fallop, G. 13
Faseln. 469
Fausius, J. K. 92
Fehr. 737
Feigblättern. 279. 281
Feigenbaum. 380. 381. 779
Feigwarzenkraut. 278
Feldhahnenfus. 295
Felsbeere. 523
Ficaria. 279–281
Ficus. 380. 381
racemosa. 779
toxicaria. 381

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite

Fidertsche. 300
Fingerhut. 215-220
Fingerhutblume. 215
Fingerkraut. 215
Firnisbaum. 365
Fischbohnen. 469
Fischkörner. 513. 514
aus dem Südmeer. 461
Fistelkraut. 210
Flammula. 262. 263. 276. 277
jovis. 264. 265
Fliegenschwamm. 640-645
Flöhkraut. 341
de Foligno Gent. 89
a Fonseca Rod. 91
Foreſt, P. 91
Fowler, Th. 554
Fraueneis. 128
Frank, J. 96
Frege, Chr. A. 163
Freſe, D. Fr. 94
Freytag. 734
Fricke (Friccius) 14
Friderici, J. A. 552
Fritillaria. 191
Frölichkeitspillen. 627
Froscheppich. 573
Froschlöffel. 260
Froschpfeffer. 281
Frühlingsschwamm. 651
Frutex excaecans. 390

Seite

Fuchs, Abr. 91
de Fulgineo, Gent. 89
Fungi. 511 ꝛc.

G.

Gährungsluft. 140 ꝛc.
Gänsefus. 490-492
Galega. 470. 471
Γαλγνος. 86
Galgant. 132
Gallensteine. 131
Gamira. 507
Ganga. 402
Gara-Mareka. 330
Garn, J. A. 165
Gartenschneken. 125
Gartshore. 736
Gas
entzündbares. 144
kohlensaures. 140-143
Gassendi. 5
Gastaldi, J. B. 94
Gaub, (ius) H. D. 25. 158
Gegengifte. 101 ꝛc.
Geisblatt. 138
Geisklee. 470
Geisraute. 133. 470. 471
Gemaladdin Abdalla Ben Abul Hassan Ali Ben. 88
Gemsenkugeln. 138

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Gerberstrauch.	514-516
Gesundheitselixir.	134
Gewürzduft.	139
Gichtkraut.	276
Gichtrebe.	558
Gichtrübe.	558
Gichtschwamm.	656
Gichtwurz.	558
Gift.	22. 26
Eintheilung.	134 ꝛc.
makassarisches.	777
Giftbaum.	364-372
Giftboom macassarischer.	777
Giftesche.	368
Giftfeigenbaum.	381
Gifthahnenfus.	281-288
Giftlehre.	22
Gifttheil.	715
Gifttaue.	675
Gifttränke.	401
Gifttreibende Mittel.	122
Gitterschwamm.	658
Gladiolus.	194
Glanzpeterlein.	566
Glaucium.	765
Gloisse.	566-572
Glorioſa superba.	197.
Gmelin, J. Fr.	94. 165
Ph. Fr.	16
Gnadenkraut.	211
Gnidium.	363
Göckel, Eb.	92
Goldäpfel.	406
Gold.	130
Goldhähnchen.	707
Goldsafran.	130
Goldsternblümlein.	279
Goldwiesenblume.	273
Gränaugen.	516
Gräser.	393. 404. 475-487
Gräter, G. L.	95
a Grafenberg, J. Schenk.	91
Gramina.	393. 404. 475-487
Grana Tiglia.	351
Granat.	129
Grasleder.	806
Gratarolus, W.	100
Gratiola.	211-214
Grete faule.	566
Grevin, J.	90
Großhead, R.	89
Guainerius, Ant.	89
Gualteria.	468
Guerin.	164
— Cl.	735
Guilandina.	381
Gumira.	507
Gummi guttae.	374

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite

Gummigutt. 374. 377
Gurken, schwarze. 189. 190
Gurkenarten. 186–190
Guyon. 100

H.

Haase. 737
Hagen, C. G. 166
Hahn. 17
Hahnemann, S. 62. 96
Hahnensus. 274–304. 703–704
Hahnensporn. 782
Halle, J. S. 96. 165
Haly Abbas. 87
Hamberger, G. E. 736
Hamilton, R. 554
Handschuhe vergiftete. 162
Hanf. 143. 626–628. 806
Harmala. 624
Harmelkraut. 624
Harrison, E. 737
Hartmann, F. 734
Hasensprünge. 127
Hatibali. 679
Hearreetree. 504. 505
Hechtskiefer. 128
Heigel, Ambr. 735
Helleboraster. 622
Helleborus
albus. 687
foetidus. 622. 702. 703
niger. 699–702

Seite

Hemerwurz. 687. 696
Heraklid. 12
Heras. 12
Herba Apollinaris. 437
Herbstblume. 199
Herbstzeitlosen. 199–209
Herissant. 164
Herodot. 12
Herzbaum. 232. 233
Herzwurm. 803
Heudust. 137. 139
Heydeck, H. 735
Hiarreeroots. 505. 506
Hilchen, L. H. L. 94
Hippokrates. 12
Hippomane. 682–687
Hippomanica. 561
Hirsch. 737
Hirschhorn. 127
Hirschhorngeist. 124
Hoffmann, Fr. 62. 94
Hofstetter, J. A. 735
Hollunder. 133. 138
Honig. 117. 118
Horminum. 459
Hornviehstein. 131
Houlston, Th. 95
Hughes Griffith. 166
Hülsengewächse. 329. 330. 404. 468–471
Hünermist. 139

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Hummatu.	426
Hundekohl.	239. 241
Hundekoth.	130
Hundsäpfel.	409
Hundsbeere.	199
Hundskohl.	239-241. 624
Hundskraut.	624
Hundskürbis.	558
Hundspeterlein.	566
Hundsrebe.	558
Hundswinde.	227-244
egyptische.	230
karibäische.	230
Hundswürger.	236-239
Hundszunge.	457
Hungerkorn.	782
Hura.	512. 513
Hure	
nakende.	199
Hyacinth.	129
Hydnum.	656
Hydrocotyle	
vulgaris.	246
Hydropiper.	331. 341
Hyoscyamus.	429-452
Hypecoum.	766

J.

Iacquinia.	504
Jadiguiari Ibn Sheriff.	88
Jakuka al Nabathe al	
Kesra Alkutani.	88
Jarava, J.	90
Iatropha.	331. 345-349
Iatrops	
umbellata.	139
Ibenbaum.	492
Ibn Wahsijah.	87
Jehuda	88
Jerichoapfel.	508
Jessenius.	62
Ifenbaum.	492
Igel.	134
Igelskolbe.	413
Ignatia.	522. 523
Ignatiusbohne.	522. 523
Illicium.	728
Imbondotrank.	402
Incompletae.	331-354. 404
	487-503. 624-632
Indig.	138. 143
Ingram.	167
Ingwer	
teutscher.	335
Ipo.	777
Iris.	194-196
Isenflamm.	96
Judenkirsche.	405
Judennadeln.	125
Juncker, J.	736
Jungfernbrüste.	407

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Jungferntabak.	556
Iuniperus.	500
K.	
Kälberkropf.	562–566
Kaffee.	774
Kajo Radia.	779
Kaiserkrone.	191–193
Kalbsmaul.	458
Kalbsnase.	458
Kalkerde.	124–128
Kalmia.	387–388
Kammgras.	486. 487
Kamokladie.	138
Kampfer. Vorr.	132. 138
Kapern	
teutſche.	273
Kappenblume.	720
Kardinalsblume.	222
Kardobenedict.	133
Karneol.	129
Karpfenſtein.	128
Kaſſine	
unächte.	385
Katu-Theka-Maruara.	178. 462
Kauranapai.	677
Kazenpeterlein.	591
Kelber.	591
Kellerhals.	354. 361–363
Kellerkraut.	354
Kellerluft.	141. 142
Kellerſchall.	354
Kerbeltern.	563
Kermesbeeren.	545. 546
Kerner.	167
Keſtner, H. E.	553
Kieſelarten.	129
de Kinder, J.	94
Kinder-Mithridat.	762
Kirſchlorbeerbaum.	767
Klapperroſe.	764
Knallgold.	130
Knoblauch.	199
Knolle, Fr. A. G.	166
Kögler, J.	91
Königskerze.	456
Körbel.	255. 563
Koffee.	398
Kohl	
faulender.	801
Kohlendampf.	146–151
Kokarito.	672
Kokosförner.	513
Kolbani, P.	96. 167
Kolokaſia.	333
Kolequinten.	186–188
Komokladie.	138
Konni.	339
Kopfkohl.	803
Korallen	
rothe.	125
weiſſe.	125

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Koriander.	508
Kornduft.	139
Kornraden.	403
Kornmutter.	782
Koſtwurz.	132
Krähenaugen.	516-521
v. Krapf, Karl.	166. 167
Krebsſcheeren.	125
Krebsſteine.	125
Kreſſenarten.	404. 461
Kriebelkrankheit.	784
Krötenpeterlein.	566
Kroton.	331. 350-352
Kugelbeeren.	386. 387
Kuhblume.	273
Kuhpilſen.	655
Kuhſchelle.	267
Kuhweizen.	476
Küchenkraut.	267
Küchenſchelle.	267-270

L.

Lachenknoblauch.	133
Lactuca.	776
Lacuna.	5
Läuſekraut.	210. 211. 354. 622
Läuſeſamen.	619-622
Langguth, G. A.	554
J. G.	165
Lanzoni, J.	94. 553
Lapis de Goa.	134
judaicus.	125
manati.	127
Laſurſtein.	129
Lathyris.	313
Lathyrus.	660. 661
Lattich.	776
Laudanum liquidum Sydenhami.	121. 753
Laugenſalze	811-816
feuerveſte.	122. 123. 811
flüchtiges.	123. 813. 814
Laureola.	361
Lauroceraſus.	767
Laurus.	372
Lazurſtein.	129
Lebenselixir.	134
Lebzelter, S.	92
Leda.	404. 462-468
Ledum.	463. 464
Lein.	143. 806
Leinen.	263
de Leiva y Aquilar, Fr.	552
Lepidium.	461
Lerchenſchwamm.	
Lianen.	674
Lichtblume.	199
Liebault.	90
Liebesäpfel.	406
Liebestränke.	403

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Liebstökel.	132. 247
Lienen.	263
Lignum moluccanum.	351
Ligusticum.	247
Lilia.	190 ꝛc.
Lilien weisse.	137.
Limeum.	705
Lindenstolpe, J.	93
Linder, J.	93
Lingua.	278
Litsi.	372
Lizwurz.	267
Lobelia.	220-228
Lober, Val.	92
Lobus Magnus ex Guinea.	507
Löffelkraut wildes.	278
Lögler.	91
Löwenmaul.	458
Logan, G.	95
Lolch.	476
Lolium.	476. 477
Loncq, F.	94
Lorbeerbaum ächender.	372
Lorbeeren	133 392
wilde.	384
Lorry.	737
Lubeer, M.	735
Luchssteine.	Seite 125
Ludolf, H.	553
Luft verdorbene, ihre Merkmale	151-153
Hülfs- und Rettungsmittel.	154-161
von Gewächsen von brennenden.	144-151
— faulenden.	143
— gährenden.	140-143
Luft.	705
Lülch.	476
Lupo-Matta-Ju.	777
Luther, J. M.	95. 166
Lycoperdon.	657
Lycopersicon.	406
Lynen.	362

M.

Madd.	408
Mäuseweizen.	476
Magnenus, J. Chph.	552
Maimonides.	88
Mhinardes.	553
Manchinellbaum.	682-687
Mancinella.	682-686
Mandeln.	804
Mandelnöl flüchtiges.	774
von Mander, C.	552
Mandragora.	409-412
Manghas.	232

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Manihot.	347
Marc.	96
Marcgraf, G.	92
Mariendiſtel.	133
Martinius, Val.	91
Martinskorn.	782
Martinus.	89
Mathon, Ph.	735
Matlot, P.	552
Mattenblume.	273
Mattſafran.	199
Maurelle.	351
Marwell Gartſchore.	736
Mayer, J. C. A.	163
Maynwaring.	552
Mayr, A.	166
Mead, R.	93
Medley, J.	736
Meel	
verfälſchung.	799
Meelthau.	801
Meerrettig.	137
Meerzwiebel.	198
Meiſterwurz.	132
Melia.	383
Melonenkürbiſſe.	779
Melothria.	189
Meniſpermum.	513
Menſchenmiſt.	131
Menſchenſchedel.	127
Mentzer, M.	554
Mercurialis	
perennis.	624-626
Mercurialis, H.	90
Merk.	573
Meruliüs.	655
Merzenblume.	705
Μεσα.	22 ꝛc.
Metel.	426. 427
Metzger, B.	62
Meyenkraut.	278
Mezereum.	354
Milch.	111. 112
Milchheke.	389
Milchſchwamm.	647
Mimoſa.	662. 663
farneſiana.	138
Mirabix.	177
Miſt.	131
Miſtſchwamm.	653
Mithridat.	97
Mithridatium Damocratis.	121
Mixtura ſimplex.	134
Mocuſine.	656
Mohn	
gehörnter.	765
ſchlafmachender.	732
Mohnſaft.	118-122
Momordica.	188. 779
Monaka.	391
de Monchy, Sal.	736
Mondmilch.	125. 128

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Morcheln.	656
Moringa.	381
Mosblume.	273
Moses Maimonides.	88
Muccomucco.	389
Mucor.	802
Mükenkraut.	341
Münze vergiftete.	162
Muschelschalen.	125
Muskatellerkraut.	137. 459
Muskatnüsse.	488. 489
Muttterkorn.	782
Muys, W. W.	94
Myristica.	488. 489
Myrrhe.	132

N.

al Nabath.	88
Nabelkraut.	246
Nachtschatten.	404-455. 511. 523
Nachtschmetterling.	802. 803
Napell.	720 ꝛc.
Napellus.	707
Narcissus.	196
Narrenkappe.	720
Nasehorn.	126
Natron.	811
Natterwurz.	132
kleine.	335
Neander.	551
Nebel.	62
Nelle.	402. 680
Nepenthe.	426
Nerium.	234. 235
Neumann, C.	736
Nibbees.	674
Nicolichia, A.	553
Nicotiana.	547-557
Nicou.	470
Nieswurz	
schwarze.	699-702
stinkende.	622. 623. 702. 703
weisse.	687. 696
Nigella.	414
Νικανδρος.	85
Nilpferdzähne.	127
Ninsi.	132
Nkassa.	402
Nüsse.	804
Nux vomica.	516-521
Nyelen.	262

O.

Oberlin, C. H.	736
Ochoa.	92
Odollum.	232
Oel.	109
brandiges.	808 ꝛc.
ranziges.	804. 805

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Oelnus.	349
Oenanthe.	248-255
Ogg.	388
Oleander.	138. 234. 235
Oleandro giallo.	455
Opium.	118-122
cydoniatum.	121
Orant.	331. 353. 458
Oribasius.	12
Orontium.	331. 353. 458
Orviatanum.	121
Os sepiae.	125
Officula de corde cervi.	131
Osteocolla.	125
Osterblume.	267
Osterlucei.	628-630

P.

	Seite
Palme brennende.	379
Papaver.	732-765
Paradiesholz.	374
Paré, Amb.	90
Paris.	547
Pasta.	738
Pastinaca.	617-619
Pastinak.	617-619
Patin, Bened.	90
Paul von Aegine.	86
Pauli, S.	552
Pechöl.	810
Pedicularis.	210. 211
Peganum.	624
Peperlein.	565
Peplus.	312
Percival.	62
Periploca.	230
Perlen.	125
Perlmutter.	125
Personatae.	209-227. 404. 457-461
Pestelixir.	134
Pestilenzwurz.	132
Peterlein stinkender.	566
Petersilie tolle.	566
Pfännlein.	293
Pfaffenhödlein.	279
Pfaffenpint.	335
Pfauenkraut.	341
Pfauenspiegel.	341. 383
Pfeffer.	490
breitblätterichter.	490
mit Gelenken.	676
Pfefferschwamm.	645
Pfefferstrauch falscher.	354
Pfeilgifte.	666-680. 684. 694. 701. 704. 717

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Pferdestein.	131
Pfersinokraut.	341
Pfirschblätter.	774
Pfifferling.	655
Pflanzengifte.	136 ꝛc. 167
äuserliche.	177. 666-680-732
auszehrende.	178. 662-665
betäubende.	178. 394-508-658. 732
Eintheilung.	167 ꝛc. 177
innerliche.	177-665. 681. 732 ꝛc.
künstliche.	167. 808-816
lähmende.	178. 659-661
natürliche.	167-780
scharfe.	178-393. 509. 658. 682
widernatürliche.	167. 781-807
Phalaena	
humuli.	802
oleracea.	802
Phalaris	
arundinacea.	393
Phallus.	656
Φαρμακα.	23 ꝛc.
Pharmakologie.	22
Phaseolus.	469
Philon.	553
Philonium romanum.	121. 753
Philtra.	403
Physalis.	405
Phytolacca.	545. 546
Piccardt, J. J.	94
Piderit.	16
Piedra	
del Cobras de Capello.	134
del porco.	131
Pinien.	804
Piper geniculatum.	676
latifolium.	490
Pisang.	779
Piscidia.	469
Piscidium.	461
Pissgras.	328
Pistacien.	804
Piso, W.	92
Plantago aquatica.	260
Platterbsen.	659-661
Plaz, A. W.	553
Pleneck, J. J.	96
Plinius, Bas.	91
Plumbago	
europaea.	225-227
Plumeria	
rubra.	235
Poinciana.	383
Polyandrae.	404. 471-475. 511. 619-624
Polygonium.	331

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Polymnia.	727
Pomeranzen.	133
Ponzetti, Ferd.	89
Porst.	463
Porstarten.	404. 462-468
Possira.	523
Post.	463
Pothos.	340
Pottasche.	811
Pouss.	761
Prachtlilie.	197
de Prado.	552
Právot, J.	92
Prestwich, J.	95
Prophetengurken.	188
Proteus.	657
Prunus.	767
Pseudacorus.	195
Puihn, J. G.	163
Pusatilla.	267-270
Purgirholz.	351
Purgirkörner.	313. 351
Purgirnus.	345-347
Purgirwinde.	228
Puteria.	673
Q.	
Quecksilber.	130
Queni.	402. 680
R.	
Räucherwerke.	144
Ramsey, W.	92
Rankkorn.	782
Ranunculi.	274-304. 703-705
Ranunculis affines.	258-274
Ranunkeln.	298
Rast, G.	92
Raswurzel.	558
Rauchapfel.	413
Raute.	135
Raygras.	477
Rebe	
römische.	558
Rebendolde.	248-255
Rechbeeren.	354
Rehfeld.	62
Reichel, Chph. C.	554
Reichenau, G. F.	736
Reimarus, H. D.	737
Reitter, J. J.	734
Requies Nicolai.	752. 753. 762
Reticularia.	793
Rettich.	137
Retz.	62
Retzroggen.	782
Reyher, J. G.	95
Rhazes.	87
Rhododendron.	464-468
Rhus.	365-372
Ricinus.	331. 349. 350
Riedgras.	493
Rindviehbälle.	131
Rindswurzel.	430

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Ringelblumen.	133
Ritter, J.	
Robinia.	470
Rodel.	210
Röser.	93
Roggenmütterlein.	782
Rorella.	259
Ros solis.	259
Rosen.	137
Rosenlorbeer.	452
Rosmarin wilder.	463
Rosschwanz.	502. 503
Rossi, P.	164
Rost.	794 ꝛc.
Rouhamon.	675
Rouille.	794
Rubigo.	794
Rubin.	129
Rudius, Cust.	91
Ruggine.	794
Rübenhahnenfus.	289
Rumpel.	736
Rus.	792
Russula.	649

S.

Sabadilla.	697-699
Sabadillsamen.	697-699
Sabina.	500-502
Saelanthus.	331. 343. 344
Säubohnen.	430
Säubrod.	224
Safran.	133. 138
Safranblume wilde.	199
Saijang.	779
Sal volatile cornu cervi.	123
oleosum.	123
angelicae.	123
Salat.	776
Salbe vergiftete.	161
Salbei.	133. 459-461
Salmiakgeist.	123.124.159.814
Salmiakholz.	814
Salsirora.	260
Salvia.	459-461
Samen ölichte ranzige.	
Samenmilch.	110
Santes de Ardoynis.	89
Sapphir.	129
Sättel vergiftete.	161
Saubrod.	224
Boissier de Sauvages.	95
Scammonea.	228. 229
Scammonienwinde.	228
Scammonium.	229

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Scandix.	255
Scariola.	776
Schärtlich.	737
Schanaki.	87
Scharbock.	279-281
Scharbockskraut.	279
Scharf, B.	92
Scharlachkraut.	460
Schedel.	127
Scheere.	563
Scheislorbeeren.	354
Scheiswurz.	558
Schelhammer, Chph.	92
Schelig, J.	91
Schellenbaum.	231. 232
Schenk a Grafenberg, J.	91
Schierling.	566. 575. 591-619
Schlafbeere.	523
Schlafkraut.	430. 523
Schlangenholz.	521
Schlangenkraut.	232
Schlangentod.	628
Schlangenwurz.	138. 232. 779
virginische.	133
Schlegel, J. A.	93
Schleim.	110. 111
Schlingbaum.	384
Schlottenblume.	267
Schmalzblümlein.	293
Schmalzblume.	273
Schmalzsternblume.	279
Schneerose.	468
Schnekenschalen.	125
Schnupftücher.	
vergiftete.	161
Schölkraut	
groses.	392
kleines.	278
Schölwurz.	218
Schöpf.	737
Schrader, Fr.	92
Schreber, D. G.	165
Schroer.	735
Schröter.	91
Schulze, J. H.	736
Schwämme.	511. 632-658. 807
Schwalbensteine.	129
Schwalbenwurz.	133. 279
Schwarz.	736
Schwarzkraut.	471
Schwarzkümmel.	414
Schweinsbrod.	224-225
Schweinszähne.	127
Schwerdel.	194
Schwerdlilie.	194-196
Schwindelhaber.	476
Scilla europaea.	198
Sclarea.	460
Secamone.	230
Seekuhstein.	126

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Seguaſter.	379
Seidelbaſt.	354
Seidenpflanze ſyriſche.	242
Seife.	117
Seifenſiederlauge.	812. 813
Seigle de mauvaiſe qualité.	799
Semecarpus.	381
Senf.	137
Seſeli.	255. 256
Sevenbaum.	500–502
Shanakk.	87
Sida aſiatica.	475
Siebold, C. Chph.	738
Siegelerde.	128
Siegwart, G. Fr.	95
Sinapius, M. A.	735
Sinnpflanze.	662. 663
Siam.	573–575
Smaragd.	129
Sodomsäpfel.	408
Solanaceae.	404–455. 511–538
Solanum.	405–409
Soldatentabak.	556
Sommer, J. Chr.	95
Sommerloch.	476–486
de la Sone, J. M. Fr.	554
Sommerthau.	259. 260
Spattenboom.	777
Speerkraut.	276. 278
Speichel.	131
Speiteufel.	648. 649
Spielmann.	164
Spiesglanz.	130
Spiesglanzzinnober.	130
Spigelia.	557. 558
Spillbaum.	385
Spinnblume.	199
Spiritus	
cornu cervi.	123
eboris.	123
lumbricorum.	123
ſalis ammoniaci.	123. 124
aniſatus.	123
aquoſus.	123
aromaticus.	123
calcareus.	123
citratus.	123
cum ſale tartari paratus.	123
faſſafratus.	125
ſimplex.	123
ſuccinatus.	123
vinoſus.	123
theriacalis camphoratus.	134
Sponſa ſolis.	
Springgurken.	188
Springkörner.	313
Springkraut.	313
Stachelnus.	413
Stachelſchwamm.	656
Stärkkraut.	458
Stahl. Jv. J.	553

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Stalagmitis cambogioides.	374
Stapelförfel.	565
Staphisagria.	619-622
Staubbrand.	793
Starke, J. Chr.	737
Stechapfel.	412-429
Steinbrand.	793
Steine von Thieren.	131
Steinmilch.	326
Stenzel, Chr. G.	94
Stephanskörner.	619-622
Sternanis.	728
Sternblümlein.	279
Sterrebeek.	166
Stikgas.	136-140
Stikwurz.	558
Störck.	16
Stötten.	794
Storchblume.	705
Stramonium.	413-425
Strandgeisraute.	471
Streubüchsenbaum.	512. 513
Stromeyer, J. Fr.	166
Strychnos.	516-521
Stubing.	90
Sturmhut.	720
Succow.	96
Sumach.	365-372
Sumpfhahnenfus.	276. 278
Sumpfläusekraut.	210
Sumpfnabelkraut.	246
Sumpfrodel.	210
Sumpfwolfsmilch.	323
Swieten.	16

T.

	Seite
Tabak	158. 547-557
Tabaköl.	808 ꝛc.
Tabernaemontana citrifolia.	236
Täubling.	649. 650
Tali leporum.	127
Tangaraea.	391
Tarton-raira.	360
Tatula.	428
Taubenfus.	289
Tarbaum.	492
Taxus.	492-500
Tazette.	196
Terrea.	124-129
Tetradynamae.	404. 461
Teufelsaugen.	430
Teufelsband.	458
Teufelsbeeren.	523
Teufelskirschen.	558
Teufelsmilch.	312
Teufelspeterlein.	591
Teufelswurz.	720
Thapsia.	256-258
Thapsus.	456
Thebesius, G. D.	553

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Theriaca	
Andromachi.	121.
122. 753. 754	
caeleſtis.	122
Thevetia.	233
Thora.	703-705
Thymelaea.	359. 360
Tiglium.	351
Tiling, M.	735
Tinctura	
ordinaria Wadelii.	134
thebaica.	121
Tintenwurmknochen.	125
Tinus.	384
Tirucalli.	311
Tithymali.	304-328
Töberich.	476
Tod.	793
Todtenkopf.	782
Tollapfel.	407
Tollhafer.	476
Tollkirſchen.	523
Tollkörfel.	591
Tollkorn.	476
Tollkraut.	591
Toxicaria.	675. 676
Toxicodendron.	364. 368.
	370. 371
Toxikologie.	22
Τοξικον.	666
Tralles, B. A.	125
Trapezentli.	241
Trapſendorf.	476
Treſzen.	476
Treſp.	476
Treſpdorp.	476
Triller.	736
Trollblume.	300
Trompeterblume.	214. 215
Trongum.	407
Tuberoſen.	137
Tupa.	221
Turbith.	255. 256
Turbithſeſel.	255. 256
a Turre, G.	93
Twalch.	476
U.	
ab Uffenbach, P.	91
Umbellatae.	244-258. 511
	562-619
Unicornu	
foſſile.	127
Unzer, J. A.	163
Uredo.	293
Uſtilago.	792
V.	
Vater, Chr.	93
Veilchen.	137
Velli-Nawi.	561
Venenum.	236.

www.dlibra.wum.edu.pl

	Seite
Veratrum.	687-699
Verbascum.	455. 456
Vernisbaum.	368
Vernix.	368
Vetzor, Fr.	
Viburnum.	384. 385
Vicat, P. R.	165
Viorna.	260
Viperngräten.	126
Virus.	231c.
Vital, M.	92
Vitalba.	262. 263
Vitis alba.	558
Voet, Laz.	90
Vogler, v. H.	92
W.	
Wachholderbeeren.	133
Wachsstöke vergiftete.	161
Wagener.	66
Wahsijah.	87
Walan.	508
Waldanemone.	705
Waldglöklein.	215
Waldhahnenfus.	705
Waldhähnlein.	705. 707
Waldnachtschatten.	523
Waldrebe.	261-266
Waldrübe.	224
Waldschmid, J. J.	735
Waldwolfsmilch.	325
Walkenbaum.	523
Wallnusbaum.	138
Wallroszähne.	127
Walther, J. G.	93
Warakabbakurru.	676
Wasser.	106 ic.
faules.	805
Wassereppich.	281. 573
Wasserfilipendul.	249
Wasserhahnenfus.	276. 278. 281. 299
Wasserkerk.	573-575
Wassernabelkraut.	246
Wasserpastinak.	573
Wasserpeterlein.	573
Wasserpfeffer.	331. 341
Wasserschierling.	575
Wasserschwerdlilie.	195
Wasserwegerich.	260. 261
Wedel, G. W.	93
Wegerich.	133
Wickart, Arn.	91
Weinsteinsalz.	123. 811
Weisweinrebe.	558
Welsch.	66
Wepfer.	4
Werdenberg.	62
Wermuth.	133
Weyherpeterlein.	573
Whinkey, W.	93

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite

Wichmann. 16
Wiesenblume gelbe 773
Wiesensafran. 199
Wiesensalbei. 460
Wilmer. 164
Wilson, J. 164
Windblume. 270. 705
Winde. 228. 229
arabische. 331. 343. 344
syrische. 228
Windkraut. 267
de Windt, W. F. 94
Winkler, D. 734
Wirtensohn, C. F. 737
Wolfsbast. 354
Wolfsgift. 721
Wolfskirsche. 523-545
Wolfsmilch. 304-328
Wolfswurz. 707. 720
Wollkraut. 455. 456
Wooirara. 675
Würgerling. 591
Wüterich. 575-591
Wunderbaum. 331. 349. 350
Wurali. 675
Wuraragift. 676
Wutbeere. 523
Wutschierling. 591
van Wyck, J. 163

Seite

Y.

Yerseylilie. 197
Yesdensis. 88
Yesdy. 88
Yucca. 347

Z.

Zähne. 126
vom Nilpferde. 127
— Wallros. 127
— wilden Schwein. 127
Zagoni. 16
Zahnwurz. 225-227
Zapfenkorn. 782
Zauberkräuter. 399 ꝛc.
Zaunrebe. 558
Zaunrübe. 558-561
Zehrwurz. 138. 335
Zeidelbast. 354
Zeiland. 354. 363. 364
Zeitlosen. 199
Ziller. 4
Zencker, H. C. 736
Zerumbet. 778
Zeviani. 167
Ziegerkraut. 591
Zigeunerkraut. 430
Zinnober. 130
wilder. 558
Zwibel. 137
Zwibelgewächse. 190-209. 404. 461. 462

www.dlibra.wum.edu.pl

Verbesserungen.

Seite 1. Zeile 4. nach wohl l. nicht.
— 1. — 6. statt ihm l. ihn.
— 6. — 24. statt dergleichen l. der gleichen.
— 8. — 22. statt dergleichen l. den gleichen.
— 14. — 7. statt Unheuer l. Ungeheuer.
— 14. — 27. statt Ulmerischer l. Ulmischer.
— 14. — lezt statt Pars Doxa l. Paradoxa.
— 16. — 18. statt er l. der.
— 16. — 25. statt Bulzow l. Bützow.
— 23. — 16. statt περὸ l. περὶ.
— 23. — 16. statt ροβολων l. ἰοβολων.
— 23. — 17. statt Gorraw l. Gorraeo.
— 23. — 24. statt Speert l. Spart.
— 23. — 27. statt sumem l. sumen.
— 24. — 22. statt exibitum l. exhibitum.
— 24. — 24. statt veneficiis l. veneficis.
— 25. — vorl. statt pathologicae l. pathologiae.
— 27. — 22. statt unausgesezt l. ausgesezt.
— 27. — 27. statt Bekon l. Belon.
— 28. — 16. statt Transactiones l. Transactions.
— 29. — 15. statt Foneſtus l. Foreſtus.
— 35. — 3. statt Viband l. Viborg.
— 35. — vorl. statt Vishaeng l. Virkning.
— 38. — 13. statt Severbaumöl l. Sevenbaumöl.
— 38. — 26. statt Ebendaſ. l. Ebenderſ.
— 38. — 27. statt Maza l. Meza.
— 39. — 14. statt Riedigras l. Riedgras.
— 39. — 14. statt Wasserpfendesamen l. Wasserpferdesamen.
— 47. — 11. nach ob l. man.
— 47. — 17. statt Salben l. Salzen.
— 48. — 24. statt gerusen l. gerufen.
— 50. — 20. statt Stengel l. Stenzel.
— 50. — 22. statt Thuauck's l. Thuan's.
— 51. — 4. statt dergleichen l. der gleichen.
— 51. — 25. 26. statt Guicciandini l. Guicciardini.

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite 51. Zeile 27. ſtatt de Pope l. du Pape.
— 59. — 23. ſtatt Anzeichen l. Anzeigen.
— 61. — lezt ſtatt a—r l. a. r.
— 62. — 15. nach wie l. ſie.
— 62. — 30. ſtatt Rebel l. Nebel.
— 64. — 4. del. in
— 65. — vorl. ſtatt Fo. l. Io.
— 66. — vorl. ſtatt conſ. l. cauſ.
— 69. — 3. ſtatt ſtellten l. ſtellte.
— 70. — 28. ſtatt Frizier's l. Frézier's.
— 71. — 11. ſtatt Momgas l. Mangas.
— 71. — 19. ſtatt Ciphyra l. Ephyra.
— 71. — 21. ſtatt παιδειας l. παιδειας.
— 71. — 21. καφ. l. κεφ.
— 71. — 26. ſtatt ve l. a ve —
— 72. — 13. ſtatt δοσαρεσηϑεντα l. δυσαρεσηϑεντα.
— 72. — 13. ſtatt ὑπ ἀυτον l. ὑπ' ἀυτου.
— 72. — 14. ſtatt πεπραγμενου l. πεπραγμενοις.
— 72. — 15. 16. ſtatt ταυριανος l. ταυριωνος.
— 72. — 17. ſtatt τὸιν l. τοις.
— 72. — 17. ſtatt γαρήν l. γαρ ἠν.
— 72. — 18. ſtatt οὐ l. ὀυ.
— 72. — 18. ſtatt ἀπελλυονσων l. ἀπολλυονσων.
— 72. — 18. ſtatt αλλα l. ἀλλα.
— 72. — 19. ſtatt ἐχουσα l. ἐχουσα.
— 72. — 19. ſtatt ἐργαζομενη l. ἐργάζομενη.
— 72. — 20. ſtatt ελανϑανε l. ἐλανϑανε.
— 72. — 21. ſtatt ἀπυντας l. ἀπαντας,
— 72. — 22. ſtatt ὦ l. ἀ.
— 72. — 23. ſtatt ούκ ἐσαξε l. οὐκ ἐσεξε.
— 72. — 23. ſtatt αλλ' l. ἀλλ'.
— 72. — 24. ſtatt ἀρόωσιαν l. ἀρόυσιαν.
— 72. — 27. ſtatt Φιλιππου l. Φιλιππυ.
— 73. — 8. ſtatt currulis l. curulis.
— 74. — 6. ſtatt ſich dieſe l. ſich auch dieſe nicht.
— 75. — 18. ſtatt Pellio l. Pollio.
— 76. — 23. ſtatt Gifttrunk l. Gifttrank.
— 76. — 24. Valentinini l. Valentinian.
— 76. — vorl. ſtatt Gryſoſtom l. Chryſoſtom.
— 77. — 4. ſtatt Smoek l. Smeek.
— 77. — 16. ſtatt Comnyn l. Comeyn.
— 77. — 25. ſtatt Menzel l. Stenzel.
— 78. — 21. ſtatt Witts l. Watts.
— 78. — 27 ſtatt Hagel l. Hagec.
— 80. — 10. ſtatt Hincolin l. Hincelin.

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite 80. Zeile 22. ſtatt Clügey l. Clugny.
— 81. — 11. ſtatt Ronaldin l. Renaldin.
— 83. — 26. ſtatt Parthan l. Parthen.
— 85. — 21. ſtatt verſit. l. verſib.
— 85. — vorl. ſtatt Saraceki l. Saraceni.
— 89. — 6. ſtatt Greßhrad l. Groshead.
— 89. — 16. ſtatt Arnod Bouhuone l. Arnold Bachuone.
— 89. — 29. ſtatt Abáno l. Abano.
— 90. — 15. ſtatt de venenis l. des venins.
— 91. — 21. ſtatt Wrickart l. Weickart.
— 92. — 7. ſtatt Pravot l. Prävot.
— 93. — 14. ſtatt G. l. Chr.
— 93. — 24. ſtatt Bauer l. Baur.
— 94. — 13. ſtatt Bockler l. Böckler.
— 98. — 9. ſtatt daß l. das.
— 98. — 25. ſtatt Gift l. Gifte.
— 102. — 11. ſtatt Triphyllo Jaknos l. Triphyllodaknos.
— 103. — 23. ſtatt Lea l. Bra.
— 103. — 26. ſtatt occurrenti l. occurrendi.
— 109. — 8. ſtatt füllen l. hüllen.
— 109. — 19. ſtatt Schärfe l. ſcharfen.
— 113. — lezt ſtatt Nativum l. Noricum.
— 121. — 22. ſtatt Μιθριδατειοτεχνια l. Μιθριδατεατεχνια.
— 121. — 24. ſtatt a l. e.
— 121. — 28. ſtatt adhibita l. adhibito.
— 121. — 29. ſtatt controverſa l. controverſo.
— 123. — 3. ſtatt Maderer l. Mederer.
— 124. — 25. ſtatt Erga l. Ergo.
— 124. — 25. ſtatt viprae l. viperae.
— 125. — vorl. ſtatt adſcripta l. adſcriptae.
— 128. — 13. ſtatt α l. γ.
— 129. — 2. ſtatt hat l. iſt.
— 131. — 15. ſtatt Aegagrobilae l. Aegagropilae.
— 132. — 10. ſtatt Albe l. Aloe.
— 133. — 4. ſtatt Zitterer l. Zittwer.
— 133. — 18. ſtatt Staubrege l. Staubwege.
— 134. — 1. ſtatt Arznei l. Arzneien.
— 134. — 2. ſtatt Gewächsreich l. Gewächsreiche.
— 134. — 8. ſtatt Elixis l. Elixir.
— 134. — vorl. ſtatt Mitel l. Mittel.
— 137. — 22. ſtatt Prieſtlei l. Prieſtley.
— 138. — 6. ſtatt Lagſi l. Laghi.
— 139. — 26. ſtatt morbifero l. montifero.

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite 139. Zeile 29. statt Seyes l. Reyes.
— 140. — 1. nach y) l. ,
— 140. — 2. statt kohlsaures l. kohlensaures.
— 140. — 12. statt c), l. c);
— 140. — 18. statt von l. van.
— 140. — 19. statt hex l. het.
— 140. — 19. statt proesin l. praefon —
— 141. — 5. statt Moscali l. Moscati.
— 141. — lezte statt Rannazzini l. Ramazzini.
— 142. — lezte statt V l. l'
— 143. — lezte statt Arn. l. Ann.
— 144. — 18. statt medicine l. medecine.
— 144. — 20. statt Scheeln l. Scheele.
— 144. — 21. statt L. l. T.
— 144. — 28. statt Senobier l. Senebier.
— 145. — 17. statt Works l. Works.
— 146. — 26. statt Paterulus l. Paterculus.
— 146. — 26. statt Foviano l. Ioviano.
— 147. — 1. nach p) l. ;
— 147. — 5. statt Panawolus l. Panarolus.
— 147. — 6. statt Hacoksber l. Hawksbee.
— 147. — 19. Analogista l. Iatrologism.
— 147. — 19. Pentecost l. V.
— 147. — 30. statt irritabilitate l. irritabilitate.
— 148. — 18. statt medicine l. medecine.
— 154. — 17. statt Stellen l. Keller.
— 154. — vorl. statt Gichter l. Gehler.
— 154. — 26. statt Coquerrau l. Coquereau.
— 154. — 27. statt Chamboe l. Chambon.
— 156. — lezte statt asphixies l. asphixiés.
— 157. — vorl. statt Guthrin l. Guthrie.
— 158. — 1. statt Anzeichen l. Zeichen.
— 158. — 28. statt Gordane l. Gardane.
— 159. — 4. statt thönenern l. thönernen.
— 159. — lezte statt d. Herrmann l. d'Hurmann.
— 160. — 7. statt laßt l. läst.
— 161. — 3. statt Pfund l. Pfund.
— 161. — 6. statt Drossel l. drosselnder.
— 161. — 16. nach Salz l. ,
— 163. — nach Z. 2. l. 1.
— 163. — 3. statt Verroog l. Vertoog.
— 163. — 3. statt ongeneyne l. ongemeyn.
— 163. — 4. statt tchadetyne l. tkadelyke.
— 163. — 6. statt Puche l. Puihn.
— 164. — 15. statt les l. las.

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite 164. Zeile 22. ſtatt ornement l. ornament.
— 164. — 23. ſtatt Carls l. Caels.
— 166. — 22. ſtatt Krampf l. Krapf.
— 166. — vorl. ſtatt Kwiatkmorky l. Kwiatonosky.
— 167. — 18. ſtatt Kollani l. Kolbani.
— 170. — 7. ſtatt betrübt l. betäubt.
— 170. — 8. ſtatt vor l. von.
— 170. — 19. ſtatt daran l. davon.
— 175. — 20. nach verfallen l. ſahen.
— 176. — 24. ſtatt den l. dem.
— 180. — 18. ſtatt ſeinem l. ſeine.
— 184. — 17. ſtatt Gift l. Gegengift.
— 187. — 6. ſtatt beſtaubt l. beſtäubt.
— 187. — 15. 16. ſtatt einförmigen l. einfärbigen.
— 187. — 27. ſtatt medic. l. medic.
— 187. — vorl. ſtatt Stolpart l. Stalpart.
— 188. — lezte ſtatt Puiſe l. Puihn.
— 189. — 3. ſtatt blos l. blas.
— 189. — 19. ſtatt Mulothria l. Melothria.
— 197. — 15. 16. ſtatt Conenelin l. Commelin.
— 199. — 4. ſtatt der l. den.
— 202. — 2. ſtatt müſſen l. miſſen.
— 203. — 6. ſtatt Macbrids l. Macbride.
— 204. — vorl. ſtatt Phytagorae l. Pythagorae.
— 205. — 26. ſtatt Hauteſiers l. Hauteſierk.
— 209. — 9. nach Zwiebelgewächſe l.
— 212. — 14. nach nicht l. nur.
— 212. — 25. 26. ſtatt Koſterzawsky l. Koſterzewsky.
— 212. — 27. ſtatt Willemot l. Willemet.
— 214. — 23. ſtatt und ſtumpf l. ſind ſtumpf.
— 218. — 7. ſtatt Fönugrel l. Fönugrek.
— 218. — 25. ſtatt F. l. J.
— 220. — 20. ſtatt Erwägung l. Erwähnung.
— 220. — 24. ſtatt Beddors l. Beddoes.
— 223. — 20. ſtatt northarn l. northern.
— 223. — 20. ſtatt particular ly l. particularly.
— 225. — 10. ſtatt untermiſcht l. unvermiſcht.
— 225. — 24. ſtatt Plank l. Plenk.
— 228. — 20. ſtatt Plank l. Plenk.
— 232. — 15. ſtatt denn l. nun.
— 237. — 13. ſtatt kleine l. keine.
— 239. — 15. ſtatt kleine l. keine.
— 258. — 7. ſtatt Thapſia l. Thapſia.
— 258. — 9. ſtatt in dem l. auf dem.

Seite

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite 262. Zeile 14. statt an l. von einander.
— 263. — 21. statt wastern l. western.
— 266. — vorl. statt Toppetti l. Tozzetti.
— 280. — 24. 25. statt indiques l. indiquer.
— 281. — 11. statt Samen l. Stamm.
— 282. — 2. statt Samengewächs l. Sommergewächs.
— 286. — 3. statt Aerzten l. Aerzte.
— 287. — 26. statt Ficrovanti l. Fioravanti.
— 299. — 6 statt habe l. hätte.
— 300. — 10. statt welchen l. welchem.
— 303. — 20. 21. statt scheichenden l. schleichenden.
— 305. — 25. statt Toppetti l. Tozzetti.
— 306. — 1. statt x) l. x),
— 316. — 7. statt Getreidsamen l. Getreidesamen.
— 317. — 10. statt bestart l. behart.
— 320. — 15. statt welchen l. welchem.
— 320. — 23. statt pro l. pro.
— 320. — vorl. statt usueles l. ufuelles.
— 325. — 1. statt Schuh l. Schuhe.
— 330. — 5. statt atbantischen l. atlantischen.
— 337. — 3. statt aus l. aus der.
— 345. — 9. del. haben.
— 349. — 2. statt grose Eisenbleche l. grosen Eisenblechen.
— 349. — 8. statt Celnus l. Oelnus.
— 349. — 35. statt Cassacae l. Cassavae.
— 351. — 17. statt den l. der.
— 355. — 17. statt Knopse l. Knospe.
— 357. — lezte statt igric. l. ingric.
— 362. — 8. statt vollgespannt l. voll gespannt.
— 363. — 23. statt frust. l. fruct.
— 365. — 16. statt einen l. einem.
— 367. — 17. statt Dossin l. Dossie.
— 369. — 24. statt Lengov l. Lemgov.
— 372. — vorl. statt servaire l. servire.
— 374. — 2. statt auf einem l. einen.
— 374. — 23. statt Murrey l. Murray.
— 381. — 2. statt den l. dem.
— 392. — 24. statt ὑποζυγυον l. ὑποζυγιων.
— 392. — 25. statt ἀφρον l. ἀφρου.
— 392. — vorl. statt ὁποοτουτου l. ὁπου· τουτου.
— 392. — lezte statt ἀπελυφλουν l. ἀπετυφλουν.
— 393. — 15. statt Rindgrases l. Riedgrases.
— 398. — 16. statt den l. denn.

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite 403. Zeile 17. ſtatt Ultraſ. l. Ultraj.
— 409. — 4. ſtatt Bitterſus l. Bitterſüs.
— 417. — 25. ſtatt Willdemann l. Willdenow.
— 423. — 27. ſtatt wird l. ward.
— 424. — 6. del. ſind.
— 425. — 10. ſtatt Volga l. Wolga.
— 436. — 30. ſtatt Lacune l. Lacuna.
— 442. — 26. ſtatt Bauron l. Bauren.
— 446. — 9. ſtatt Mayerer l. Mayerne.
— 447. — 27. ſtatt Toppetti l. Tozzetti.
— 451. — lin. antepenult. ſtatt Scoticat. l. Scoticar.
— 452. — 6. ſtatt Azaſea l. Azalea.
— 454. — 22. ſtatt ὑγιαινοντοις l. ὑγιαινοντας.
— 454. — vorl. ſtatt ἰσχριης l. ἰσοριης.
— 455. — 23. ſtatt rauhe l. rauche.
— 460. — 11. ſtatt Farbe l. Krone.
— 453. — 24. ſtatt ſolchen l. ſolcher.
— 464. — 18. ſtatt Bibrelund l. Bjärnlund.
— 465. — lin. antepen. ſtatt Giftkrankheiten l. Gichtkrankheiten.
— 468. — 6. ſtatt ſeinen l. dieſen.
— 469. — 27. ſtatt Nabenblättchen l. Nebenblättchen.
— 496. — 5. 6. ſtatt Toppetti l. Tozzetti.
— 497. — 14. ſtatt ſtarben l. ſterben.
— 507. — 16. ſtatt Samen l. Namen.
— 513. — 3. ſtatt Meniſpernum l. Meniſpermum.
— 518. — 3. 4. ſtatt Steifigkeiten l. Steifigkeit.
— 521. — 19. ſtatt Wepfer l. Weber.
— 522. — 5. ſtatt Blume l. Blumen.
— 525. — 23. ſtatt perſonat. l. perſanat.
— 535. — 26. ſtatt einige l. bei einigen.
— 539. — 6. ſtatt ſehr l. ſo ſehr.
— 539. — 9. ſtatt ſtrömten l. ſtrömte.
— 554. — 14. ſtatt Amourup l. Amoureux.
— 556. — 7. ſtatt mindre l. minder.
— 560. — 24. ſtatt wirkt l. wirke.
— 564. — 15. ſtatt Kraſcheminikow l. Kraſchenninikow.
— 575. — 4. ſtatt Parzenkrant l. Barzenkraut.
— 582. — 26. ſtatt Liſett l. Liſetti.
— 588. — 4. ſtatt ſtehenden l. ſtechenden.
— 598. — 15. ſtatt Toppetti l. Tozzetti.
— 604. — 23. 24. ſtatt Toppetti l. Tozzetti.
— 606. — 6. ſtatt den l. das.

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite 606. Zeile 6. ſtatt der l. das.
— 606. — 7. ſtatt gebraucht l. gemacht.
— 609. — 4. ſtatt Kaiſin l. Raiſin.
— 611. — 3. ſtatt Schweizer l. Schweizern.
— 611. — 4. ſtatt Arpli l. Aepli.
— 611. — 7. ſtatt Viventi l. Viventi.
— 615. — vorl. ſtatt Agrell l. Acrell.
— 616. — 24. ſtatt Wahlborn l. Wahlboom.
— 630. — 18. ſtatt Erigenon l. Erigeron.
— 631. — 21. ſtatt acra l. acre.
— 631. — lezte ſtatt Kropf l. Krapf.
— 632. — 8. nach Schwämme l. n).
— 635. — 27. ſtatt Toppetti l. Tozzetti.
— 636. — 17. — — — l. — —
— 637. — 11. — — — l. — — u. a.
— 639. — 10. ſtatt hiernach l. hernach.
— 655. — 3. ſtatt Mericlius l. Merulius.
— 656. — 1. ſtatt Hydrum l. Hydnum.
— 665. — 11. ſtatt Munde l. Magen.
— 675. — 15. ſtatt Wurabi l. Wurali.
— 683. — 4. ſtatt Speige l. Spize.
— 684. — 22. ſtatt der l. die.
— 687. — 4. ſtatt Suricamiſchen l. Surinamiſcher.
— 704. — 18. ſtatt ſtarben l. ſterben.
709. — 13. ſtatt Turnere l. Turner.
— 718. — 24. ſtatt Vividet l. Viridet.
— 724. — 2. ſtatt Surach l. Sumach.
— 729. — 13. ſtatt durchzogen l. durchgezogen.
— 729. — 14. nach wenn l. man.
— 729. — 25. ſtatt Reintion l. Relation.
— 736. — 13. ſtatt danos l. annos.
— 737. — 6. ſtatt Dreſſches l. Dreſſcher.
— 737. — 24. ſtatt Schaentlich l. Schaertlich.
— 738. — 1. venenre l. veneree.
— 739. — 26. ſtatt Trammsdorff l. Tromms-
— dorff.
— 740. — 27. ſtatt apiatorum l. opiatorum.
— 740. — 28. ſtatt egendi l. agendi.
— 741. — 17. ſtatt Bordon l. Bordeu.
— 747. — 16. ſtatt ihr l. der.
— 756. — 21. 22. ſtatt nacurelle l. naturelle.
— 760. — 16. ſtatt ſüſen l. ſüſem.
— 761. — lezte ſtatt Bornier l. Bernier.
— 769. — 15. ſtatt Langriſch l. Langriſh.

www.dlibra.wum.edu.pl

Seite 769. Zeile 25. ſtatt experience l. experiences.
— 772. — 6. ſtatt gelüſtet l. gelüſtete.
— 786. — 5. ſtatt Zähne l. zähen.
— 792. — 13. del. α).
— 792. — 16. nach Krankheit l. d).
— 802. — 26. ſtatt Schwanne l. Schwamm.
— 804. — 12. nach Mandeln l. Nüſſe, Buchekern.
— 811. — antepen, ſtatt Natran l. Natron.

www.dlibra.wum.edu.pl

Studium Historii Medycyny
WUM
SHM 1114
122000001114

www.dlibra.wum.edu.pl